

Rapport d'observations – Trip Report

À Fuerteventura du 15 au 21 octobre 2003



Introduction

Lorsque mon épouse m'a proposé d'aller passer une semaine à Jandia sur Fuerteventura dans le bel hôtel de la brochure - surplombant 24 km de plage de rêve - je n'imaginai pas qu'à côté de cela, cette île renfermait autant d'attraits pour un amoureux de la nature.

Les plages sont superbes ; le sable d'une finesse égale à celui de notre littoral belge ; le soleil excessivement généreux en cette mi-octobre ; la t° avoisine les 26° le jour et 20° la nuit ; les canariens sont accueillants et l'infrastructure hôtelière irréprochable... Voilà pour Madame !

Pour Monsieur, maintenant : « Les plages sont superbes etc... » et ... il y a ces merveilleux oiseaux qu'on trouve sur le littoral mais plus souvent dans ces steppes semi-désertiques, bénéficiant du statut de Parc Naturel, au Sud, au Centre-Est et au Nord-Ouest de l'île.



Quelques réflexions

Avant de vous faire une liste de mes observations de cette semaine, je livre quelques réflexions qui pourraient aider le futur touriste qui aimerait visiter Fuerteventura et faire un peu de birdwatching :

- Les routes principales sont très bonnes mais, malheureusement, l'observation des oiseaux y est très difficile car les accotements ne sont pas stabilisés, les touristes sont assez nombreux et le parking très hasardeux. Les routes secondaires sont moins fréquentées donc plus fréquentables pour l'ornithologue et les pistes (tracks) sont tranquilles.
- L'essence est très bon marché.
- L'observation des oiseaux est - bien entendu - beaucoup plus productive le matin que l'après-midi mais j'ai fait quelques belles observations également l'après-midi. Le soir est très bon pour le seawatching mais je n'ai pas observé d'espèce « spéciale ».
- Les distances entre la pointe SW et le Nord sont assez importantes (plus de 100 km) et j'ai hésité plusieurs fois à rejoindre seul les sites prestigieux du Nord de l'île décrits dans les guides. Heureusement, j'ai trouvé mon bonheur - et mes oiseaux du désert - également dans le Sud.



Liste des espèces – Check List

Puffin cendré (*Calonectris diomedea borealis*)- Cory's Shearwater

Observé en mer chaque soir. Quelques comptages : 20 ex. sur ¼h à Morro Jable le 15 et le même nombre à Jandia le 19 ; 150 ex sur 1h à Jandia le 20 et 200 ex sur 1h le 21 par grand vent, toujours à Jandia.

Héron gardebœufs (*Bubulcus ibis*) - Cattle Egret

2 observations : 1 ex à Morro Jable le 20 et un autre à El Castillo le 21.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) - Little Egret

Observé une dizaine d'exemplaires : à Los Molinos ; à la réserve de Catalina Garcia près de Tuineje lors de 2 visites sur le site les 17 et 21 ; à Jandia (3ex le 18).

Héron cendré (*Ardea cinerea*) - Grey Heron

5 observations à différentes dates sur différents sites y compris un exemplaire dans le semi-

désert.

{ Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus*) – Sacred Ibis }

5 ex fréquentaient régulièrement la plage de Jandia tôt le matin à l'heure où les touristes dorment toujours. Le 16, ils étaient accompagnés d'un Ibis rouge (zoo de Jandia à 4 km) !

Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) – Spoonbill

A La Lajita le 16, 1 ex se dirigeait vers l'Océan.

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*) - Ruddy Shelduck

Un couple fréquentait le plan d'eau de Catalina Garcia les 17 et 21. Un garde local m'a signalé la rareté et le caractère exceptionnel de la nidification sur le site de cette jolie espèce marocaine.



Fuligule à bec cerclé (*Aythya collaris*) - Ring-necked Duck

A défaut de la Sarcelle marbrée - elle aussi « chouchoutée » par les naturalistes locaux - la seconde espèce d'anatidé que j'ai observé sur Fuerteventura et à Catalina Garcia est une paire de mâles de cette espèce américaine. J'avoue cependant n'avoir pas reconnu un vol d'une 40aine de canards le 16 dans le lointain (peut-être des sarcelles) !

Percnoptère d'Égypte (*Neophron percnopterus*) - Egyptian Vulture

Un adulte est venu se faire admirer longuement le 21 près de Tuineje.

Buse variable (*Buteo buteo*) – Buzzard

Observé seulement 4 ex vers Tuineje sur tout le séjour malgré l'abondance de petites proies-écureuils sur toute l'île.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus canariensis*) – Kestrel

De 2 à 6 exemplaires chaque jour : sur les côtes comme à l'intérieur des terres.



Faucon de Barbarie (*Falco pelegrinoides*) – Barbary Falcon

3 exemplaires ont été observés : 1 juvénile chassant le pigeon à La Lajita le 16 ; 1 adulte à Los Molinos le 22 et 1 ex à Catalina Garcia le même jour.

Perdrix gabra (*Alectoris barbara*) - Barbary Partridge

Malgré mes prospections répétées des steppes désertiques, je n'ai observé qu'une seule troupe de 8 ex à La Pared le 21.

Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*) – Moorhen

2 ex à Catalina Garcia le 17.

Foulque macroule (*Fulica atra*) – Coot

Une vingtaine d'ex à Catalina Garcia les 17 et 21.

Outarde houbara (*Chlamydotis undulata*) - Houbara Bustard

Un mâle de l'espèce pour laquelle j'avais choisi de passer mes vacances à Fuerteventura (ce n'est finalement pas mon épouse) s'est montré à mes yeux le 19 à La Pared vers midi. Je remercie ici le chauffeur du 4X4 qui en passant sur la piste en contre-bas l'a fait se lever et me l'a fait repérer !

Échasse blanche (*Himantopus himantopus*) - Black-winged Stilt

3 ex dont un juvénile étaient présents à Catalina Garcia les 17 et 21.

Courvite isabelle (*Cursorius cursor*) - Cream-coloured Courser

4 ex très coopérants avec l'observateur le 17 à Tindaya et 7 ex tout aussi coopérants le 19 à La Pared.

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*) - Ringed Plover

Il y avait 5 ex sur la plage de Jandia le 15 et 1 individu a également été observé en vol lors d'une séance de seawatching le 19.

Petit gravelot (*Charadrius dubius*) - Little Ringed Plover

5 ex étaient sur la plage de Jandia le 15 et 1 ex a été détecté le 19 en vol lors d'une séance de seawatching.

Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*) - Common Sandpiper

Un exemplaire à Los Molinos en bordure de mer le 17 ainsi qu'un ex à Catalina Garcia le 21.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) – Greenshank

Un exemplaire le 17 et le 21 à Catalina Garcia.

Goéland leucophée (*Larus cachinnans atlantis*) – Yellow-legged Gull

Assez nombreux sur les côtes ; présence à l'intérieur des terres également.

Goéland brun (*Larus fuscus graelsii*) - Lesser Black-backed Gull

Régulier avec un maximum de 50 ex le 15 à Jandia.

Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*) - Sandwich Tern

3 ex à Jandia le 18 et 4 ex le 19 au même endroit.

Ganga unibande (*Pterocles orientalis*) - Black-bellied Sandgrouse

J'ai eu l'occasion d'observer cette espèce, que j'apprécie tout particulièrement, à de nombreux exemplaires notamment dans le semi-désert de La Pared le 19 : au moins 44 ex se sont montrés en vol en 3 ou 4 groupes + 1 ex posé pour le plaisir de l'observateur. Entendu et observé également 5 ex le 17 à Tindaya et 6 ex le 21 à La Pared encore.

Pigeon biset (*Columba livia*) - Rock Dove

Observé souvent sur les rochers ou ailleurs mais pas dénombré vu les interférences avec les nombreux individus féraux fréquentant tous les milieux de l'île.

Tourterelle maillée – (*Streptopelia senegalensis*) – Laughing Dove

Une surprise de retrouver un exemplaire adulte de cette espèce sur la petite falaise en face de ma fenêtre à l'hôtel de Jandia le 16 !

Tourterelle turque – (*Streptopelia decaocto*) - Collared Dove

Vraiment très abondante notamment au « Jardin botanique » de La Lajita.



Martinet unicolore – (*Apus unicolor*) – Plain Swift

Observé uniquement sur la péninsule de Jandia de 2 à 5 ex maximum à partir du 15.

{ Conure veuve – (*Myiopsitta risoria*) – Monk Parakeet }

Quelques dizaines d'individus faisaient un réel tintamarre en ville et autour des hôtels à Jandia. Cette espèce - qui en Belgique est parfois appelée Perriche jeune-veuve ou ailleurs perruche souris - se reproduit depuis quelques années sur l'île et ne passe pas inaperçu.

Huppe fasciée (*Upupa epops*) – Hoopoe

Ce gracieux oiseau a été observé presque chaque jour ; un groupe de 5 ex au moins se nourrissait dans le désert à Costa Calma le 16.

Alouette pispolette (*Calandrella rufescens polatzeki*) - Lesser Short-toed Lark

Sympathique petite alouette de la sous espèce polatzeki finement rayée qui se déplace parfois en groupes imposants : par exemple, j'ai observé plus de 150 ex à La Pared le 16 et 200 ex le 19 sur le même site. Des individus étaient rencontrés ici et là dans les zones désertiques et alentour.



Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) – Sand Martin
2 ex en vol au-dessus du jardin botanique de La Lajita le 16.

Pipit de Berthelot (*Anthus berthelotii*) – Berthelot's Pipit
J'ai observé un premier exemplaire de cette espèce endémique aux îles Canaries quelques heures après ma descente d'avion à Tuineje et je l'ai revue tous les jours parfois « dans mes pieds » ou à quelques mètres. Cette espèce fréquente tous les milieux y compris le désert et les hôtels de luxe !



Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) - White Wagtail
Un ex entendu le 17 et 10 ex observés autour d'une ferme à chèvres à La Pared le 18.

Tarier des Canaries (*Saxicola dacotiae*) – Fuerteventura Chat
Uniquement présent à Fuerteventura (d'où sa dénomination anglaise), ce petit tarier assez pâlot - surtout la femelle - m'a donné une petite peur car il m'a fallu 3 jours pour trouver le premier exemplaire. Observations d'un mâle à Los Molinos le 17 ; 1 couple à Esquinzo le 18 ; 1 mâle à La Pared le 18 ; enfin 1 couple à Tuineje le 21.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) – Wheatear
3 observations : à Costa Calma le 16 ; à Morro Jable le 20 et 1 mâle le 21 à La Pared.

Fauvette à lunettes (*Sylvia conspicillata*) - Spectacled Warbler
Régulièrement observée dans les salicornes en bordure d'océan et dans les buissons sur les flancs de coteaux. De l'ordre de 25 observations au total de la semaine.

Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) - Sardinian Warbler
Entendu quelques fois et observé 1 ex vers Tuineje le 21.

Pie-grièche méridionale (*Larus meridionalis*) – Southern Great Grey Shrike
L'espèce « la plus en vue » à Fuerteventura car elle se montre régulièrement sur les fils électriques (au contraire des tariers locaux) ou sur les branches, les poteaux etc. La sous-espèce présente sur l'île devrait être *koenigi* avec un court sourcil mais je n'ai aperçu celui-ci que rarement (voir photo) ; de 2 à 5 observations quotidiennes. Son alimentation doit certainement comprendre les innombrables papillons fréquentant l'île ainsi que les petits lézards trouvés dans les zones semi-désertiques.



Grand corbeau (*Corvus corax*) – Raven
Plusieurs observations quotidiennes de cette espèce très expressive dont 1 ex sur le toit de l'hôtel voisin à Jandia le 20.

Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*) – Spanish Sparrow
Des groupes pouvant atteindre les 200 ex dans les villages et dans les zones cultivées.

Roselin githagine (*Bucanetes githagineus*) - Trumpeter Finch
Un groupe dépassant les 150 ex a été observé à La Lajita le 17 et des petits groupes se trouvaient souvent dans les zones agricoles ou semi-désertiques. Plusieurs oiseaux chanteurs et « trompetteurs » ont été observés.

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) – Linnet
Quelques individus ici et là totalisant la trentaine d'exemplaires sur le séjour.

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) – Goldfinch
2 ex en vol à Costa Calma le 18.

Autres observations :

Un petit écureuil dont je traduirai le nom anglais par Ecureuil de Barbarie (*Atlantoxerus getulus*) a été introduit sur l'île et se retrouve sur chaque monticule, mur ou tas de pierres.



J'ai observé des lapins à 3 reprises ; un gecko une seule fois ; des petits lézards (*Gallotia atlantica* ?) font de brèves apparitions dans le désert.

Des papillons migrants (et autres ?) étaient présents par milliers notamment dans le jardin botanique de La Lajita .

Novembre 2003-10-30

Textes et photos de Charly Farinelle

136 Rue de la Rochette 4400 Flémalle Belgium

cfarinelle@teledisnet.be

