

Voyage sur l'île de Lesbos du 26 avril au 3 mai 2004



Retour à Lesbos

Après avoir participé à un voyage ornithologique à Lesbos en mai 2003, j'ai confectionné un petit rapport d'observations pour faire bénéficier les copains de mon expérience. Ce rapport a plu à pas mal de personnes et il a donné l'envie à d'autres naturalistes de faire également ce séjour sur l'île grecque fin avril - début mai. Par exemple, Jacques m'a demandé des renseignements et c'est ainsi que je me suis fait embarquer -non pas pour Cythère- mais, de nouveau pour Lesbos (ou Lesbos) en ce printemps 2004...

Et je ne l'ai pas regretté car l'île est toujours aussi belle et accueillante, la nature aussi merveilleuse et les oiseaux aussi présents et nombreux. A propos de ceux-ci, je me suis aperçu une nouvelle fois que le printemps est vraiment une période merveilleuse car, en cette saison, les oiseaux revenant de leur site d'hivernage décident ou pas de passer à tel endroit et à telle période et les observations d'une année peuvent différer sensiblement d'une année à l'autre ! Le meilleur exemple est cette invasion de l'île par les Faucons kobez en 2004 alors que nous n'avions fait que les apercevoir l'année précédente -au dernier jour de notre séjour.

L'ornithologie est tout de même un hobby merveilleux ! Car en plus, au cours de ce voyage nous avons fait la connaissance, ma femme et moi, de personnes passionnées, charmantes, vraiment sympathiques.



Liste des oiseaux

- Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : 2 ou 3 individus au marais de Kalloni.
- Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : quelques observations
- Puffin yelkouan (*Puffinus (yelkouan) yelkouan*) : espèce très présente le long des côtes ; un début de soirée au temple de Dyonisos près de Polichnitos nous a permis d'en observer plus de 200 ex
- Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*) : quelques observations notamment le long de la côte en face de la Turquie
- Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) : peu d'observations comparativement à un voyage précédent : de l'ordre de 15 ex notamment à Kalloni et à Sigri.
- Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) : un ex. sur l'East River puis 5 ex
- Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) : le héron le plus fréquemment observé
- Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : commune
- Grande aigrette (*Egretta alba*) : 1 ou 2 ex quotidiennement
- Héron cendré (*Ardea cinerea*) : assez commun
- Héron pourpré (*Ardea purpurea*) : observé fréquemment notamment un vol crépusculaire d'une 20aine d'ex aux salines de Kalloni
- Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : seulement quelque 5 ex sur tout le séjour
- Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : une 20aine d'ex au total
- Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*) : une 50aine d'exemplaires observés au total avec les habitués du marais de Kalloni
- Flamant rose (*Phoenicopterus ruber*) : environ 400 ex dans les salines de Kalloni.
- Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*) : plus de 25 ex observés au total dont la plupart aux salines de Kalloni mais aussi dans les prairies, sur les côtes etc.
- Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : 6 ex dans les salines de Kalloni
- Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) : 1 ex à Kalloni
- Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : 1 ex
- Aigle de Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*) : 3 ex dont un couple à Molivos
- Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : de 8 à 10 observations.
- Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : une dizaine d'observations au total
- Busard St-Martin : 1 ex

- Busard cendré (*Circus pygargus*) : une petite dizaine d'observations aux alentours des salines de Kalloni.
- Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) : 1 ex
- Buse variable (*Buteo buteo*) : commune
- Buse féroce « rufinus » (*Buteo rufinus rufinus*) : une 10aine d'observations de ce beau rapace
- Faucon crécerellette (*Falco naumanni*) : une quinzaine d'individus près de Sigri.
- Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : assez commun
- Faucon kobez (*Falco vespertinus*) : une véritable invasion sur l'île de cette magnifique espèce - notamment au début du séjour- nous a apporté de 150 à 200 ex observés dans toutes les conditions : posés, en chasse, en vol migratoire. La majorité était du sexe mâle mais de nombreuses femelles faisaient partie du tourbillon.



- Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) : 4 ex observés
- Faucon d'Éléonore (*Falco eleonora*) : 3 ex en phase claire sur tout le séjour
- Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : 3 ex observés dont l' « habituel » en face de Rabbit Island.
- Perdrix choukar (*Alectoris chukar*) : 6 ex au total dont 2 vers le monastère de Eftalou
- Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : entendu 2 fois à Kalloni
- Marouette poussin (*Porzana parva*) : 1 ex vue.
- Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*) : assez commune
- Foulque macroule (*Fulica atra*) : rarement observé : 5 à 6 ex au marais de Kalloni
- Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) : commun à Kalloni Pool, Parakila et sur les salines de Kalloni avec un maximum de 20 individus ensemble.
- Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*) : observé uniquement dans les salines de Kalloni avec un effectif de environ 100 oiseaux
- Oédicnème criard (*Burhinus oedicephalus*) : quelques observations seulement avec un total proche de 5 ex
- Glaréole à collier (*Glareola pratincola*) : une 100aine d'ex seront observés aux salines de Kalloni en quelques jours
- Petit gravelot (*Charadrius dubius*) : observé quotidiennement surtout sur les rivières.
- Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) : présent dans la région de Kalloni.
- Vanneau éperonné (*Hoplopterus spinosus*) : 1 ex à Kalloni
- Bécasseau minute (*Calidris minuta*) : présent dans les salines de Kalloni et sur les rivières (East River notamment) avec un total d'ex observés supérieur à 150 exemplaires.

- Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*) : observé régulièrement sur l'East River au début du séjour avec un total avoisinant les 30 ex
- Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) : observé régulièrement en petit nombre (30)
- Bécasseau variable (*Calidris alpina*) : quelques exemplaires.
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*) : très commun notamment dans les salines de Kalloni et dans l'East River



- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : 1 ex à Kalloni
- Courlis cendré (*Numenius arquata*) : 2 ex à Kalloni
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : 1 ex dans les salines de Kalloni
- Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : une 15aine dans les salines de Kalloni et sur l'East River
- Chevalier stagnatile (*Tringa stagnatilis*) : 1 ex à Kalloni Pool.
- Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : ce chevalier est bien le plus commun de l'île
- Chevalier culblanc : (*Tringa ochropus*) : quelques ex
- Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : pas loin de 40 ex observés au total
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : 10 ex vers Kalloni
- Goéland railleur (*Larus genei*) : 1 adulte aux salines de Kalloni
- Goéland leucophée (*Larus cachinnans*) : abondant partout même à l'intérieur de l'île.
- Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*) : 10 ex à Kalloni Pool
- Sterne caspienne (*Sterna caspia*) : 1 ex aux salines
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) : régulière en petit nombre.
- Sterne naine (*Sterna albifrons*) : une 20aine d'observations dans les salines de Kalloni.
- Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*) : observation régulière avec un total d'une 40aine d'ex
- Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*) : total pour la semaine d'une 40aine d'individus à Kalloni
- Pigeon biset (*Columba livia*) : présent en petit nombre.
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : abondante sur toute l'île.
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : quelques observations
- Coucou gris (*Cuculus canorus*) : quelques chanteurs quotidiennement et quelques belles observations de la forme rousse.
- Petit duc scops (*Otus scops*) : 2 ex sont observés de jour dans les eucalyptus le long de la route Kalloni/Molivos



- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) : au moins 6 ex sont observés sur tout le séjour dont un exemplaire « très noir » (mélanique ?) aux salines de Kalloni
- Martinet noir (*Apus apus*) : quelques observations
- Martinet à ventre blanc (*Apus melba*) : une trentaine d'exemplaires observés dont plusieurs à Molivos
- Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : observations quotidiennes de cette jolie espèce notamment en passage migratoire
- Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) : 2 ex dont 1 à Sigri
- Huppe fasciée (*Upupa epops*) : assez commune.
- Pic mar (*Dendrocopos medius*) : quelques exemplaires aperçus ; l'espèce avait l'air d'être déjà très discrète
- Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) : un beau groupe de plus de 20 ex à Kandria plus quelques ex aux alentours des salines de Kalloni.
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : un des champions du point de vue quantitatif
- Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : assez commune notamment du côté de l'East River
- Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : abondante
- Hirondelle rousseline (*Hirundo daurica*) : de nombreux oiseaux en migration active et quelques couples nicheurs sont observés
- Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) : abondante
- Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : 1 ex aux salines de Kalloni
- Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) : 2 ex au total
- Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*) : environ 25 ex autour des salines de Kalloni
- Bergeronnette printanière « flava » (*Motacilla flava*) : observée dans les prés salés de Kalloni.
- Bergeronnette des Balkans (*Motacilla flava feldegg*) : plus courante que la précédente mais aucun nombre important n'est noté.



- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) : une dizaine d'observations
- Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) : 1 ex sur la rivière au sud de Vatera
- Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : 1 ex entendu
- Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*) : 2 ex près des salines de Kalloni et 1 ex à Sigri.
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : commun
- Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) : au moins 5 ex dans les oliveraies près de Sigri
- Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : une 15aine d'ex sont notés tout au long du séjour.
- Tarier pâtre (*Saxicola torquata*) : 5 observations
- Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*) : un ex dans la Vergias Valley
- Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : 5 ex ici et là
- Traquet oreillard « melanoleuca » (*Oenanthe hispanica melanoleuca*) : cette espèce appréciée par tout le groupe, très commune se retrouve partout sur l'île : son chant résonne dans ses 4 coins.
- Monticole bleu (*Monticola solitarius*) : 2 ex au total dont un nourrissage « à la sauterelle » au monastère d'Ipsilou
- Merle noir (*Turdus merula*) : assez commun surtout dans les milieux forestiers
- Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : commune et ne passant pas inaperçue
- Lusciniole à moustaches (*Acrocephalus melanopogon*) : 3 ou 4 ex traînaient dans les céréales à Kalloni
- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*) : une petite dizaine d'ex au total
- Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*) : quelques contacts
- Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*) : une dizaine d'observations au total
- Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*) : abondant mais ne remporte pas non plus la palme du « plus abondant »
- Hypolaïs des oliviers (*Hippolais olivetorum*) : quelques contacts sonores et 1 ex observé à Napi Valley

- Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) : nombreuses observations pouvant totaliser la 40aine d'ex au total
- Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) : plus ou moins 15 observations de cette jolie espèce
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*) : une 10aine de contacts
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : quelques chanteurs ici et là.
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : une 10aine de contacts également.
- Fauvette de Rüppel (*Sylvia rueppelli*) : près de la route à l'entrée de Molivos, il y avait au moins cinq chanteurs
- Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) : 1 ex migrateur
- Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : 1 seul exemplaire
- Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : une dizaine d'exemplaires du côté de Sigri
- Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*) : au moins 15 ex du côté de Sigri et Ipsilou
- Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : quelques ex notamment à Sigri et à Molivos.
- Mésange lugubre (*Parus lugubris*) : pas plus de 8 ex observés
- Mésange bleue (*Parus caeruleus*) : présente
- Mésange charbonnière (*Parus major*) : présente.
- Sittelle de Neumayer (*Sitta whiteheadi*) : rencontrée fréquemment là où se trouvent des rochers. On peut estimer le total d'observations à une 20aine
- Sittelle de Krüper (*Sitta krueperi*) : un oiseau nourrissant ses jeunes au nid dans la forêt près de Achladeri et quelques exemplaires entendus (4 sortes de cris) au même endroit

- Grimpereau des jardins (*Certhia familiaris*) : cris dans la forêt « à la Sittelle de Krüper »
- Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : commune
- Pie-grièche à poitrine rose (*Lanius minor*) : bien représentée : au moins 10 observations sur la semaine
- Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : assez commune un peu partout ; total d'observations de l'ordre de la trentaine
- Pie-grièche masquée (*Lanius nubicus*) : assez peu souvent observée : entre 10 et 15 exemplaires
- Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) : le geai de Lesvos a les joues blanches et se retrouve en petit nombre quand le milieu lui est favorable
- Choucas des tours (*Corvus monedula*) : observé autour de Sigri principalement.
- Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*) : commune.
- Grand corbeau (*Corvus corax*) : 2 fois 2 exemplaires.
- Lorient d'Europe (*Oriolus oriolus*) : pas plus de deux à quatre contacts au quotidien.
- Moineau domestique (*Passer domesticus*) : abondant
- Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*) : excessivement abondant
- Moineau soulcie (*Petronia petronia*) : un ex au monastère d'Ipsilou.
- Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : commun partout.
- Serin cini (*Serinus serinus*) : assez commun dans les forêts de pins notamment.
- Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) : assez commun
- Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) : commun
- Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) : une 15aine d'ex sur tout le séjour
- Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) : 1 ex à Napi
- Bruant zizi (*Emberiza cirrus*) : une 15aine de chanteurs.
- Bruant cendré (*Emberiza cineracea*) : 4 ex plus quelques chanteurs dans la Vergias Valley
- Bruant cendrillard (*Emberiza caesia*) : belle espèce bien présente surtout sur les rochers



- Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*) : assez peu remarqué au début du séjour mais arrivé en nombre impressionnant par la suite (parfois 3 chanteurs sur 100 m) ; il nous a semblé ne trouver ce magnifique oiseau que près de l'eau : près des côtes, les rivières, les marais ???
- Bruant proyer (*Miliaria calandra*) : très abondant : nous lui décernons le titre de l'oiseau champion quantitativement (hormis hirondelles et moineaux) à cause sa présence vocale

LiListe herpétologique

- Rainette verte (*Hyla arborea*) : chanteurs.
- Crapaud vert (*Bufo viridis*) : chanteurs
- Grenouille rieuse (*Rana ridibunda*) : chanteurs

- Emyde lépreuse (*Mauremys caspica*) : très commune.
- Agame (*Agame stellio*) : commun sur les rochers.
- Lézard vert des Balkans (*Lacerta trilineata*)
- Ophisops elegans
- Gecko sp rose



LiListe des mammifères

- Ecureuil de Perse (*Sciurus anomalus*)
- Pipistrelle (*Pipistrellus pipistrellus*)
- Chauve-souris sp

LiListe des papillons et autres insectes

- Hespérie (*Spialia orbifer*)
- Procris (*Coenonympha pamphilus*)
- Bronzé (*Lycaena phlaeas*)
- Thais balkanique (*Allanacstria cerisyi*)
- Flambé (*Iphiclides podalirius*)
- Aurore (*Anthocharis cardamines*)
- Machaon (*Papilio machaon*)
- Belle dame (*Cynthia cardui*)
- Vulcain (*Vanessa atalanta*)
- Argus bleu sp.



- Barbitiste
- Longicorne (*Dorcadion arenarium*)

Liste botanique

Impossible à établir vu notre faible niveau de compétence mais nous avons tout de même pu observer 4 espèces d'orchidées différentes (en ne cherchant pas beaucoup, il faut bien l'avouer car nous avons trop souvent « le nez en l'air ») et admirer une flore magnifique.



Sites visités

Kalloni, marais de Kalloni, salines de Kalloni, East et West River, Eftalou, Polichnitos, Molivos, Agiossos, Napy Valley, Sigri, monastère d'Epsilou, Vergias Valley



Salines de Kalloni



Bocage de Molivos



East River



Chapelle orthodoxe

Les gens de Lesbos

Pour terminer ce petit tour d'horizon, j'aimerais attirer l'attention du candidat visiteur sur l'accueil chaleureux, l'extrême gentillesse, la sérénité et la simplicité des habitants de l'île. Dire aussi que l'infrastructure hôtelière de l'île est impeccable (l'hôtel Pela, par exemple est un hôtel pas cher du tout et de bon accueil) et les buts d'excursion nombreux même si la Nature a cependant encore le premier rôle.



Dans les rues de Agiossos

Rapport réalisé par Charly Farinelle avec l'aide de Jacques, Philippe, Roger, François, Michel, Simone, Josiane, Laura et Nicole.



Photos de Nicole et Charly Farinelle, François Collard et Jacques Bultot (et Josiane qui n'est pas sur la dernière photo pas beaucoup plus que Nicole !)

Mai 2004

Charly Farinelle
Rue de la Rochette, 136
B-4440- Flémalle

Belgium

cfarinelle@teledisnet.be

