

Voyage au Yucatan du 02/10/04 au 16/10/04

Trip Report

Hormis une courte incursion sur la côte Est des Etats-Unis il y a une dizaine d'années, je n'avais jamais mis les pieds sur le continent américain.

Dans le cas présent, l'aventure ornithologique allait être totale car je m'attaquais en même temps aux espèces tropicales ou sub-tropicales du Yucatan et à celles, migratrices, du Nord du continent.



Circonstances

Mon épouse et moi, nous décidons d'aller passer nos vacances au Yucatan-Mexique.

Notre but est de visiter les grands sites archéologiques mayas puis de nous reposer sur la côte Est de la péninsule (en ce qui concerne ma femme) et d'observer et d'essayer d'identifier les oiseaux locaux (en ce qui me concerne).

La première partie de notre voyage consiste donc en un circuit guidé de 5 jours dans les principaux hauts-lieux de la civilisation maya puis en second lieu, un séjour d'une dizaine de jours dans un hôtel de luxe (dont je ne citerai pas le nom) du côté de Puerto Morelos entre Cancun et Playa del Carmen.

Sites visités

A peu près dans l'ordre chronologique de notre voyage :

- ° Valladolid : ville du centre de la péninsule ayant beaucoup de charme et où j'observe mes premiers vautours et oiseaux des villes. Izamal (couvent).
- ° Merida : grande ville de l'Ouest qui nous a plutôt servi de dortoir.
- ° Uxmal : peut-être le plus beau des sites mayas que nous avons visité mais peu d'oiseaux y ont été observé.
- ° Celestun : petite bourgade de la côte Ouest sur le golfe du Mexique. C'est là que je ferai le plus d'observations d'oiseaux d'eau notamment lors d'une excursion en bateau sur la lagune.

° Chichen Itza : le plus connu des sites archéologiques, en pleine forêt tropicale. Les oiseaux sont plus nombreux qu'à Uxmal et j'observe mes premiers orioles.



Pyramide de Chichen Itza - Marais de Puerto Morelos

° Puerto Morelos, le Jardin Botanique Dr Alfredo Barrera est une réduction de la forêt à visiter absolument. Je m'y rendrai à 3 reprises et j'y ferai la connaissance de Luis qui se dit le SEUL Birdwatcher yucatéque. Il m'aidera dans la découverte du « jardin » et de ses oiseaux mais m'indiquera également d'autres sites dans les environs.

° Puerto Morelos, la ville, sa mangrove, sa plage, son marais, sa forêt. N'ayant plus trop envie de faire des centaines de kilomètres, je resterai souvent dans cette zone et trouverai là-bas toutes les espèces désirées en ce qui concerne les ardéidés, les rapaces et autre martin-pêcheur. Il faut tout de même que j'ajoute que, mesurant les dimensions de la péninsule, j'ai beaucoup hésité à m'aventurer sur des sites ornithologiques prestigieux éloignés de plusieurs longues heures de déplacement (Rio Lagartos se trouvait à 5 heures de voiture de mon logement ; Sian Kaan –autre Réserve de la Biosphère- à 3 heures au moins) et sur des pistes dangereuses pour mon petit véhicule de location. Finalement, cette option s'est révélée bonne (et beaucoup moins stressante) car j'ai observé de nombreuses espèces et dans de bonnes conditions dans « mon petit coin ».

Je recommande à ceux qui voudraient « ratisser » complètement le Yucatan de bien choisir leurs étapes en fonction des sites à visiter.

° Cancun : sa lagune et sa côte sont intéressantes et nous avons passé une soirée à regarder les grands ardéidés et cormorans rejoindre leur dortoir.

° Coba : un très beau site maya et un bon site pour l'ornithologie ainsi que les lacs qui jouxtent l'endroit.

J'y ai effectué des photos extraordinaires du courlan (sorte de héron qui n'en est pas un !) à quelques mètres mais je les ai malheureusement « perdues » ! Grrr.

° Tulum : autre site sur la côte Est pas très loin de Puerto Morelos sur lequel –malgré le nombre élevé de visiteurs- j'y ai fait quelques belles observations.



La mer des Caraïbes aux environs de Tulum

Le Yucatan et les mexicains



Avant de parler d'oiseaux et de listes, je voudrais faire une parenthèse pour vous donner quelques impressions sur le pays que nous avons visité et sur les personnes (yucatéques se disant parfois mayas) que nous avons rencontrés.

° Les habitants sont extrêmement gentils, sympathiques et serviables. Les commerçants ne harcèlent pas le touriste ; les prix sont honnêtes (et l'essence très bon marché = 0,45 Eur/l en 2004). Les gens du peuple sont généralement très pauvres ce qui ne les empêche pas d'être toujours souriants, cherchant le contact avec l'étranger et pas forcément pour en retirer un bénéfice quelconque.

Jamais, non plus, nous n'avons eu un sentiment d'insécurité dans quelque endroit que ce soit alors que la police est très peu visible et peu répressive en apparence.

De plus, les conducteurs sont prudents (il faut tout de même préciser que les nombreux « casse-vitesse » peuvent facilement « casser » une voiture) et très « fair-play » : pas d'appel de phare, de coup de klaxon, d'injure ou de geste obscène en cas d'erreur de conduite.

° Les touristes sont nombreux (environ 85 % d'américains ; en octobre il y a également quelques français ... et des belges) mais restent souvent dans les hôtels ou sur les plages !

Spécialités locales à ne pas manquer

° la tequila locale, bien sûr, car jadis, le Yucatan a été un gros producteur de cet alcool mais les plantations d'agaves ont souvent été abandonnées par la suite. J'ai particulièrement apprécié la marque Hornitos ! Devinez pourquoi ?

° la bière blonde ou foncée

° la cuisine locale : tacos, tortillas, guacamole (purée à base d'avocat), enchiladas (viandes hachées), limes et bien sûr tous les produits de la mer.

° la douche tropicale : octobre est un mois où les pluies sont encore abondantes et le risque de se faire « doucher » est important. Se faire rincer par une pluie chaude puis se laisser sécher est une expérience que je qualifierai pour le moins d'agréable (température moyenne des 15 jours : 30° environ).

° la forêt tropicale : s'enfoncer dans la forêt seul et faire connaissance avec ses hôtes est une expérience inoubliable. Les cris des oiseaux, des singes et des batraciens ; des rencontres avec quelques-uns de ses habitants font partie des grands moments de la vie d'un naturaliste.



Cenote - Singe atèle - Iguane

Ouvrages utilisés

Steve Howell et Sophie Webb "A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America" éd. Oxford

Les Beletsky « Tropical Mexico » Ecotravellers' Wildlife Guide éd. Academic Press

Chandler Robbins Bruun et Sim "Guide des oiseaux d'Amérique du Nord" éd. D.N.

Le guide de Hoswell est La référence : très complet, très lisible mais le nombre de planches est réduit et les oiseaux ne sont pas tous représentés.

L'écoguide de Beletsky ne reprend qu'un certain nombre d'oiseaux : les plus représentatifs du Yucatan. Il permet une bonne approche de l'avifaune du pays mais aussi de toutes les classes animales de la région et il m'a été d'un grand secours sur le terrain vu mon manque total d'expérience sous ces latitudes.

Le guide des oiseaux d'Amérique du Nord est nécessaire pour identifier les migrateurs du Nord et notamment les oiseaux d'eau.

Malgré ces ouvrages, il est indéniable qu'un certain nombre des oiseaux à côté desquels je suis passé n'a pas été identifié : cette liste aurait été beaucoup plus étoffée avec un peu plus d'expérience ! Les espèces pour lesquelles j'ai eu une hésitation ne sont pas reprises dans cette liste.



Le prédateur (Laughing Falcon) et sa proie

Checklist

Oiseaux

Least Grebe (*Tachybaptus dominicus*) ou Grèbe minime : une dizaine notamment à Puerto Morelos PM
 Pied-billed Grebe (*Podilymbus podiceps*) ou Grèbe à bec bigarré : 1 ex à Punta Laguna et 1 ex à PM
 Brown Booby (*Sula leucogaster*) ou Fou brun : 1 ex à Cancun
 Neotropic Cormorant (*Phalacrocorax brasilianus*) ou Cormoran vigua : quelques rassemblements sur les côtes
 Double-crested Cormorant (*Phalacrocorax auritus*) ou Cormoran à aigrettes : quelques ex
 Anhinga (*Anhinga anhinga*) ou Anhinga d'Amérique : quelques ex à Coba, à Cancun et à PM



Anhinga d'Amérique



Jacana



Sterne royale

Magnificent Frigatebird (*Fregata magnificens*) ou Frégate superbe : omniprésente sur toutes les côtes
 Brown Pelican (*Pelecanus occidentalis*) ou Pélican brun : nombreux sur les côtes
 Great Blue Heron (*Ardea herodias*) ou Grand héron : environ 10 observations dans les milieux aquatiques

Great Egret (*Egretta alba*) ou Grande Aigrette : présente partout y compris sur les plans d'eau des hôtels
 Snowy Egret (*Egretta thula*) ou Aigrette neigeuse : très fréquente
 Little Blue Heron (*Egretta caerulea*) ou Aigrette bleue : observé environ 10 ex à PM et à Cancun
 Tricolored Heron (*Egretta tricolor*) ou Aigrette tricolore : 1 ex à Celestun
 Cattle Egret (*Bubulcus ibis*) ou Héron garde-bœufs : quelques ex à Coba
 Green Heron (*Butorides virescens*) ou Héron vert : observé à 4 reprises notamment à PM
 Bare-throated Tiger Heron (*Tigrisoma mexicanum*) ou Onoré du Mexique : 1 ex le soir à PM
 Yellow-crowned Night Heron (*Nyctanassa violacea*) ou Bihoreau violacé : 1 ex tôt le matin à PM
 Least Bittern (*Ixobrychus exilis*) ou Petit Blongios : 1 ex à Cancun, 1 autre à PM
 White Ibis (*Eudocimus albus*) ou Ibis blanc : 4 ex à Celestun, 20 ex sur une pelouse à Cancun, 55 ex à l'aéroport
 Roseate Spoonbill (*Platalea ajaja*) ou Spatule rosée : environ 4 ex à Celestun
 Wood Stork (*Mycteria americana*) ou Tantale d'Amérique : 3 ou 4 ex à Celestun
 American Flamingo (*Phoenicopterus ruber*) ou Flamant rose : environ 50 ex à Celestun
 Black-bellied Whistling-Duck (*Dendrocygna autumnalis*) ou Dendrocygne à ventre noir : 3 ex à PM
 Blue-winged Teal (*Anas discors*) ou Sarcelle à ailes bleues : 15 ex à PM et 4 ex à Cancun
 Black Vulture (*Coragyps atratus*) ou Urubu noir : omniprésent ; aux heures chaudes, souvent 250 ex à la fois
 Turkey Vulture (*Cathartes aura*) ou Urubu à tête rouge : souvent observé
 Lesser Yellow-headed Vulture (*Cathartes burrovianus*) ou Urubu à tête jaune : quelques ex
 Osprey (*Pandion haliaetus*) ou Balbuzard pêcheur : 3 ex à Celestun et 1 ex à Coba
 Common Black Hawk (*Buteogallus anthracinus*) ou Buse noire : au moins 1 ex à Celestun
 Grey Hawk (*Buteo nitidus*) ou Buse grise : 2 ex dont 1 ex à Uxmal
 Roadside Hawk (*Buteo magnirostris*) ou Buse à gros bec : 3 ex dont 2 à PM
 Short-tailed Hawk (*Buteo brachyurus*) ou Buse à queue courte : 1 ex à PM
 Laughing Falcon (*Herpetotheres cachinnans*) ou Macagua rieur : 3 ex dans les environs du JB de PM
 Peregrine Falcon (*Falco peregrinus*) ou Faucon pèlerin : 1 ex en vol au-dessus de la plage de Cancun
 Plain Chachalaca (*Ortalis vetula*) ou Ortalide chacamel : 1 famille à Merida et un groupe de 8 ex à PM
 Common Moorhen (*Gallinula chloropus cachinnans*) ou Gallinule poule-d'eau : très commune
 Limpkin (*Aramus guarauna*) ou Courlan brun : 2 ex très peu farouches à Coba
 Northern Jacana (*Jacana spinosa*) ou Jacana du Mexique : très commun sur les marais (> 50 ex)
 Black-necked Stilt (*Himantopus mexicanus*) ou Echasse d'Amérique : 1 ex à Cancun
 Black-bellied Plover (*Pluvialis squatarola*) ou Pluvier argenté : 2 ex (1 J) sur le rivage de PM
 American Golden Plover (*Pluvialis dominica*) ou Pluvier bronzé : 6 ex sur la plage de Celestun



Pluvier semipalmé ou Gravelot semipalmé

Semipalmated Plover (*Charadrius semipalmatus*) ou Pluvier semipalmé : très commun sur les rivages
 Wilson's Plover (*Charadrius wilsonia*) ou Pluvier de Wilson : une dizaine sur la plage de Celestun
 Snowy Plover (*Charadrius nivosus*) ou Pluvier neigeux : quelques ex à Celestun
 Willet (*Catoptophorus semipalmatus*) ou Chevalier semipalmé : au moins 10 ex sur la plage de Celestun
 Solitary Sandpiper (*Tringa solitaria*) ou Chevalier solitaire : 2 ex à PM dont un dans la mangrove
 Spotted Sandpiper (*Actitis macularia*) ou Chevalier grivelé : 8 à 10 ex à PM dont 2 en vol le dernier jour
 Ruddy Turnstone (*Arenaria interpres*) ou Tournepierrre à collier : abondant sur les rivages
 Short-billed Dowitcher (*Limnodromus griseus*) ou Bécassin à bec court : 7 ou 8 ex sur la plage de Celestun
 Sanderling (*Calidris alba*) ou Bécasseau sanderling : très commun sur les plages
 Least Sandpiper (*Calidris minutilla*) ou Bécasseau minuscule : commun sur les rivages
 Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*) ou Bécasseau semipalmé : une 20aine sur la plage de Celestun
 Laughing Gull (*Larus atricilla*) ou Mouette atricille : omniprésente sur les côtes
 Gull-billed Tern (*Sterna nilotica*) ou Sterne hansel : 4 ou 5 ex sur la plage de Celestun

Common Tern (*Sterna hirundo*) ou Sterne pierregarin : 3 ex sur la plage de Celestun
 Royal Tern (*Sterna maxima*) ou Sterne royale : très commune et magnifique
 Sandwich Tern (*Sterna sandvicensis*) ou Sterne caujek : une centaine sur la plage de Celestun
 Feral Pigeon (*Columba livia* ssp) ou Pigeon féral : nombreux



Pigeon à bec rouge



Conure aztèque



Urubu à tête rouge

Red-billed Pigeon (*Columba flavirostris*) ou Pigeon à bec rouge : une dizaine d'ex au marais de PM
 White-winged Dove (*Zenaida asiatica*) ou Tourterelle à ailes blanches : quelques ex à Merida
 Ruddy Ground-Dove (*Columba talpacoti*) ou Colombe rousse : présente partout y compris dans les villes
 Blue Ground-Dove (*Claravis pretiosa*) ou Colombe bleutée : assez fréquente
 Olive-throated (Aztec) Parakeet (*Aratinga nana astec*) ou Conure aztèque : une 20aine au JB de PM et environs
 Squirrel Cuckoo (*Piaya cayana*) ou Piaye écureuil : observé ce beau cuculidé à 3 reprises à PM
 Lesser Nighthawk (*Chordeiles acutipennis*) ou Engoulevent minime : quelques ex au marais de PM
 Vaux's Swift (*Chaetura vauxi*) ou Martinet de Vaux : très commun
 Black-headed Trogon (*Trogon melanocephalus*) ou Trogon à tête noire : 1 ex au Jardin Botanique
 Violaceous Trogon (*Trogon violaceus*) ou Trogon violacé : 2 ou 3 ex au JB
 Belted Kingfisher (*Ceryle alcyon*) ou Martin-pêcheur d'Amérique : observé sur tous les plans d'eau
 Yucatan Woodpecker (*Melanerpes pygmaeus*) ou Pic du Yucatan : observé fréquemment
 Golden-fronted Woodpecker (*Melanerpes aurifrons*) ou Pic à front doré : observé au JB
 Ruddy Woodcreeper (*Dendrocincla homochroa*) ou Grimpar roux : 1 ex au JB
 Ivory-billed Woodcreeper (*Xiphorhynchus flavigaster*) ou Grimpar à bec ivoire : 2 ex à PM
 Eastern Wood-Pewee (*Contopus virens*) ou Pioui de l'Est : observé au JB de PM
 Tropical Pewee (*Contopus cinereus*) ou Moucherolle cendré : assez commun



Tyran quiquivi



Moucherolle cendré



Tyran quiquivi

Great Kiskadee (*Pitangus sulphuratus*) ou Tyran quiquivi : très commun autour des habitations et très familier
 Boat-billed Flycatcher (*Megarhynchus pitangua*) ou Tyran pitangua : observé au moins à Chichen Itza
 Social Flycatcher (*Myiozetetes similis*) ou Tyran sociable : commun
 Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*) ou Tyran mélancholique : commun
 Couch's Kingbird (*Tyrannus couchii*) ou Tyran de Couch : 1 ex observé au JB
 Masked Tityra (*Tityra semifasciata*) ou Tityre masqué : 2 ex dont 1 ex à Vallarta et l'autre au JB
 Purple Martin (*Progne subis*) ou Hirondelle noire : plusieurs ex notamment à PM
 Mangrove Swallow (*Tachycineta albilinea*) ou Hirondelle des mangroves : plusieurs à Celestun et à PM
 Cave Swallow (*Hirundo fulva*) ou Hirondelle à front blanc : notamment observée à Celestun et Izamal
 Green Jay (*Cyanocorax yncas*) ou Geai vert : un groupe de 5 ex à PM

Brown Jay (*Cyanocorax morio*) ou Geai enfumé : 1 ex en vol au dessus de la route à PM
 Yucatan Jay (*Cyanocorax yucatanicus*) ou Geai du Yucatan : nombreux groupes bruyants à PM
 Tropical gnatcatcher (*Polioptila plumbea*) ou Gobemoucheron tropical : 1 ex au JB
 White-breasted Wood-Wren (*Henicorhina leucosticta*) ou Troglodyte à poitrine blanche : 1 ex à Valladolid
 Blue-gray Gnatcatcher (*Polioptula caerulea*) ou Gobemoucheron gris-bleu : 1 ex sur le site de Chichen Itza
 Grey Catbird (*Dumetella carolinensis*) ou Moqueur chat : plusieurs ex dans des milieux divers
 Black Catbird (*Dumetella glabrirostris*) ou Moqueur noir : assez commun
 Tropical Mockingbird (*Mimus gilvus*) ou Moqueur des savanes : très commun et très démonstratif



Yucatan Vireo (*Vireo magister*) ou Viréo du Yucatan : une observation au JB de PM
 Tennessee Warbler (*Vermivora peregrina*) ou Paruline obscure : qq ex au JB
 Nashville Warbler (*Vermivora ruficapilla*) ou Paruline à joues grises : 1 ex à Celestun
 Northern Parula (*Parula americana*) ou Paruline à collier : 1 ex au JB
 Magnolia Warbler (*Dendroica magnolia*) ou Paruline à tête cendrée : nombreuses avec e.a. 1 ex à Merida
 Yellow-throated Warbler (*Dendroica dominica*) ou Paruline à gorge jaune : 2 ex à Merida
 Black-and-white Warbler (*Mniotilta varia*) ou Paruline noir et blanc : nombreuses au JB
 American Redstart (*Setophaga ruticilla*) ou Paruline flamboyante : 1 ex au JB de PM
 Prothonotary Warbler (*Protonotaria citrea*) ou Paruline orangée : 1 ex au JB
 Worm-eating Warbler (*Helmitheros vermivorus*) ou Paruline vermivore : 2 ex au JB
 Ovenbird (*Seiurus aurocapillus*) ou Paruline couronnée : qq ex au JB
 Northern Waterthrush (*Seiurus noveboracensis*) ou Paruline des ruisseaux : nombreuses y compris à l'hôtel
 Common Yellowthroat (*Geothlypis trichas*) ou Paruline masquée : 1 ex à PM
 Hooded Warbler (*Wilsonia citrina*) ou Paruline à capuchon : qq ex dont 1 ex à Valladolid
 Wilson's Warbler (*Wilsonia pusilla*) ou Paruline à calotte noire : 1 ex à Valladolid et 1 ex à PM
 Bananaquit (*Coereba flaveola*) ou Sucrier à ventre jaune : 2 ex au JB
 Red-legged Honeycreeper (*Cyanerpes cyaneus*) ou Guit-guit saï : une dizaine dans la forêt de PM
 Yellow-throated Euphonia (*Euphonia hirundinacea*) ou Organiste à gorge jaune : 1 ex au JB
 Red-throated Ant-Tanager (*Habia fuscicauda*) ou Tangara à gorge rouge : 1 ex au JB
 Summer Tanager (*Piranga rubra*) ou Tangara vermillon : 1 ex au JB
 Greyish Saltator (*Saltator coerulescens*) ou Saltator gris : 2 ex sur le site de Chichen Itza
 Northern Cardinal (*Cardinalis cardinalis*) ou Cardinal rouge : 1 ex aperçu dans la forêt de PM
 Rose-breasted Grosbeak (*Pheucticus ludovicianus*) ou Cardinal à poitrine rose : 2 ex à PM
 Indigo Bunting (*Passerina cyanea*) ou Passerin indigo : une dizaine au marais de PM
 White-collared Seedeater (*Sporophila torqueola*) ou Sporophile à col blanc : une famille à Coba
 Yellow-faced Grassquit (*Tiaris olivacea*) ou Sporophile grand-chanteur : 2 ex au site de Chichen Itza
 Melodious Blackbird (*Dives dives*) ou Quiscale chanteur : très commun



Great-tailed Grackle (*Quiscalus mexicanus*) ou Quiscale à longue queue : très commun et très envahissant
 Bronzed Cowbird (*Molothrus aeneus*) ou Vacher bronzé : un groupe à Tulum
 Hooded Oriole (*Icterus cucullatus*) ou Oriole masqué : observé à plusieurs reprises à PM
 Yellow-backed Oriole (*Icterus chrysater*) ou Oriole noir et or : 2 ex aux environs de l'hôtel de PM
 Yellow-tailed Oriole (*Icterus mesomelas*) ou Oriole à queue jaune : observé à plusieurs reprises à PM et à Tulum
 Altamira Oriole (*Icterus gularis*) ou Oriole à gros bec : plusieurs ex dont 1 à Chichen Itza



Moqueurs des savanes

Mammifères

Au contraire de beaucoup de régions du Monde, les observations de mammifères peuvent être nombreuses au Yucatan.

J'y ai observé :

- ° l'opossum commun sur les pelouses de l'hôtel le soir
- ° une chauve-souris dormant à Chichen Itza, vraisemblablement un vampire commun

- ° des singes atèles (Central American Spider Monkey) au JB de Puerto Morelos
- ° des agoutis (à 4 reprises)
- ° un tatou
- ° des écureuils du Yucatan et une autre espèce près de l'hôtel
- ° une moufette (Skunk) écrasée



° 3 loutres « néotropicales » à P. Morelos

° plusieurs coatis, mes préférés : magnifique mammifère d'Amérique

Herpétologie

N'ayant que peu de connaissances dans ce domaine, je me contenterai de citer pour mémoire, les nombreux lézards (3 espèces d'iguanes, dont Spiny-tailed Iguana très souvent -notamment sur les sites archéologiques), 2 espèces de serpent, 1 espèce de tortue, le crocodile et des batraciens pour accompagner le tout.



Sans oublier les insectes et surtout la fascinante tarentule noire et rousse !

Texte réalisé par Charly Farinelle de Flémalle (Belgium) cfarinelle@teledisnet.be

Photos de Charly Farinelle et Luis Kù Quinones (Laughing Falcon et sa proie)

Merci à mon épouse pour ce beau voyage au pays des Mayas.

