

Le Pic épeiche (*Dendrocopos major*) prédateur de la Mésange bleue (*Parus caeruleus*).

Dans le bois de Vieusart à Corroy-le-Grand, le 16 mai 1974, mon attention est attirée par un Pic épeiche femelle houspillé par un couple de Mésanges bleues. Le Pic, posé sur un tronc d'arbre à 75 cm du sol et à proximité du nid des Mésanges, tient un oisillon dans le bec. Pendant une ou deux minutes, il disparaît derrière le tronc. Lorsqu'il réapparaît, sans sa proie, il cherche sa nourriture comme à l'ordinaire, toujours houspillé par les Mésanges. Après son départ, je constate que l'oisillon a été fiché entre le tronc et l'écorce de l'arbre.

C.-A. de BEHAULT
Rue d'Arlon 51
1040 Bruxelles

Hivernage de Linottes à bec jaune (*Carduelis flavirostris*) aux portes de Bruxelles.

Le 9 novembre 1974, notre attention est attirée par un groupe d'environ septante Fringilles qui se sont abattus sur les cîmes des bouleaux de notre jardin à Kraainem, et se nourrissent des graines avec avidité.

Ce sont bien des *Carduelis flavirostris* qui peuplent nos bouleaux, car chaque fois que la troupe se déplace nous reconnaissons les petits cris explosifs, entrecoupés de « twie twie twiet... » nasillards. L'enregistrement que nous avons pris l'hiver précédent sur les bords de l'Escaut confirme d'ailleurs notre opinion.

Nous les revoyons tous le lendemain. Sporadiquement, au cours du mois de novembre, ils reviennent dans les bouleaux du quartier, mais par groupes moins importants de quinze à vingt exemplaires.

Les 23 et 26 novembre nous en comptons encore environ soixante; en décembre la troupe s'amenuise : quarante exemplaires le 4; six exemplaires le 22.

Nous les retrouvons encore le 5 et le 8 janvier (environ quinze exemplaires). Pour la dernière fois, nous entendons leurs cris le 23 janvier.

S. BAUGNIET et S. LHOEST
Avenue du Bois Soleil 88
1950 Kraainem

Consommation de baies de Viorne obier (*Viburnum opulus*).

Les baies de Viorne obier sont peu recherchées par les oiseaux. Elles résistent bien aux gelées, et de ce fait subsistent tout l'hiver. Seul, jusqu'à présent, le Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*) nous a paru apprécier ces fruits : il consomme la baie entière en l'avalant. Nous avons également observé des Bouvreuils de la sous-espèce nordique (*Pyrrhula p. pyrrhula*) se nourrissant sur cet arbuste, mais ils n'en consomment que les graines, rejetant la pulpe au point qu'un buisson de Viorne visité par ces Bouvreuils est environné d'une multitude de pulpes roses qui jonchent le sol et constituent la « signature » des consommateurs. Par contre, nous n'avons jamais observé que « nos » Bouvreuils, consommassent ce genre de baies.