

LE GOÉLAND ARGENTÉ PORTUGAIS (*Larus argentatus lusitanicus*), NOUVELLE FORME DE GOÉLAND ARGENTÉ À PATTES JAUNES

par C. JOIRIS (1)

La forme de Goéland argenté que l'on peut rencontrer dans la péninsule ibérique, d'après la littérature, est principalement *Larus argentatus michahellis*, caractérisée par des pattes jaunes, un manteau moyennement sombre (plus sombre que celui de notre *L. a. argentatus* à pattes roses) et une taille supérieure à la forme nominale. Elle fréquente l'Espagne, le Portugal, la Mer Méditerranée jusqu'aux Balkans. Une autre forme, *L. a. atlantis*, de taille comparable à celle de *L. a. argentatus*, a le manteau nettement plus sombre et les pattes jaunes; elle est présente aux Açores, à Madeire, aux îles Canaries et pourrait fréquenter la côte atlantique du Maroc (Dement'ev *et al.*, 1969; Fisher et Lockley, 1954; Vaurie, 1965; Witherby *et al.*, 1941). Il faut remarquer que, pour Fisher et Lockley, le Portugal serait occupé par *atlantis* et que Vaurie signale que les oiseaux du Maroc sont plus clairs que les autres *atlantis*, et ainsi sont plus proches de *michahellis*.

Près de Peniche (Portugal, 75 km environ au N.N.W. de Lisbonne), le 27 janvier 1976, mon attention est attirée par plusieurs groupes (plus de 200 au total) de Goélants argentés à pattes jaunes. Dans un des groupes se trouvent trois sub-adultes à pattes roses, manteau gris, tête et cou striés de lignes noires et lorums assez sombres, identifiés comme *L. a. argentatus*. La comparaison directe rend les caractéristiques des Goélants à pattes jaunes plus évidentes encore : taille nettement inférieure, manteau gris perle plus clair. La tête et le cou des adultes sont blanc immaculé, leurs pattes jaune vif. Chez les immatures, le dessous est beige clair, le dos nettement marqué de fines barres transversales, la tête claire avec les lorums sombres très dessinés.

Il est frappant que cette description des adultes ne correspond ni à celle de *L. a. michahellis*, à cause de la taille principalement, ni à celle de *L. a. atlantis*, à cause de la teinte claire du manteau. Ces observations nous semblent suffisantes pour envisager que la côte atlantique du Portugal soit occupée par une autre forme, que nous proposons de baptiser *Larus argentatus lusitanicus*. Il semble vraisemblable que cette forme fréquente également le Maroc : elle se situerait donc, à la fois par ses caractéristiques et par sa distribution, entre *atlantis* et *michahellis*.

Reçu le 20V1978.

(1) Rue du Fodia, 3 - 5942 Ramillies.

AVES, 15 (1978) : 17-18.

Le biotope fréquenté par ces Goélands consiste en des sommets de falaises rocheuses sur la côte, et des îlots inaccessibles proches de la côte. La séparation écologique est très nette par rapport aux Goélands bruns britanniques (*Larus fuscus graelsii*), présents dans la région par milliers, qui fréquentent les plages, estuaires, égouts, ... où aucun Goéland argenté n'a été rencontré. Les falaises, par contre, ne sont fréquentées que par les Goélands argentés, à l'exclusion de tout Goéland brun.

BIBLIOGRAPHIE

- DEMENT'EV, G.P., GLADKOV, N.A. and SPANGENBERG, E.P. (1969) : *Birds of the Soviet Union*, volume III. Translated from Russian. Jerusalem.
- FISHER, J. and LOCHLEY, R.M. (1954) : *Sea-birds*. London.
- VAURIE, C. (1965) : *The birds of the palearctic fauna. Non-passeiformes*. London.
- WHITERBY, H.F., JOURDAIN, F.C.R., TICEHURST, N.F. and TUCKER, B.W. (1941) : *The Handbook of British Birds*, volume V. London.