

indiquent que le Lièvre est âgé d'au moins deux ans; l'œil gauche est arraché et l'animal est fort maigre. Une fois dépouillé, l'animal se révèle avoir été tué par un coup de serres à la nuque. L'articulation de l'épaule gauche porte un abcès sous-cutané de 3 cm de diamètre environ. Le nettoyage des os par cuisson fournit le résultat suivant (voir photos). L'épaule gauche montre des anomalies : les os sont attaqués par une arthrose enclenchée par une blessure extérieure due soit à un fil barbelé soit, plus probablement, à un plomb de chasse (commentaires du vétérinaire M. Denis, de Malmédy).

Ceci me permet de conclure qu'une fois de plus, l'Autour s'est attaqué à un animal handicapé et a ainsi joué son rôle de régulateur naturel, tâche que les chasseurs feraient bien de lui laisser !

W. PFEIFFER
Krinklet, 128
4761 Rocherath

Curieux comportement d'une Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) **en hiver**

Le 27 janvier 1978, ayant jeté des restes de pain dans notre jardin, nous avons la surprise de voir un mâle de Fauvette à tête noire venir se poser sur la pelouse parmi les Merles (*Turdus merula*) et les Moineaux (*Passer domesticus*). Il avale gloutonnement et difficilement des morceaux de pain trop gros, sans essayer de les fractionner.

Un comportement semblable est observé le 15 mars : l'oiseau se pose sur une grosse croûte de pain et en arrache des parcelles avec vigueur, tenant tête aux Moineaux et aux Etourneaux (*Sturnus vulgaris*).

On peut supposer que le même individu amateur de pain soit revenu après une longue absence (il n'avait pas été observé entretemps), ou que ce comportement particulier soit partagé par plusieurs exemplaires de la même espèce.

S. BAUGNIET, S. LHOEST et Jo. van ESBROECK
Av. du Bois-Soleil, 88
1950 Kraainem