

des isolés; elles n'augmentent guère en 11. Notons un passage assez important à Eupen le 18.10 (100 ex.) (JD), Polleur le 19.10 (350 ex.) (PTo) et Spa le 27.10 (150 ex.) (PTo).

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) : passage important signalé à Boitsfort (Plateau) le 16.10 : 150 ex. par groupes de 20 à 30 ex. en 4 heures d'observation (MWa).

LORIOT (*Oriolus oriolus*) : une donnée tardive : Chimay 13.09, 1 chant entendu (JPSc).

CORNEILLE MANTELÉE (*Corvus corone cornix*) : Lissewege 31.10, 1 ex. (MFa).
CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) : les premiers passages sont signalés dès le 04 et 07.10 (JF, AJo), mais demeurent faibles jusqu'au 17; ils sont importants et même très intenses à partir du 18 et jusqu'au 22 à l'Est de la Meuse. Ils commencent un peu plus tard et sont nettement moins importants en Moyenne-Belgique. Encore quelques passages en 11 (AJo, GMe, JaE, JoE, JF, JD, LJ, LSc, ML, MWa, PGI, PTo, RLi). Le plus souvent les Freux sont accompagnés de **CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*)** en nombre peu important. **PIE BAVARDE (*Pica pica*)** : Weerde 16.10, 1 ex. attaquant un Faucon crécerelle (MFa); Lobbes 25.10, dortoir d'environ 30 ex. (APr). **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*)** : plus de 20 mentions de 1 à 4 ex.; plusieurs de celles-ci sont réalisées en dehors des régions habituelles, concernant des oiseaux très peu farouches (souvent à l'intérieur des villages) et permettent de conclure une petite invasion. Spa, 4 fois 1 ou 2 ex. en 09 au même endroit et 3 ex. le 16.09 en un autre endroit (PTo); La Reid 13.09 (PTo); Lorcé (Chevron) 25.09 (BH); Bévercé-Wairmes, régulièrement 1 ou 2 ex. en 09 (ESe); La Gleize, régulier depuis le printemps (R. de Faily); Lierneux, fréquent depuis le mois d'août (JFG); La Reid et Sart-lez-Spa, 12 et 15.10 (PTo); Rahier 16.10, 4 ex. (ALa); Ghlin (Mons) 17.10, 1 ex. sur une pelouse* (C. Sturbaut et al.); Polleur 24.10 (ADx); Rixensart 18.10 au 06.11, 1 ex. peu farouche capturé* (TMn, EMa, PGI, CVa, JT); Rouveroy 25.10, 1 ex.* (AP); Gaurain-Ramecroix 31.10, 1 ex.* (JBa); Chapon-Seraing 08.11, 1 ex. peu farouche capturé* (JF); Aineffe 01 au 11.11, 1 ex.* (FDa); Gouvy début 11 (peut-être bien plus tôt) au 10.12 environ, 1 ex. peu farouche dans le village (EC); Saint-Vith 13.11, 1 ex. dans un jardin (HWa); Huy 23 au 27.11, séjour de 1 ex.* (JLD, PDe); Haasrode 27.11, 1 ex.* (TMi). De l'ensemble de ces données, il résulte que les premières arrivées s'effectuent vers le 15.10 et concernent des individus isolés, présentant la familiarité anormale typique lors de l'invasion célèbre de 1968. Les arrivées s'échelonnent jusqu'à la fin novembre, à moins qu'il ne s'agisse d'exemplaires errant dans nos régions suite à un apport, très limité dans le temps, en début de période de présence. **GEAI DES CHÊNES (*Garullus glandarius*)** : un passage exceptionnellement fourni, constaté surtout à l'Est de la Meuse et dans le Hainaut, à lieu à partir du 10.09 : de nombreux ex. isolés ou par petits groupes sont notés au passage, mais la direction suivie est assez variable : Est au Sud-Ouest et même Nord. En tout, 143 ex. sont notés le 11.09 à Rouveroy (AP). Quelques passages encore début 10. Ils cessent définitivement après le 20.10 à Pailhe (RLi).

Chronique ornithologique 1978/1 : décembre 1977, janvier, février (E. Clotuche)

Conditions climatiques

Décembre 1977 fut assez doux et marqué par deux périodes de temps particulièrement clément, du 8 au 14 et du 23 au 26. Le maximum absolu enregistré le 24, à Uccle, est le second plus élevé depuis le début du siècle. Il y eut quelques journées de gel, mais seule la Haute-Ardenne connut 3 jours d'hiver (max. inférieur à 0° C). La durée des périodes ensoleillées fut anormalement longue et les précipitations partout déficitaires. Des vents assez forts à très forts furent enregistrés du 7 au 11 et du 23 au 30

Bien que très couvert, janvier présenta aussi un léger déficit de la cote udométrique. Conséquence de ce temps couvert, les températures maximales furent trop peu élevées et les minima trop doux. Aucune journée d'hiver ne fut enregistrée, sauf en Ardenne.

Février fut à la fois plus froid et plus chaud : dès le 4 les gelées nocturnes deviennent fréquentes et le froid s'accroît fortement à partir du 18. La fin du mois, à partir du 23, connaît par contre un relèvement brusque des températures (maxima de 12 à 16° C). Les précipitations furent encore plutôt déficitaires, quoique les chutes de neige furent fréquentes.

Faits saillants

L'abondance relative ou la présence inaccoutumée de beaucoup d'espèces d'oiseaux d'eau, **HÉRON CENDRÉ**, **ANATIDÉS**, **CHEVALIERS CULBLANC** et **GUIGNETTE** notamment, s'explique probablement par les conditions climatiques de décembre et janvier et si février apporte des perturbations, celles-ci varient selon les espèces et les lieux.

Des **ÉPERVIERS** sont régulièrement observés, notamment dans le Brabant et la région de Charleroi, phénomène récent.

La situation des **PASSEREAUX** présente quelques faits particuliers : **GRIVES LITORNES** et **MAUVIS** sont peu abondantes, sauf en certains endroits; **TARIN**, **PINSONS DES ARBRES** et du **NORD** sont très peu nombreux, partout, tandis que le **VERDIER** est très abondant dans la région liégeoise. L'hivernage de divers « insectivores » est relativement fréquent : **POUILLOT VELOCE**, **BERGERONNETTE GRISE**, **TRAQUET PÂTRE** et **FAUVETTE À TÊTE NOIRE**.

Incontestablement le fait le plus marquant de cette période hivernale est le brusque réchauffement de fin février et ses conséquences : déclenchement simultané et très net de la migration chez la plupart des premiers migrateurs (**BERGERONNETTES GRISE** et **DES RUISSEAUX**, **ALOUETTE DES CHAMPS**, **PIPIT FARLOUSE**, **BRUANT DES ROSEAUX**, etc.). Premiers chants chez beaucoup d'espèces et nombreux mouvements chez les hivernants (**FRINGILLES** et **GRIVES** par exemple).

Au cours de la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : XII : 04, 11, 18 et 25; I : 01, 08, 15, 22 et 29; II : 05, 12, 19 et 26.

Détail des observations

PLONGEON ARCTIQUE (Gavia arctica)* : Roly 17.12, 1 ex. (JHO); Gaurain-Ramecroix 15.01, 1 ex. (PS, MCa). **PLONGEON sp. (Gavia sp.)*** : Péronnes (Grand-Large) 18.12, 1 ex. au vol (PGt). **GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus)** : seul Hofstade accueille un nombre élevé d'hivernants : des effectifs de 30 à 50 ex. sont notés en 12, 01 (57 ex. le 15.01) et 02 et atteignent même 72 ex. le 12.02 (EB, MBa, MFa, PGt, Exc. Aves). On note environ 8 ex. toute la période à Nimy (BA, Clf, DV, RD). A Harchies 2 ex. seulement en 12 mais 5 ex. le 29.12 et 6 ex. tout 01 (parades le 02.01) (ECu, DH, JSa, ML); Dyle 2 ou 3 ex. en 12 (Neerijssche et Rhode-Sainte-Agathe), 5 le 29.12, 12 le 15.01, 10 le 30.01 (EG, Exc. Aves, HWm, JYC, MBa, MWa, PGt, PLt, Trog, VL). Le 15.01, 1 ex. sur le plan d'eau de Bütgenbach (AHb, WP). Les effectifs diminuent sur les grands plans d'eau lors des fortes gelées de février mais les apports s'amorcent normalement après celles-ci. **GRÈBE JOUGRIS (Podiceps griseigena)*** : Grand-Leez 01.02, 1 ex. (JaE, JoE); Harelbeke 05.02, 1 ex. (DH, Exc. Aves). **GRÈBE ESCLAVON (Podiceps auritus)*** : 4 mentions : Hofstade 11.12, 1 ex. (EB); Sint-Ulriks-Kapelle 30.12, 1 ex. (OD); Walem 16.01, 1 ex. (SB, SL); Weerde, 1 ex. du 26.12 au 08.01 (RSn, GVe, JaE, JoE, SHO, EMa, PGt, F. Hensmans). **GRÈBE À COU NOIR (Podiceps nigricollis)*** : Rumst 29.01, 1 ex. (EB).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : 1 ex. depuis le 05.12 jusqu'à la mi-février à Hofstade (EMa, JaE, JoE, MBa, MPo, OD, PGt, PN, TMn); Harelbeke 11.02, 2 adultes et 1 immature (DH, JSa). **CORMORAN sp. (*Phalacrocorax sp.*)** : Ben-Ahin (Meuse) 04.12, 1 ex. (CGo). **CORMORAN HUPPÉ (*Phalacrocorax aristotelis*)*** : Jambes 26.02, 1 ex. (GR).

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) : très nombreuses données (30 à 40 chaque mois) d'ex. isolés ou en petits groupes dans toutes les régions. Notons seulement l'observation de 41 ex. ensemble à Basse-Wavre le 26.12 (HWm). **GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*)*** : 1 ex. séjourne à Rhode-Sainte-Agathe du 10 au 29.12 (CGe, DLa, EMa, GVe, JaE, JoE, JHo, MBa, MBo, MWA, O. Hanotte, PGt, P. Mélon, PN, PVa, RoP, Trog, TV, A, Van Vrecken). **GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*)** : Berg 10.12, 1 ex. (MPo); Rhode-Sainte-Agathe 10.12, 1 ex. au vol (CGe).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : Gomzé-Andoumont 04.12, 1 ex. au vol vers le Sud (GOR); Nandrin 11 au 13.02, 1 ex. dans et aux alentours du village (FBI). Les observations hivernales sont tout à fait exceptionnelles, peut-être s'agit-il d'exemplaires en errance à partir des sites de réintroduction.

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) : hivernage très important à Harchies : ± 600 ex. en 12, 250 en 01 et 500 le 18.02 malgré le gel (ML, BBr, JYC, PLt). Effectif assez important à Grand-Leez en 12 et 01, dans la vallée de la Dyle début 12, à Walem fin 12 et début 01, à Malines fin 01, à Godarville mi-01 et sur les étangs du Sud et de l'Est du Brabant-Wallon mi-01 (CVa, JFN, LN, EMa, JHo, JYC, MBa, MCE, MPo, PGt, RML, TMn, Trog, TV, VL, RSn, MFa, JSe). Ailleurs, observations irrégulières de petits groupes ou d'isolés, dont 1 ex. à Grandhan, le 15.01 (YF). **SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*)** : observation très précoce d'un mâle le 04.02 à Pommerœul (DH, JSa). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : assez abondant cet hiver : Harchies, 9 observations de 1 à 12 ex. réparties sur les 3 mois (ECu, ML); Walem 04 et 26.12, 6 et environ 15 ex., 08 et 17.01, 3 et 2 couples (MPo, RSn, PGt, SB, SL); Rumst 11.12, environ 12 ex. (EB); Malines 22.01, environ 25 ex. (MFa); 1 à 7 ex. signalés aussi à Rhode-Sainte-Agathe, 04.12, 26 au 29.12 et 24.02 (EMa, Trog, MBa, VL), Bierges 01.01 (JaE, JoE), Harelbeke 18.12 et 11.02 (DH, JSa), Roly 25.01 (JBI), Obourg 15 et 28.01 (BA, RD), Hofstade 04.12 et 14 et 15.01 (MPo, JaE, JoE, MBa), Baudour 15.01 et 26 et 28.02 (BA, RD) et Angleur (Ourthe) le 20.12 (GOR). **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : nombreuses observations sur la plupart des plans d'eau du Brabant et du Hainaut. Nette diminution en 02 : Rhode-Sainte-Agathe, 4 observations de 1 à 6 ex. (EG, MBa, VL, Exc. Aves); Harchies 25.02, 2 mâles (ML); Harelbeke 11.02, 1 mâle et 2 femelles (DH, JSa). Notons aussi 2 couples le 04.01 sur le lac de Coe (PHa) et 1 ex. le 15.01, sur celui de Bütgenbach (AHb, WP). **CANARD PILET (*Anas acuta*)** : très fréquent en 12 et 01 dans le Brabant et le Hainaut, par groupes atteignant parfois 10 ex. Beaucoup plus localisé en 02 : Dyle (Rhode-Sainte-Agathe et Vieux-Héverlée) 04, 18, 24 et 26.02, 1, 7, 22 et 9 ex. (EG, Exc. Aves, MBa, VL); Harchies-Pommerœul environ 15 ex. tout le mois, 21 à la fin (DH, ECu, JSa, ML). Deux observations en Ardenne : Harre (Fays) 31.12, 1 ex. (peut-être domestique) (PBo) et Coe 26.02, 1 couple (PN). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : même situation que les deux espèces précédentes mais les effectifs observés sont plus importants et la diminution moins nette en février. Harchies, environ 50 ex. en 12, maximum 10 ex. en 01 et 30 à 40 ex. en 02 (ECu, ML, BBr, JYC, PLt); Rumst 11.12, environ 100 ex. (EB); Walem 26.12, 30 ex. (RSn); Hofstade 12.02, 35 ex. (MBa); Baudour, 20 à 40 ex. en 01 et 02 (BA, Pan, RD). **NETTE ROUSSE (*Netta rufina*)** : Rumst 11.12, 2 ex. (EB); Baudour 26 et 28.02, 1 mâle (RD). **FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)** : Nimy 19.02, 1 femelle (RD). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : très bien représenté en groupes atteignant fréquemment 10 à 20 ex. dans le Hainaut et le Brabant et sur la Meuse à Ben-Ahin (CGo, JF). L'effectif atteint 40 à 60 ex. à Harchies (ECu, ML, PGt) et Hofstade (PGt) en 01 tandis qu'il est d'environ 100 ex. à Walem début 01 (PGt) et de plusieurs centaines à Rumst le 29.01 (EB). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : très abondant en Hainaut et Brabant : le 15.01,

172 ex. dans la vallée de la Dyle (JaE, JoE), 250 ex. à Harchies-Pommerœul (ECu), 222 ex. à Baudour (BA). La Meuse est encore bien occupée à Ben-Ahin avec des maxima de 43 ex. en 12 et de 74 ex. en 02 (CGo) tandis qu'à Liège la darse Monsin continue à être visitée occasionnellement : 07 au 09.12, 1 ex., 01, 25 et 28.01, 16, 40 et 1 ex., 14.02, 11 ex. (PC).

FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*)* : Harchies 18.02, 1 ex. (ML). **GARROT**

À CŒIL D'OR (*Bucephala clangula*) : hivernage de 5 à 7 ex. à Harchies-Pommerœul (DH, ECu, ML, PGT, JSa) et de 1 à 4 ex. à Walem (MDb, MPo, JaE, JoE, PGT, SB, SL, MWa) pendant les 3 mois. Seule autre observation pour 12 et 01 : Rumst 11.12, environ 12 ex. (EB). En 02 : Rhode-Sainte-Agathe 24.02, 1 femelle (MWa); La Hulpe 08.02, 2 femelles (EP); Nimy 19.02, 3 mâles et 2 femelles (BA, RD) et Baudour 26 et 28.02, 1 femelle (RD). Notons le fait que 2 observations seulement concernant des mâles.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) : Harchies 08.01, 1 femelle au vol (ECu).

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) : Nimy 19.02, 5 ex. (RD). **EIDER À DUVET**

(*Somateria molissima*) : 1 femelle observée plusieurs fois sur la Meuse près de Namur en 12 et début 01 (JBI, PLt) et 1 couple à Moignelée le 11.01 (LJ); Vieux-Héverlée, 1 ex. fin 01 (EB, Mfa, Pva); à Nimy 1 groupe de 5 ex. est noté le 11.12 et 1 ex. est observé plusieurs fois jusqu'au 19.02 (BA, Clf, DV, PN, RD).

HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*) : bien représenté en 12 et 01, il devient rare après la mi-février : Hofstade, maximum de 12 femelles le 06.02 (MBa); Weerde, maximum de 9 femelles le 07.01 (JaE, JoE, PN); Harelbeke, maximum de 9 ex. le 01.01 (Exc. Aves) et 2 femelles jusqu'à fin 02 (DH, JSa); Ben-Ahin 24.12, 1 ex. (CGo); Dyle, 1 femelle le 04.12 (Ne) et les 16 et 17.12 (VH) (EMa, EP, MWa, PGT, Pva, Trog, VL); Blaasveld 03.12, 1 couple (MDb); Gozée 15.01, 1 femelle (PGy); Obourg 12.02, 2 femelles (BA). Un seul mâle signalé.

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*) : à Harchies, l'hivernage est régulier depuis 1975 : 1 femelle en 12, 2 les 24 et 29, 2 (parfois 3) en 01 et 4 en 02 (ECu, ML, ADu, BBr, DH, JYC, PLt, JSa); Walem 08 et 16.01, 3 et 1 femelles (PGT, SB, SL); Godarville 15 et 28.01, 1 femelle (RD); Nimy 19.02, 2 mâles (les seuls observés cet hiver) (RD).

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) : sa présence hivernale est devenue régulière et même fréquente dans le Brabant et le Hainaut : plusieurs groupes de 5 à 8 et même jusqu'à 19 ex. sont signalés jusqu'à début février. Il disparaît ensuite aux fortes gelées sauf à Baudour où 1 ex. est présent le 19.02, 2 les 24 et 25 et 5 les 26 et 28 (RD, PAN). Notons aussi 2 ex. à Grand-Leez du 10 au 17.12 (JFN, LN).

OIE CENDRÉE (*Anser anser*) : 1 ex. isolé est observé à Neerijssche le 29.01, à Rhode-Sainte-Agathe les 04 et 18.02 et à La Hulpe le 19.02 (Pva, EG, Exc. Aves, EP). Un début de passage est décelé début février : Harchies 05.02, 31 ex., vol vers le NE (MMn) et Louvain-la-Neuve 06.02, environ 100 ex. vers le N (JPSc).

OIE sp. (*Anser sp.*) : l'un ou l'autre petit vol en 12 et 01 : Le Rœulx 04.12 (CLf), Flobecq 25.12 (MMn), Basècles 16.01 (ECu) et Pommerœul 24.01 (GRi). Les mouvements s'intensifient fin janvier à début février : Sart-Tilman 31.01 (JF), Loupoigne (Genappe) 31.01 (XA), Yvoir 02.02 (JBI), Roly 03.02 (JBI), Couvin 03.02 (BTh), Overijssche 06.02 (O. d'Oultremont), Zaventem 06.02 (AR), Courtrai 07.02 (DH, JSa), Dinant (Lefte) 10.02 (JBI), Harchies et Bernissart 12.02 (ECu).

CYGNE SAUVAGE (*Cygnus cygnus*)* : hivernage dans la vallée de la Dyle : le nombre total d'exemplaires semble être de 9 ou 10 dont au moins 5 adultes (CGe, D. Fastrez, EG, EMa, EP, Exc. Aves, GVe, HWm, JaE, JoE, JYC, MBa, M. Decker, Mfa, O. Hanotte, O. Landelius, PGT, PLt, Pva, SB, SL, TMn, Trog, TV, VL). Winksele 10.12, 1 ex. (JaE, JoE). Deux observations aussi dans le Sud-Ouest : Roly (Fraitry), 2 adultes et 2 immatures du 03 au 22.01 (CLy, JBI, JPH, MI); Godarville 05.02, 3 adultes s'envolent d'une prairie (JSe). **CYGNE DE BEWICK (*Cygnus bewickii*)** : Harchies-Pommerœul, 1 ex. les 17 et 18.12 (PGT, ECu), dernière observation le 24.12 (ML). Dans la vallée de la Dyle, observations régulières de 6 à 9 ex. à Vieux-Héverlée, Neerijssche et Basse-Wavre du 09.12 au 08.01 avec un maximum de 15 ex. (2 adultes) le 18.12 (JYC, PLt, VL). Une seule observation après le 08.01 : 2 adultes s'envolent de Vieux-Héverlée le 30.01 (Mfa) (EMa, HWm, JaE, JoE, JHo, MBa, MWa, OD, PGT, P. Mélon, Pva, SB, SL, TMn, Trog, TV).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) : hivernage observé en Brabant : 4 ex. en 12 dans la vallée de la Dyle; 4 ex. à Bousval et 1 à Brussegem (PGT, Trog, RSn, YR). L'hivernage

dans la région au Sud de Charleroi est bien mis en évidence grâce à une enquête de la Section Aves (APr, APu, BTh, JBI, JMi, JPHe, JPSc, PLB). Mouvements et passage sont signalés partout durant la seconde moitié de février, surtout les 25 et 26 (APu, Exc. Aves, PN, PTo, RLi, VL, YR). A Pailhe, un couple est cantonné depuis début 01 (RLi). **ÉPÉRVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)** : plus de 60 données pour toute la période, nombre en augmentation régulière, particulièrement en provenance de la province de Liège, du Brabant et de la région de Charleroi. **MILAN ROYAL (Milvus milvus)** : hivernage en augmentation : Givry 25.12, 1 ex. (AP); Lambusart 04.01, 2 ex. (LJ); Meyerode 10.01, 1 ex. en vol vers le S (HWe); Olloy-sur-Viroin 17.01, 1 ex. (BTh); Nouvelles 22.01, 1 ex. (DV); Neuville-en-Condroz 04.02, 1 ex. (FBI); Spa 16.02, 1 ex. en vol vers le NE (PTo). Les premiers retours sont nets : 15 observations totalisant 23 ex. les 25, 26, 27 et 28.02, surtout dans l'Est du pays (ADx, AHb, APu, ARi, CH, Exc. Aves, FBI, HWe, LSc, MBa, PTo, RLi). **BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)** : Clavier 03.01, 1 ex. (JVV); Godarville 15.01, 1 femelle (JSe). **BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus)** ou oiseaux déterminés comme tel : hivernage d'une femelle à Harchies (ML, ADu, ECu, EMa, PGt); Rhode-Sainte-Agathe 19.12, 1 ex. (Trog); Vellereille-le-Sec 06.01, 2 mâles (RD); Pailhe 17.01, 1 femelle (RLi); Blaton 12.02, 1 femelle (ECu); Bihain (Les Tailles) 26.02, 2 mâles et 1 femelle (CGo). **BUSARD GRIS sp. (Circus sp.)** : Verlainne 25.12, 1 femelle ou immature (JF); Ernage 11.01, 1 ex. (JYC); Havelange 23 et 24.02, 1 ex. observé plusieurs fois (CH) et Anseremme 28.02, 1 couple de passage, assez haut (JBI).

FAUCON PÈLERIN (Falco peregrinus) : Elsenborn 22.01, 1 ex. en forêt (LSc). **FAUCON ÉMERILLON (Falco columbarius)** : Baudour 04.02, 1 mâle en vol vers le NE (PAn); Rhode-Sainte-Agathe 26.02, 1 ex. (VL). **FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus)** : signalé comme abondant dans les régions de Charleroi et Mons-Tournai; Géroncourt 11.01, 1 ex. parasité par une Pie qui lui dérobe sa proie; le 25, observation d'un accouplement (BTh).

GRUE CENDRÉE (Grus grus) : fin de passage encore fourni bien que exceptionnellement tardif, en décembre : bandes de 7 à 30 ex. observées à Banneux le 03 (M. Labeye), Francorchamps le 04 (JD), Robertville (Mont-Rigi) le 09 (R. Fabri), Rouveroy le 09 (AP); Woluwe-Saint-Lambert le 10 (VL), Forges le 14 (PGI) et Spa le 17 (PTo). Si l'on excepte la bande importante observée le 03 à Ombret (JF, de seconde main) le passage de retour débute vers la mi-février : le 12, Huy, 1 ex. (JLD), le 14.02, Hanzinelle, 10 ex. (BCh) et Ivoz-Ramet, 1 troupe (GOR). Dès le radoucissement de fin février, les données commencent à augmenter : Spa 24.02, Gedinne, 25.02, Harre 27.02 (JDe, GOR, JoE, G. de Bonhomme, PTo, YF).

HUÏTRIER PIE (Haematopus ostralegus) : Ben-Ahin 15.01, 1 ex. en vol vers l'Est (CGo).

VANNEAU HUPPÉ (Vanellus vanellus) : passage important vers le SW signalé début 12 dans le Condroz et le Brabant (RLi, JDe). Ensuite, pratiquement absent du Condroz jusqu'à fin 01 (RLi). En 12 et 01, il est rare partout, sauf en Hesbaye namuroise où il est abondant (bandes de 500 à 1.500 ex.) (JFN, LN). Quelques passages notés occasionnellement début 02, plus nombreux dès le 23 : les sites de nidification commencent à être réoccupés et les premières parades sont observées (ADu, ADx, DH, ECu, Exc. Aves, HG, JBI, JDe, JPHe, JSe, LJ, ML, MWa, PGt, Rd, YR). **PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricaria)** : Grand-Leez 17 et 30.12, 1 ex. et 3 + 7 + 4 ex. avec des Vanneaux (JFN, LN); Ramillies 02.01, 420 ex. avec 1.000 Vanneaux (CJ).

BÉCASSINE DES MARAIS (Gallinago gallinago) : hivernage de petits groupes signalés en maints endroits. Harchies 18.12, environ 40 ex. (PGt), environ 10 ex. en 01 (ML), 50 et 30 ex. les 08 et 25.02 (ECu); Oudenaarde 01.01, environ 20 ex. (MFa); vallée de la Dyle 30.01, environ 20 ex. (MFa); Grandhan 15.02, 11 ex. (YF). **BÉCASSINE SOURDE (Lymnocyptes minimus)** : Bambois 07.01, 1 ex. (PLt) et Malines 22.01, 1 ex. (MFa). **BÉCASSINE DES BOIS (Scolopax rusticola)** : signalée en 12 à Ferrières (CGo), Châteineau (JMi), Harchies-Hensies (ECu, PN), Woluwe-Saint-Lambert (VL) et Watermael-

Boitsfort (MWA); en 01 à Rhode-Sainte-Agathe (MFa) et Rhode-Saint-Genèse (PVA), en 02 à Thieusies (CLf), La Hulpe (EP) et Ransart (JBI). **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : Flobecq 11.12, 1 ex. en vol vers le SE (MMn); Harchies 25.02, 4 ex. de passage (ECu). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : l'hiver assez doux explique probablement le nombre anormalement élevé d'observations : Dyle, maxima de 6 et 7 ex. en 12, 2 et 4 ex. les 01 et 30.01, 8, 11 et 12 ex. les 04, 24 et 26.02 (CGe, EG, JaE, JoE, JYC, MBa, MFa, MWA, OD, PGT, PLT, TMn, Trog, VL). Signalé aussi en 12 à Grand-Leez (JFN, LN, MPo), Rosières (PGt), Emines (JYC) et Harchies (ECu, ML), en 01 à Emines, Erbisœul et Obourg (JYC, BA) et en 02 à Emines (JYC), Harchies (ML), Evere (MBa) et Genappe (GMe). **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)** : 4 données concernant peut-être des tentatives d'hivernage : Walem 03.12, 1 ex. (MDb); Roly 08.02, 1 ex. (JBI); Baudour 25 et 28.02, 1 ex. (RD) et Roly 26 et 28.02, 1 ex. (CLy, JBI). **CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)** : Baudour 24.02, 1 ex. (PAn), premier passage. **CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)** : passage précoce d'un ex. à Harchies le 25.02 (ML).

GOËLAND MARIN (*Larus marinus*) : Weerde 10 et 11.12, 1 adulte (EMa, PGT), 19.02, 1 immature (MBa); Gaurain-Ramecroix 15.01, 2 ex. (MCA). **GOËLAND BRUN (*Larus fuscus*)** : Obourg, 1 à 3 ex. au dortoir en 01, 3 ex. le 15.02 (BA, RD); Hofstade 09.12, 1 adulte (MFa); Woluwe-Saint-Etienne 13, 19 et 26.12, 1, 2 et 2 ex., 07 et 25.02, 4 et 1 ex. (MBa, TV). **GOËLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)** : de plus en plus fréquent et abondant dans le Brabant et le Hainaut occidental, également dans et aux abords de la vallée de la Meuse. Les plus fortes concentrations signalées, le 15.01 : 760 ex. à Obourg (BA, RD), 515 ex. dans l'Est du Brabant (CVa), 23 ex. à Godarville (JSc). **GOËLAND CENDRÉ (*Larus canus*)** : signalé fréquemment dans les mêmes régions que le précédent, mais toujours en petit nombre : maximum 20 ex., une fois 37 ex. à Hofstade le 14.01 (MBa). Retour de 2 ex. au site de nidification de Obourg dès le 25.02 (RD). **MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*)** : Walem 03.12, 1 immature (MDb).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : Harchies, environ 300 ex. en 12 (ML); Laeken 07.01, 5 ex. (MFa); Korbeek-Dijle 23.01, 1 ex. (PVA); Manage 28.01, 26 ex. (RD); Obourg 02 et 10.02, 70 et 22 ex. (ADu); retour et premier chant à Boitsfort le 25.02 (MWA). **PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)** : rare cet hiver dans le Condroz (RLi); Bousval, abondant en 01 (YR); Obourg 19.01, 70 ex., 12 et 15.02, 150 et 250 ex., dispersion dès le 22 (ADu). Quelques passages et stationnements de bandes dans la région de Charleroi (CLy, JBI, JPHe, JSe), début du passage le 20.02 à Neuville-en-Condroz (FBI). **TOUTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*)** : Ben-Ahin 03.12, rassemblement de 700 ex. autour d'un dépôt de grain (CGo); Erbisœul 16.12, 370 ex. (idem) (ADu); Vellereille-le-Sec, 250 ex. dans un verger en 12 et 01; Saint-Symphorien 10.02, 1 couple construisant son nid, malgré le gel (RD); Mouscron 20.02, brusque amorce des parades (DH, JSA).

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) : signalé à Harre (PBo), Olloy-sur-Viroin (BTh), Casteau (BA), vallée de la Dyle (HWm, PVA, Exc. Aves), Ransart (JBI), Genappe (GMe), Neuville-en-Condroz (FBI), Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert (JaE, JoE, VL). **PIC NOIR (*Dryocopus martius*)** : Wespelaer 07.01, 1 mâle creusant un tronç de Hêtre, le 10.01 il quitte cette même cavité (JaE, JoE).

COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*) : Etterbeek 15.12 au 18.01, 1 chanteur (CJ); 1 ou 2 ex. à Schaerbeek en 12 et en 02 (MBa, TV); Evere 11.01, 1 ex. (PVS); Woluwe-Saint-Lambert 28.02, 1 ex. (JaE, JoE). **ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*)** : Dion-Valmont début 12, 2 ex. (CVa, YL); Gerpinnes 25.02, 1 ex. de passage (APu). **ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)** : hivernage signalé surtout dans le Brabant et la région de Charleroi, notamment une bande d'environ 300 ex., le 20.12 à Rixensart (PGt) (ADu, B. Philippart, CLy, Exc. Aves, EP, HG, JBI, JMi, JYC, MFa, PLT, YR). Les beaux jours de fin février déclenchent le passage et les chants dans la province de Liège (ADX, FBI, HWe, JF, LSc, PTo).

PIPIP FARLOUSE (*Anthus pratensis*) : hivernage signalé en quelques endroits, notamment Harchies avec environ 15 ex. en 12 et 01 (ML, BBr, JYC, PLt) et Bousval avec 35 et 25 ex. en bande les 04 et 18.12 (YR). Passage dans la province de Liège à partir du 25.02 (Exc. Aves, FBI, JD, JF, PTo). **PIPIP SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)** : Vieux-Héverlée 17.12, 1 ex., 23.01, 12 ex., 30.01, 1 ex., 18 et 24.02, 4 et 2 ex. (Exc. Aves, MFa, MBa, PVa); Weyerde et Walem 08.01, 1 et 2 ex. (PGt). **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : 1 ou 2 ex. signalés en 12 à Namur (FLj), Schaerbeek (MBa), Huy (RLi), Verviers (LSc), Spa (PBc), Dyle (JYC, MWa, PLt, VL), Woluwe-Saint-Etienne (MBa), Seilles (YF) et Goé (LSc); en 01 à Bütgenbach 2 ex. (LSc), Woluwe-Saint-Etienne (MBa), Roly 12 et 25.01, 7 et 1 ex. (JBI) et Mont-sur-Marchienne 21.01, 3 ex. en vol vers l'Est; Genappe 05.02, 1 ex. (GMe); Theux 14.02, 1 ex. sur la Hoegne (ADx). Passage généralisé à partir du 25.02. **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)** : hivernage ou présence hivernale constatée en une vingtaine d'endroits de Haute et Moyenn-Belgique. Par contre, première absence depuis 8 ans à Fléron (PC). Retour généralisé à partir du 22.02.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) : chants et poursuites le 08.01 à Ham-sur-Heure (ABo).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) : quelques mentions d'isolées ou de petits groupes : Harchies-Pommerœul 23.12, environ 35 ex. (JYC, PLt); La Hulpe 28.12, environ 100 ex. (MWa). Premiers chants à Mouscron le 03.02 (DH, JSa), à Pailhe le 15.02 (RLi) puis généralisés fin 02. Petites troupes en rétromigration devant la neige le 14.02 à Haasrode (JT). **GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : très peu abondante en 12 : une bande de 250 ex. à Malmédy le 03 (JD) et 4 mentions seulement de bandes de 30 à 60 ex. (PBo, MTo, HG, JD). En janvier, elle est présente un peu partout mais toujours en assez petit nombre sauf au Sud de Namur et de Charleroi surtout, où l'on note des bandes de 100 à 1.000 ex. (APr, BTh, JBI, JMi, JYC, JPHe, PLb). Elle diminue un peu en 02 dans cette même région mais augmente en fin de mois en Ardenne (CGo, JD, LSc, PTo). **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : quelques chants en 12 à Jambes (FLj), en 01 à Bruxelles et Malines (YR, PGt), début 02 à Boisfort et Mouscron (MWa, DH, JSa) et fin 02 partout. **GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)** : très peu abondante en 12 sauf en Forêt de Soignes (Exc. Aves, MWa) où elle est toujours abondante en 01 tandis qu'elle augmente un peu dans les autres régions. Fin février, on note un passage massif le 23 à Ixelles (ABo) et des arrivages en Ardennes (CGo, LSc, MDe). **MERLE NOIR (*Turdus merula*)** : un ex. albinos à Lobbes en 01 (JPHe); Woluwe-Saint-Lambert 04.02, 1 œuf cassé contenant un embryon prêt à éclore (VL). Premiers chants à Trazegnies le 06.02 (JSe) et Mouscron le 18 (DH, JSa). **TRAQUET PÂTRE (*Saxicola torquata*)** : 2 données d'hivernage possible fin 01 : Malines 22.01 (MFa) et Biesmes-sous-Thuin 25.01 (RD). Un premier migrateur à Bierset le 17.02 (GMe), ensuite premiers retours à Erpent le 24 (GR), à Solre-Saint-Géry et Fexhe-le-Haut-Clocher le 26 (HG, GMe) et à Rance le 28 (PLb). **ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*)** : 2 données hivernales : Aubel 04.12 (GOR) et Woluwe-Saint-Etienne 17.12 (MBa). **ROUGEGORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*)** : Rouge-Cloître 04.01, 3 chanteurs (MWa) et Forges 27.02, 1 chanteur (PGI). **FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)** : hivernage constaté en plusieurs endroits : à Ombret un mâle, différent de celui du 27.11, est observé le 27.12 et plusieurs fois en 01; premiers chants le 28.02 (JF); Uccle 03.12, 1 mâle (DE); Seraing 05.01, 1 mâle capturé (MRa); Kraainem 27.01, 1 mâle se nourrissant de pain (SB, SL); Jemeppe-sur-Meuse, 1 mâle tout février (GMe); Genappe 12.02, 3 mâles et 2 femelles ensemble et 1 femelle le 22.02 (GMe). **POUILLOT VÉLOCE (et sp.) (*Phylloscopus collybita*)** : Harchies, au moins 3 hivernants en 12 et 1 en 01 (ML, DH, JSa); Pailhe 02.12, 1 ex. (RLi); Mons 18.12, 1 ex. (DV); Hofstade 18.12, 2 ex. (JaE, JoE); Jodoigne 19.12, 1 ex. (CVa); Ganshoren 22.12, 3 ex. (PVa); Namur (Citadelle) 18.01, 1 ex. sp. (GJ); Quiévrain 28.01, 1 ex. sp. (GRi). Nivelles 03 au 12.02, 1 ex. (RR); Liège (ville) 16.02, 1 ex. (FDa); Clermont 16.02, 1 ex. (BCh); Trazegnies 22.02, premier chant (JSe); Sorinne-la-Longue 26.02, 2 ex. chanteurs (Exc. Aves) et Ombret 28.02, 1 ex. chanteur (JF). Les données de février concernent probablement déjà des migrateurs précoces.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (Parus major) : le passage important signalé en 11 dans la région liégeoise se prolonge début 12 et est suivi d'un hivernage important par endroits : Forêt-Trooz 05.12, 29 ex. capturés (PC, JTe). Situation similaire apparemment à Hermeton-sur-Meuse où 64 ex. (32 mâles et 32 femelles) sont capturés le 11.12 (JMi). **MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus)** : Hofstade 12.02, une bande de 80 ex. (MBa). **MÉSANGE NOIRE (Parus ater)** : encore abondante dans la région de Spa-La Reid début 12 (PTo); quelques observations inhabituelles en 12 et 01 en région liégeoise : Jupille 09.12, 1 ex. capturé et 2 ex. observés régulièrement jusqu'en avril (EC, PC), Fléron 25 et 26.12, 1 et 2 ex. capturés, première observation en 8 ans (PC). Le Rœulx 18.02, environ 100 ex. sur un parcours de 2 km (CLf). **MÉSANGE A MOUSTACHES (Panurus biarmicus)** : Harchies-Pommerœul 22.12, 2 ex. (DH) et 21 et 22.01, 1 mâle, 1 femelle (GRi, ML), après une période d'absence de plusieurs années.

GRIMPEREAU DE JARDINS (Certhia brachydactyla) : premier chant à Genk le 24.02 (JT).

BRUANT PROYER (Emberiza calandra) : Eghezée (Branchon) 25.12, 1 ex. (PBo); Ramillies 02.01, 30 ex. (CJ); Nimy 12.02, 5 ex. (ADu). **BRUANT JAUNE (Emberiza citrinella)** : Thommen 17.12, environ 30 hivernants (JD); Rotheux-Rimèrès 05.01, environ 50 ex. (FBI); Mont-sur-Marchienne 19.02, environ 100 ex. (PLb). Premiers chants dès le 24.02. **BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus)** : hivernage d'isolés ou de petits groupes essentiellement dans le Brabant et le Hainaut occidental. Début du passage vers le 24-25.02 dans l'Est du pays notamment (ADu, CGe, CLf, EB, EP, Exc. Aves, GMe, JBI, JMi, JPSc, JYC, MFa, PAn, PLI, PVa, RLi, SB, SL).

GROS-BEC CASSE-NOYAUX (Coccothraustes coccothraustes) : quelques petites bandes signalées : La Reid 25.12, 11 ex. au vol (PTo); Ombret, observé régulièrement en 01, 19 ex. ensemble le 22 (JF); Fexhe-le-Haut-Clocher 19.02, 18 ex. (GMe) et Le Rœulx 26.02, 12 ex. (CLf). **VERDIER D'EUROPE (Chloris chloris)** : hivernage le plus important observé depuis 8 ans dans la région liégeoise : à Fléron environ 250 ex. sont capturés et bagués à la mangeoire sur les 3 mois (PC). Il semble par contre plus rare dans le reste du pays. **CHARDONNERET ÉLÉGANT (Carduelis carduelis)** : hivernage de petits groupes surtout dans le Brabant et le Hainaut occidental (ADx, EB, EP, FBI, HG, JBI, JD, JMi, JPSc, LSc, MFa, MWA, PFI, PN, SB, SL). Relevons notamment : Harchies-Pommerœul, environ 15 ex. de fin 12 à fin 01 (BBR, JYC, PGt, PLt); Moignelée 31.01, 17 ex. (LJ); Genappe 22.02, environ 50 ex. dans un terrain vague (GMe). **TARIN DES AULNES (Carduelis spinus)** : il n'est absent d'aucune région mais demeure rare ou même très rare partout : la plupart des observations concernent en effet des groupes de moins de 20 et même 10 ex., et on souligne sa rareté en Forêt de Soignes (Boitsfort) (MWA) et dans la vallée de la Meuse (JF). Relevons quelques bandes plus importantes : Harchies 23.12, 25 ex., 30.12, plus de 30 ex., 21.01, environ 80 ex. (GRi, JYC, ML, PGt, PLt); Rhode-Sainte-Agathe 26.12, environ 30 ex. (MPo); Neerijssche 20.12, environ 40 ex. (MFa); Moignelée 21.01, 57 ex. (LJ). Apport subit de migrateurs dans l'Est du pays et la vallée mosane aux derniers jours de février (FBI, JF, PTo). **LINOTTE MÉLODIEUSE (Carduelis cannabina)** : Châtelaineau 25.12, environ 100 ex. de passage (JMi); Harchies 24.12, environ 40 ex. en bande, observation rare à cette époque (ML); 3 ex. le 25.12 à Verlaine, région où elle est rare l'hiver (JF). **LINOTTE À BEC JAUNE (Carduelis flavirostris)** : Walem 03.01, environ 35 ex. (JæE, JoE) et La Hulpe 08.02, 2 ex. (EP). **SIZERIN FLAMMÉ (Carduelis flammea)** : présent mais en petit nombre : 1 à 6 ex., généralement 2 ou 3, signalés en 12 à Beaumont (HG), Gembloux (MPo), Genval (PGt) et Schaerbeek (MBa, TV), en 01 à Taminés (LJ), Meyerode (HWe), Kraainem (SB, SL), Ransart (JBI) et Ben-Ahin (CGo), en 02 à Pérot (Exc. Aves), la Fagne du Steinley (RLi), Spa (PTo), Nimy (DV), Floreffe (PLt) et Sorinne-la-Longue (Exc. Aves). 12 ex. environ le 20.01 à Châtelet (JMi); 10 ex. les 11 et 18.02 à Bousval (YR) et 10 ex. à Verviers le 13.02 (LSc). **SIZERIN FLAMMÉ BORÉAL (Carduelis flammea flammea)*** : 4 mentions d'oiseaux appartenant à cette sous-espèce : Heppignies, 10 ex. bagués en 12 (L.A. supérieure à 76 mm) (PLb); Ombret 31.12, 1 mâle bagué, 21.01.

1 mâle observé et une femelle baguée (JF); Moignelée 06.01, 10 ex. (LJ). **SIZERIN BLANCHÂTRE (*Carduelis hornemanni*)*** : exceptionnel en Belgique : Raeren 26.12, 3 ex. (MFI, F, Salée); Taminies 17.01, 1 ex. (LJ). **SERIN CINI (*Serinus serinus*)** : 5 mentions en 12 et 01 : Solre-Saint-Géry 05.12, environ 15 ex. (HG); Genval 19.12, 4 ex. (PGt); Jodoigne 24.12, 1 ex. (CVa); Etterbeek 07.01, 1 ex. (MBa) et Châtelineau 23.01, 1 femelle (JMI). Quatre mentions concernant probablement un début de passage : Louvain-la-Neuve 22.02, 7 ex. (HG); Fexhe-le-Haut-Clocher 26.02, environ 80 ex. (GMe); Fléron 25.02, 1 mâle (PC) et Faulx-les-Tombes 27.02, 1 ex. chanteur (PLt). **BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*)** : une bande de 35 ex. le 01.01 à Mariembourg (Dourbes) (YR). **BOUVREUIL ÉCARLATE (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*)*** : Lierneux 07 au 15.01, 2 mâles et 4 femelles appartenant à cette sous-espèce (MDe). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : abondant en Ardenne où quelques cas de nidification* possible ou probable sont signalés : Wanne 16.01 (MDe); Bévercé 02.01 (ES); Fagnes de l'Est 02.01 (RLi); Saint-Hubert 06.02 (RLi); La-Neuveville-au-Bois (Champlon) 12.02 (JF). Deux observations hors Ardenne : Hermeton-sur-Meuse 11.12, 1 mâle et 2 femelles (JBI) et Pailhe 12.12, entendu (RLi). **PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*)** : aucun groupe important n'est signalé avant les passages déclenchés par le dégel de fin février (JD, GJ, Exc. Aves) si ce n'est 25 ex. le 18.02 à Biercée (JPHe) et environ 50 ex. à Obourg le 22.02 (ADu). Sa rareté est soulignée en Forêt de Soignes (MWa). **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : pratiquement absent également jusqu'à fin février où l'on note un apport dans plusieurs régions, notamment à l'Est de la Meuse (EC, Exc. Aves, FBI, JD, LSc, MBa, MDe, PC, PTo). Très rare aussi en Forêt de Soignes (MWa). Deux groupes plus importants : Spa 26.12, environ 400 ex. (PTo) et La Gileppe 15.01, environ 80 ex. (LSc).

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) : une bande d'environ 300 ex. dans un champs, chaque jour vers 17 h, début 12 à Sint-Ulriks-Kapelle (OD).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)* : Buzenol 03.01, 1 ex. (BT, JT) (l'un des nombreux exemplaires lâchés dans la nature lors de la tentative de réintroduction en cours dans cette région). **CORNEILLE MANTELÉE (*Corvus corone cornix*)** : 4 mentions : Boitsfort 21.12, 1 ex. (MWa); Cortil-Noirmont 26.12, 2 ex. (JFN, LN); Soheit-Tinlot 22.01, 1 ex. (B. Philippart) et Petit-Rechain 28.01, 1 ex. au dépôt (LSc). **CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)** : premiers passages décelés les 25 et 26.02 à Hemptinne (Philippeville) (CLy) et Gerpennes (APu). Signalons aussi des doctoirs plurispécifiques de Corvidés (Corneille noire, Corbeaux freux et Choucas des tours) à Ben-Ahin, environ 2.000 ex. en 12 et 4.500 début 02 (CGo) et de plusieurs milliers d'ex. à Vieux-Héverlée en 12 (MWa). **PIE BAVARDE (*Pica pica*)** : Lobbes 18.12, environ 120 ex. (APr). **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*)** : en dehors des observations habituelles dans certaines zones du Haut-Pays, l'Ardenne fournit encore quelques observations d'oiseaux très peu farouches, reliquat de la faible invasion amorcée en septembre : Spa 07, 27 et 29.12, 1 ex. dans un jardin (PTo); Aubel (Centre) 15 au 25.12, 1 ex. dans un jardin (GOR); Verviers (Heusy), 1 à 4 ex. observés régulièrement dans un jardin (LSc); Spa 03 et 04.02, 1 ex. dans un quartier résidentiel (PTo). Observation hors Ardenne : Mont-sur-Marchienne, 1 ex. capturé fin 12, 12.02, 2 ex. dans un jardin, l'un des deux étant présent dès le 07 et capturé le 20; sa biométrie correspondrait à celle de la sous-espèce sibérienne, **Caryocatactes caryocatactes macrorhynchos*** (PLb).

Phénomène ornithologique particulier au printemps 1978

Fin mai, un exemplaire de **GOBEMOUCHE NAIN (*Ficedula parva*)*** fut repéré en hêtre pure dans la Forêt de Soignes (Brabant). Ce mâle, chanteur bien cantonné, s'est laissé observer à loisir durant plusieurs semaines, par un nombre élevé d'observateurs.

Il s'agit de la première donnée printanière réalisée en Belgique, qui permettrait, étant donné l'accumulation des heures d'observation, de réaliser une étude détaillée de ce cas tout à fait exceptionnel.

Dans le but d'établir cette synthèse, il est demandé à tous les observateurs de bien vouloir fournir à la Centrale Ornithologique un maximum de renseignements (dates et heures des observations, critères d'identification dans la nature, comportement de l'oiseau : chant, vol, chasse, déplacements, etc., sans oublier photos et enregistrements éventuels). Merci d'avance. (JT).

Résultats du quatorzième recensement hivernal des oiseaux d'eau, hiver 1977-1978 (J. Tricot)

Nous remercions tous les collaborateurs qui ont, une fois de plus, permis d'établir le statut précis d'hivernage des oiseaux d'eau, aux deux dates prévues (cet hiver, respectivement les 20.11.1977 et 15.01.1978) :

Aves-Bruxelles : Baguette, M.; de Borman, M.; du Bus de Warnaffe, P.; Chiwy, B.; Cligneux, M.; de Croy, M.; Depaepe, J.C.; van Esbroeck, Ja.; van Esbroeck, Jo.; Goffart, P.; Houbart, J.; Lafontaine, R.M.; Lhoest, S.; Neuray, P.; Potvliege, R.; Rousseau, M.; Timers; Van der Velde; Vansteenwegen, C.; Verdin, R.

Aves-Mons-Tournai : Amand Y.; Amory, B.; Cantraine, M.; Cuvelier, E.; Dascotte, R.; Hubaut, D.; Lefebvre, C.; Loison, M.; Moncousin, M.

Aves-Charleroi : Bultot, J.; Charlotteaux, B.; Gailly, P.; Guerriat, F.; Guerriat, H.; Ittelet, M.; Lambrechts, P.; Lemy, C.; Scohy, J.P.; Sedek, J.

Aves-Namur : Chodoire, J.Y.; Javaux, L.; Lamotte, P.; de Mévius, E.; Noulard, J.F.; Noulard, L.

Aves-Liège : Goblet, C.; de Harenne, P.

Aves-Ostkantone : Doneux, A.; Dumont, J.; Habsch, A.; Pfeiffer, W.; Veithen, M.; Wiesemes, H.

... et tous ceux dont le nom n'a pu être déchiffré sur les rapports.

Les tableaux ci-joints fournissent la synthèse des différents comptages et permettent, en ce qui concerne les totaux généraux, la comparaison avec les résultats obtenus au cours des cinq hivers précédents.

Les données des deux journées de recensement 1977-1978 y sont réparties en huit zones géographiques, selon la ventilation suivie dans les rapports antérieurs :

1. Région bruxelloise;
2. Vallée de la Dyle;
3. Province de Brabant, hors 1 et 2;
4. Meuse, d'Heer-Agimont à Namur;
5. Meuse, de Namur à Visé;
6. Province du Hainaut;
7. Province de Namur;
8. Province de Liège.

La région bruxelloise regroupe une série d'étangs répartis dans la zone méridionale de l'agglomération : Ixelles, Bois de la Cambre, Ten Reuken, Val Duchesse, Woluwe, Boitsfort, Rouge-Cloître. La vallée de la Dyle, suivant l'axe nord-sud, déroule son chapelet de pièces d'eau : Vieux-Héverlée nord et sud, Eaux-Douces, Neerijssche, Neerijssche Clinique, Rhode-Sainte-Agathe, Pécrot, Florival nord et sud, Gastuche, Wavre et Limal. En Brabant, les sites classiques sont prospectés : Hofstade, Weerde, Walem, Groenendael, La Hulpe, Sart-Dames-Avelines, Genappe et toute une série d'étangs de moindre importance, vers le Sud et vers l'Est. Si la Meuse a été longée