

## **Chronique ornithologique 1979/1 : décembre 1978, janvier, février** (J.-P. Jacob).

### **Conditions climatiques**

Le mois de décembre fut doux et pluvieux du 09 au 16 et du 26 au 30, mais assez frais et ensoleillé le reste du temps.

L'offensive brutale du froid et de la neige s'est déclenchée au cours de la nuit du 30 au 31 décembre pendant laquelle la chute de température fut de l'ordre de 15 à 20°C, le front froid se déplaçant lentement du Nord vers le Sud. Il faut remonter au 31 janvier 1956 pour constater un phénomène du même ordre de grandeur.

L'aube du 01 janvier fut marquée par la neige et un gel intense sauf encore en Lorraine, atteinte en fin de journée (baisse de 24,9°C entre le maximum et le minimum de ce jour, à Virton). En Moyenne-Belgique, le thermomètre frôla - 15°C durant la nuit du 01 au 02 janvier.

La période hivernale qui suivit fut exceptionnellement rude et rappelle celle de 1956 et de 1962-1963. L'enneigement persista pendant tout le mois de janvier et celui de février. Ces deux mois furent caractérisés par une alternance de périodes de grands froids avec gel permanent et de périodes un peu moins rigoureuses mais neigeuses avec des températures insuffisantes pour provoquer un dégel sensible (faible dégel diurne fin du mois de janvier en Moyenne-Belgique)

Le premier réchauffement net eut lieu du 12 au 14 février mais il fut immédiatement suivi d'une nouvelle offensive du froid. Les derniers jours de février restèrent frais, mais émergèrent enfin de la grisaille.

### **Faits saillants**

Après un mois de décembre plutôt banal, l'arrivée soudaine du froid et de la neige le 31.12 provoque en un premier temps une importante fuite, vers le Sud, d'Oies, mais aussi d'autres oiseaux d'eau et de Passereaux (Alouettes, Grives,...). La persistance des sévères conditions hivernales marque la suite de l'hiver. Des espèces hivernant normalement plus au Nord apparaissent en nombre inhabituel. Les plus remarquables sont les Oies, les Harles bièvres et piettes, les Busards Saint-Martin (Aves, 15 : 147-148). Les Grèbes huppés, les Fuligules milouins, les Garrots forment des concentrations parfois remarquables, notamment sur la Meuse qui accueille en 01 un nombre exceptionnellement élevé de plongeurs. Les Mouettes et les Goélands sont nombreux, spécialement le Goéland cendré. Les Grèbes jougris (en 02), les Cygnes sauvages et les Faucons émerillons sont pour leur part notés plus fréquemment que par hiver doux. Enfin, quelques espèces exceptionnelles sont observées : Aigle royal, Pygargue, Buse pattue et Outarde barbue.

Sous l'emprise du gel et de la neige, les bois et les campagnes sont désertés par bon nombre de Passereaux tels les Alouettes, les Turdidsés, les Bruants et les Fringilles; même les Etourneaux se font moins abondants. Bien des oiseaux restés au pays se rapprochent alors des habitations et des lieux de nourrissage où, en-dehors des hôtes habituels, l'on rencontre à l'occasion des Pics, des Grives, des Corvidés et certains Fringilles dont le Grosbec qui fréquente les mangeoires d'une manière inaccoutumée.

En même temps, quelques rapaces s'enhardissent à chasser près des maisons et pénètrent même parfois en pleine ville.

En février, le nombre d'hivernants nordiques décroît et des passages sont sensibles, principalement à la fin du mois où leur remontée vers le Nord se juxtapose à l'amorce normale du passage d'autres espèces.

Au cours de la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 03, 10, 17, 24 et 31.12; 07, 14, 21 et 28.01; 04, 11, 18 et 25.02.

### Détail des observations

**PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*)**\* : Blaton 17 et 18.02, 1 ex. (ECu, ML, MMn).  
**PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*)**\* : Ostende 23.02, 1 ex. (VL); Ploegsteert 24.02, 1 ex. (PCI).  
**GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*)** : l'arrivée du froid entraîne la désertion début 01 des étangs de la vallée de la Dyle, de ceux de l'Entre-Sambre-et-Meuse et du site d'Harchies. Parallèlement, des Grèbes apparaissent en nombre inusité sur la Meuse : plusieurs dizaines à mi-janvier. En Hainaut, de petits groupes séjournent en 01 et 02 à Hautrage, Mons, Nimy, Obourg et Péronnes (ADu, BA, CLf, DV, ECu, FDC, MCA, PS, RD). En Brabant, seulement quelques individus à Vilvorde fin 01 et en 02 (VF), mais surtout, à Walem, une concentration atteignant 120 ex. le 14.01, 20 à 30 ex. ensuite (CEy, MPr, MWa, SB, SL, VF). Dès mi-février et davantage à la fin du mois, un certain retour est perceptible en Hainaut et sur la Meuse en aval de Liège (BA, EC, FDC, GBI, ML, RD).  
**GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*)**\* : 1 ex. à Walem les 03.12, 02 et 09.01 (PN, RoP, SB, SL); 1 ex. sur la Meuse à Jambes les 14 et 28.01 (FLj, PLt). Observations beaucoup plus nombreuses que d'habitude en 02 : Zeebrugge 01, 1 ex. (SB, SL); Tournai 04, 1 ex. recueilli épuisé dans le centre de la ville (ED, PBn, PR, PS); Gaurain 14, 1 ex. (MCA, PS); Harchies-Pommerœul 15.02 au 17.03, 3 ex. (ML et al); Nieupoort, bassin de chasse 17, 1 ex. (MBA, GVA, SHO); Ostende, bassin de chasse 17,2 ex. (MBA, GVA, SHO); Ronquières 19 au 27, 1 à 2 ex. (DD); Obourg 17, 2 ex. (BA); Ostende 23, 1 et 3 ex. (JBr, OH, TVa, VL); Knokke 24, 1 ex. (EP); Silenieux, barrage de Falemprise 24 et 25, 1 ex. (Cl, CLy); Walem 27, 1 ex. (PJa, VF); Hermalle-sous-Argenteau 28.02 et 02.03, 1 ex. (EC, YF).  
**GRÈBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*)**\* : Zeebrugge 04.01, 1 ex. (VF); Dinant 14.01, 6 ex. sur la Meuse (CHa); Visé 26.01, 2 ex. sur la Meuse (GG); Ben-Ahin 11.02, environ 9 ex. (F, d'Oultremont, M, de Liedekerke, OO); Ostende 17.02, 2 ex. (MBA, GVA, SHO); Gaurain 18.02, 1 ex. (MCA, PS); Chanly 18.02, 1 ex. sur la Lesse (PLo); Ostende 23.02, 3 ex. (JBr, OH, TVa, VL); Péronnes 25.02, 1 ex. au Grand Large (ECu).  
**GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)**\* : Walem 05.01, 1 ex. (YR); Hautrage 24 et 25.01, 2 et 1 ex. (ML, YAm); Visé 30 et 31.01, 1 ex. sur la Meuse (EC); Péronnes 27.02, 1 ex. (MCA, PS).

**GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)** : Godinne, sur la Meuse, en 01 jusqu'au 25.02, max. 10 ex. le 15.02 (CHa, JMLe, JPL, JLC, BI); Jambes 03 et 05.01, 1 ex. (FLj).

**HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*)** : nombreuses observations pendant les froids au bord des rivières et barrages de la province de Liège ainsi que sur l'ensemble du cours de la Meuse où ils sont sensiblement plus nombreux que lors des derniers hivers. Relativement peu signalé par contre en Brabant et Hainaut. Des cas de mortalité ou d'épuisement

\*Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les Chroniques ornithologiques sans préjuder de l'avis ultérieur de la dite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'une demande spéciale d'homologation ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret.

dû au froid sont mentionnés à plusieurs reprises (EP, HW, JPJ, PJo, YR). Des Hérons de retour le 24.02 à Harchies (ML). **GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*)** : Harchies, un hivernant (ML); Jambes 05, 06.01, 1 ex. (FLj, PLt); Hastière 12.01, 1 ex. (CHa) et Gendron-Celles 17.01, 1 ex. au bord de la Lesse (VHa).

**CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*)** : un fort passage devant le froid le 31.12 à Fiobecq (MMn); anormalement nombreux sur la Meuse en 01. **SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)** : début d'hivernage important en 12 avec des concentrations de  $\pm$  500 ex. à Harchies (ML), 50 à 180 ex. à Grand-Leez (JFN, JPJ, LN),  $\pm$  100 ex. à Roly (JBI), 30 à 55 ex. à Rhode-Sainte-Agathe (MWa) et 20 à 50 ex. à Gozée (CEAG). En 01-02, l'hivernage d'Harchies tombe à 200-250 ex. (ML); ailleurs, des Sarcelles sont notées en petit nombre un peu partout dont Bullange (LSc), Noisieux, Fronville, Grandhan (YF) et Havelange (JPBe), les plus fortes bandes comptant 55 ex. le 14.01 à Godarville (JSc) et 50 ex. le 16.01 à Lixhe (APu). Fin 02, 100 ex. le 24 dans la Dyle sont sans doute des migrateurs (CGe). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : Harchies, forte concentration en 12 avec 70 ex. au maximum les 08 et 10; disparition en 01, retour de 11 ex. le 10.02 et 40 ex. présents fin 02 (ECu, ML, MLn). Neuf autres observations : Ben-Ahin 06.12 et 14.01, 1 ex. (CGo); Walem 16.12, 07.01 et 17.02, 16, 5 et 1 ex. (MWA, OH); Liège 02 au 07.01, 3 ex. (CKo); Blaton 04.01, 1 femelle (ECu); Obigies 18.02, 3 ex. (MLn) et Cerfontaine 24.02, 1 mâle (Cl). **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : isolés et petits groupes en Brabant-Hainaut jusqu'au 19.12; peu représenté en 01-02 sauf après le 13.02 où l'on compte entre autres 50 ex. à Gaurain (MCA, PS), 200 ex. le 14 à Leers-Nord (FSm) et 70 ex. le 28 à Harchies (ML). **CANARD PILET (*Anas acuta*)** : quelques données du Brabant et du Hainaut en 12; 4 observations d'isolés en 01. En 02, 1 mâle le 02 à Gaurain (MCA, PS) et plus fréquemment à partir du 12 où 7 ex. à Gozée (BB) et 60 ex. à Harchies (ML) amorcent la remontée printanière. **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : quelques ex. dans la vallée de la Dyle, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et à Hofstade jusqu'à la fin décembre (BB, EP, JBI, MWa, PDU); présence à Harchies durant toute la période : 50-70 ex. en 12, une dizaine en 01-02, premiers retours fin 02 avec 25 ex. (ML); sur la Meuse, quelques exemplaires épars, notamment à Liège et à Godinne en janvier (GG, JPL, MLe, CKo); à Hofstade et Obourg, premiers retours constatés fin 02 (DV, VF, VL). **NETTE ROUSSE (*Netta rufina*)** : Harchies 16 et 17.12, 1 femelle (ECu). **FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)** : Vilvorde 07.01, 1 mâle (VF); Péronnes 14.01, 1 ex. (MCA, PS); Nimy 17.02 1 mâle (RD); Ronquières 18 au 27.02, 1 femelle (DD). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : très peu noté en 01 sauf à Walem, 100 ex. le 07 (MBA) et sur la Meuse où il est bien représenté, surtout à la fin du mois; on ne le signale pratiquement plus sur la Meuse en 02 alors que les observations reprennent en Brabant et Hainaut, principalement à partir du 13, avec des rassemblements atteignant 150 ex. le 09 et 80 ex. le 27 à Walem (MPr, VF) ou encore 50 ex. le 13 sur le canal de Charleroi à Ittre (ADt). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : commun en Brabant-Hainaut en 12, les principales bandes comptant  $\pm$  400 ex. à Harchies (ML), 195 ex. le 11 au barrage de Plate-Taille (JBI) et 145 ex. le 15 à Rhode-Sainte-Agathe (JPJ). En 01, sporadiquement en dehors de la Meuse où l'effectif hivernant passe de quelques dizaines à plusieurs centaines. Diminution sur la Meuse au cours de 02 et, comme pour le précédent, reprise des observations dans le Brabant et le Hainaut avec notamment 200 à 500 ex. à Gaurain (MCA, PS), 230 ex. le 14 à Leers-Nord (FSm), 150 ex. le 07 à Walem (MBA) et 110 ex. le 17 à Lessines (GBI). **FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*)**\* : Neerijssche 02.12, 1 femelle (VF); Lessines 17.02, 2 ex. (GBI); Ben-Ahin 14 au 20.12, 1 mâle (CGo, JLa). **GARROT À ŒIL D'OR (*Bucephala clangula*)** : en 12, 4 à 6 ex. à Harchies (ECu, ML, VF), 2 à 8 ex. sur les barrages de l'Eau d'Heure (Cl, CLy, JBI) et 1 mâle le 15 à Weerde (VF). Une trentaine de données en 01 et la moitié en 02 provenant du Brabant, du Hainaut et de la vallée de la Meuse où stationne le seul

groupe important : 55 ex. dont 3 mâles adultes à Lixhe le 16.01 (APu). **MACREUSE BRUNE (Melanitta fusca)** : 1 femelle le 03.12 à Obourg (BA), le 06.12 à Ben-Ahin (CGo) et le 03.01 à Jambes (FLj); 1 couple le 17.02 à Nimy (RD). **EIDER À DUVET (Somateria mollissima)** : Chertal 04.01, 1 mâle immature (EC); Meuse namuroise 14.01, 1 femelle (CHa, JHa). **HARLE BIÈVRE (Mergus merganser)** : 1 et 3 femelles à Harchies en 12 (ECu, ML, MMn), 1 mâle et 3 femelles les 15 et 16.12 à Hofstade (MWa, VF). L'hivernage pendant la période des grands froids est remarquable, principalement sur la Meuse qui héberge plusieurs centaines de ces Harles dont une troupe d'environ 200 ex. à mi-janvier, à Ben-Ahin. Ailleurs, toute une série de sites fournissent des observations dont le lac de Coö (PHa) et Fronville sur l'Ourthe (YF); les plus grosses bandes atteignent en 01, 20 ex. le 26 à Blaton (ECu), 32 ex. le 04 à Obourg (AP) et 45 ex. le 05 à Walem (YR). Moins fréquents fin 01 et courant 02 sauf à la fin de ce mois : apparition dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, 11 ex. le 25 à Falemprise (CLy, JPSc, HD) et augmentation à Walem où ils passent de 4 ex. le 26 à 70 le lendemain (VF). **HARLE HUPPÉ (Mergus serrator)** : du 18 au 27.02, à l'époque des retours, en Hainaut occidental, à Walem et Harelbeke; au plus 13 ex. le 18 et 12 ex. le 24 à Ploegsteert (PCI), 12 ex. le 25 à Péronnes (ED, PS); le 28.02, 1 couple à Hermalle-sous-Argenteau et 2 femelles à Visé (EC, YF). **HARLE PIETTE (Mergus albellus)** : des isolés le 10.12 à Harchies (ECu), les 10 et 17.12 dans la Dyle (EP, VF). À partir de début 01, l'hivernage est également exceptionnel aussi bien sur la Meuse où ils sont toutefois un peu moins nombreux que les bièvres, qu'en Hainaut et à Walem qui abrite une concentration oscillant entre 120 ex. à mi-janvier et 60 à 90 ex. en 02 (MPR, OH, SB, SL, VF). **HARELDE DE MIQUELON (Clangula hyemalis)\*** : Falemprise 19, 22 et 24.12, 1 ex. (CI, CLy, JBI); Nimy 22.12, 3 ex. (VF). **TADORNE DE BELON (Tadorna tadorna)** : moins abondant cet hiver; les maxima sont de 10 ex. ensemble en 12, le 20 à Harchies. (EP) et de 5 ex. en 01-02; en 01, quelques Tadorne apparaissent sur la Meuse (JF, GG, RLi).

La fuite des oies devant le froid et la neige est spectaculaire dès le 31.12 et se poursuit au cours de la première semaine de 01. Elle est principalement observée en Brabant et Hainaut; quelques données proviennent du Namurois et de la région liégeoise. Des **OIES CENDRÉES (Anser anser)**, **RIEUSES (Anser albifrons)** et **DES MOISSONS (Anser fabalis)** sont identifiées. Par la suite, quelques passages et des groupes erratiques sont notés en 01 en Moyenne-Belgique, surtout du 12 au 16 et du 26 au 30. Les observations sont plus fréquentes en 02, notamment en Hainaut où stationnent de petits groupes d'Oies cendrées et des moissons alors que les Oies rieuses qui étaient plus fréquentes en 01 ne sont repérées qu'en une seule occasion. Du 22 au 27.02, le mouvement de retour vers le Nord, pour les trois espèces, est très nettement perceptible en Hainaut, secondairement en Brabant et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Les données de 12 à 02 ont déjà été publiées en détail (Aves, 15 : 147-148). **OIE DES NEIGES (Anser caerulescens)\*** : Knokke-Heist 17.02, 1 ex. parmi une troupe d'**OIES À BEC COURT (Anser fabalis brachyrhynchus)** (PRa, O. et T. Rabau, B. Fripiat, A. Vanderborgh). **BERNACHE NONNETTE (Branta leucopsis)\*** : Harchies 26 et 27.02, 6 ex. (ADt, ECu, HLI, JPV, ML). **BERNACHE DU CANADA (Branta canadensis)\*** : Tongrinnes 28.01, 1 ex. blessé (JPL, Baurant); Péronnes-lez-Binche 28.01, 2 ex. (RLe); Ploegsteert fin 01 et début 02, 8 ex. (FSi, RVn); Rixensart 03.02, 7 ex. en vol vers le Nord (JT); Eijsden (Hollande), 6 ex. séjourner du 09.02 au 20.03 (EC, GG). **CYGNE TUBERCULÉ (Cygnus olor)** : quelques mouvements relevés au cours de la première semaine de 01 à Harchies (ECu, ML), Louvain-la-Neuve (JPSc), sur l'Escaut (MLn) et la Meuse (JF) où les hivernants restent ensuite assez nombreux. **CYGNE SAUVAGE (Cygnus cygnus)\*** : apport tout à fait inhabituel : Neerijse 10.12, 17.12 et 16.01, respectivement 2, 3 et 3 ex. (CGo, EP, PN, VF); Roly 10 au 19.12, 3 ex. (JBI, JSe); Stamburges 03.01, 1 ex.; Coö 06.01, 5 ex. (JPL); Lixhe-Lanaeken 14.01, 1 ex. (EC, YF); Meuse liégeoise en 01, 1 ex. (GG); Marcourt 20 et 27.01, 3 ex. (JW);

Nimy 25 et 27.01, 7 ex. (FDc, AVh, JPVh); Stambruges 25.01 au 27.02, 3 ex. (PS); Gaurain 30.01 au 14.02, 7 ex. (ED, PD, PDa, PS); Harchies 11.02, 3 ex. (AVB); Nimy 17.02, 9 adultes et 5 immatures (RD); Walem 17 au 27.02, 1 ex. (CEy, E. Walravens, H. Moulin, MWa, PJa, VF); Herbeumont 25.02, 2 ex. (ADn); Harchies 25 et 26.02, 3 ex. (ADt). **CYGNE DE BEWICK (*Cygnus bewickii*)** : Harchies, 1 adulte le 09.12 (ECu) et 5 ex. les 27 et 28.02 (ML); Walem 20.01, 4 ex. (MWa).

**AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*)\*** : Boitsfort 23.02, 1 ex. (EP). **BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)** : répandue en Moyenne-Belgique pendant la période de froid, par ex. : 10 ex. le 13.01 dans la vallée de la Dyle (BV); l'une ou l'autre Buse s'aventure même en ville (Gembloux, Ixelles) (JPJ). En 01, 20 à 25 ex. fréquentent régulièrement une place à charognes à Wallerode (HWe). Fin 02, des parades sont remarquées en Hainaut (JBI) et à Champlon (MI) ainsi que des migratrices les 26 et 27 en Brabant (VF, YR). **BUSE PATTUE (*Buteo lagopus*)\*** : est centralisé un nombre relativement élevé d'observations rapportées à cette espèce : Ambresin 20.01, 1 ex. (JPJ); Roucourt 04.02, 1 ex. (ECu); Nivelles 05.02, 1 ex. (BA); Harchies 12.02, 1 ex. (ML, JPVh); Wenduine 17.02, 1 ex. (PRa et al.); Strée 22 au 24.02, 1 ex. (JDo, JMLt). **ÉPERVIER (*Accipiter nisus*)** : l'augmentation du nombre des données se poursuit : environ 90 pour la période, la moitié en 01. En 01 et 02, des Éperviers se rapprochent régulièrement des mangeoires (AP, CHa, HW, JBI, MDe, MMn, PTo). **AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)** : 13 observations dont 1 ex. le 01.01 à Haasrode (VF) et 2 ex. le 11.02 à Rhode-Sainte-Agathe (PWT). **MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)** : passage ou erratisme début 12 : 5 ex. le 01 à Havelange (CH), 1 ex. vers WSW le 03 à Ombret (JF) et 1 ex. vers S le 05 à Warsage (JTe). En hiver, 1 ex. le 22.12 à Nimy (VF), le 28.12 à Bourlers (BTh) puis, pendant les froids, le 03.01 à Wallerode (HWe), le 04.01 à Harchies (ECu, ML) et Neuville (FBI), le 30.01 à Givry (AP); ensuite, huit données du 09 au 27.02 se rapportent peut-être à une première remontée diffuse : Strée 09, 1 ex. (CLO); Flostoy 10, 3 ex. (CMA); Godarville 10, 1 ex. (JSe); Wallerode 12 au 23, 1 ex. (HWe); Harchies 12 au 27, 1 ex. (ML); Ombret 23, 1 ex. (JF); Péronnes 24, 2 ex. (PS); Schockville 27, 2 ex. (ABI). **PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*)\*** : Harchies 04.01, 1 immature (ECu); vallée de la Dyle 03, 11 et 27.02, 1 ex. (DE, MFa, JJ. Strijckmans, PWT, Trog). **BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)** : Harchies, 1 femelle trois fois en 01 (ECu, ML); Acoz, 1 femelle vers NNE le 26.02 (APa). **BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*)** : l'abondance des hivernants est exceptionnelle à partir de début 01 : à 8 observations de 12 font suite une cinquantaine de données en 01 et plus de 30 en 02. Elles proviennent pour une large majorité de l'Ouest de la Meuse en 01, en totalité en 02. Quelques oiseaux sont notés en mouvement vers le Sud les 02, 03.01 (JPSc, PTo). Plusieurs observateurs signalent par ailleurs des Busards se rapprochant des lieux habités en 01-02 et allant même jusqu'à chasser en pleine ville, Liège (MLe). Outre le nombre d'hivernants, la fréquence des mâles adultes fut tout aussi anormalement élevée, au moins en 01 : 41 % des busards en 01 et 26 % en 02.

**FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*)** : Grandhan 06.01, 1 ex. (YF); Eisenborn 22.01, 1 ex. (LSc); Sibret 17.02, 1 ex. (ABI).. **FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*)** : un petit nombre d'hivernants apparaît pendant la vague de froid : Ruisbroeck 03.01, 1 ex. (MWa); Grand-Hallet 05.01, 1 femelle (JPJ); Grand-Reng 06 et 09.01, 1 femelle (AP); Lubbeek 14.01, 1 ex. (JHI); Mont-Saint-Guibert 27.01, 1 femelle (JPJ); Harchies 27.01 1 mâle (ECu) et Bousval le 03.02, 1 femelle (YR). **FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*)** : plusieurs observations inhabituelles en ville (Liège, Verviers - JPJ, LSc) ainsi que des individus poursuivant des passereaux et même des Tourterelles turques, Theux (ADx).

**PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*)** : présence insolite le 19.01 d'une Perdrix en pleine gare de Namur (JF).

**GRUE CENDRÉE (*Grus grus*)** : une dernière vague de migratrices passe le 02 et le 05.12; 15 observations décrivent ce passage décelé en Ardenne et Moyenne-Belgique. Le 31.12, un petit groupe et une isolée à Chiny (JDe). Trois observations hivernales, en 01 : 9 ex. le 06 à Marilles (JVV), 27 ex. vers SSW le 07 à Spa (PTo) et 1 ex. au bord de la Meuse le 13 à Java (JPL). Les premières migratrices courant 02 : 1 ex. blessé le 13 à Hastière (VP), deux bandes le 14 et le 15 à Forges (PGI) et un vol le 27 à Schockville (ABI).

**RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*)** : en 01, nombreuses observations à Harchies (ML) ainsi que plusieurs en Brabant et à Visé (JHI, VL, YR, MLe). **FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*)** : anormalement abondantes sur la Meuse et l'Escaut en 01 tandis qu'à Harchies l'effectif décroît régulièrement de 12 à 02, passant de 1.000 ex. le 10.12 à 700 ex. le 18.02 (ML). La mortalité est assez importante pendant les grands froids. **OUTARDE BARBUE (*Otis tarda*)**\* : Merbes-le-Château fin 01, 1 femelle (RNOB).

**HUÏTRIER PIE (*Haematopus ostralegus*)** : 1 ex. le 31.12 à Harchies (ECu) et le 08.02 à Gaurain (PS)

**VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*)** : nombreux début 12 en Hesbaye et en Condroz sauf dans sa partie septentrionale, rare également au Pays de Herve. Des petits mouvements vers le Sud sont décelés dès le 03 et une fuite importante est relevée le 06 (ED, JPJ, JD, MMn). Par la suite, les Vanneaux restent assez fréquents en Moyenne-Belgique jusqu'au 31.12. Une seule donnée en 01 : 100 ex. vers le Sud le 14 à Bienne-lez-Happart (JPhE). Réapparition en petit nombre à partir du 10.02; le mouvement vers le Nord est bloqué dès le 14 par le retour du froid mais reprend nettement les 27 et 28.02 bien que des vols en sens contraire soient également notés. **PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)** : très rare, seulement 2 ex. le 05 12 à Gembloux (JPJ) et 1 ex. du 05 au 08.02 à Harchies (ML).

**BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*)** : quelques individus malgré le froid, en Brabant, dans la région liégeoise et la vallée de la Haine; 1 ex. le 18.02 à Amblève (Exc. Aves). **BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*)** : 1 ex. le 03.12 à Braine-l'Alleud (HW) et le 17.12 à Gozée (CEAG). **BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)** : 6 observations de 12 dont 1 ex. blessé au bec se posant sur un trottoir à Jambes (FLj); 2 données en 01-02 : Woluwe-Saint-Lambert 14.01, 1 ex. (MWa); Vossem 18.02, 1 ex. (EB). **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : 2 ex. les 10 et 26.12 à Harchies. Plus fréquent que de coutume en 01-02 : Harchies, 1 à 2 ex. en 01 puis 6 à 8 ex. du 24.01 à fin 02 (ML, YAm); Noisieux, ± 20 ex. du 01 au 07.01 (GK); Flobecq, 8 ex. le 24.01 (MMn); Obigies, 1 ex. le 03.02 (MLn); Castillon, 6 ex. le 18.02 (BCh) et 3 ex. vers le Nord dans la vallée de la Dyle le 24.02 (CGe). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : noté sporadiquement à Maisières (DV, CLf) et Falemprise (CLy) en 12, à Acoz, Nimy, Vilvorde et Vossem (APu, EB, DV, VF) en 01 ainsi que dans la vallée de la Dyle en 02 (CGe, MPri). **CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)** : Tournai 11.12, 3 ex. (JSh); Maisières 26.12, 1 ex. (DV). **CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)** : Harchies 10.12, 1 ex. (ECu). **BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)** : Noisieux 02.01, 1 ex. (CK). **BÉCASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*)**\* : Péronnes 25.02, 1 ex. (ECu).

**GRAND LABBE (*Stercorarius skua*)**\* : Jambes 03.01 : 1 ex. (FLj). **GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*)** : Walem 07.01, 2 ex. (PDu), 20.01, 6 ex. (MWa); Jambes 21.01, 1 immature (FLj) et Gaurain 18.02, 1 adulte (MCa, PS). **GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*)** : pas moins de neuf mentions : Walem 16.12, 1 ex. et 07.01, 2 ex. (MBa, MWa). Kain 01, plusieurs (MLn); Boitsfort et Harchies 03.01, 1 adulte (ML, MWa); Uccle 09.01, 1 adulte (HW); Obourg 13.01, 1 ex. **Larus f. graellsii** (CLf) tout comme Walem 26.01 (VF); Woluwe-Saint-Lambert 15.01, 2 ex. (MBa). **GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)** : communs en Brabant, selon MWa davantage que l'hiver dernier; également nombreux en Hainaut mais par contre seulement signalé de temps à autre sur la Meuse. **GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*)** :

particulièrement répandus et nombreux en 01 en Hainaut, sur la Meuse et en Brabant où plusieurs centaines se concentrent notamment au dépotoir de Mont-Saint-Guibert avec un maximum de  $\pm$  1.000 ex. le 12.01 (JPJ). **MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)** : très communes cet hiver; en outre, le froid pousse bon nombre d'entre elles à fréquenter des sites inhabituels (villas...). **MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*)** : Nimy 17.02, 2 ex. (RD).

**PETIT PINGOUIN (*Alca torda*)\*** : Ostende 24.02, 1 ex. en mer (VF, P. du Bus).

**PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*)** : plusieurs groupes importants sont observés en 01 Harchies, 150 ex. (ML); Lubbeek 06 et 14, 41 et 40 ex. (JHL); Vilvorde 09, 200 ex. (SB, SL) et Wemmel 25, 50 ex. (RSn). A Pailhe, le retour d'un nicheur local est noté le 05.02 alors que la région reste vide de **PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)**, espèce très peu signalée en 01-02. **TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)** : exceptionnellement en hiver, 1 ex. le 09.01 à Rotheux en compagnie d'un Pigeon colombine (FBI).

**HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*)** : un dortoir d'une quinzaine d'individus tout l'hiver à Mouscron, les pelotes de réjection contiennent pour partie des restes d'oiseaux (PVo), un autre dortoir rassemble 14 ex. le 07.01 à Arquennes (DD); Mont-Saint-Guibert 05 et 06.12, plusieurs ex. exploitent un dortoir d'Étourneaux (***Sturnus vulgaris***) (JPJ). Observations en ville pendant les grands froids de 01 : Liège 15.01, 1 ex. dans un jardin du centre de la ville (L. Remacle); Bruxelles 20.01, 1 ex. place du Luxembourg (JPJ). **HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*)** : Deux-Acren 26.01 (GBI), Beaumont 18.02 (HG) et Ronquières 21 au 25.02 (DD), 1 ex chaque fois.

**PIC CENDRÉ (*Picus canus*)\*** : Hermeton-sur-Meuse 08.12, 1 ex. (JBI); Membach 28.01, 1 ex. (LSc). **PIC NOIR (*Dryocopus martius*)** : en Brabant, un chanteur le 02.12 à Rhode-Saint-Genèse (HW) et 1 ex. les 09 et 18.02 à Nethen (Trog).

**ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)** : fin du passage d'automne le 03.12 à Boitsfort (MWa). L'offensive du froid provoque une fuite vers le Sud remarquée le 31.12 et les jours suivants (AR, JPJ, MWa, PVo); les campagnes sont pratiquement désertées en 01. Avec le redoux, les observations se multiplient à partir du 11.02; les Alouettes sont fréquentes dès la moitié de ce mois tandis que les passages se poursuivent. **ALOUETTE HAUSSE-COL (*Eremophila alpestris*)\*** : Perwez 18.02, 10 ex. capturés (PMA, JPBo).

**PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)** : quelques-uns début 12 à Daussois (HG) et Lobbes (APr) tandis qu'à Boitsfort un très faible passage se poursuit tout au cours du mois (MWa); en 01, 2 ex. séjournent à Hermalle-sous-Argenteau (EC) et 1 ex. le 03 à Ruisbroeck (MWa); premier apport migratoire observé le 18.02 à Grandhan et Noiseux (YF). **PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)** : Walem 16.12 et 14.01, 3 et 1 ex. (MWa); Pécrot 13.01, 2 ex. (BV); Woluwe-Saint-Lambert 20.01 et 17.02, 1 ex. (MWa, Exc. Aves); Bousval 03.02, 2 ex. (HW) et Harchies 10.02, 2 ex. (BA). **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : 9 données pour la période, 1 ex. chaque fois : Woluwe-Saint-Pierre 14.12, Hofstade 16.12, Tervuren 23.12 (MWa), Walem 02.01 (PN), Ruisbroeck 03.01 (MWa), Jambes 05 au 28.01 (FLj), Hermalle-sous-Argenteau 08.01 (EC), Evere 08.02 (PVS) et Gougnyes 25.02, premier retour (APa). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)** : 20 observations avant le 15.01, seulement trois après.

**PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*)** : présence habituelle en Haute-Belgique et dans le Brabant; également rencontrée le 18.02 à Harmignies (ADu), le 22.12 à Kain (MLn) et du 17 au 27.02 à Obourg (BA, FDC). **JASEUR BORÉAL (*Bombus garrulus*)** : Harchies 03.12, 1 ex. (MMn); Louvain-la-Neuve 13.01, 1 ex. (JPSc) et Lierneux 19.01, 2 ex. (MDe).

**GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*)** : 6 observations de 1 ou 2 ex. avant le 18.12;

plus aucune jusqu'au 16.01, à Baileux (BTh). Le premier chant est remarqué le 27.01 à Mont-Saint-Guibert (JPJ). D'autres reprises du chant et de petits groupes migrateurs à partir du 12.02. **GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : communes en Haute-Belgique et en petit nombre ailleurs jusqu'au 31.12 où l'on observe d'importants passages vers le Sud à Boitsfort (MWa), Heusy (LSc) et Mouscron (PVo). Rares en 01-02, le seul groupe appréciable comptant une certaine d'oiseaux séjournant à Harchies en 01 (ML); pratiquement absente à l'Est de la Meuse à cette époque, faible retour à partir de la mi-février. **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : hivernage diffus limité à l'Ouest de la Meuse, mieux marqué en 12; premiers chants sporadiquement à partir du 28.01, Jambes (FL); retour dans la région de Granhan dès le 18.02 (YF). **GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)** : faible présence en 12. La fuite devant le froid est observée le 31.12 à Boitsfort (MWa), Heusy (LSc) et Mouscron (PVo); après cette date, une seule donnée, le 14.01 à Woluwe-Saint-Lambert : 1 ex. (VL), puis 2 ex. le 15.02 à Uccle (OH) et environ 200 ex. le 17.02 à Warsage (JTe). **MERLE NOIR (*Turdus merula*)** : passage vers SW le 01.01 à Rouveroy (AP). **TRAQUET PÂTRE (*Saxicola torquata*)** : Blaton 11.12, 1 mâle séjournant depuis un mois (RC); Thuillies 28.02, 1 ex. (JDo). **ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*)** : Theux 18.12, 1 ex. (ADx); Gembloux 28.02, un chanteur (JFN, LN).

**FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)** : 1 mâle le 04.12 à Verviers (LSc) et le 10.12 à Uccle (DE). **POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*)** : 6 observations en 12 à Harchies (ML, MMn) et deux autres en hiver à Bruxelles : 1 ex. le 21.12 à Uccle (OH) et le 15.02 à Schaerbeek (VF). **ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)** : Ombret 31.12 et 01.01, 1 chanteur (JF); Uccle 16.12 et 11.01, 2 et 1 ex. (DE); Auderghem 07.01, 1 ex. (PN) et Harchies 02, présent (ML).

Les **MÉSANGES CHARBONNIÈRES (*Parus major*)** et **BLEUES (*Parus caeruleus*)** fréquentent en grand nombre les endroits de nourrissage en 01-02; des **MÉSANGES NOIRES (*Parus ater*)**, **NONNETTES (*Parus palustris*)** et **BORÉALES (*Parus montanus*)** y sont également observées de même que quelques **SITTELLES TORCHEPOT (*Sitta europea*)**.

**BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*)** : Berg 19.01, un dortoir de 300 ex. dans le marais (VF). **BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*)** : absent du Brabant en 01 (HW), rare en Lorraine à la même époque (JPJ); noté parfois aux mangeoires et une fois dans le centre d'une agglomération, Lobbes 08.01 (PRv). **BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schœniclus*)** : 10 observations de 1 à 5 ex. entre 12 et 02 dont une à l'Est de la Meuse. **BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*)\*** : Perwez 24.02, 1 ex. capturé (PMa, JPBo).

**GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*)** : Boitsfort 12, suite d'observations particulièrement nombreuses depuis 10 (MWa). En 01 et dans une moindre mesure en 02, des Gros-becs fréquentent les lieux de nourrissage en nombre inaccoutumé; les observations aux mangeoires proviennent de la région bruxelloise (DE, HW, JT), de Jambes (OPi), Ombret (JF), Jupille (EC) et Winterslag (JT). **VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*)** : à l'exception de Rixensart (JT), n'est signalé qu'en petit nombre et de manière éparse en Brabant, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et la région liégeoise. **CHAR-DONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)** : de petites bandes dans la région bruxelloise de 12 à 02; à Harchies, environ 50 ex. en 01 et 75 ex. en 02 (ML). Ailleurs, noté irrégulièrement et en petit nombre du Hainaut à la région liégeoise; une exception : Obourg 25.02, 100 ex. (RD). **TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)** : régulier et localement abondant de 12 à 02 dans les provinces de Liège et de Brabant; en Hainaut, régulier en 12 et occasionnellement ensuite. L'hivernage se termine dès mi-février à Ombret (JF); fin 02, des passages ont lieu en Brabant (YR). **LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*)** : 3 ex. le 16.01 à Amay (JF), 2 ex. le 25.01 à Lobbes (PRv) et 30 migratrices le 11.02 à Sart-à-Rèves (HW). **LINOTTE À BEC JAUNE (*Carduelis flavirostris*)** : Gembloux 19.12, environ



20 ex. (JPJ); Lobbes 01.01, notée (PRv) et Uccle 21.01, 10 ex. (DE). **SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammea*)** : hivernage réduit : Boitsfort 03 et 18.12, 1 ex. (MWa); La Hulpe 16.12, 6 ex. (EP); Jambes 25 et 26.12, 5 et 2 ex. (FLj); Noisieux 02.01, 20 ex. (CK); Ombret 06 au 23.02, 1 à 3 ex. (JF) et Heusy 18.02, 3 ex. (LSc). **SERIN CINI (*Serinus serinus*)** : Ombret 10.12, 1 ex. (JF); Acoz 03 et 04.01, 1 couple (APu); Ruisbroeck 03.01, 6 ex. (MWa) et Uccle 05.01, 4 ex. (OH). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : seulement 2 ex. le 23.12 à Tervuren (MWa), 1 ex. le 07.01 à Auderghem (MBa) et 5 ex. le 28.02 à Couvin (JDo) en-dehors de l'Est de la province de Liège où il ne semble pas rare (BV, LSc, Exc. Aves). **PINSON DES ARBRES (*Fringilla cœlebs*)** : peu d'informations : faible hivernage en 12 en Forêt de Soignes (MWa) mais nombreux le 02.01 à Rhode-Saint-Genèse (PDs), un petit mouvement vers le Sud décelé le 01.01 à Châtillon (JPJ) et quelques citations aux mangeoires. **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : hivernage réduit sauf à Ransart (JBI); régulièrement observé aux endroits de nourrissage en 01-02 mais toujours en petit nombre.

**GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)\*** : Cortil-Noirmont 31.12, 1 des 2 ex. échappés de captivité (Gembloux) (JFN, LN). **CORNEILLE MANTELÉE (*Corvus corone cornix*)** : Cortil-Noirmont 28 au 31.12, 2 ex. (JFN, LN); Barry 03.02, 1 ex. (MCa, PS). **CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)** : Bastogne 20.02, première réoccupation des colonies (ABI). **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*)** : Spa 23.12, 1 ex. (PTo); Vielsalm 06.01, 1 ex. (AWa); Stoumont 14.01, 1 ex. (CH) et Logbiermé 17.02 (Exc. Aves).

## Phénomène ornithologique particulier à l'automne 1979

Le séjour d'un **PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*)** dans la vallée de la Dyle est un phénomène tout à fait exceptionnel à ce jour. L'oiseau observé, parfois durant plusieurs heures d'affilée, par toute une série d'ornithologues semblait s'apprêter à passer tout l'hiver.

Les rapports de demande d'homologation parvenus à la C.O.A. (à la date du 12.01.1980) indiquent une première observation le 20.10 à Rhode-Sainte-Agathe, puis, toujours au même site, les 23 et 24.10, 02, 10 et 11.11. L'oiseau est encore signalé le 16.12 à Florival (Ja. et Jo. van Esbroeck, J. Vanmerbeeck, H. François, Y. Robert, B. Votron, M. Bruton, Ysebaert).

Il serait intéressant que toute personne ayant observé ce Pygargue fournisse le détail de ce qu'elle a vu (heures d'observation, technique de chasse et de pêche, directions de vol, périodes de repos, etc.). L'ensemble de toutes les données permettrait de rédiger un texte se rapportant au comportement de l'oiseau durant son séjour. Les observations sont à envoyer directement à J. Tricot, rue Haute 40, 1330 Rixensart.

(JT).

## Chronique ornithologique 1978/3 (Aves, 15 : 183-184)

### ERRATUM

Les précisions du 17.06, apportées à la nidification de la **BARGE À QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)**, à Harchies, se rapportent au seul et unique cas de nidification observé à ce jour dans ce site, remontant à 1977 (Aves, 14 : 204). Les observations citées pour juillet et août concernent bien 1978.