


Observation d'un Héron crabier (*Ardeola ralloides*) aux étangs de Groenendael. (1)

Le 20 juin 1979, l'un de nous découvre le matin un Héron crabier adulte aux étangs forestiers de Groenendael, à Hoeilaart. L'échassier était perché sur une branche basse surplombant l'étang du château. Petit héron clair et trapu, au cou replié, il porte une livrée semblable au plumage nuptial. L'aspect est cependant moins roux et le bec gris cendré à bout noir. De fines et longues plumes blanches liserées de noir retombent sur le dos. Il reste longtemps immobile, puis fait sa toilette. Lorsqu'il s'envole, il paraît très blanc. Il se pose sur les nénuphars, marche avec la délicatesse d'un râle puis se fige et attend. Soudain il tend violemment le cou et capture un poisson qu'il avale aussitôt.

Le lendemain soir, nous le retrouvons perché sur son arbre. Avec d'autres ornithologues, nous l'observons longuement et le photographions. Il reprend sa pêche sur les nénuphars, puis, dérangé par notre présence, il s'envole vers un autre étang. Nous le redécouvrons rapidement près d'une berge à la végétation dense. Au vol, nous remarquons le cou replié en S, les pattes dépassant à peine les rectrices et les battements plus rapides que ceux du Héron cendré (*Ardea cinerea*). Inquiet, il dresse verticalement le cou, le bec horizontal. Lorsqu'il pêche en marchant, il le tend en avant. Pendant toute l'observation, il n'émit qu'un cri rauque et grave.



(1) Transmis à la Commission d'Homologation.



Photos : P. Ector.

Héron crabier (*Ardeola ralloides*), étangs de Groenendael, 21-06-1979.

Selon Lippens et Wille, (*Atlas des Oiseaux de Belgique et d'Europe occidentale*, 1972), cette espèce n'a été notée que 14 fois en Belgique entre 1840 et 1969. Il s'agit d'individus errant loin au Nord de leur aire de reproduction. On les observe principalement en mai et juin, parfois en août. D'après Cramp et Simmons (*The birds of the Western Palearctic, vol 1*, 1977), ces observations semblent de plus en plus rares. Les lieux de nidification les plus proches se situent dans les Dombes et en Camargue (une centaine de couples) et dans le Nord de l'Italie (plaine du Pô notamment : une trentaine de couples).

E. et M. WALRAVENS
av. des Nymphes, 20
1170 Bruxelles