

**Chronique ornithologique 1980/1 : Décembre 1979, janvier, février
(E. Clotuche)**

Liste des observateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée :

AA : Anonyme	FLj : F. Lejeune	JW : J. Waget
ABI : A. Blondlet	FLm : F. Lemaître	LN : L. Noulard
ACo : A. Cornet	FLu : F. Lutgen	LV : L. Verroken
ADr : A. Dernier	FM : F. Michel	MCA : M. Cantraine
ADu : A. Delaunois	FS : F. Scheuren	MDe : M. Deroanne
ADx : A. Doneux	FSm : F. Smigielski	MDq : M. Duquet
AHb : A. Habsch	FXD : F. Dupret	MI : M. Ittelet
AJ : A. Jacques	GBI : G. Blondeel	ML : M. Loison
ALj : A. Lejeune	GK : G. van der Kelen	MLg : M. Laguesse
AP : A. Pourtois	GLi : G. Linden	MLn : M. Languy
APr : A. Périel	GN : G. Nève	MMn : M. Moncousin
APu : A. Paquet	GR : G. Robert	MPe : M. Peeters
AR : A. Rappe	GRa : G. Rasson	MS : M. Schröder
BA : B. Amory	GRI : G. Rimaux	MWa : M. Walravens
BB : B. de Brier	HC : H. de Callatay	MWe : M. Wéry
BDe : B. Deceuninck	HD : H. Detiffe	NP : N. Percsy
BF : B. Frippiat	HLi : H. Liénart	OB : O. Bourlon
BFu : B. Fullyelove	HW : H. de Wavrin	OO : O. d'Oultremont
BJ : B. Jadin	HWe : H. Wiesemes	PA : P. Azorne
BT : B. Tricot	HWm : H. Wilmotte	PBW : P. du Bus de Warnaffe
BTh : B. Thiry	JBI : J. Bultot	PCq : P. Coquette
BVo : B. Votron	JD : J. Dumont	PDn : P. Dandois
CD : C. Dehem	JDe : J. Delvaux	PDt : P. Destexhe
CE : C. Eykermans	JaE : Ja. Van Esbroeck	PGI : P. Gall
CEAG : C. Etude Aves Gozée	JoE : Jo. Van Esbroeck	PLT : P. Lamotte
CI : C. Istasse	JFI : J. Fléron	PN : P. Neuray
CJo : C. Joukoff	JFB : J.F. de Bruyne	PRa : P. Rabau
CLy : C. Lemy	JFN : J.F. Noulard	PRy : P. Ryelandt
CPe : C. Percsy	JHo : J. Houbart	PVDA : P. Van Damme
CVa : C. Vansteenwegen	JHv : J. Havart	RDC : R. De Coster
DE : D. van der Elst	JLBo : J.L. Bodeux	RF : R. de Faily
DEt : D. Etienne	JLe : J. Lemaire	RHK : R. Heck
DH : D. Hubaut	JaLi : Ja. Liénart	RLi : R. de Liedekerke
DRa : D. Rabosée	JMo : J. Mois	RdP : Rd. Potvlieghe
DRo : D. Rosillon	JMCh : J.M. Charlier	RoP : Ro. Potvlieghe
DV : D. Voituron	JMLe : J.M. Leprince	RRo : R. Rosoux
DVa : D. Vantroyen	JMLi : J.M. Linden	RSn : R. de Schaetzen
DVe : D. Verroken	J&N : Jeunes et Nature	SFe : S. Fetter
EC : E. Clotuche	JPB : J.P. Bivort	SP : S. Peten
ELz : E. Lizen	JPHe : J.P. Herman	SPo : S. Powis
EPI : E. Pigeolet	JPJ : J.P. Jacob	TBR : T. de la Brousse
Eva : E. Vanbellingen	JPLh : J.P. Lhotellerie	Trog : Le Troglo
EW : E. Wielnant	JPLi : J.P. Liégeois	VF : V. Furnelle
EWa : E. Walravens	JPSc : J.P. Scohy	VL : V. Lenoir
FBI : F. de Bellefroid	JPY : J.P. Yernault	VU : V. Ugen
FDc : F. Declève	JT : J. Tricot	WP : W. Pfeiffer
FDf : F. Dufey	JTe : J. Teheux	YF : Y. Fanon
FHe : F. Héla	JTh : J. Thilmany	YR : Y. Robert

Conditions climatiques

Les conditions climatiques de l'hiver 1979-80 offrent un contraste très net par rapport aux conditions exceptionnellement rudes de janvier et février 1979. On peut donc parler d'un retour à la normale par rapport à l'hiver précédent.

Le mois de décembre fut très peu ensoleillé et anormalement doux, surtout au début, les précipitations ayant été très fréquentes et abondantes, surtout en Haute Belgique. Des gelées diurnes, rares et peu prononcées, n'ont été enregistrées qu'en cette même région où les neiges durables n'apparurent que le 28.

Janvier fut nettement plus froid pendant les deux premières décades, la seconde ayant été plus particulièrement ensoleillée et froide. La neige, tombée fin décembre, disparut de quasi toutes les régions au cours de la troisième décade.

Assez pluvieux au début, février évolua bientôt en un premier printemps très doux et assez ensoleillé, du 09 au 27, avec cependant encore de fréquentes gelées nocturnes. La seule gelée diurne fut notée le 29 sur le Plateau des Hautes-Fagnes.

Décembre fut très venteux, surtout du 09 au 18, avec un excès très net des secteurs WSW à SSE. Janvier et février furent par contre très calmes, sauf la période du 31.01 au 05.02, marquée par d'assez forts vents de S à SW.

Faits saillants

L'hivernage ne présente bien sûr pas le caractère exceptionnel de l'hiver précédent. On note néanmoins l'abondance inhabituelle des Harlès et Garrot, de même que du Busard Saint-Martin.

En février, les retours ou passages d'anatidés sont très bien mis en évidence, surtout dans la seconde décade.

Les passereaux hivernants tels que Grives et Fringilles sont assez peu abondants et les premiers retours des migrateurs précoces paraissent beaucoup moins soudains que chez les anatidés.

Durant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 12 : 02, 09, 16, 23 et 30; 01 : 06, 13, 20 et 27; 02 : 03, 10, 17 et 24.

Détail des observations

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) : les observations sont assez peu nombreuses en 12 et 01 et concernent rarement des groupes importants : Harchies 02 et 30.12, 27 et 16 ex., 13.01, 5 ex. (ML, MMn); Weerde, Walem et Hofstade 12.01, 8, 15 et 14 ex. (J&N); barrage de Plate-Taille 12.01, 16 ex. (CLy, MI). Retours progressifs et passages sont notés en février, essentiellement après le 10 : à Harchies-Pommerœul, par exemple, 02, 09, 19 et 23.12, 1, quelques-uns, 9 et 33 ex. (DVe, FXD, LV, ML), mais aussi sur la plupart des grands plans d'eau du Hainaut, du Brabant, de Hesbaye

* Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis ultérieur de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret.

et de l'Entre-Sambre-et-Meuse. **GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*)*** : 3 sites d'observation : Walem, 1 ex. (le même?) les 23.12, 12.01 et 02 et 19.02 et 3 ex. le 23.02 (MWa, PA, VF, Exc. Aves); Harchies-Pommerœul, 1 ex. du 16 au 30.12 et 1 ex. le 09.02 (HLi, GRi, JMLe, ML, PA, JPLh); Nimy (Grand-Large) 12.01, 2 ex. (JPLh, PA). **GRÈBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*)*** : Hofstade 23 et 31.12 et 06.01, 1 ex. (MWa, GRa, BVo, JFI); Weerde 28.12 au 12.01, 1 ex. (RoP). **GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)*** : Neerijse 01.12, 1 ex. (J&N). **GRÈBE CASTAGNEUX (*Podiceps ruficollis*)** : observations peu nombreuses, généralement de 1 ou 2 ex. Notons le seul chiffre important signalé : 10 + 6 ex. le 17.11 sur l'Escaut à Antoing (MLn, PCq).

FULMAR (*Fulmarus glacialis*)* : Knokke 01.02, 4 ex. morts sur la plage (SPe). **FOU DE BASSAN (*Sula bassana*)*** : 1 ex. électrocuté est récolté le 18.12 à Doische, dans l'Est de l'Entre-Sambre-et-Meuse (RRo); 1 ex. en vol bas à Quevaucamps (Hainaut) le 18.12 (ECu).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : peu observé : 1 ex. tout le mois de décembre à Harchies-Pommerœul et 5 ex. le 21 (GRi, HLi, JMLe, ML); Baudour (Saint-Ghislain) 12.12, 1 ex. sp. (BA); barrage de Plate-Taille 12.01, 1 adulte et 1 immature (CLy, MI) et 1 ex. le 17.01 à Oost-Maarland (Basse-Meuse liégeoise) (EC).

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) : les conditions climatiques assez clémentes ne provoquent guère de très fortes concentrations et les observations sont fréquentes dans toutes les régions. Notons seulement les deux groupes les plus importants de janvier : 15 et 23 ex. les 12 et 17 à Hofstade (J&N, PRa) et au moins 40 et 20 ex. les 13 et 17 à Oost-Maarland (EC, JTe). La dispersion reprend en s'accroissant encore avec le dégel de février. Le 10.02 sont entendus les premiers cris de parade à la colonie condruzienne de Pailhe (RLi). **GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*)** : Harchies-Pommerœul 31.12, 1 ex. (ML, MMn).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) : en 12, concentration de 1.500 ex. le 09 à Gozée (CEAG). En 01 et début 02, les rassemblements importants sont fréquents, même en Haute-Belgique (Coo, Eupen, Beho, Gozée, Plate-Taille, ...), les deux sites les plus importants, Hofstade et Oost-Maarland, rassemblant respectivement environ 2.000 et 2.500 ex. (PRa, EC, JTe). **SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)** : peu fréquente début 12, elle devient abondante dès les premières neiges, après le 20, mais n'est pas observée à l'Est de la Meuse; nette diminution en 02. Harchies-Pommerœul, \pm 340 ex. le 20.12, \pm 500 ex. en 01, 100 à 150 ex. en 02 (ML, DVe, GRa, LV, VF); Grand-Leez, 25 à 60 ex. à partir du 22.12, \pm 200 le 04.01 et maximum de 11 ex. en 02 (le 02) (ELz, JFN, LN, BDe); vallée de la Dyle, maximum d'environ 80 ex., le 02.01 (GK); Saint-Ghislain 25.12, 22 ex., 17.02, 33 ex. (ADu); Godarville 13.01, 40 ex., 24.02, 2 ex. (JSe). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : peu observé, sauf à Harchies-Pommerœul où il est présent toute la période, au nombre de 20 à 30 ex. en 12, encore 20 ex. le 13.01 et 9 ex. le 09.02 (ML, HLi, PA, JPLh); Baudour 12.12, 1 couple (BA); Dyle, 02 et 05.12, 1 mâle (GK, GN); Walem 12.01, 2 mâles, 19.02, 5 ex. (VF). **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : hivernage quasi nul. Les 15 observations signalées, essentiellement en Brabant et Hainaut, se répartissent en effet comme suit : 3 début décembre, 4 entre le 20.12 et début 02, et enfin 8 à partir du 09.02, amorce du passage printanier aux premiers beaux jours, avec notamment 1 couple le 23 en Meuse hutoise (ADr). L'observation la plus remarquable est sans doute celle de 12 ex. le 12.12 sur le lac de Robertville (JD), toutes les autres concernant des isolés ou groupes de moins de 5 ex., sauf 4 observations de 8 à 20 ex. en février. **CANARD PILET (*Anas acuta*)** : situation comparable à l'espèce précédente : une dizaine d'observations, souvent d'ex. isolés,

en Brabant, Hainaut et Meuse liégeoise en 12 et 01, mais il est régulier à Harchies (RDC, ML, MMn). Plus fréquent en février, surtout à partir du 09 : notons 23 et 34 ex. les 09 et 19 à Malines (Nekkerspoel) (BVo, VF). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : peu répandu. Harchies-Pommerœul, 20 à 32 ex. au moins jusqu'au 20.12, 4 à 7 ex. en 01 malgré la glace et une dizaine en 02 (AJ, ML, DVe, LV); Hofstade, 4 observations de 2 à 11 ex. au moins entre le 15.12 et le 17.01 (VF, GRa, J&N, PRa); les quelques autres observations concernent des isolés ou petits groupes, sauf 2 en février, où s'amorce le passage printanier : Walem 19.02, 40 ex. (VF) et Baudour 24.02, 11 ex. (ADu). **FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)** : 2 données seulement, dans le Haut-Escaut : Hérinnes 20.01, 1 femelle et Obigies 20.01 au 04.02, 1 femelle (la même?) (MLn). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : la plupart des observations, nombreuses par ailleurs, concernent des isolés ou groupes de moins de 8 ex. en 12 et 01. On retiendra surtout : La Hulpe (Solvay) avec environ 50 ex. en 12 et encore 30 ex. le 01.01 (EVa, FHe, J&N, SP, VF); Rhode-Saint-Genèse, 31 et 18 ex. les 16 et 20.12, 90 ex. (VF). Dispersion encore plus forte et amenuisement des bandes en 01 où l'on notera cependant 24 et 30 ex. les 13 et 31 à Ben-ahin (ADr). A nouveau des groupes plus importants et plus fréquents en février, surtout après le 09 : une amorce très nette des retours printaniers est notée à Harchies-Pommerœul, dans la vallée de la Dyle et le Brabant en général, à Grand-Leez le 19, à Oost-Maarland, de même qu'au lac de Robertville, avec 2 mâles et 2 femelles le 28 (JD). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : relativement peu fréquent et abondant en 12, il se répand en groupes nombreux mais le plus souvent assez modestes pendant la période la plus froide, de fin 12 à début 02 : on le rencontre alors partout, sauf en Ardenne. Le début de la période printanière se marque par une diminution des plus grosses bandes correspondant à une augmentation (parfois passagère) des petites et sur les sites de nidification. Dans la vallée de la Dyle, par exemple, l'effectif passe d'une cinquantaine d'ex. environ en 12 (mais 90 le 29) (VF) à une vingtaine seulement en 01, pour aller de 40, le 02.02, à environ 340 puis 230 et enfin 75 ex. les 09, 21 et 29 (FHe, GK, GN, J&N, JPJ, JPSc, OO, SP); à Grand-Leez, par contre, 5 ex. seulement de 12 à 02, puis 38 et 57 ex. les 19 et 22.02 (ELz, JPJ). Le site d'hivernage le plus important est celui d'Oost-Maarland : de 300 ex. à la mi-12, l'effectif passe à environ 2.000 ex. en 01 et début 02, pour retomber à environ 200 ex. le 25 (EC, JTe). **FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*)*** : 1 ex. (le même?) les 13 et 19.01 à Hofstade et Walem (JaE, JoE, CJo, A. Joukoff). **GARROT À CEIL D'OR (*Bucephala clangula*)** : sans atteindre bien sûr les chiffres records obtenus lors des hivers très rudes comme celui de 1978-79, le nombre d'observations peut être considéré comme élevé pour un hiver normal : plus de 25 (3 en 12, 8 en 02) sur une douzaine de sites (dont 6 sur la Meuse). La plupart concernent 1 ou 2 ex.; Harchies-Pommerœul, 5 ex. du 16 au 30.12 et 4 ex. fin 02 (HLi, ML, AJ, DVe, LV); 4 ex. sur la Meuse entre Dave et Yvoir le 13.01 (JFB); environ 12 ex. à Lixhe le 16.01 (APu). **MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*)** : Plate-Taille 12.01, 1 ex. (CLy, MI); Vieux-Héverlée 02.01, 1 ex. (J&N); Oost-Maarland 07.02, 2 mâles (EC). **MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*)** : Obourg 08 et 12.12, 1 et 3 ex. (BA); Rhode-Sainte-Agathe 29.12, 1 mâle (VF, SP). **EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*)** : une seule observation : Dave, tout le mois de décembre, 1 femelle, peut-être échappée de captivité (FLj). **HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*)** et **HARLES femelles sp.** : même remarque que pour le Garrot à œil d'or. Dix-huit observations dont 3 en 12 et 4 en 02. Hainaut, 2 observations en 12 (Obourg et Gozée) et 3 en 01 (Obigies, Harchies, Falemprise) (BA, CEAG, MLn, ML, CLy, MI). En Meuse, une observation entre Dave et Yvoir (2 ex. le 13.01), 2 à Ben-Ahin (6 et 4 ex. les 13 et 18.01) et 7 en aval de Liège, où le site de Oost-Maarland semble occupé toute la période avec un maximum de 15 ex. à la mi-janvier (ADr, DRa, EC, JFB, JTe, RLi, Exc. Aves). Les deux seules observations brabançonnaises

sont réalisées en février, à Walem (4 ex. le 02) et Weerde (Exc. Aves, J&N). **HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*)** : barrages de l'Eau d'Heure, Plate-Taille 24.12, 1 femelle (Cl); Nimy (Grand-Large) 13.01, 1 mâle et 1 ou 2 femelles (DV, JPLh, PA); Oost-Maarland 13.01, 10 ex. : nombre particulièrement élevé pour un site aussi éloigné de la côte (JTe, Exc. Aves). **HARLE PIETTE (*Mergus albellus*)** : comme pour le Harle bièvre, abondance inhabituelle d'observations et des effectifs; notons cependant que la proportion de mâles est plus faible que l'hiver précédent. En dehors de 2 femelles présentes respectivement à Harchies et Rhode-Sainte-Agathe dès début 12 (GRi, ML, RDC, VF, FHe, GK, J&N, PN), toutes les observations se situent après le 10.01. Les sites occupés, en plus des deux précités, sont Walem (CE, RoP, VF), Obigies (MLn), Falemprise (JPLh, JSe, PA) et la Meuse, surtout en aval de Liège. Généralement moins de 4 ex., sauf 12 ex. le 12.01 à Walem (VF) et en Basse-Meuse liégeoise où environ vingt ex. sont présents de la seconde décade de janvier à la seconde décade de février, dont 8 mâles au moins le 17.01 à Oost-Maarland (ADr, APu, DRa, EC, FLj, JF, JTe, PLt, RLi). **TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)** : toujours quelques observations, de 1 à 4 ex. max. dispersés sur les plans d'eau du Brabant et du Hainaut. Notons seulement une exceptionnelle observation ardennaise : 1 ex. le 24.02 à Thommen (HWe).

Quelques passages d'**OIES GRISES (*Anser sp.*)** : sont notés, surtout dans la seconde décade de décembre, mais aussi en janvier. Ils concernent surtout l'**OIE CENDRÉE (*Anser anser*)** : (sauf mention contraire ci-après). Pratiquement aucun stationnement durable n'est signalé. Des mouvements de retour sont notés à partir du 30 janvier. Saint-Ghislain 12.12, 18 ex. en vol (BA); Kain 12.12, 18 ex. (sp.) en vol vers le Sud (MLn); Francorchamps 12.12, une bande (sp.) vers le SW (JD); Anserœul 16.12, 40 ex. vers le SW (DVe, LV); Obigies 16.12, 62 ex. (sp.) vers le SSW (MLn); Forges 18.12, 20 ex. vers le SW (PGI); Renaix 20.12, 2 et 1 ex. (sp.) (DVe, LV); Boitsfort 21.12, 3 ex. (sp.) vers le NE (sp.); Rouveroy 23 et 24.12, 30 **OIES DES MOISONS (*Anser fabalis*)** au sol (AP); Forges 10.01, 12 ex. vers le NW (PGI); Macquenoise 11.01, passage vers le S (DH); Ombret 12.01, 6 ex. (sp.) vers le SW (JF); Oost-Maarland 13.01, 20 **OIES RIEUSES (*Anser albifrons*)** au sol (JTe, Exc. Aves) et 17 ex. (sp.) en vol bas le 17.01 (EC); Uccle 15.01, 11 ex. (sp.) vers le SSW (DE); Obigies 17.01, 1 ex. au sol (MLn); Flobecq 30.01, vol vers le NE (MMn); Wardin (Lux.) 30.01, ± 20 ex. (sp.) en vol (ABI); Thorembais-Saint-Trond 01.02, 27 ex. vers l'Ouest (BDe); Gembloux 03.02, 5 ex. (sp.) en vol (ELz); Macquenoise début 02, 8 ex. (HD); Louvain-la-Neuve 05.02, 3 ex. vers le NW (JPSc); Biesmes 10.02, 1 passage nocturne (sp.) vers le Nord (CLy); Malines (Nekkerspoel) 19.02, 2 ex. au sol (VF); Braine-le-Château 29.02, 1 passage nocturne (sp.) (GN). **BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*)** : Rixensart 16.01, 4 ex. en vol vers le Nord, assez haut (GRa). **CYGNE DE BEWICK (*Cygnus bewickii*)** : vallée de la Dyle, Vieux-Héverlée, 1 ex. le 01.12, 6 ex. le 29 (J&N, SP, VF), Rhode-Sainte-Agathe 09.12, 1 immature (FHe); Harchies 19.12, 6 ex. (HLi, ML); Oost-Maarland 12.12, 1 ex. (EC); Malines 09.01, 1 ex. dans un pré inondé (BVo). Renaix 10.02, 4 ex. en vol assez haut vers le NNE, identifiés, aux cris, comme Cygnes de Bewick ou **CYGNES SAUVAGES (*Cygnus cygnus*)***.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) : bien présente dans toutes les régions de Haute et Moyenne-Belgique pendant toute la période. Une bonne vingtaine d'ex. au nourrissage (charognes) en janvier à Meyerode (Wallerode) (HWe). Quelques indices de passage printanier dans la seconde quinzaine de février, plus marquée à la fin. Le 19.02, à Trooz, une aire a déjà été rechargée (DRa) et les premières parades sont bientôt observées : Bomal le 22, Gerpinnes le 23, Saint-Ghislain le 24, Baileux le 29 (YF, CLy, ADu, BTh). **EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)** : plus de 80 observations, bien réparties dans toutes les régions. Notons entre autres : capture de 5 Etourneaux en

vingt minutes à Wardin (Neffe) (ABI); Eisenborn 24.02, un couple en parade (LSc); Châtelineau 28.02, 1 femelle en vol vers le NE (MI); plusieurs observations au voisinage des mangeoires et des habitations (ABI, BT, JPJ, JTe, MMn). **AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)** : signalé notamment dans la vallée de la Dyle et à Bousval (J&N, VF); Waimes 26.02, 1 ex. en migration vers le NE (JD). **MILAN ROYAL (Milvus milvus)** : un ex. aurait hiverné dans la région de Mazée, Entre-Sambre-et-Meuse (JPJ, de seconde main); signalé aussi le 23.12 à Bra-sur-Lienne (BT) et le 18.01 à Baulers (JMCh, PRy); passage d'un ex. vers le SW les 03 et 06.01 à Huy et Sautin (ADr, JPSc); 3 observations de février annoncent peut-être le début des retours printaniers : 1 ex. le 18 à Thiaumont et le 22 à Amblève (Hepscheid) (JMo, WP) et environ 10 ex. de passage le 18 à Heppenbach (AHb). **PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (Haliaeetus albicilla)*** : Gozée 29.12, 1 ex. volant dans la direction Landelies-Thuin (J. Waget). **BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)** : Saint-Ghislain 18.12, 1 ex. (ADu). **BUSARD SAINT-MARTIN (Circus cyaneus)** : encore très abondant cet hiver, dans toutes les régions : en 12, plus de 30 observations, sur 19 sites, dont un dortoir accueillant jusqu'à 10 ex. (le 17) à Rouveroy (AP); en 01, une vingtaine d'observations, en douze localités; en 02, une trentaine d'observations, en vingt-deux localités, dont un dortoir accueillant jusqu'à 5 ex. (les 15 et 29) à Longvilly (Moinet) (ABI); plusieurs sites rapportent des observations répétées au cours de périodes plus ou moins longues. Les 16.01 et 02.02, à Theux, une femelle est identifiée comme **BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus)**, peut-être échappée du parc animalier assez proche de Hellental en Allemagne (ADx).

FAUCON PÉLERIN (Falco peregrinus) : Bruxelles 19.12, 1 ex. immature en vol assez bas (HW). **FAUCON ÉMERILLON (Falco columbarius)** : Harchies 20.12, 1 ex., 12.01, 1 femelle (VF, ML); Bossut-Gottechain (Pécrot), 1 ex. femelle ou immature (PRa); Noisieux 09.02, 1 mâle (FM); Havelange 28.02, 1 ex. (RLi). **FAUCON CRÉCERELLE (Falco tinnunculus)** : sur un transect d'environ 50 km entre Philippeville et Beaumont, environ 18 ex. sont recensés fin 01, 4 seulement le 24.02 : ils semblent éprouver des difficultés à se nourrir, car 2 ex. capturés ont le bec souillé de terre (MI).

GELINOTTE DES BOIS (Tetrastes bonasia) : Corbion 16.02, 1 ex. mâle (APu).

GRUE CENDRÉE (Grus grus) : abondance inhabituelle d'observations toute la période. En décembre, on observe deux périodes de passage : la première du 12 au 16, la seconde les 25, 28 et 29 (ABI, AL, BTh, DEt, HWe, THv, MS, WP). Tous les groupes dénombrés comptent moins de 20 ex., souvent moins de 10. Dans la région de Lierneux-Bihain-Vielsalm séjournent en outre 8 ex. du 10 au 25.12 et 15 ex. y sont signalés aussi à partir du 20.01 (MDe). Quatre observations encore concernent des attardés ou hivernants : Tavigny et Longvilly 09.01, 8 ex. (ABI); Bras-bas 12.01, 9 ex. vers le S (DRo); Verviers 14.01, 25 et 10 ex. vers le SSE (LSc) et Hollange (Sainlez) 02.02, 12 ex. vers l'Ouest (JTh). Premières remontées printanières à Wavre le 10.02, 40 ex. et à Sart-Lierneux le 27, environ 200 ex. (JT, MDe).

RÂLE D'EAU (Rallus aquaticus) : noté fin 12 à Rhode-Saint-Genèse, fin 12 et début 01 à Woluwe-Saint-Lambert, mi-01 à Gozée et début 02 à Pommerœul (Eva, VF, BVo, CEAG, DVe, LV). **POULE D'EAU (Gallinula chloropus)** : abondante sur l'Escaut en amont de Tournai (Kain-Obigies) : 80 à 150 ex. en 12 et 01 (MLn); 300 ex. le 29.02 sur des prairies au bord de la Sambre à Moignelée (MI). **FOULQUE MACROÛLE (Fulica atra)** : deux grosses concentrations : Harchies, environ 1.000 et 750 ex. début 12 et le 13.01 (RDC, ML); Oost-Maarlant, 3.000 à 5.000 ex. du 13.01 au 07.02 au moins, environ 1.000 ex. le 25.02 (JTe, EC). Assez abondante partout,

sauf à l'Est de la Meuse. Premiers retours printaniers et comportements territoriaux le 09.02 à Harchies, à Freux le 11, à Longchamps (Lux.) le 19 et à Pailhe le 27 (ML, ABI, RLi).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) : très nombreux début 12 en Hesbaye namuroise et dans la région de Mons-Tournai, rare en Brabant et Condroz; il se raréfie très rapidement dès les premières neiges, fin 12, mais quelques erratiques sont encore observés en 01. Les retours restent modérés dans la première moitié de 02, mais il réapparaît en Haute-Belgique pour la fin du mois. Quelques ex. cantonnés dès le 24 à Roly (MI). **PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)** : Sombreffe 09.12, 44 ex. en vol avec des Vanneaux (JFN: LN); Grand-Reng 12.12, \pm 25 ex. au sol (AP); apparition passagère en Hainaut avant la détérioration du temps : Leers-Nord 19 et 21.12, 120 ex. et 30 ex. (FSm); Rouveroy 22.12, 1 ex. (AP); Renaix 24.12, 1 + 20 ex. en vol vers l'Est (DVe, LV); Pommerœul 26.12, 1 ex. (GRi); Saint-Sauveur 31.12, 1 ex. (DVe, LV). Premier retour fin 12 : 75 ex. le 25 à Petegem (DVe, LV).

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) : observée presque uniquement en Hainaut, parfois en nombre : Harchies 16.12, 50 ex. (HLi); Renaix (Basse-Durenne) 24 et 31.12, au moins 70 et 100 ex., 02.01, 52 ex. (DVe, LV); Warcoing 22.12, 13 ex. parmi des Vanneaux (FSm); Petegem (Escaut) 25.02, 87 ex. sur environ 5 ha (DVe, LV); 26 autres observations, dont 8 seulement en 02, concernant le plus souvent 1 ou 2 ex. **BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*)** : Gembloux 16.02, 1 ex. (BDe). **BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)** : une dizaine d'observations réparties sur toute la période, dont 1 ex. vu plusieurs fois en 12 à Trooz et trouvé mort le 20.02 (JTe); Rhode-Saint-Genèse, Nivelles, Ottignies, Horrues, Kain, Maisières, Virelles, Trooz (autre endroit) (EVA, JMCh, BF, EW, MLn, FDC, JPSc, MLg, PVDa). **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : plusieurs observations de 1 ou 2 ex. à Harchies à partir du 20.12 : l'hivernage y est régulier depuis quelques années (DVe, LV, GRi, ML, VF); Forges 12.01, 3 ex. près de la Wartoise (PGL); Fromiée (Gerpennes) 16.01, 2 ex. en vol (CLy); Lixhe 19.01, 1 ex. au bord de la Meuse (DRa); Falemprise 16.02, 1 ex. (JPLh, PA). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : anormalement abondant : 18 observations (7, 8 et 3 en 12, 1 en 02) réparties dans toutes les régions, Ardenne comprise : Grandhan 13.01, 2 ex. au bord de l'Ourthe (YF); présent tout 12 et 02 à Gembloux, avec un maximum de 4 ex. le 08.12 (ELz). **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)** : 5 sites d'observation, ce qui est exceptionnel : Vieux-Héverlée 01.12, 1 ex. (J&N); Erbisœul 18.12, 3 ex. (ADu); Obourg 30.12, 1 ex. (DV); Vilvorde 06.01, 1 ex. (RoP); Hermalle-sous-Argenteau 27.01 et 07.02, 1 ex. au bord de la Meuse (EC).

GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*) : Renaix 20.12, 1 ex. (DVe, LV); Vilvorde 06.01, 1 adulte (RoP); Hofstade 06.01, 1 ex. (BVo); Walem 12 et 13.01, 1 et 2 ex. adultes (VF, RoP), 02.02, 1 ex. (Exc: Aves); Ramegnies-Chin 16.01, 1 adulte (MLn). **GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*)** : quelques observations en Hainaut : Pommerœul 16.12, 1 ex. (HLi); Haut-Escaut (Kain, Hérinnes, ...), 4 ou 5 ex. en 12, 1 à 2 en 01 et 1 en 02 (FSm, MLn); Renaix 02 et 06.01, 1 adulte en vol vers le SSW et le NNW (DVe, LV). **GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)** : observations, devenues régulières, sur les dépotoirs ou quelques plans d'eau (dortoirs) ou en mouvements locaux dans le Brabant (où il continue à augmenter), le Hainaut et les vallées de l'Escaut et de la Meuse. **GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*)** : La quasi absence d'observations en 12 (Auderghem, Val-Duchesse, le 24) et 02 (Ramegnies-Chin) ne représente peut-être pas un phénomène réel; observé en 01 dans les mêmes régions que l'argenté, mais toujours en nombre beaucoup plus réduit. La Basse-Meuse liégeoise semble la mieux fréquentée (DRa). **MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)** : deux observations ardennaises : Recogne 12 et 26.12, 2 et 1 ex. (JPJ); Grandhan 13.01, 4 ex. (YF).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : plusieurs groupes, parfois importants, en Hainaut : Harmegnies 09.12, 11 ex. (ADu); Cordes (Arc-Ainières) 16 et 20.12, environ 150 ex. dans des betteraves (DVe, LV); Saint-Sauveur (Basse-Durenne) 31.12, 27.01 et 11.02, \pm 30 ex., 110 ex. et 50 ex. (DVe, LV); Pailhe 19.02, premier chant (RLi). **PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)** : très nombreuses observations. Forte migration vers le Sud les 03 et 04.12 à Chimay (BTh). De nombreuses bandes, parfois très importantes et divers mouvements dans l'Entre-Sambre-et-Meuse tout le reste de la période : par exemple \pm 4.000 ex. le 06.01 à Gerpinnes et \pm 2.000 ex. le 13.01 à Hemptinne (Phil.) (CLy); plusieurs milliers en vol vers le Sud le 10.02 à Baileux (BTh). Hivernage assez important aussi, mais en plus petites bandes, dans le Condroz (ELz, RLi). Nettement moins abondant dans les autres régions. Migration printanière et réapparition de bandes en Ardenne après le 20.02 (ABI, FDF, LSc). **TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*)** : 230 ex. le 18.12 à Erbisœul (ADu); première observation (1 ex.) depuis trois ans à Nobressart (JMo).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) : quelques dortoirs, de 5 à 10 ex. à Graty en 12 (JPY), Baulers et Evere en 01 (JMCh, PRy, VF), Visé et Thoricourt en 02 (EC, EX). **HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*)** : Gembloux 04.01, 1 ex. (ELz).

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) : quelques observations dans le Brabant et le Hainaut : Rhode-Saint-Genèse, Rhode-Sainte-Agathe, La Hulpe, Harchies-Pommerœul, Overijse, Hofstade, Genval (EVa, FHe, J&N, SP, GRa, GRi, ML, OO, VF).

COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*) : Ixelles, plateau du Schoolgat, 2 ex., présents toute l'année (GK). **ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*)** : Saint-Sauveur (Garceau) 16.12, 1 ex. (DVe, LV); Walhain-Saint-Paul 23.02, 1 ex. passe en chantant (BDe). **ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)** : des bandes, parfois assez importantes, sont observées pendant toute la période dans la région de Renaix, quelques isolés ou très petits groupes dans les autres régions. Des passages sont notés fin 12 et début 01, surtout en Hainaut (Renaix) et Brabant. Les premiers chants sont notés dès le début de février, et elle passe ou stationne en nombre un peu partout, y compris l'Ardenne, dès la seconde décennie de février.

PIPIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) : noté en 12 (1 à 4 ex.) à Saint-Sauveur, Silly et Cordes. Quelques observations pendant la période la plus froide : Pécrot 29.12, 1 ex. (SP); Renaix 02.01, 2 ex. et 3 ex. de passage (DVe, LV); début 01, plusieurs observations de 1 à 3 ex. dans les régions de Wavre, Gembloux, Boitsfort, ... (GN, JPY); Overijse 05.01, 16 ex. (FHe); Weerde 12.01, 1 ex. (aile cassée) (J&N); Argenteau 13 et 17.01, \pm 12 ex., absents le 27 (EC). Saint-Sauveur (Basse-Durenne) 30.01 et 15.02, 30 ex. (DVe, LV), Noiseux 10.02, 1 ex. (YF). Premiers chants et passage à partir du 23.02 à Pailhe, Elsenborn et Petegem (RLi, LSc, DVe, LV). **PIPIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)** : Neerijse 03 et 06.01, 1 et 4 ex. (JPJ, RoP). **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : 8 et 11 observations dont deux de 2 ex. pour 12 et 01, toutes au Nord du sillon mosan. Retour printanier noté dès le 10.02 à Noiseux, 4 ex. dont trois en plumage d'été (YF), ensuite le 14 à Erneville, le 16 à Obourg et Longvilly, le 24 à Bomal, Meyerode et Seloignes et le 27 à Forges (FDF, BA, ABI, YF, HWe, PGI). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)** : 8, 9 et 5 observations, au Nord du sillon mosan, sauf une en Ardenne : Erneville (Cens) 19.01, 1 ex. (FDF).

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) : signalée en Ardenne et à Harchies début 12; un seul ex. (Longvilly, le 08.01) dans la région de Bastogne du 15.12 au 20.01, pour 7 ex. début 12, retour de 2 ex. après le 20.01 (ABI, FDF); 1 ex. le 01.01 à Gouvy (EC), le 13 à Ocquier (Vervoz) (RLi) et les 17 et 19 à Harchies (ML); plus répandue ensuite, en Haute-Belgique et en Brabant.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) : combats territoriaux à Trooz le 20.12 (JTe).

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) : Ottignies 10.02, 1 ex. chante en pleine ville, à 03 h 35, sans doute encouragé par l'éclairage public (BA). Pecq 14.02, construction d'un nid en cours (FXD). **ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*)** : premiers chants à Harchies et Woluwe-Saint-Lambert le 24.01, s'échelonnant tout au long de février ensuite (GK, ML).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) : quelques bribes de chants le 08.12 à Pailhe (RLi) et un premier chant le 13.01 à Neufchâteau (Visé) (JPJ); hormis ces deux exceptions, les premiers chants sont notés partout dans la première décade de février. Notons aussi un groupe de 55 ex. le 18.01 à Villers-le-Temple (ELz). **GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : assez peu répandue en 12 et 01, quelques concentrations passagères et mouvements migratoires surtout fin 12-début 01. Réapparition en plus grand nombre et en Ardenne à partir de début 02, surtout après le 10 (ABI, LSc, JD, ...). **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : quelques hivernants, signalés en 12 à Boitsfort et Renaix (chants les 03, 10, 14 et 21) et en 01 à Ixelles (chant le 07) et Ombret (SP, DVe, LV, JPJ, JF). Réapparition progressive et premiers chants notés d'abord le 18.01 à Gembloux (JPJ), puis dans toutes les régions fin 01 et début 02. **GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)** : très peu fréquente cet hiver, sauf dans le Brabant qui fournit des observations plus régulières (J&N, FHe, OO, SP, GK, BF, BVo, VL, JDe, CJo). Quelques apparitions en Ardenne à partir de fin 01 (ABI, JD, JTh). **MERLE NOIR (*Turdus merula*)** : chant matinal soutenu le 30.12 à Marcinelles (CI). Premiers chants printaniers à Uccle et Rixensart les 27 et 30.01 (CPe, NP, JT). Renaix le 08.11, Gozée le 10, Bra-sur-Lienne le 17 (DVe, LV, CI, BT). **TRAQUET PÂTRE (*Saxicola torquata*)** : premier retour (1 ex.) le 22.02 à Biesmes (Fromiée) (JBI). **ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*)** : deux tentatives d'hivernage : Pailhe, 1 ex. noté les 22.12 et 13.01 (gel intense) (RLi); Ixelles 18.01, 1 ex. (RoP).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) : quelques observations, toujours d'un seul exemplaire, à Harchies-Pommerœul (AJ, DVe, LV, ML). **FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)** : un mâle hivernant, habituel, le 16.12 à Uccle (Dieweg) (DE); 1 mâle capturé, en bonne santé apparente, le 21.12 à Jambes (GR). **POUILLOT VÉLOCE (et sp.) (*Phylloscopus collybita*)** : au moins quatre tentatives d'hivernage : Olne, 1 ex. le 21.12 (DRa); La Hulpe 22.12, 1 ex. (sp.); Harchies, observations régulières de 1 ex. toute la période et de 2 ex. le 01.02 (BA, GRa, GRi, HLi, ML, MLn); Kain 13.01, 1 ex. (MLn, PCq). A Uccle, 4 observations (au même endroit) de 1 ex. à partir du 14.02, dont un chant le 18 : il s'agit peut-être d'un migrateur précoce (CJo). **ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*)** : premiers chants : le 02.02 à Modave, le 10 à Bernisart, le 21 à Froidchapelle et le 24 à Ben-Ahin et Jupille (RLi, AJ, BTh, AdR, EC). **ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)** : Tervuren 16.01, 1 ex. (VF); Bousval 19.01, 1 ex. (J&N); Neufchâteau (Lux.) 16.02, 3 ou 4 ex. (EPI).

En ce qui concerne les Mésanges, notons que les **MÉSANGES CHARBONNIÈRES (*Parus major*)** et **BLEUES (*Parus caeruleus*)** sont peu abondantes aux endroits de nourrissage en 12 et 01 dans la région liégeoise, mais un apport très net a lieu dans la troisième décade de 01 (PC). A Renaix, l'hivernage, inhabituel, de la **MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*)** est observé jusqu'à début 02 (DVe, LV). Les premiers chants des Mésanges noires, **NONNETTE (*Parus palustris*)** et **BORÉALE (*Parus montanus*)** sont notés dès la mi-février (DVe, LV, EC). **SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*)** : 7 ex. dans un même arbre le 16.12 à Auderghem (Rouge-Cloître) (FHe).

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*) : Amblève (Wolfsbusch) 17.02, 1 ex. (Exc. Aves). **GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*)** : premiers chants à Rixensart le 19.01, Frasnes-lez-Buissenal le 23.02 et Ben-Ahin le 24.02 (BT, JT, DVe, LV, ADr).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) : Berg 30.12, une bande de ± 70 ex. (dortoir?) (VF); Horrues (La Loge) 13.01, au moins 40 ex. (EW); Châtelineau, petit dortoir (10 ex.), dans des aubépines, à partir du 20.02 (MI). **BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*)** : quelques observations en 12 et 01, surtout en Hainaut et Brabant, nettement plus répandu en 02. Quelques bandes importantes : Lonzinne 01 et 07.12, 30 et 15 ex. (APu); Longvilly (Arloncourt) 10.01, ± 40 ex. (ABI); Bousval 19.01, ± 200 ex. (J&N); Noville (Rachamps) 04.02, ± 100 ex. (ABI). Premiers chants à partir du 09.02 (Grand-Leez) (BDe). **BRUANT DES ROSEUX (*Emberiza schoeniclus*)** : quelques isolés en 12 et 01 : Châtillon 29.12, 1 ex. (JPJ); Neerijse 03.01, 1 ex. (JPJ); Lanaye 19.01, 2 ex. (DRa). Harchies-Pommerœul 02 et 09.02, 5 et 20 ex. (FXD, DVe, LV), amorce probable du retour printanier. Godarville 24.02, 1 ex. chanteur (JSe); Theux 26 et 29.02, premières captures (ADx).

GROS-BEC (*Coccothraustes coccothraustes*) : beaucoup moins fréquent que l'hiver précédent. Notons cependant : Pommerœul, ± 10 ex. régulièrement en 12 sur une haie de charmes (APu); Heusy 17.02, un groupe de 21 ex. (LSc). **VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*)** : assez rare au passage habituel d'octobre à Moulins-sous-Fléron, il est particulièrement abondant de mi-novembre à fin décembre (PC). **CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)** : petits groupes d'hivernants notés en divers lieux à l'Ouest du sillon mosan. Noté aussi à Etalle, 1 ex. le 26.12 à la mangeoire (JPJ); Modave 20.01, 5 ex. (RLi); Bomal sur Ourthe 24.02, ± 15 ex. (YF). **TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)** : assez rare en 12, il est nettement plus répandu en 01, sans toutefois être abondant : on le rencontre alors dans toutes les régions. A nouveau plus rare en 02. Environ 150 ex. le 02.12 à Amblève (Halensfeld); ± 75 ex. en 01 à Uccle (CJo); ± 100 ex. les 20 et 25.01 à Houffalize (FLu); ± 80 ex. le 20.01 à Modave, 50 à 60 ex. les 10 et 16.02 (OO, FBI); ± 60 ex. le 27.01 à Neerijse (FHe); environ 60 ex. le 10.02 à Reuland (Auel) (HWe). **LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*)** : quelques passages tardifs fin 12-début 01 en Hainaut occidental et à La Hulpe (DVe, LV, EW, SP) ainsi qu'à Gembloux (1 ex.) (JPJ). Horrues (La Loge) 13 et 20.01, 23 et 15 ex. (EW). Premiers retours début février : Renaix, 6 ex. le 07 (DVe, LV); Gembloux, ± 50 ex. le 10 (ELz). **SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammaea*)** : une dizaine d'observations seulement : Gembloux 03.12, 2 ex. (ELz); Ketelberg (Enghien) 19.12, 4 ex. (VF); Gouvy 01.01, une bande de ± 15 ex. (EC); Ombret 02.01, 1 femelle (JF); Gerpinnes 16 et 19.01, 20 et 30 ex. (CLy); Embourg, plusieurs observations de 1 à 4 ex. en 01 et 02 dans un jardin (Pdt); Frasnes-lez-Buissenal 01.02., 18 ex. (DVe, LV); hofstade 09.02, 2 ex. (BVo); Raeren 10.02, 1 ex. (LSc); Wallerode (Meyerode) 21.02, ± 12 ex. (HWe). **SERIN CINI (*Serinus serinus*)** : Ixelles 06.01, 1 mâle chanteur (RoP); Scry 18.01, 1 ex. (ELz); Boitsfort 27.01, ± 10 ex., chantant et se poursuivant (RoP); Bras (Seviscourt) (Lux.) 17.02, 2 ex. (DRo). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : 2 observations, début 01 et fin 02, à Elsenborn (LSc) et plus de 10 observations dans le Brabant, à Bousval, Uccle, La Hulpe, Auderghem et Tervuren où 43 ex. sont notés le 06.01 (VF) (YR, CJo, SP, VF, PRa). **PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*)** : premiers chants à partir du 14.02, surtout après le 20 (ABI, ADr, ADx, BDe, CPe, FBI, JD, JPSc, JSe, NP). **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : comme le Tarin, très rare en 12, sauf dans le Brabant, nettement plus répandu en 01 et à nouveau beaucoup moins abondant en 02. Environ 150 ex. les 16 et 17.01 à Couture-Saint-Germain (TBr); Ter-

vuren 27.01, deux bandes totalisant 350 ex. (BF); Hoeilaart (Groenendael) 11.02, \pm 350 ex. de passage (JDe).

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) : La Hulpe 10.02, 1 mâle et 2 femelles transportant des matériaux dans deux nids d'Hirondelles (FHe); Walhain-Saint-Paul 17.02, parades nuptiales (BDe).

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) : Wardin (Neffe), abandon progressif d'un dortoir (\pm 130.000 ex. en octobre), totalement déserté pour le 20.12, et à nouveau quelques ex. à partir du 08.02 (ABI). Dans la région de Spa, de nombreux ex. présentent des signes de maladie au niveau des yeux et du bec (PTo). Châtelaineau 15.02 et Bra-sur-Lienne 28.02, construction de nids (MI, BT).

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*) : Longvilly (Arloncourt) 31.01, 2 couples défendent les abords d'anciens nids, 26.02, apport de matériaux (ABI).

CORNEILLE MANTELÉE (*Corvus corone cornix*) : signalée en sept localités, dont deux en Condroz : Rhode-Sainte-Agathe 09.12, 1 ex. (FHe); Walhain-Saint-Paul 24.12, 2 ex. (BDe); Obigies-Kain 27.12, 1 ex. en vol vers le Sud (MLn); Ocquier (Vervoz) 12 et 19.01, 1 ex. (RLi); Soheit-Tinlot 18.01, 1 ex. (ELz); Grand-Leez 09.02, 1 ex. (ELz); Warcoing 17 et 19.02, 2 ex. et 2 ex. plus un hybride **corone/cornix** (Mln, PCq). Quelques passages de **CORBEAUX FREUX (*Corvus frugilegus*)** et **CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*)**, parfois accompagnés de Corneilles noires sont notés vers le Sud ou l'Ouest jusqu'à début 01 et des mouvements en sens inverse dès la fin de la première semaine de février. Premiers retours de Freux à la colonie le 26.02 à Bastogne, plusieurs couples de Choucas visitant des cheminées dès le 12, également à Bastogne (ABI). **PIE BAVARDE (*Pica pica*)** : Uccle 19.12, dortoir de 30 ex. (SP); Rhode-Saint-Genèse 19.01, environ 50 ex. dont 28 groupés (BVo); Erneuville (Cens) 09.02, 30 ex. ensemble (FDf); Villers-la-Tour 28.02, dortoir de 25 ex. (BTh). Début de construction des nids vers le 10.02 à Jupille, le 27 à Wardin et Hollange (EC, ABI, JTH). **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*)** : signalé seulement à Bra-sur-Lienne, Wanne et La Reid (BT, MDe, PTo).