

Chronique ornithologique 1981/1 : décembre 1980, janvier, février
Elaboration du fichier : N. Leprince-de Schaetzen et E. Clotuche.
Rédaction : E. Clotuche.

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée (cf. chronique 1980/4)

Conditions climatiques

Le mois de décembre commence sous la neige et le froid, les maxima restant souvent négatifs en Haute-Belgique pendant la première décennie. Le temps est plus doux et assez pluvieux par la suite. En moyenne, ce mois s'inscrit dans la normale, avec toutefois un petit excès des précipitations et des vents du secteur SSE à SSW.

Janvier demeure relativement doux également, et surtout anormalement pluvieux, l'excès de précipitations, le plus marqué en Moyenne et Haute-Belgique, variant de 30 à 84 %. Les chutes de neige sont rares en Basse-Belgique et les gelées diurnes quasi limitées aux sommets ardennais. Le régime des vents se caractérise par un déficit du secteur NE à SSE et des vitesses relativement élevées pendant la première semaine et du 14 au 19.

La première décennie de février reste du même aloi, avec de la pluie (ou de la neige), des vents, parfois forts, de S à W, et des températures relativement douces. Le vent s'oriente ensuite au secteur N à NE, mais reste en général faible à modéré : il s'ensuit un temps assez ensoleillé et sec, avec fortes gelées nocturnes, et même diurnes en Ardenne, mais quelques chutes de neige du 17 au 20 et de pluie les 27 et 28. Février est donc nettement le mois le plus froid de cet hiver.

Faits saillants

Ces conditions climatiques très moyennes, et peu contrastées, n'entraînent guère de phénomènes ornithologiques très particuliers. Aucune espèce anormalement abondante, ou anormalement rare, sauf localement.

Pour les oiseaux d'eau, notons la relative abondance tout de même de la Sarcelle d'hiver, le Garrot à œil d'or et les Harles n'étant pas rares non plus, et la confirmation d'Oost-Maarland comme grand centre d'hivernage, pour le Fuligule milouin surtout. Les observations de Goélands bruns et marins continuent à se reproduire en Hainaut et Brabant, et deux Goélands bourgmestres* sont aussi observés, dont un de façon prolongée.

Affaire à suivre aussi, une tendance à l'hivernage et aux retours précoces se confirmant chez le Milan royal.

Chez les passereaux, notons surtout la relative rareté, malgré les conditions clémentes, des Grives et des Fringilles en général, sauf le Tarin et le Chardonneret.

Pendant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 12 : 07, 14, 21 et 28; 01 : 04, 11, 18 et 25; 02 : 01, 08, 15 et 22.

Détail des observations

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*)* : Stavelot, bassin inférieur de la centrale de Coö, 07 au 21.12, 1 ex. (PHa, DRa, EC, JD, JTe). **PLONGEON CATMARIN**

(Gavia stellata)* : Silenrieux (Falemprise), barrage de l'Eau d'Heure, 14.12, 1 ex. (JSe, ADt); Rhode-Saint-Genèse (étang ULB) 19.01, 1 ex. mazouté, capturé le 21 et relâché le 31 à Knokke (HW, JaE, JoE, SB, SL).

GRÈBE HUPPÉ (Podiceps cristatus) : trop peu signalé en 12. L'hivernage se déroule de façon classique : petits groupes et isolés en Brabant et Hainaut occidental, parfois ailleurs, plus fortes concentrations sur les plans d'eau de la région malinoise (maximum d'environ 20 ex. en tout) (Exc. Aves, BVo, J&N, MLu, SP, TMq), à Oost-Maarland (30 à 40 ex. toute la période) (BPh, EC, Exc. Aves) et aux barrages de l'Eau d'Heure (15 à 20 ex.) (Cl, CLy, JLc, JSe). Parmi les isolés, retenons plus spécialement l'observation du 27.12 sur le lac de Robertville (JD) et le séjour d'un ex. à Stavelot (Coo) au moins du 14.12 au 18.01 (CH, JD, PHa). Quelques parades nuptiales sont signalées dès les premiers jours de février et l'observation de ± 120 ex. à Oost-Maarland le 01.02 (BPh) laisse supposer un passage important, guère ressenti cependant dans les autres régions, où quelques mouvements semblent se dérouler plutôt à partir du 10, mais de façon assez discrète. **GRÈBE JOUGRIS (Podiceps griseigena)*** : Walem 27.12 au 25.01, 1 ex. (ABP, MPo, MBo, PRa, AHI, VF, ...). **GRÈBE CASTAGNEUX (Tachybaptus ruficollis)** : les conditions météorologiques assez clémentes permettent le séjour de l'espèce sur bon nombre d'étangs, même en Haute-Belgique : Longchamps (Grand-Vivier) 27.12, 1 ex., première observation hivernale en 10 ans (ABI); Pailhe (Saint-Fontaine et Saint-Lambert), 2 ex. les 28.12 et 10.01 (RLi). Les effectifs sont presque toujours très réduits; à retenir cependant : Antoing/Péronnes (Escaut et Canal), 15 à 20 ex. en 12 et 01, 26 ex. le 26.12 (JLc, MLn, PCq); La Hulpe, ± 45 ex. début 12, ± 15 ex. en 01 et 02, 2 ex. seulement le 25.02 (J&N, MWa, SP, FHe, FDM); Villers-Devant-Orval, 9 ex. en 01-02 (JMo, PPI, PWI); Gêrouville (La Soye) 14 ex. le 18.01, 4 ex. le 08.02 (JMo, PPI).

GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo) : une donnée importante : 33 ex. sur l'Escaut à Obigies les 23 et 24.12 (MLn); 1 ex. aussi le 06.12, absent le 14, à Vaulx-Antoing (MLn). Début du passage avec 1 ex. à Oost-Maarland le 15.02 (FBI).

HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) : hivernage anormalement abondant à Harchies-Pommerœul, avec des maxima de 30 à 40 ex. au moins de début 01 à mi-02 (ML, CRBH, JMLc, DH, DVe, LV); Oost-Maarland, hivernage de 10 à 15 ex. au moins (PBh, EC); vallée de la Dyle 14.12, 18 ex. à Vieux-Héverlée (Exc. Aves), ensuite pas plus de 7 à 8 ex. Signalons aussi un groupe de 9 ex. en vol le 12.01 à Erneuville (Wyompont) (FDf). Nombreux isolés et petits groupes dans toutes les régions. **GRAND BUTOR (Botaurus stellaris)** : une seule observation : Harchies-Pommerœul 14.12, 1 ex. (RD).

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) : les effectifs semblent très fluctuants sur la plupart des sites, le mois de janvier étant le plus souvent marqué par un creux et le mois de février par un maximum; par exemple : à Harchies-Pommerœul, ± 2.500 ex. le 16.12, ± 1.500 ex. le 27.12, ± 500 à ± 1.000 ex. en 01, environ 1.500 ex. le 15.02 et 2.000 ex. le 21.02 (DV, Dve, LV, CRBH); à Gozée, maximum de 1.000 ex. mi-12, et de 600 à 700 ex. en 01 et 02, avec parfois seulement 150 à 200 ex. entretemps (CEAG); barrages de l'Eau d'Heure, 1.000 à 1.500 ex. dans la seconde moitié de 12, quelques centaines en janvier semble-t-il, 2 à 3.000 ex. sur la glace début 02, 1.000 à 2.000 ex. les 08 et 15, plusieurs centaines le 22 (Cl, CLy, JLc, JSe). **SARCELLE D'HIVER (Anas crecca)** : en général assez abondante et bien répandue, avec notamment quelques grosses concentrations : Harchies-Pommerœul, plusieurs fois 400 à 500 ex., avec quelques creux de 100 à 150 ex. (CRBH, DVe, LV, ML, J&N); Walem 16.12, ± 150 ex., 31.01, ± 200 ex., 15.02, ± 100 ex., 22.02, 10 ex. (BVo, J&N,

MPO, SP); Malines (Nekkerspoel) 22.12, 250 ex. (DE, SP); Saint-Ghislain (Baudour) 18.01, 184 ex. (JPB), 15.02, 140 ex. (ADu); vallée de la Dyle, \pm 130 ex. le 14.12, 20 à 30 seulement en 01 et \pm 160 ex. le 24.02 (Exc. Aves, J&N, FDM, FHe, CGe, MPO, TMq); Grand-Leez 07.02, 150 ex. (Elz); Oost-Maarland 100 à 200 ex. en 12 et 01, avec un maximum de 500 ex. le 17.01, 20 à 30 ex. en 02 (BPh, EC). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : signalé exclusivement en Hainaut occidental et dans la région malinoise : Walem, présent toute la période, 5 à 15 ex. (Exc. Aves, J&N, CHM, MPO, SP); Nekkerspoel 31.01, 3 ex. (SP); Harchies-Pommerœul 07.12, \pm 15 ex., puis 1 à 6 ex., 22.02, 12 ex. (BA, DVe, LV, ML, YAm, CRBH). **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : abondant en région malinoise, surtout au Nekkerspoel, avec 18 et 50 ex. les 16 et 27.12, 21 ex. le 14.01 et 80 ex. les 08 et 22.02 (MLu, MPO, SP, TMq, VF, J&N); 80 ex. aussi le 23.01 à Harchies (CRBH); signalé aussi sur quelques sites en Hainaut et Brabant et en Ardennes en janvier : Longchamps (Grand-Vivier) 10.01, 6 ex. (MCH); Stavelot (Coo) 18.01, 1 couple (JD). **CANARD PILET (*Anas acuta*)** : région malinoise, Nekkerspoel, 25 à 30 ex. en 12 et début 01, \pm 20 ex. le 31.01 (MLu, MPO, SP, Exc. Aves); quelques isolés et petits groupes en Hainaut et Brabant, ainsi que dans l'Entre-Sambre-et-Meuse : Gozée 02.01, 3 mâles et 2 femelles (CEAG); Roly 31.01, 4 mâles (JPSc); barrages de l'Eau d'Heure (Féronval) 14 et 15.02, 1 couple (CLy); plutôt en diminution en 02, à part 24 ex. le 24 à Neerijse (MPO). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : effectifs relativement modérés en 12, plus importants en 01 et 02, avec quelques gros groupes : en région malinoise, 60 à 70 ex. le 03.01, \pm 200 ex. le 31.01 au Nekkerspoel, 40 ex. le 22.02 (MLu, MPO, SP, J&N, Exc. Aves); Saint-Ghislain (Baudour) 18.01, 29 ex., 15.02, 40 ex. (ADu, JPB); Harchies 21.02, \pm 20 ex. (ML, CRBH); en dehors de ces régions, signalé seulement à Oost-Maarland et Gozée (BPh, DRa, EC, CEAG). **NETTE ROUSSE (*Netta rufina*)** : un mâle adulte signalé à Malines (Nekkerspoel) du 28.12 au 18.01 (MLu, Exc. Aves). **FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)** : La Hulpe, 2 femelles au Grand Etang le 03.12, 1 ou 2 mâles juvéniles au domaine Solvay du 07 au 22, puis 2 mâles juvéniles en tout du 23 au 26; enfin 1 mâle juvénile le 15.02 (SP). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : en décembre-janvier, le gros des hivernants, limité à quelques centaines, est concentré à Harchies-Pommerœul, \pm 150 ex. en 12, 50-60 ex. en 01 (DVe, JMLe, LV, CRBH), à La Hulpe, maximum de 120 ex. le 28.12, plusieurs fois 50 à 70 ex. (FDM, SP, J&N), en région malinoise, 80 à 100 ex. en 01 (SP, Exc. Aves) et à Oost-Maarland, 50 à 150 ex. (BPh, EC), les autres sites n'étant fréquentés que par de très petits groupes; à noter, cependant, 30 à 75 ex. les 18 et 31.01 à Huldenberg (FDM). Des mouvements sont sensibles dès début 02, plus particulièrement avec l'augmentation très forte des effectifs dans la vallée de la Dyle, très peu fréquentée par l'espèce en 12 et 01 : le 01.02, 78 ex. à Neerijse et 27 ex. à Overijse (FHe), le 07, 10 ex. à Vieux-Héverlée, 20 à Overijse et 30 à Neerijse (CGe, FHe); le 13, \pm 160 ex. à Rhode-Sainte-Agathe, 15 à Neerijse et \pm 130 à Vieux-Héverlée (SP), diminution ensuite. **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : à Oost-Maarland, l'effectif culmine à environ 2.200 ex. à la mi-janvier et retombe à environ 1.000 ex. en février (EC); ailleurs, peu de groupes dépassant la centaine d'ex. en 12 et 01 : environ 200 ex. en 12 à Harchies-Pommerœul, de 50 à 200 en 01 (CRBH, DVe, LV, JMLe); en moyenne 100 à 120 ex. en 01 à Péronnes-Antoing (MLn, PCq), environ 150 ex. en tout dans la vallée de la Dyle en 01, jusqu'à 250 à La Hulpe (FDM, FHe, JaE, JoE, JMLe, J&N, MLu, SP, TMq), 135 ex. le 10.12 à Nimy (Grand-Large) (JMLe), 100 ex. les 26 et 27.12 à Gozée (CEAG); assez peu fréquentés pendant ces deux mois, beaucoup de plans d'eau voient leurs effectifs augmenter nettement en 02, parfois dès fin 01, notamment sur les sites de nidification de la vallée de la Dyle et du Brabant en général, et à Grand-Leez. Signalons aussi 7 ex. le 28.12 sur le lac de La Gilleppe

(JD) et 3 femelles le 31.01 à Stavelot (Coo) (JD). **FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*)*** : Oost-Maarland 18.12 et 11.02, 1 mâle adulte (EC). **GARROT À ŒIL D'OR (*Bucephala clangula*)** : fréquemment signalé cet hiver : Harchies-Pommerœul, où l'hivernage peut être considéré comme régulier (ML), présent toute la période, 3 à 5 ex. environ, maximum 8 (N.....); Haut-Escaut (Hérinnes, Espierres, Péronnes) 1 à 2 ex. chaque fois, toute la période (MLn, PCq); Nimy (Grand-Large) en 12 et 01 (BA, DV, JMLe); barrages de l'Eau d'Heure, 1 et 3 ex. en 12 et en 02, mais 10 à 12 ex. le 01.02 et 6 le 22 (Cl, CLy, JSe); vallée de la Dyle et La Hulpe, 1 ou 2 ex. fin 12-début 01 et début 02 (BVo, FHe, JaE, JoE, JMLe, SP); Walem, Hofstade, Nekkerspoel, 3-4 ex. toute la période, sauf 27 ex. le 01.02 à Walem (AHI, DE, J&N, MPo, SP, TMq, VF); Oost-Maarland 17.01, 3 ex. (BPh) et enfin Lac de La Gilleppe 12.12, 2 femelles, 04.01, 7 femelles, 18.01, 8 ex. (DRa, ASm). **EIDER À DUVET (*Somateria mollissima*)** : lac de La Gilleppe 12.12 et 18.01, 1 femelle, déjà présente le 23.11 (DRa, ASm); Harchies 04.01, 1 mâle (RD); Ronquières 04 au 18.01, 1 mâle immature (DD, GN). **HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*)** : hivernage d'environ 10 ex. à peu près toute la période à Oost-Maarland (EC, BPh); 12 ex. aussi le 01 et 15.02 aux barrages de l'Eau d'Heure, 4 ex. le 21.12, et 6 ex. le 08.02 (Cl, CLy); ailleurs signalé par 1 ou 2 ex. sur les sites malinois (N,...), à Pommerœul (JLc), à Saint-Denis (3 ex., première observation en dix ans) (BA), à Gozée (CEAG) et en Haute-Meuse, à Godinne et Yvoir (JFB). **HARLE PIETTE (*Mergus albellus*)** : un peu plus abondant que le précédent : présent de mi-12 à fin 02 à Hermalle-sous-Argenteau, environ 10 ex., avec un maximum de 17 la seconde moitié de janvier (DRa, EC); présence à peu près permanente aussi à Harchies-Pommerœul, 3-4 ex., maximum 6 ou 7 (N...), à Walem, maximum 9 ex. fin 12 et 11 le 22.02 (J&N, MPo, SP, TMq, VF, Exc. Aves) et aux barrages de l'Eau d'Heure, 2-3 ex., 6 mi-02 (Cl, CLy, JLc); signalé aussi à Oost-Maarland (EC), Antoing (MLn, PCq), Gaurain (MCa) et Ben-Ahin (ADr). **HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*)** : non signalé, mais 2 observations possibles, sous forme de Harles sp. : barrages de l'eau d'Heure 13.12, 1 ex. (Cl) et Andenne 22.02, 1 femelle (RLb). **TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)** : relativement répandu fin 12 : Harchies-Pommerœul, 4 ex. tout le mois de décembre (CRBH, JLc); Rhode-Sainte-Agathe 16.12, 1 mâle (SP); Harelbeke (Gavers) 26.12, 3 ex. (DVe, LV); Audérghem (Val Duchesse) 31.12, 1 ex. (MLu); Walem 27 et 30.12, 1 femelle, 31.01, 15 ex. (BVo); La Hulpe, 1 femelle à partir du 18.02 (SP, J&N).

Les journées des 06 et 07.12 recueillent le plus grand nombre d'observations d'**OIES GRISES (*Anser sp.*)**, la plupart non identifiées : 10 vols sont observés en Moyenne-Belgique et en Ardenne, en général moins de 20 ex. se dirigeant vers le secteur ouest à nord (sauf un vers le sud-ouest). Par la suite, quelques vols sont encore observés, aussi bien vers le nord que vers le sud, en décembre et début janvier. Fin janvier (surtout les 24 et 26), 6 ou 7 groupes de 20 à 50 ex. en déplacement vers le nord, en Brabant surtout. Quasi pas notée en février : les deux plus grosses observations sont ardennaises : Bonnert 20.02, ± 100 ex. vers le N (FLr); Recogne fin 02, un groupe vers le NE (JPJ). La majorité des exemplaires identifiés sont des **OIES CENDRÉES (*Anser anser*)**, dont quelques unes séjournent à Harchies fin 02 (ML) et 1 ex., apparemment sauvage, est noté le 06.01 sur un dépôt d'immondices à Chênée (BPh). **OIE RIEUSE (*Anser albifrons*)** : une seule observation sûre : Harchies 24.01, 11 ex. vers le SE (LV). **OIE DES MOISSONS (*Anser fabalis*)** : Pottes-Escanaffles (Bossuit) 07.12, 6 ex. vers le NW, très bas (MLn, PCq); Flobecq 16.12, 45-50 ex. vers le NE (MMn); Merbes-le-Château 10.01, 6 ex. vers l'est (PFI). **BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*)** : Harchies 07.01, 2 ex. (CRBH). **OIE DES NEIGES**

(Anser hyperboreus)* : Lillois 31.01, 3 ex., à considérer comme échappés probables de captivité (JP Romain). **CYGNE TUBERCULÉ (Cygnus olor)** : en général peu suivi, mais apparemment peu abondant cette année. **CYGNE SAUVAGE (Cygnus cygnus)*** : un groupe de 2 adultes et 6 juvéniles observé les 20 et 21.12 à Erbisœul, puis du 31.12 au 10.01 à Harchies-Pommerœul, où séjourne un juvénile jusqu'au 12.03 (ADt, AVh, BA, DVe, ECU, JPVh, LV, CRBH). Un ex. à nouveau à Erbisœul du 28.01 au 07.02 (ADu); Nimy (Grand-Large) 08.02, 1 ex. immature (JPVh, AVh); Genappe 26.12, 2 ex. (JP Romain). **CYGNE DE BEWICK (Cygnus bewickii)** : Roly 18.01, 3 ex. (CLy).

BUSE VARIABLE (Buteo buteo) : 20-25 ex. visitent régulièrement un lieu de nourrissage en 01 à Meyrode (Wallerode) (HWe). Premiers vols nuptiaux dès le 18.01 à Sautour (CLy) et le 27.02 à Theux (ADx). Migration sensible dès début 02, surtout après le 10. **ÉPERVIER D'EUROPE (Accipiter nisus)** : la tendance des années précédentes se confirme : l'espèce est observée dans toutes les régions, parfois de façon répétée, en Brabant notamment. Environ 20 observations rapportées pour décembre, une quarantaine pour janvier, plus de 30 en février. **AUTOUR DES PALOMBES (Accipiter gentilis)** : respectivement 7, 6 et 16 observations par mois, toutes en Haute-Belgique sauf 1 ex. immature le 15.02 à La Hulpe (Solvay) (SP). **MILAN ROYAL (Milvus milvus)** : encore 4 migrateurs tardifs descendant vers le sud le 11.12 à Wardin (Neffe) (ABI). Deux observations de début janvier, à rapprocher de la tendance à l'hivernage observée (en France également) depuis quelques années : Etalle 04.01, 1 ex. (JLBo) et Harchies 05.01, 1 ex. (ML). Un ex. aussi le 05.02 à Louveigné (FNo), le 06 à Heinsch (Schoppach) (PMT), le 10 à Villers-sur-Semois (DCo), puis un ex. parasitant des Corneilles noires le 18 à Vaux-sur-Sûre (ABI). Le début du passage est bien marqué, étant à la fois précoce et fourni à partir du 21.02 : 12 observations totalisant 26 ex. (dont 2 groupes de 6 et 7 ex.), uniquement en province de Luxembourg, excepté une à Soheit-Tinlot (Condroz) (PBa) et 2 à Meyrode (Wallerode) (HWe). **MILAN NOIR (Milvus migrans)** : un migrateur précoce : Thuillies 28.02 (HG, JGu). **BUSARD DES ROSEAUX (Circus aeruginosus)** : 3 observations précoces : Rhode-Sainte-Agathe 01.02, 2 ex. (FDM); Harchies 07.02, 1 mâle (J&N) et Antoing 28.02, 1 femelle (MLn). **BUSARD SAINT-MARTIN (et BUSARD « GRIS » sp.) (Circus cyaneus et Circus sp.)** : environ 15, 20 et 10 données en 12, 01 et 02, dont 1, 5 et 3 mâles; à peu près la moitié des observations, dont quelques séjours prolongés, en Hainaut occidental, quelques-unes en Hesbaye et Brabant, très peu ailleurs (région de Bastogne, Etalle, Beho, Jupille, Entre-Sambre-et-Meuse).

FAUCON PÊLERIN (Falco peregrinus) : Nivelles 07.02, 2 ex. (DD). **FAUCON ÉMERILLON (Falco columbarius)** : 3 observations de 1 ex. (2 fois une femelle) à Harchies, les 14.12, 04.01 et 08.02 (RD, ML); 1 ex. le 15.02 à Boneffe (DLA).

PERDRIX GRISE (Perdix perdix) : une seule observation signalée : 6 ex. pendant le 25.01 à Mouscron (DH).

RÂLE D'EAU (Rallus aquaticus) : hivernage particulièrement bien fourni au SE de Bruxelles, notamment à La Hulpe et Genval avec des maxima de 7 et 5 ex. entendus ensemble (SP, J&N). Entendu aussi à Gozée en 12 et 01 (BB, CEAG), à Serinchamps le 21.12 (MPa) et en Hainaut occidental, Harchies-Hensies, Antoing, Harelbeke (DH, JLc, ML, MLn, PCq). **POULE D'EAU (Gallinula chloropus)** : en général trop peu suivie, mais le plus souvent fort dispersée il est vrai. Signalée en nombre uniquement en Hainaut occidental; Gaurain-Ramecroix 20.12, le soir, 87 ex. pâturant sur une pelouse au bord d'un petit étang, nombre anormalement élevé (PS); Warcoing, en décembre, 80 à 100 ex.; Escanaffles 01.02, ± 160 ex.; Pecq-

Obigies 01.02, \pm 200 ex.; Antoing 01.02, \pm 120 ex. (MLn). **FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*)** : les seules grosses concentrations signalées le sont à Harchies, environ 500 ex. en 12, plus de 800 ex. après la mi-01, \pm 250 ex. mi-02 (DVe, LV) et à Oost-Maarland, \pm 500 ex. début 12, au moins un millier d'ex. à partir de mi-12 et maximum d'environ 2.000 ex. de mi-01 à début 02 (BPh, EC); sur l'Escaut, d'Antoing à Pecq, aussi, augmentation très forte à la mi-12, jusqu'à 250 ex. environ (MLn). Ailleurs, rarement plus de 100 ex. : barrages de l'Eau d'Heure, maximum de 250 ex. en tout (de mi-12 à mi-01) (CDm, Cl, CLy, JSc), Walem, La Hulpe, Huldenberg, Nekkerspoel, de façon irrégulière. Quelques hivernants aussi à Stavelot (Coo) et Pailhe (JD, RLi), en Haute-Belgique.

HUÏTRIER-PIE (*Haematopus ostralegus*) : Harchies 24.01, 1 ex. (CRBH).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) : en général peu abondant; en 12, quelques mouvements et concentrations en Hesbaye et Hainaut occidental vers les 06 et 07, puis fin du mois et début 01, avec notamment \pm 1.000 ex. les 03 et 04 à Saint-Sauveur (DVe, LV); absent du Condroz en 12, par contre (RLi); un peu plus répandu mais presque toujours en très petits groupes, fin 01 et début 02, avec notamment quelques apparitions en Ardenne. **PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)** : en Hainaut (extrême) occidental : Dergneau 24.12, 2 ex. en vol vers l'ouest (DVe, LV); Herseaux 21 et 26.12, \pm 130 et 53 ex. au sol, 09 et 29.01, 60 et 50 ex. au sol (JLc); Luigne 17.01, 50 ex. (JLc).

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) : quelques rares hivernants sont notés un peu partout à l'ouest de la Meuse toute la période, en isolés ou très petits nombres, sauf 30 ex. le 29.12 à Saint-Sauveur (Basse-Durenne) (DVe, LV); à Ronquières (RNOB) forte augmentation passagère fin 01, avec \pm 40 ex. le 26 (DD). Peut-être un peu plus répandue fin 02. Seules observations à l'est de la Meuse : Etalle 18.01, 6 ex. (J&N) et Beaufays 21.02, 2 ex. (BPh). **BÉCASSE DES BOIS (*Scotopax rusticola*)** : Gerpennes 01.12, 1 ex. (CLy); Saint-Denis 06.12, 1 ex. (BA); Mouscron 04 et 17.01, 1 ex., 16.02, 1 ex., 23.02, 2 ex. se poursuivant (DH); Braine-le-Château 24.02, 1 ex. (GN). **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : hivernage de 1 ex. à Oost-Maarland, à partir du \pm 25.12 (DRa, EC, Exc. Aves). Hérinnes 07.12, 1 + 8 ex. vers le SSW (MLn, PCq); barrages de l'Eau d'Heure (Cerfontaine) 13.12, 2 ex. « levés » (Cl); Dergneau 23.12, entendu (DVe); Overijse (Malaise) 23.12, 1 ex. vers le SW (SP); La Hulpe 07.01, 1 ex. vers l'est (SP, J&N); Feluy (Wespin) 11 au 26.01, 1 ex. (DD); Frasnes-lez-Gosselies 28.02, 1 ex. de passage (HW). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : comme chaque hiver, quelques hivernants erratiques ou en séjour plus ou moins prolongé : Grand-Leez 05.12, 2 ex., 28.12, 6 ex., 30.01, 1 ex., 01.02, 2 ex., 06.02, 3 ex., 8 au 11.02, 4 ex. (BDe, ELz); Vieux-Héverlée 14.12, 2 ex. (Exc. Aves); Hotton (Ardenne!) 20.12, 1 ex. (en fait, **Tringa sp.**) (PDM); Gozée 16.12, 1 ex.; Ronquières (RNOB) 10.01, 2 ex. (TDe); Monstreux 10.01 et tout 02, 1 ex. (TDe); Couture-Saint-Germain 17.01, 1 ex. (TBr); Evelette (Tahier) (Condroz) au moins du 26.01 au 03.02, 1 ex. (RLi); Genappe 01.02, 3 ex. (TDe); Castillon 03.02, 1 ex. (HG, JGu); Florival (Dyle) 07.02, 1 ex. (FDm); Saint-Denis 14.02, 1 ex. (BA). **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)** : plus inhabituel : Rosières 24.01, 1 ex. en vol (J&N); Roly (Fraity) 25.01, 1 ex. (PFI).

GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*) : de plus en plus fréquent en Hainaut occidental et Brabant : Walem 27.12, 2 adultes (MPo); Mont-Saint-Guibert (dépotoir) régulièrement en 01, 1 adulte le 14.02 (GN, JPJ); Antoing 04.01, 1 adulte (MLn); Herseaux 17.01, 1 adulte et 1 immature (JLc); Pecq 23.01, 2 adultes (MLn); Luigne 12.02, 2 ex. (JLc) et Harchies 22.02, 1 immature (CRBH). **GOÉLAND BOURGMESTRE (*Larus hyperboreus*)*** : Mont-Saint-Guibert, du 21.12 au 14.02, 1 ex. immature de

premier hiver (EP, SP, OL, GN, GRa, etc...); Harchies-Pommerœul 07.02, 1 ex. immature de second hiver (ADt, GRa et Gr. Nat. Saint-Michel). **GOËLAND BRUN (Larus fuscus)** : un peu plus fréquent et abondant que le Goéland marin, dans les mêmes régions : Hérinnes 06 et 28.12, 3 et 1 ex. (MLn); Renaix 08.12, 1 adulte vers le nord (DVe); Luigne 20.12, 1 adulte (JLc), Walem 27.12 et 03.01, 1 et 2 adultes (MPo, Exc. Aves); Mont-Saint-Guibert, présent très régulièrement en 01, 2-3 ex. le 21 (JPJ, SP); Pecq 03, 23, 28 et 31.01, 4, 3, 4 et 10 adultes (MLn); Antoing 18.01, 1 adulte et 1 immature (MLn). **GOËLAND ARGENTÉ (Larus argentatus)** : omniprésent en nombre appréciable en Hainaut occidental (vallée de l'Escaut notamment), en Brabant et en Basse-Meuse liégeoise, mais peu d'estimations précises, rendues difficiles, il est vrai, par les nombreux mouvements; Mont-Saint-Guibert 21.01, \pm 500 ex. (SP); Rhode-Sainte-Agathe 31.01, \pm 250 ex. en vol vers le nord (FDm). Deux ex. aussi aux barrages de l'Eau d'Heure les 14.12 et 14.02 (JSe, CLy) et 1 ex. à Jambes le 28.02 (PLt). **GOËLAND CENDRÉ (Larus canus)** : beaucoup moins signalé que l'espèce précédente, et presque toujours moins de 10 ex. sauf à Ixelles (étangs) le 18.01, 35 ex. (RoP) et à Mont-Saint-Guibert (dépotoir), plusieurs centaines le 14.02 (GN); en aval de Liège, toujours quelques ex. sur la Meuse, augmentant à l'approche de Oost-Maerland, où il est assez abondant (EC). Semble beaucoup plus rare en Hainaut : seulement 4 mentions de 1 ex., et une de 7 ex. à Harchies-Pommerœul (CRBH). Noté aussi à Lustin le 04.01, 1 ex. immature (JFB), à Jambes le 22.02, 1 ex. (PLt) et aux barrages de l'Eau d'Heure le 15.02, 1 ex. (CLy). **MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus)** : toujours aussi abondante et difficile à dénombrer : estimée à environ 20.000 ex. le 29.12 à Oost-Maerland (BPh). En Ardenne : Fronville (Deulin) 04.01, 76 ex. dans une prairie inondée par l'Ourthe (PDm); Hannoncourt/Lamorteau 04.01, \pm 25 ex. dans des prés bas (JMo); Termes 27.02 (JPLa); Recogne fin 02, \pm 50 ex. en halte puis s'éloignant vers le nord (JPJ).

PIGEON COLOMBIN (Columba oenas) : quelques hivernants signalés en 12 et 01 à Overijse (Malaise), en nette augmentation en 02, avec des groupes atteignant 40 ex. (SP); retour du nicheur local et premier chant le 31.01 à Pailhe (RLi); Premiers chants le 08.02 à Boitsfort (MWa); 3 ex. le 14.02 à Solre-Saint-Géry (HG, JGu). **PIGEON RAMIER (Columba palumbus)** : en général assez peu abondant, beaucoup moins que l'hiver précédent dans la région de Hanzinne-Gerpinne, notamment (CLy) et très peu en 12 en Ardenne et Condroz selon RLi, mais \pm 850 ex. le 21 à Flostoy (RLi). Augmentation sensible, mais modérée, à partir du 20.01, avec quelques bandes de 100 à 500 ex. (les 20-21 à Seneffe) (DD) en Brabant et Hainaut, après la mi-02 seulement en Ardenne (ABI, RDt). **TOURTERELLE TURQUE (Streptopelia decaocto)** : premier vol nuptial le 18.01 à Renaix (DVe, LV); début de construction le 10.02 à Belœil (ED), une femelle couvant déjà ses deux œufs le 31.01 à Haine-Saint-Paul (RD). A Belœil, depuis plusieurs années, un dortoir de plusieurs centaines d'ex. dans une plantation de mélèzes et épicéas au centre du village (ED); Fronville 07.02, 68 ex. sur des fils électriques (PDm).

HIBOU GRAND-DUC (Bubo bubo)* : 25-26.02, 1 ex. chantant dans le Sud-Luxembourg (PWI). **CHOUETTE CHEVÊCHE (Athene noctua)** : Escanaffles 28.01, 5 ex. chanteurs sur moins d'un kilomètre carré (MLn). **HIBOU MOYEN-DUC (Asio otus)** : quelques dortoirs signalés : à Arquennes en 12, 4 ex. (TDe); à Houtain-le-Val, 3 ex. en 12, environ 5 en 01 et 02 (TDe); à Bôlhe (région de Waremmes), 9 à 10 ex. en 01 (R. de Meeus); à Evere 06.01, 17 ex. (MWa); à Mouscron, \pm 15 ex. jusqu'au 18.01, \pm 20 ex. du 20 au 31, 8 ex. seulement le 01.02, 12 ex. le 09.02, au moins 8 ex., et peut-être un couple nicheur du 15 au 23; les parades nuptiales débutent le 02.01 et atteignent leur paroxysme fin janvier et du 06 au 08.02 (DH). Bomal 04.12, 1 ex., rare dans la région (YF). **HIBOU DES MARAIS**

(Asio flammeus) : Escanaffles 28.01, 1 ex. « levé » (MLn).

MARTIN-PÊCHEUR (Alcedo atthis) : peu signalé : une vingtaine d'observations, seulement en Hainaut occidental et Brabant, et régulièrement à Saint-Aubain en 12 et 01 (OB).

PIC CENDRÉ (Picus canus) : Messancy 02.12, une femelle observée longuement, cherchant sa nourriture sur la façade arrière d'une maison, puis dans les vergers du quartier (CMo). **PIC MAR (Dendrocopos medius)*** : Mabompré (Engreux) 27.12 et 27.02, 1 ex. (MCh). **PIC NOIR (Dryocopus martius)** : hors Haute-Belgique, signalé en 12 à Aarschot (TBr), en 01 à Ottignies (L-L-N) (Exc. Aves) et en 02 à Limal (GN).

COCHEVIS HUPPÉ (Galerida cristata) : Grivegnée (Belleflamme) 04.12, 1 ex. sur un parking en bordure d'un grand terrain vague en lotissement; non revu par la suite malgré quelques recherches, mais présence de plusieurs ex. confirmée par des promeneurs (EC). Signalé aussi, comme chaque année, à Woluwe-Saint-Lambert, 2 ex. le 10.12 (JaE, JoE). **ALOUETTE DES CHAMPS (Alauda arvensis)** : très forte migration vers l'ouest le 07.12 à Renaix, \pm 6.800 ex. sur la journée (DVe, LV); présente en isolés ou petits groupes en 12 en Condroz-Famenne (RLi) et assez répandue dans la vallée de la Dyle le 14.12 (Exc. Aves); quelques ex. aussi, parfois jusqu'à 20-30 ex., en 12 et 01 en Brabant et Hainaut. Les observations augmentent légèrement et les premiers passages et premiers chants sont signalés dans les derniers jours de janvier ou début février dans toutes les régions, mais l'espèce est encore peu abondante fin 02, surtout en Ardenne.

PIPIT FARLOUSE (Anthus pratensis) : encore \pm 30 ex. sur un terrain vague à Argenteau le 01.12, absents quelques jours plus tard (EC); présence régulière signalée en 12 et 01 à Grivegnée (Belleflamme) (BPh, EC), Pecq et environs (10 à 15 ex.) (MLn), Genappe et Nivelles (TDe), plus irrégulièrement à Oost-Maerland (EC), Rhode-Sainte-Agathe (Exc. Aves), Woluwe-Saint-Pierre (MLu) et Renaix (LV). Premiers passages et retours, très modérés, à partir du 31.01. **PIPIT SPIONCELLE (Anthus spinoletta)** : très peu d'hivernage à Harchies (ML); Obigies 28.12, 1 ex. (MLn); Malines (Nekkerspoel) 07.01, 1 ex. (MPo); Genval 14.01, 2 ex. (J&N); Péronnes (Grand-Large) 30.01, 1 ex. (MLn). Petit afflux en février, surtout après le 20 : Vieux-Héverlée 13.02, 1 ex., (SP); Neerijse 13 et 21.02, 4 et 1 ex. (SP); Walem 22.02, 1 ex. (SP); Malines (Nekkerspoel) 22.02, \pm 10 ex. (SP, DE); La Hulpe 27.02, 1 ex. en halte quelques minutes (SP). **BERGERONNETTE GRISE (Motacilla alba)** : en 12 et 01, 14 observations de 1 ou 2 ex., de façon répétée parfois : à Overijse (Malaise) (SP) et à Luigne-Herseaux (JLc); 5 ex. ensemble le 22.12 à Harchies (JLc); en Ardenne, 1 ex. le 01.01 à Erneuville (FDf). Quatre observations seulement en février en d'autres lieux qu'en 12 et 01 ne permettent guère de les attribuer à de l'hivernage ou du passage, observé toutefois à Overijse (Malaise) (SP) : 3 et 1 ex. les 21 et 22 à Beaufays (BPh), 1 ex. à Boitsfort le 26 et 2 ex. à Vossem le 27 (J&N). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (Motacilla cinerea)** : quelques isolés, parfois 2 ex., un peu partout à l'ouest de la Meuse, aussi le 29.12 à Arlon (PPI) et à Bonnert le 14.02 (PPI).

PIE-GRIÈCHE GRISE (Lanius excubitor) : signalée à peu près toute la période, ou en séjour prolongé en tout cas, à Harchies, Lillois-Witterzée, Genval, Neerijse-Rhode-Sainte-Agathe et Hofstade-Malines (ML, TDe, J&N, SP, FDM, Exc. Aves, MPo); dans la dépression de la Fagne (Lompret, Fagnole, Dourbes, Matagne-la-Petite, Matagne-la-Grande) (PFI, PGy, CLy), à Villers-le-Gambon (CLy) et aux barrages de l'Eau d'Heure (Cl) en 01-02; à Evelette (Libois) et Flostoy, en Condroz, en 01 et 02 (CH, HC); en Ardenne enfin et surtout, mais à souligner l'absence de données luxembourgeoises en janvier.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) : premiers chants dès les 04 et 07.01 à Boitsfort et Florennes (MWa, OB), le 24 à Luvingne (JLe), le 01. 02 à Jumet et Clabecq (GN, CDm), début 02 à Lillois et Nivelles (TDe), le 14 à Hollange et Jupille (JTh, EC) et le 23 à Waimes (JD).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) : Gozée 16.12, 4 ex. chanteurs (BB); vallée de la Dyle 14.12, quelques ex. présents (Exc. Aves); signalée ensuite seulement après le 20.01 (surtout 29-30) en Moyenne-Belgique (sauf Pailhe, en Condroz) (RLi), avec les premiers chants. En Ardenne seulement le 09.02 à Waimes, premier chant (JD), puis après le 20 en province de Luxembourg. **GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : en 12 et 01, signalée un peu partout, en petits groupes le plus souvent, 100 à 200 ex. parfois, sauf en Ardenne où l'espèce est quasi absente. Les groupes augmentent en nombre et en fréquence à partir du 07.02 et l'espèce réapparaît en Ardenne, dans la région de Longvilly notamment où elle était totalement absente, en janvier-début février. A Overijse (Malaise) le 08.02, 2.500 à 3.000 ex. en vol vers l'ouest, le 10 plusieurs groupes importants en rémigration (SP). **GRIVE MUSCICENNE (*Turdus philomelos*)** : Woluwe-Saint-Lambert 21.12, 2 ex. dont 1 chanteur (BVo); Uccle 05.01, premier chant (CLf); quelques ex. signalés au nord du sillon Sambre-et-Meuse en 12 et début 01, puis des chants après le 20.01; au sud du sillon, premier retour le 14.02 à Pailhe (RLi), seule donnée. **GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*)** : encore bien moins fréquente que la Litorne, et groupes de plus de 50 ex. encore plus rares. Douze données seulement en février. Trois observations au sud du sillon Sambre-et-Meuse : Waimes 27.12, ± 40 ex. (JD); Florennes 28.12, 1 ex. (OB); Hollange (Sainlez) 14.02, une bande au sol (JTh). **MERLE NOIR (*Turdus merula*)** : Auderghem (Val Duchesse) 03.01, 1 ex. entièrement blanc (PN). Premiers chants dans toutes les régions à partir du 25.01 et début 02. **TRAQUET PÂTRE (*Saxicola torquata*)** : Harchies 15.01, 1 mâle (ML). **ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*)** : 1 ex. hivernant en 01 à La Hulpe (Solvay) et à Overijse (Malaise) (SP).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) : Harchies-Hensies-Pommerœul, effectif redevenu normal, selon ML, au moins 5 ex. le 27.01 (MLn). Marais d'Antoing 30.01, 1 ex. chanteur (MLn). **FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)** : Renaix 08.12, 1 mâle (LV); Gaurain-Ramecroix 09.12, 1 ex. se nourrissant d'une pomme tombée (PS); Dilbeek 01, 02 et 03.01, 1 femelle chaque matin à la mangeoire (T. Van Cauwelaert); Ombret 10.11 et 25.01, 1 mâle se nourrissant de cotoneaster (JF). **POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*)** : Belœil 02.12, 2 ex. observés (ED); Trooz 31.12, 1 ex. dans une étable (JTe); Harchies 03.01 et 01.02, 1 ex. (JLc, DVe, LV); Woluwe-Saint-Lambert 06.02, 1 ex. (AR). **ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*)** : Jupille 06.02, premier chant (EC). **ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)** : quelques hivernants signalés à Braine-le-Château (en 12), à Uccle (en 12 et 02), à Pommerœul (5 ex. le 03.01), à Chiny (en 01) et à La Hulpe (6 ex. le 08.02) (GN, DE, CJo, JLc, J&N, SP).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) : un premier chant le 14.01 à Florennes et le 01.02 à Longvilly; premières poursuites et visites de nichoir aussi, les 02 et 03.02 à Forges et Longvilly (OB, ABi, PGI). **MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*)** : Solre-sur-Sambre 18.02, un ex. unijambiste à la mangeoire, pour le troisième hiver consécutif (HG, JGu). **MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*)** : Woluwe-Saint-Lambert 21.12, 1 ex. chantant et « descendant en parachute », à la manière d'un Pipit (BVo). **MÉSANGE BORÉALE (*Parus montanus*)** : Theux 25.02, premier chant (ADx). **MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*)** : relativement abondante, semble-t-il, fin 12 dans la région d'Arlon et début 02 en Entre-Sambre-et-Meuse notamment (PPI, HG, JGu). **MÉSANGE À MOUSTACHES (*Paranus biarmicus*)** : Harchies-Pommerœul 07.02, 1 ex. et Hensies 22.02, 1 ex. (DH, JLc).

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*) : quelques ex. signalés fin 12 et en 01 dans la région d'Arlon et à Lacuisine (PPI, ADn).


BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) : quelques ex. signalés en Brabant et Hainaut occidental, notamment le 15.01 à Renaix (Sabot) et au moins 20 ex. le 30.01 à Saint-Sauveur (Les Hauts) (DVe, LV). **BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*)** : très peu signalé en décembre. En janvier, par contre, signalé souvent en Brabant et Hainaut occidental en petites bandes, à partir du 10 surtout, alors qu'il est rare en Ardenne; présent dans toutes les régions (sauf Hainaut ?) en février, surtout après le 10, plus particulièrement en Ardenne. Longvilly, présent quotidiennement à la mangeoire en 12, absence totale en 01, ± 50 ex. le 05.02 (ABI); Erneuville (Cens) 25.01, retour de ± 50 ex. (FDf); Grand Pecq, 2 bandes de ± 30 ex. en 01 (MLn); Lillois (Witterzée) 10 au 31.01, passages importants, par groupes de ± 15 à ± 60 ex. (TDe); Overijse (Malaise) ± 20 ex. en 01, plusieurs groupes de ± 25 ex. en 02 (SP); Bomal-sur-Ourthe, 2-3 groupes de ± 10 ex. en 02 (YF); Bonnert 11.02, ± 15 ex. (PPI); Purnode (Houx) 15.02, 50 ex. (JFB); Gerpennes 23.02, 20 ex. (CLy); Vossem 27.02, 20 ex. (J&N). Nombreux autres petits groupes et isolés. **BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schœniclus*)** : quelques ex. hivernants en 12 et 01 signalés à Ottignies, Ronquières, Huldenberg, Malines (Nekkerspoel) (TMq, JMLe, FDM, MPo); ± 60 ex. le 04.01 à Harchies (RD); quelques dortoirs bien fréquentés en 01-02 dans le Haut-Escaut : Pottes, ± 10 ex. en 01; Kain, ± 15 ex. en 01; Héringes, ± 25 ex. en 01; Antoing (marais), ± 80 ex. en 01, plus de 100 ex. le 30, au moins 25 à 30 en 02, 120 ex. le 15 (MLn, PCq). Début de migration mi-02, avec ± 70 ex. à Longchamps (Grand-Vivier) (Ardenne) (MCh), signalé seulement après le 20 en quelques autres lieux, avec retour des nicheurs locaux le 27 à Genval notamment (SP).

GROS-BEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) : très peu répandu cet hiver : signalé plus ou moins régulièrement (6 observations de 1 à 3 ex.) en 12 et 01 à Florennes seulement (OB); 23 ex. aussi en 6 ou 7 groupes le 25.01 à Saint-Aubain (OB); petit afflux, semble-t-il, après le 20.02, notamment ± 20 ex. le 25 à Bonnert (PPI); à Longvilly, 5-6 ex. du 01 au 10.01, absence totale ensuite (ABI). **CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)** : assez répandu toute la période à l'ouest du sillon méosan, en général par groupes de moins de 10 ex., mais quelques fois de plus de 20 ex., et même jusqu'à 50 ex. à Harchies-Pommerœul fin 01-début 02 (DVe, LV, ML). Une donnée à l'est de la Meuse : Fronville 10.01, une bande de 25-30 ex. (YF). **TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)** : relativement abondant toute la période à l'ouest de la Meuse et en Condroz, plus rare en Ardenne; particulièrement répandu en Brabant (en 01 surtout) où il semble diminuer un peu en février tandis qu'il augmente en Ardenne. Les bandes comptent le plus souvent moins de 30 ex., parfois 50 à 60, la plus grosse atteignant ± 120 ex. le 11.02 à Bonnert (PPI). **LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*)** : signalée 7 fois seulement en 01 et 02, à Weerde (± 20 ex.), Renaix, Mont-Saint-Guibert, La Hulpe, Harchies et Oost-Maarland, (Exc. Aves, DVe, LV, J&N, ML, EC). **LINOTTE A BEC JAUNE (*Carduelis flavirostris*)** : Malines (Nekkerspoel) 28.12 et 18.01, ± 10 ex. (MLu, AH). **SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammae*)** : régulièrement signalé en Brabant, par 1 à 5 ex., sauf ± 20 ex. les 08 et 09.12 à Uccle (Kauwberg) (CJo), 22 ex. le 04.01 à Boitsfort (MWa) et 18 ex. le 21.02 à Couture-Saint-Germain (TBr); ailleurs : ± 10 ex. le 26.12 à Forge-Philippe (HG, JGu); 2 ex. le 31.01 à Leers-et-Fosteau (JPHe) et 1 ex. entendu en vol vers le nord le 15.02 à Pailhe (RLi). **SERIN CINI (*Serinus serinus*)** : Petit-Aaz (?) 28.12, 2 mâles chanteurs et une femelle (MLg, PVDa); Boitsfort 02.02, 2 ex. (J&N). **BECCROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : très rare : Redu 13.12, 2 ou 3 ex. en vol (FH), même région, même date, aucune observation sur toute la journée (RLi); Vresse-sur-Semois 28.12, 1 couple dont le mâle chante fortement (MPa);

Tervuren 31.01, 1 mâle (MWa) **PINSON DES ARBRES (*Fringilla cœlebs*)** : premiers chants : le 08.02 à Boitsfort, le 09 à Neuville-en-Condroz, le 17 à Longvilly et Mabompré (Vellereux), le 22 à Theux et le 26 à Hampteau (MWa, FBI, ABI, FLu, ADx, PBa). **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : en général peu abondant. En décembre, signalé essentiellement en Haute-Belgique, en petit nombre, l'espèce apparaissant notamment aux mangeoires le 07 et 08 dans les régions de Liège et Arlon (BH, EC, PC, NE, PPI), et quelques ex. aussi à Renaix, Harchies-Pommerœul, Uccle et Ottignies (DVe, LV, CJo, TMq); nombreuses bandes cependant dans la région de Rochefort (MPa) et 2.000 à 3.000 ex. s'abattent sur une hêtraie le 15.12 à Wolkrange (PPI). Plus rare encore en 01 et 02, sauf peut-être à l'ouest de la Meuse; passages notés le 12.02 à Lillois (CJo) et le 08, surtout des mâles, et le 28, surtout des femelles, à Tohogne-Durbuy (RT).

A Longvilly, 200 à 300 Moineaux fréquentent la mangeoire en 01, environ 20 % de **MOINEAUX DOMESTIQUES (*Passer domesticus*)** et 80 % de **MOINEAUX FRIQUETS (*Passer montanus*)**.

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) : 2 ex. présents tout l'hiver en forêt d'Anlier (ACo). **CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone corone*)** : Forges (Abbaye) 10.12, 1 ex. agressant un Geai pour lui dérober une pomme de terre prise au nourrissage; ce comportement, observé d'autres jours, semble permettre à la Corneille de profiter du nourrissage sans trop s'approcher des bâtiments (PGI); Wardin (Neffe) 14 au 31.12, un couple construit un nid et monte la garde presque continuellement près de l'ébauche (ABI). **CORNEILLE MÂNTELÉE (*Corvus corone cornix*)** : Rhode-Sainte-Agathe 07.12, 1 ex. sur l'étang gelé, mangeant un laridé mort, avec deux Corneilles noire (JFB) et 18.01, 1 ex. (JaE, JoE); Barry ± 15.12, 2 ex. (PS); Walem 27.12, 2 ex. (MPo); Thieusies 06.01, 1 ex. (BA); Pipaix 14.01, 1 ex. (MCa); Walhain-Saint-Paul 16.01, 1 ex. (BDe). **PIE BAVARDE (*Pica pica*)** : Arlon, 18 ex. à un dortoir en 02 (PPI); Neuville-en-Condroz, visites fréquentes à un nid de l'année précédente à partir de mi-02 (FBI). **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocatactes*)** : Lierneux 19.02, un ex. visitant un poulailler (MDe). **GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*)** : Forges (Abbaye), février, particulièrement affamé ou échappé de captivité, 1 ex. prend la nourriture dans la main (PGI).



Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*).
D. van der Elst, Uccle, décembre 1980.