

CHRONIQUE DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE AVES

Chronique ornithologique 1981/2 : mars, avril, mai.

Elaboration du fichier : N. et P. Leprince et E. Clotuche.

Rédaction : E. Clotuche et R. de Liedekerke.

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée

A :	Anonyme	Ch. Weber	GOB :	G.O. Bastogne	
ABk :	A. Boeckx	DA :	D. Arnould	GRa :	G. Rasson
ABI :	A. Blondlet	DCo :	D. Collin	HC :	H. de Callatay
ABP :	A. Bas-Perez	DD :	D. Daune	H. Delvoey	
ACo :	A. Collin	DE :	D. van der Elst	HG :	H. Guerriat
AD :	A. Demaret	DG :	D. Gendebien	HW :	H. de Wavrin
ADn :	A. Dumont	DH :	D. Hubaut	HWe :	H. Wiesemes
ADu :	A. Delaunois	DLa :	D. Lafontaine	I. Clément	
ADx :	A. Doneux	DRa :	D. Rabosée	ID :	I. Degrez
AHI :	A. Holvoet	DRo :	D. Rosillon	J. de Bonhomme	
A. Nicolay		D. Salmon		JB1 :	J. Bultot
AR :	A. Rappe	DV :	D. Voituren	J. Burnotte	
ASm :	A. Smeets	DVe :	D. Verroken	JCC :	J.C. Claes
BA :	B. Amory	Dy Wiel :	Dyle Wielewaa1	JCDe :	J.C. Dechamps
BB :	B. de Briey	EBo :	E. Bossart	JD :	J. Dumont
BDe :	B. Deceuninck	EC :	E. Clotuche	JaE :	Ja. Van Esbroeck
B. Forget		ED :	E. Delmée	JoE :	Jo. Van Esbroeck
BH :	B. Henry de Frahan	EDg :	E. Degroz	JF :	J. Fouarge
BI :	B. Iweins	ELz :	E. Lizen	JFB :	J.F. de Bruyne
BPh :	B. Philippart	EP :	E. Peten	JFN :	J.F. Noulard
BTh :	B. Thiry	ESe :	E. Serexhe	J. Ghijs	
BVo :	B. Votron	EVe :	E. Verheggen	JGu :	J. Guerriat
B. Van Acker		FBI :	F. de Bellefroid	J. Hansen	
CCo :	C. de Coune	FBu :	F. Bourgeois	JHo :	J. Houbart
CD :	C. Dehem	FDf :	F. Dufey	JHv :	J. Havart
CEAG :	C. Etude Aves Gozée	FDm :	F. Demeyere	J. de Jonge	
CGe :	C. Geyer	FH :	F. le Hardy	JJS :	J.J. Strijkmans
CH :	C. de Harenne	FHa :	F. Halot	JLBo :	J.L. Bodeux
CHa :	C. Hallet	FHe :	F. Héla	JLc :	J. Leclercq
CHM :	C.H. Moulin	F. Incourt		JLD :	J.L. Dambiermont
CI :	C. Istasse	FLr :	F. Lambert	JLG :	J.L. Gillet
CJo :	C. Joukoff	FLu :	F. Lutgen	JMLe :	J.M. Leprince
CKe :	C. Kempgens	FMr :	F. Maréchal	JMLi :	J.M. Linden
CLa :	C. Langhendries	FNo :	F. Noifalise	JMLo :	J.M. Lommaert
CLe :	C. Lefebvre	FRo :	F. Rossillon	JMo :	J. Mois
CLy :	C. Lemy	FTa :	F. Tahon	JPHe :	J.P. Herman
CMn :	C. Monard	FVa :	F. Vandenput	J.P. Hirtz	
CMo :	C. Mois	GBa :	G. Bauchau	JPJ :	J.P. Jacob
CRBH :	C.Rech.Biol. Harchies	GDS :	G. De Schutter	J.P. Kuy1	
CVa :	C. Vansteenwegen	GN :	G. Nève	JPLa :	J.P. Launois

JPLh : J.P. Lhotellerie	OL : O. Lardinois	PVm : P. Vanmeerbeeck
JPR : J.P. Reginster	OO : O. d'Oultremont	PWa : P. de Warnaffe
JPSc : J.P. Scohy	O. Petitjean	PWI : P. Willemet
JSe : J. Sedek	OPi : O. Picard	RDC : R. De Coster
JTa : J. Tahon	PA : P. Azorne	RDt : R. Detaille
JTh : J. Thilmany	P. Bastien	RL : R. Lambert
JVa : J. Vandervelden	PBa : P. Brasseur	RLb : R. Libois
LMe : L. Mercier	PBe : P. Borceux	RLi : R. de Liedekerke
LSc : L. Schmitz	PC : P. Collette	RLn : R. Langhendries
LV : L. Verroken	PCe : P. Carlier	RML : R.M. Lafontaine
MAm : M. Ameels	PCq : P. Coquette	RdP : Rol. Potvliege
MBa : M. Baguette	PDa : P. Dachy	RoP : Rob. Potvliege
MBo : M. de Borman	PDm : P. Demoulin	RRo : R. Rosoux
MCa : M. Cantraine	PDv : P. Deviche	R. Schneider
MCh : M. Chable	PDW : P. De Wolf	RSn : R. de Schaetzen
MDe : M. Deroanne	PFe : P. Feller	RT : R. Thomas
M. Forget	PGI : P. Gall	RV : R. Verdin
ML : M. Loison	PGt : P. Goffart	SP : S. Peten
MLg : M. Laguesse	PGy : P. Gailly	SIO : St. Init. Ornitho.
MLn : M. Languy	PK : P. Kempgens	TBr : T. Ch. de la Brousse
MLu : M. Luy	PLe : P. Leprince	TDe : T. Dewitte
M.L. Van Hammée	PLt : P. Lamotte	T. Leclipteux
MMn : M. Moncousin	PMI : P. Melon	TMi : T. Michiels
MPa : M. Paquay	PMt : P. Mertz	TMq : T. Maniquet
MPo : M. Peero	PN : P. Neuray	TVn : T. Vandenput
M. Rits	PPi : P. Pierre	VF : V. Furnelle
MWa : M. Walravens	PRy : P. Ryelandt	V. Schmitz
NG : N. Goetghebeur	PS : P. Simon	YF : Y. Furnelle
OB : O. Bourlon	PVDa : P. Van Damme	Y Valenne

Les observations signalées sous le sigle Dy Wiel nous ont été communiquées par la section du Wielewaal couvrant la vallée de la Dyle. Elles sont extraites des notes déposées dans la boîte aux lettres de la cabane de Rhode-Sainte-Agathe; une proportion non négligeable a été réalisée par des membres d'Aves.

Conditions climatiques

En mars 1981, la pression atmosphérique moyenne est très anormalement basse et les vents des secteurs SE à WSW largement excédentaires : il en résulte un déficit très net d'insolation mais des températures exceptionnellement douces. Toutes les cotes udométriques relevées dans le pays sont supérieures à la normale, dont elles représentent 143 % en Condroz à 260 % en Gaume. Les gelées nocturnes sont rares et seuls les sommets ardennais subissent quelques faibles gelées diurnes. La troisième décade est plus particulièrement douce, surtout les journées du 26 au 30.

Insolation et précipitations sont plutôt déficitaires en avril. Les températures, bien que relativement douces en moyenne, sont à peine supérieures à celles de mars; très agréables du 09 au 16/17, elles accusent cependant une baisse sensible à partir du 18 et la neige réapparaît en Haute-Belgique.

Jusqu'au 07 mai, le temps reste anormalement froid et humide, avec des gelées nocturnes et des maxima diurnes le plus souvent inférieurs à 10° C. Nettement plus printanier ensuite, il se refroidit à nouveau après le 20. Le temps du mois de mai se caractérise cependant avant tout par sa grande instabilité, liée à des pressions atmosphériques extrêmement basses (moyenne la plus basse depuis 1891). Les phénomènes orageux sont exceptionnellement fréquents, surtout après le 20. Les températures moyennes sont cependant plutôt supérieures à la normale et les précipitations ne sont sensiblement excédentaires qu'en Basse-Belgique. Les vents sont relativement modérés, avec un excès des secteurs SE à SW.

Faits saillants

Un nombre inhabituellement élevé d'observations précoces a marqué ce printemps : les premiers Faucon hobereau, Mouette pygmée, Coucou, Hironnelles de fenêtre et de rivage, Rougequeue à front blanc, Locustelle tachetée et Fauvette des jardins notamment sont signalés avec une avance très nette sur la normale, ainsi que l'Hirondelle de cheminée et la Fauvette à tête noire, pour lesquelles ces avant-gardes sont relativement abondantes. De même, deux premiers cas de nidification sont observés exceptionnellement tôt, chez la Fauvette grisette et la Bergeronnette printanière.

Parmi les espèces plutôt abondantes au passage, on retiendra le Garrot à œil d'or, exceptionnellement nombreux en Hainaut occidental, le Milan royal, la Barge à queue noire et le Chevalier aboyeur dans la vallée de la Dyle. Le passage de la Grue a par contre été très irrégulier et peu fourni, comme celui de la Bondrée et, surtout, du Gobe-mouche noir, quasi insignifiant.

Au chapitre des nidifications rares, on notera l'installation d'un couple de Hérons cendrés à Nivelles et celle de l'Hypolaïs polyglotte à Frasnes-lez-Couvin et, enfin, celle de la Cigogne blanche à Samart qui, même s'il s'agit de la troisième année consécutive, reste un fait important.

Durant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 03 : 01, 08, 15, 22 et 29; 04 : 05, 12, 19 et 26; 05 : 05, 12, 19 et 26.

Détail des observations

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) : passage marqué dans la première quinzaine de mars avec environ 60 ex. à Walem les 08 et 15 et environ 80 ex. à Hofstade le 15 (FDm), une trentaine d'ex. aux barrages de l'Eau d'Heure (Plate Taille) (Cl, CLy) et 4 ex. sur le lac de Bütgenbach le 15 (Exc. Aves). Les premiers jeunes sont signalés le 30.04 à Harchies (ML) et en plusieurs endroits dans les premiers jours de mai, alors que d'autres couples en sont seulement au stade de la ponte, à Woluwe-Saint-Pierre (étangs Mellaerts) (JaE, JoE) et Boitsfort (MWa) notamment. **GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)*** : Pommerœul 16.05, 2 ex. adultes (LV). **GRÈBE CASTAGNEUX**

* Données soumises à la Commission d'Homologation, citées dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.

(Tachybaptus ruficollis) : encore 17 + 9 ex. le 06.03 sur le Haut-Escaut (PCq); en Ardenne, retour à Longchamps les 10 et 15.03 (ABI) et 12 ex. le 28 au Grand-Vivier (FDf). Premiers jeunes signalés le 24.04 à Antoing (PCq); peu de couples installés à Harchies-Pommerœul (ML).

GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo) : observations assez fréquentes de mi-mars au 20 avril surtout, dont quelques groupes relativement importants : Rhisnes (Hulplanche) 22.03, 15 ex. en vol vers le N (Exc. Aves); Profondeville 03.04, 9 ex. vers le S (ABP); Neerijse 13.04, 16 ex. vers l'est (MAm) et Obourg 20.04, 7 ex. (BA). Après cette date, 1 ex. à Lustin le 25 (MLn) et 2 ex. en vol le 29 à Bouvignes-sur-Meuse (RL). Harchies-Pommerœul, présence régulière du 18.03 au 06.05, avec des maxima de 5 ex., dont un à tête blanche (**Ph. c. sinensis**), le 28.03, 8 ex. le 14.04 et 9 ex. le 01.05 (BVo, DV, LV).

HÉRON CENDRÉ (Ardea cinerea) : bien répandu et même abondant en de nombreux endroits jusqu'à la mi-avril, plus localisé ensuite : dans le bassin de la Sûre (Bastogne) par ex., 13 ex. en 03 sur les étangs et cours d'eau (RDt) et à Harchies-Pommerœul, plusieurs fois 20 à 30 ex. en 03 et 04 (LV, ML, CRBH). Dans la vallée de la Dyle, l'espèce augmente fortement lors de la vidange de l'étang de Rhode-Sainte-Agathe aux environs du 19 mars; des nombres de 25 à 40 ex. sont alors notés plusieurs fois, avec un maximum de 43 ex. le 14.04, les maxima de mai étant de 17 et 13 ex. les 07 et 31 (DLA, JCC, TMI, ... DyWiel). A Harelbeke, où il a niché pour la première fois en 1977, 13 couples sont dénombrés en 03 (DH, JLC); un nouveau site de nidification est découvert en Brabant wallon : un nid sur un hêtre, dans un parc, à Nivelles, le 19.05 (JHo). **HÉRON POURPRÉ (Ardea purpurea)** : Berg 17.04 1 ex. (RoP, RdP); La Hulpe 20.05, 1 ex. en vol vers le N (MWA). **HÉRON BIHOREAU (Nycticorax nycticorax)*** : Neerijse 13.05, 1 adulte (DLA, PCe, RML); Genval, étang du Lido, 14 au 15.05, 1 adulte (EP, GRa, SP). **BLONGIOS NAIN (Ixobrychus minutus)** : Antoing (marais) 16.05, 1 mâle posé (MLn). **GRAND BUTOR (Botaurus stellaris)** : Harchies 12.04, 1 ex. (ML); Harchies-Hensies-Pommerœul 20 au 28.05, 1 ex. (JaE, JoE, JBI, DVe, LV, ML, CRBH).

CIGOGNE BLANCHE (Ciconia ciconia) : à Samart, un ex. est présent au nid dès le 27.03 (JBI) et au moins un jeune est visible le 30.05 (RoP). Un premier passage est noté le 09.03, 12 ex. vers le N à Erezée (Soy) (PBa), puis deux observations d'isolées seulement le 13.03 à Lillois (TDe) et le 05.04 à Olne (DRa). Le passage reprend début mai, étant bien marqué seulement en province de Luxembourg, notamment 5 ex. le 11 à Bourcy-Rachamps (ABI, FDf).

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos) : nombreuses nichées écloses le 25.04 en Brabant (RoP) et à Harchies, en mai, bonne réussite de la nidification (ML). **SARCELLE D'HIVER (Anas crecca)** : bien répandue en 03 et 04, y compris en Ardenne, mais en petit nombre en général; à Gozée, 100 ex. le 20.03, 48 le 15, 30 le 21, une vingtaine jusqu'au 22.04, 13 et 9 ex. les 24 et 26, puis 1 mâle en mai (BB, CEAG); 10 à 20 ex., parfois jusqu'à 30, en 03 et 04 à Harchies-Pommerœul (DVe, LV, ML, B. Van Acker, CRBH), environ 5 couples tout le mois de mai (ML); vallée de la Dyle, maximum de 56 ex. le 20.03 et de 42 ex. le 09.04 (FHe), plus rare après (DyWiel); encore un couple en mai à Rhode-Sainte-Agathe et nidification probable à Overijse (DyWiel, EP, SP); La Hulpe 13.03, 45 ex.; Grand-Leez 25 et 29.03, 25 et 24 ex. (ELz). Signalée aussi en mai le 09 à Ronquières (Canal) (Exc. Aves) et le 28 à Elsenborn (JD). **SARCELLE D'ÉTÉ (Anas querquedula)** : après quelques rares ex. apparus le 14 ou le 15.03 en Hainaut occidental et Brabant (DH, ML, DLA, MBo,

MPO, SP), l'espèce se rencontre dans toutes les régions après le 20 et diminue déjà après le 15.04. Il s'agit toujours d'ex. isolés ou de tout petits groupes, le plus gros étant observé en Ardenne, 15 ex. le 21.03 à Longchamps (Grand-Vivier) (MCh). Quelques ex. sont encore notés en mai, dont 1 ou 2 couples présents en permanence à Harchies-Pommerœul (ML). **CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)** : comme pendant la période hivernale précédente, l'espèce n'est signalée qu'en petit nombre et essentiellement en Hainaut et Brabant, mais 12 ex. (le plus gros groupe signalé) le 15.03, puis 1 couple le 28.03 et 1 mâle le 01.04 à Oost-Maarland (DRa, PLe), 1 mâle du 15.04 au 01.05 et 2 mâles le 10.05 à Gozée (BB, CEAG) et enfin 1 femelle à Longchamps (Lux.) le 19.04 (MCh); 1 ou 2 couples présents tout 05 à Harchies-Pommerœul (ML), parfois 5 à 6 mâles (DVe, LV, CRBH), 1 ex. à Florival le 13.05 et à Rhode-Sainte-Agathe le 18.05 (ELz, TMi) et un couple le 13.05 à La Hulpe (MWa, RLn). **CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*)** : très nette diminution des effectifs dans la région malinoise dès 03; signalé essentiellement à Harchies-Pommerœul, avec des maxima de 15 à 25 ex. mi-03 et début 04, et quelques ex. présents jusqu'au 09.05 (DVe, LV, ML, ...). A noter, en Ardenne : Longchamps (Grand-Vivier) 10 et 20.03, 8 et 10 ex. (ABl); Stavelot, bassin inférieur de la centrale de Coö, 5 couples (JD) et Fêchereux (?) 15.05, 1 ex. sur l'Ourthe (CKe, PK). **CANARD PILET (*Anas acuta*)** : en Hainaut, quelques petits groupes (maximum 15 ex. à Hérimettes et Harchies) (PCq, CRBH) jusqu'au 21.03; plus répandu en Brabant, surtout dans la vallée de la Dyle : notamment 27 ex. le 15.03 à Neerijse-Rhode-Sainte-Agathe (SP) et 36 ex. le 07.04 (DLa, RML) et encore 1 couple le 10.04 à Neerijse (ELz), 1 mâle à La Hulpe du 22.04 au 01.05 (EVe, RL, EP, SP) et 1 mâle à Rhode-Sainte-Agathe le 24.05 (NG). Un ex. enfin le 12.04 à Eisenborn, barrage de la Schwarzbach (Exc. Aves). **CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)** : bien répandu toute la période, avec un maximum marqué entre le 20.03 et le 10-12.04 : des nombres de 30 à 50 ex., jusqu'à 70 ex. même (Rhode-Sainte-Agathe 21.03) (FHa, EP, SP, TMi), sont signalés en Hainaut et Brabant, l'Ardenne et l'Entre-Sambre-et-Meuse rapportant quelques observations de 10 à 15 ex. Plus localisé après le 10.05. A Harchies-Pommerœul, on note encore environ 25 couples tout 04 et environ 35 ex. le 01.05, et au moins 2 nichées éclosent les 26 et 28.05 (ML). **FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)** : des groupes de plus de 50 ex., parfois même plus de 100 ex. sont encore signalés en Hainaut (Harchies-Pommerœul), en Brabant (Dyle surtout) et à Oost-Maarland en 03 et jusqu'à mi-04; effectifs plus réduits et plus dispersés par la suite : au moins 100 ex. en tout dans la vallée de la Dyle le 23.05 (FHe) et environ 25 ex. à Harchies-Pommerœul en 05 (ML). Aucune observation au sud du sillon Sambre-et-Meuse, sauf à Gozée, 1 couple régulièrement toute la période (BB, Cl, CEAG) et Roly 30.03, 9 mâles et 8 femelles (JPSc). **FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)** : à Oost-Maarland, encore ± 400 ex. le 15.03, puis moins de 10 ex. en 04 (PLe). Ailleurs, l'espèce est bien répandue, assez souvent par groupes de 20 à 50 ex. en Hainaut et Brabant, parfois jusqu'à 100-120 ex. en mars à Harchies, La Hulpe et la vallée de la Dyle. En mai, 22 ou 23 couples à Grand-Leez (ELz), environ 120 ex. en tout dans la vallée de la Dyle le 23 (FHe) et premières éclosions à Harchies-Pommerœul le 16.05 (ML). **FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*)*** : Seneffe (Buisseret) 21.03, 1 mâle (JPLh, PA). **GARROT À CEIL D'OR (*Bucephala clangula*)** : remontée printanière bien marquée en mars et début avril : l'espèce se rencontre alors essentiellement en Hainaut occidental, en nombre exceptionnellement important à Harchies-Pommerœul pendant la seconde quinzaine de mars : environ 30 femelles (à Pommerœul) le 14 selon OPi, 17 femelles et 2 mâles le 15 (ML), 10 femelles et 2 mâles le 21 (Exc. Aves) et encore 12 femelles le 04.04 (DVe, LV), la dernière observation ayant lieu le 10.04 (ML); signalé aussi en isolés ou groupes de 2-3 ex. pendant cette période à Maisières, Antoing, Walem, barrages de l'Eau d'Heure, Liège (Monsin) et Oost-Maarland (BA, MLn, Cl, CLy, EC, DRa, FBI). Observation peu banale enfin, une femelle

présente sur l'Escaut à Hérinnes-Espierres non seulement tout le mois d'avril mais aussi tout le mois de mai (MLn, PCq). **MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*)** : une femelle sur l'Escaut à Hérinnes-Espierres les 11 et 12.04 (MLn, PCq). **HARLE BIÈVRE (*Mergus merganser*)** : quelques derniers hivernants ou migrateurs dans la première quinzaine de mars : barrages de L'Eau d'Heure (Falemprise) 08.03, 6 ex. (Cl,CLy); Oost-Maerland 12 et 15.03, 1 mâle et 2 femelles (EC, PLe) et Walem 15.03, 2 mâles (FDm). **HARLE PIETTE (*Mergus albellus*)** : fin d'hivernage également à la mi-03 : à Hermalle-sous-Argenteau (Meuse), encore 17 ex. le 01, 4 mâles et 10 femelles le 05 et 1 mâle et 3 femelles le 12 (DRa, EC); Falemprise, 4 femelles le 01 (JSe); Walem, 2 femelles et 1 mâle le 08 (FDm); Harchies-Pommerœul enfin, encore 1 mâle et 6 femelles jusqu'au 15 (ML, FDm, LV, CRBH). **TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*)** : Walem 08 et 15.03, 2 et 6 ex. (FDm); Rhode-Sainte-Agathe 04 au 09.04, 1 ex., 06, 07, 23 et 31.05, 1, 1, 2 et 2 ex. (FHa, FHe, PGI, DLa, ... DyWiel). A Harchies-Pommerœul, observations régulières toute la période, avec un maximum de 9 ex le 15.03 (LV); 2 couples sont nicheurs certains, mais 1 ou 2 ex. supplémentaires sont observés sporadiquement et une femelle (troisième couple?) est notée le 28.05 du côté français (ML). **TADORNE CASARCA (*Tadorna ferruginea*)*** : 1 ex. observé plusieurs fois de mi-03 à mi-04 à Neerijse (CGe, FHe, SP).

OIES GRISES (*Anser sp.*) et **OIE CENDRÉE (*Anser anser*)** : une vingtaine d'observations, dont les deux tiers identifiées comme Oies cendrées, pendant les deux premières décades de mars, depuis le Hainaut occidental jusqu'à l'Ardenne; la plupart des ex. identifiés appartiennent à des tout petits groupes (moins de 10 ex.) observés au sol et 6 groupes seulement atteignent ou dépassent 30 ex., notamment 80 ex. sp. en vol vers le N le 09 à Cul-des-Sarts (BTh) et 100 ex. sp. vers le NNE le 01 à Renaix (DVe, LV). Quelques observations ont encore lieu en avril : 70 à 80 ex. sp. vers le NE le 06 à Bomal-sur-Ourthe (YF), 90 ex. sp. vers l'est à Hotton (date non précisée) (PBa), 8 ex. sp. en vol le 25 à Pérot (RLn) et 6 observations d'Oies cendrées, par 1 ou 2 ex., sauf 4 posées à Elsenborn (Richelvenn) le 05 (LSc). Enfin, 15 ex. sp. en vol le 04.05 à Vierves-sur-Viroin (PRy) et 1 Oie cendrée se posant à Harchies le 19.05 (LV). **OIE DES MOISSONS (*Anser fabalis*)** : Antoing (marais) 09 au 19.04, 1 ex. (MLn, PCq).

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*)* : Villers-la-Ville 15.03, 1 ex. sub-adulte (GrA et Gr. Nat. St-Michel). **BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)** : migration et parades nuptiales observées dans toutes les régions jusqu'à mi-avril, parfois encore en mai, notamment le 29 à Overijse (EP, SP). **ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)** : plus de 50 observations, parfois répétées, en mars, témoignant d'un passage assez important; nette diminution en avril, surtout en Moyenne-Belgique; en mai, signalé en 11 localités, dont une en Brabant et une en Hainaut. **AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)** : observations à peu près deux fois plus nombreuses en mars qu'en avril et mai; exclusivement en Haute-Belgique, sauf un immature en forêt de Soignes le 10.05 (HW). Ecllosion mi-05 dans la région de Hotton (PBa). **MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)** : passage très important dès les premiers jours de mars (en fait depuis le 21.02), sensible dans toutes les régions mais en très grosse majorité au sud du sillon Sambre-et-Meuse, plus particulièrement en Ardenne, quelques sites de nidification étant occupés dès le début de ce mois (ABl, HWe). En mars, toutes les observations de Moyenne-Belgique sont réalisées entre le 01 et le 08, journée marquée par une hausse des températures et rassemblant la majorité des observations de groupes importants, de 5 à 12 ex., en Haute-Belgique. Net déclin du passage après le 10.04, puis observations à nouveau plus fréquentes après la mi-mai. Moyenne-Belgique : 1 ex. le 09.04 à Bruxelles, le 11.04 à Harchies, le 10.05 à Neerijse et le 25.05 à Flobecq (TVe, DV,

ML, JMLe, MMn). **MILAN NOIR (*Milvus migrans*)** : 4 observations en mars : à Hachy (07), Fronville (15), Bomal-sur-Ourthe et Lierneux (30) (A, Nicolay, PDm, YF, MDe); 3 début avril : Etalle, 1 puis 2 ex. le 04 (JLG), Barbençon le 06 (HG, JGu) et Halma le 08 (SIO). Plus fréquent à partir du 15.04 et jusqu'à fin mai, surtout en Sud-Luxembourg mais aussi en Hainaut et Brabant. Dans la région d'Arion, site de nidification occupé à partir du 07.04 (CMo, etc...). **BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*)** : très peu notée ce printemps. Deux premiers ex. très précoces sont signalés le 28.03 à Overijse, en déplacement vers le SE (SP), puis 4 observations en avril : Pommerœul 12.04, 2 ex. (JaE, JoE, RDC), Hotton 13.04, 1 ex. posé (PBa), Doische 17.04, 1 ex. (PRy) et Harchies 21.04, 3 ex. (CRBH). Un peu plus fréquente à partir du 07.05, mais aucun passage important n'est signalé. **BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)** : retour d'hivernage et migration notés en Brabant, à Grand-Leez et à Harchies à partir du 15 et surtout du 25.03. Les observations se multiplient en avril et début mai, quelques-unes provenant de Haute-Belgique (Tavier, Virelles, Gozée, Halma, Auffe, Ethe, Flémalle) (PDv, JPSc, CEAG, SIO, FVa, TVn, EP, SP). Harchies-Hensies-Pommerœul, 3 couples présents (ML, B. Van Acker, JaE, JoE, CRBH). **BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*)** : le nombre élevé et la concordance des observations de **BUSARDS GRIS (*Circus sp.*)** avec celles de Busards Saint-Martin permettent d'en attribuer la plus grande part à cette dernière espèce. Environ 20 et 25 observations en 03 et 04, essentiellement entre le 15.03 et le 15.04, dont environ la moitié attribuées au Saint-Martin. Contrairement à la période hivernale précédente, les observations sont nombreuses en Haute-Belgique, dans la région de Bastogne notamment en mars, avec quelques groupes et séjours plus ou moins prolongés : 2 mâles et 3 femelles le 15.03 à Longvilly par exemple (ABl). Parmi les « non identifiés », retenons 1 femelle le 21.04 à Noville (Luzery), capturant un papillon (FLu), 1 mâle le 28.04 à Saint-Gérard (CHa) et 1 ex. le 03.05 à Elsenborn (Exc. Aves) et le 09.05 à Baugnies (MCA). **BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*)** : 1 mâle 04.04 à Etalle (JLG) et un couple le 08.05 dans la région de Virton (PD, J. Terschuren).

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*) : le passage commence dans la troisième décennie de mars (premier le 21 à Neerijse, M. et B. Forget) et est noté surtout entre le 27.03 et le 20.04 en Brabant et Haute-Belgique. Après, noté le 22.04 à La Hulpe (RLn), le 25.04 à Rhode-Sainte-Agathe (DE), le 10.05 dans la vallée de l'Hermeton (JSe) et surtout 1 ex. séjournant à Harchies-Pommerœul du 21.04 au 10.05 (ML, DH, JMLe, LV, CRBH).

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*) : une seule observation : Eupen (Hertogenwald) 22.03, 1 femelle (JCDe). **FAUCON HOBÉREAU (*Falco subbuteo*)** : 1 premier ex. très précoce le 28.03 à Boitsfort (JMLe, GDS), ensuite le 18.04 à Filot (PLe), le 25 à La Hulpe et Neerijse (EVe, ABk) et le 26 à Sorée (RLi). Plus fréquent en mai; un site de nidification brabançon est occupé à partir du 09.05 (MWa, EP, SP). **FAUCON CRÈCERELLE (*Falco tinnunculus*)** : relative rareté de l'espèce signalée en plusieurs zones de Haute-Belgique en mai : Bertogne, Bertrix-Neuchâteau, autoroute Liège-Verviers, Elsenborn (Exc. Aves, EBo, DRa, JD). Couvaion en cours à Gosselies dès le 09.04 (JBI). A Anvaing, le 13.03 un mâle et le 06.04 une femelle, « prisonniers » dans le même hangar d'usine, se libèrent de la même façon, en brisant une vitre du toit (MMn).

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) : demeure rare en Condroz et dans la région de Rochefort, 1 couple le 04.05 à Havelange (CH) et le 13.05 à Eprave (MPa); 2 couples paraded le 22.03 à Court-Saint-Etienne (MWa); 18 ex. le 30.03 à Ottignies (L.-L.-N) (FHe); quelques ex. aussi à Ottenburg, Rhode-Sainte-Agathe, Dilbeek, Houtain-le-Val, Han-

sur-Lesse et Ronquière en 04 et 05 (FHe, JP, Kuyl, SIO, Exc. Aves). Trop peu signalée; il est vrai que les réintroductions fréquentes et anarchiques à des fins cynégétiques rendent l'évolution réelle de cette espèce très difficile à suivre. **CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*)** : Pailhe 21.05, 1 ex. chante quelques instants dans les céréales (RLi); Maffe 30.05, 1 ex. (RLi); Mabompré (Vellereux) 31.05, 1 ex. (FLu).

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) : quelques bandes sont notées dès le 01.03; plus important du 10 au 15, le passage demeure très irrégulier et la plupart des bandes observées ne comptent guère plus de 30 ex., la plus importante atteint néanmoins 300 ex. (le 10, à Noville) (GOB) et la plus grosse journée totalise un peu plus de 550 ex. seulement, le 13. Très modérée du 16 au 21, la migration reprend quelque peu du 26.03 au 06.04 : 6 observations dont 100 ex. le 28 à Uccle (RLn) et 150 ex. le 06 à Belvaux (SIO) Quatre observations encore par la suite : 5 ex. le 17.04 à Rhode-Sainte-Agathe (DyWiel), 2 ex. le 15.05 à Theux (ADx) et enfin 2 ex. tournoyant très haut le 23.05 à Forges (Abbaye) (PGI). En plus des 3 citées ci-dessus, 4 observations à l'ouest de la Meuse: une grosse bande le 07.03 à Villers-la-Tour (BTh), 12 ex. le 13.03 à Bourlers (JPSc), 22 ex. le 14.03 à Blaton (ML) et 1 ex. le 15.03 à Neerijse (SP).

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) : noté à La Hulpe (régulièrement), Serinchamps (en 03 et 04), Gozée, Thorembois, Cortil-Wodon, Vance (début 04), Humain, Longchamps (Lux.) (Grand-Vivier et Rolley) (MWa, SP, FHe, MPa, CEAG, BDe, HW, EBo, FdF, ABI, MCh, Exc. Aves). **MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*)** : Genk 25.04, 1 ex. dans un arbuste (DRa); Antoing 01 et 16.05, 1 ex. entendu et 2 ex. vus ensemble dans un milieu propice à la nidification (MLn); Genval 29.05, 1 ex. adulte (EP, SP). **POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*)** : passage nocturne noté le 29.03 à Pailhe (RLi). **FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*)** : retour progressif mi-03 en Ardenne : Longchamps (Grand-Vivier) 10.03, 4 ex. de retour, 15.03, 12 ex., à partir du 20.03, 20 ex. (ABI); encore \pm 350 ex. le 14.03 à Harchies-Pommerœul (ML), une centaine début 04 (DVe, LV). Premières éclosions dans les premiers jours de mai à Harchies, Gozée et Longchamps (ML, BB, CEAG, ABI). Pailhe (Saint-Lambert), trois pontes détruites par des Corneilles lors de la vidange de l'étang début 05, mais deux autres nichées menées à terme (RLi).

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) : Oost-Maarland, 2 ex. le 12.03, puis présence régulière de 1 à 3 ex. au moins jusqu'au 07.05 (EC, DRa, PL); Rhode-Sainte-Agathe 02.04, 1 ex., 10.05, 2 ex. (DyWiel, JMLe); Harchies 02, 15 et 16.04 puis 09.05, 1 ex. (ML, DH, B. Van Acker).

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) : des passages et retours de nicheurs locaux sont notés dans toutes les régions dès les premiers jours de mars et surtout pendant la première semaine, beaucoup plus rarement ensuite; à Renaix, par ex., \pm 3.500 ex. du 01 au 08, dont 1.033 ex. en 3 h 45' le 01 et un groupe de \pm 1.550 ex. le 08 (DVe, LV); à Wardin, \pm 800 ex. posés le 07 (RDt); à Tavigny (Buret), \pm 500 ex. le 07 (ABI); à Overijse, passage abondant par petits groupes le 01 (SP); à Vierset-Barse, 30 ex. le 05, première observation depuis fin novembre 1980 (RLi). La plupart des observations d'après la mi-mars concernent de très petits groupes, avec parades nuptiales le plus souvent, et une ponte complète est notée le 02.04 à Harchies (ML). Premiers mouvements postnuptiaux : 50 ex. en vol vers le NE à Biercée le 29.05 (JPHe) et les 30-31 à Obigies, Renaix, Leuze-en-Hainaut (MLn, LV). **PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*)** : très rare à l'intérieur du pays : Oost-Maarland 02.05, 1 ex. (PLe). **PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*)** : quelques observations dès les premiers jours de mars, augmentation très forte du 20 au 27, puis noté quelques fois jusqu'au

08.04 et les 21.04 et 09.05. Le Hainaut extrême occidental totalise la grande majorité des observations, une seule provenant de Hesbaye namuroise, probablement par manque de prospection (ou non transmission des données). Hainaut : Herseaux, Estaimpuis, Harchies, Renaix, Obigies (JLc, ML, DVe, LV) et, surtout, Pecq et Hérinnes avec $\pm 575 + 71$ ex. le 20.03, ± 3.000 ex. le 21, ± 2.000 ex. le 22, 1.000 à 1.200 ex. le 27 et encore 450 ex. le 08.04 et 140 ex. le 21 (MLn, PCq). Brabant : Lillois, Overijse (TDe, SP) et Nivelles 12.04, ± 150 ex. (TDe); Hesbaye : 110 ex. le 05.04 à Cortil-Wodon (ABP). A retenir, une observation ardennaise : 12 ex. en vol le 01.03 à Wanne (Exc. Aves). Le dernier ex. est noté le 09.05 à Harchies (ML). **GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*)** : observations relativement fréquentes ce printemps (chaque fois 1 ou 2 ex.) : Pecq 17.03, Harchies 21.03, Obigies 15.03 et 16.04 (PCq, RML, MLn); Nalinnes 11.04, Genappe 12.04 (JTa, TDe); Oost-Maarland 02.05, Rhode-Sainte-Agathe 08.05, Ploegsteert 09.05, Tirlémont 17.05 (PLe, ABk, LV, RLn). **PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)** : premiers retours le 21.03 à Hensies et Rhode-Sainte-Agathe (RML, DyWiel), mais signalé surtout à partir du 05.04 ou même après le 10, essentiellement en Hainaut et Brabant, avec des indices ou preuves de nidification assez souvent. Une seule observation en Haute-Belgique : Arlon 13.04, 3 ex. le long de la Semois (PPi). **TOURNEPIERRE À COLLIER (*Arenaria interpres*)*** : Obigies 19.04, 1 adulte en plumage nuptial (MLn); Rhode-Sainte-Agathe 07.05, 1 ex., présent quelques jours (RoP, TMI).

BÉCASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) : à quelques exceptions près, signalée seulement en très petit nombre (mais assez souvent), quelques fois début mars, mais surtout après le 20 et jusqu'à la mi-04, puis quelques fois encore jusqu'à la mi-05. Obigies 15.03, 20 ex. au sol et ± 90 ex. en vol (MLn); Cortil-Wodon 05 et 13.04, 52 et 36 ex. (HW, ELz); Arlon 14 et 21.03, 16 et 12 ex., 02.04, 15 + 2 ex. (PPi). Des vols nuptiaux et chants sont signalés seulement fin 03 et dans la première quinzaine d'avril à Robertville (29.03 et 12.04) (JD), Sourbrodt (CMn) et Cortil-Wodon (HW). En mai, ex. isolés signalés le 01 à Harchies, le 02 à Oost-Maarland, le 09 à Ronquières et le 17 à Ochamps (DVe, LV, PLe, Exc. Aves, DA). **BÉCASSINE DOUBLE (*Gallinago media*)*** : Malines (Nekkerspoel) 08.03, 1 ex. (AHL, A. Baccaert). **BÉCASSINE SOURDE (*Lymnocryptes minimus*)** : Gozée 01.03, 1 ex. (CEAG); La Hulpe 02.03, 1 ex. (SP); Gembloux 27.03, 1 ex. (ELz); Cortil-Wodon 05.04, 2 ex. (HW). **BÉCASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)** : signalée en 23 localités, dont 20 ex. le 11.04 à Dworp (Exc. Aves); éclosion de 4 œufs le 16.04 à Erezée et le 23.04 à Hotton (PBa), et un adulte et un jeune le 17.05 à Trooz (MLg, PVDa). Marche en Famenne, 4 ex. en croûle sur 2 km (DE). **COURLIS CENDRÉ (*Numenius arquata*)** : peu signalé : Oost-Maarland, fin d'hivernage, 2, 1 et 2 ex. les 12, 20 et 28.03 (EC, DRa); Harchies-Pommerœul, 1 ex. les 08, 14 et 20.03, 2 ex. en vol vers le N le 04.04 et 2 ex. le 05.04 (ML, DVe, LV, CRBH); Rhode-Sainte-Agathe 17.04, 1 ex., 02.05, 1 ex. (DyWiel); Longvilly (Michamps) 05.05, 1 ex. dans un semis (ABI). **COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*)** : une observation ardennaise : Meyrode (Wallerode) 22.04, 1 ex. en vol migratoire (HWe). Mouscron 26.04, 1 ex. posé (DH). **BARGE À QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*)** : premières observations le 15.03 à Obigies, 3 ex. (MLn), le 17 à Renaix, 30 ex. vers le NNe (DVe, LV) et à Pecq, 1 ex. (PCq) et le 18 à Harchies, 18 ex. vers l'est (JLc); plus répandue à partir du 20, mais seulement en Hainaut et Brabant (Dyle); c'est à Rhode-Sainte-Agathe, les 04 et 05.04, avec au moins 15 + 9 + 19 ex. et 32 + 20 ex. (BVo, RML, ... DyWiel) que le passage est le plus important, les autres observations ne concernant le plus souvent que moins de 5 ex., mais 23 ex. posés et 8 ex. en vol le 01.05 à Obigies (MLn); nette diminution dès le 07.04 et quelques données encore en mai : 1 ex. le 02 à Gaurain (MCa), le 08 à Rhode-Sainte-Agathe (ABk), 1 à 2 ex. jusqu'au 08 et 10 ex. en vol le 04, à Harchies (ML,

DH) et 2 ex. en vol le 31 à Quaregnon-Ghlin (ADu). **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : quelques ex. le 03.03 à Renax, le 04 et le 18 à Gembloux, le 14 et le 15 (4 ex.) à Neerijse (LV, ELz, FHe, SP); plus fréquent à partir du 20, avec un pic de passage du 30.03 au 10.04 dans la vallée de la Dyle où l'on note des maxima de 21 ex. le 06 à Rhode-Sainte-Agathe (DyWiel) et de 15 ex. le 07 à Neerijse (DLA). Noté fréquemment jusqu'aux premiers jours de mai, puis 2 ex. le 09 à Hérinnes (MLn), 1 ex. les 14 et 15 à Grand-Leez (ELz) et 1 ex. le 30 à Escanaffles (LV). **CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*)** : le plus rare de nos chevaliers : 1 ex. le 15.04 à Neerijse (MWA), le 20 à Rhode-Sainte-Agathe (OL) et Machelen (VF), 2 ex. le 07.05 à Hensies (YAm) et Oost-Maarland (PLe); 4 ex. le 07 à Rhode-Sainte-Agathe (PGt) et 9 ex. Cul-blancs ou Sylvains le 02 au même endroit (DyWiel). **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)** : les premiers ex. sont signalés à partir du 07.04, à des dates très variables, mais la plupart des régions semblent « touchées » dès le 15; à noter, déjà 10 ex. le 07 à Neerijse (CVa). Le passage se déroule alors de la façon habituelle, avec un maximum d'observations pendant la première décennie de mai. Les groupes sont le plus souvent très petits; à retenir : Oost-Maarland 02.05, 12 ex. (PLe); Pommereul 02.05, 17 ex. sur 1 km de canal (digue asphaltée) (ML); Rhode-Sainte-Agathe, maximum du 06 au 08.05, 6 à 9 ex. seulement (DyWiel); Ploegsteert 09.05, au moins 8 ex. (LV); Genappe, 4 à 10 ex. à partir du 08.05 (PMI). **CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*)** : passage beaucoup plus étalé dans le temps : 13 observations en mars, à partir du 12, dont 9 ex. le 17 à Pecq (PCq) et 2 ex. le 26 à Tavigny (Buret) (ABl); plus de 30 observations en avril, sans pic migratoire bien marqué : comme maxima, retenons 12 ex. les 18 et 19 à Rhode-Sainte-Agathe (FHe, DyWiel), 10 ex. le 20 à Obourg (DV) et 22 ex. le 29 à Harchies (ML); en mai, passage pendant la première semaine, suivi de quelques atterrés : Oost-Maarland 02.05, 10 ex. (PLe); Rhode-Sainte-Agathe, 9 ex. le 06 (DyWiel); Harchies, fin du passage le 06, 12 ex., puis entendu le 19 (ML, DVe, LV); Dyle, 1 ex. le 13 (ELz); Thommen, 1 ex. le 24 (HWe). **CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*)** : quelques ex. dès les premiers jours d'avril à Rhode-Sainte-Agathe puis à Neerijse (BVo, DLa, MAm, RML, DyWiel), le 11 à Harchies (ML) et enfin plus répandu après le 15, surtout entre le 20.04 et le 07.05, les derniers (3 ex.) étant notés le 09 à Rhode-Sainte-Agathe (DyWiel). Le plus souvent 1 ou 2 ex., parfois 4 ou 5, environ 30 observations en tout. Une observation ardennaise : 3 ex. le 25.04 à Longchamps (MCh). **CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)** : un premier ex. précoce le 25.03 à Mouscron (JLc); présent dès le 01.04 à Rhode-Sainte-Agathe (DyWiel), le 05 à Genappe (JMLe) et le 08 à Obigies (MLn, PCq), plus répandu à partir du 15. Passage assez important du 20.04 au 08.05, culminant très nettement entre le 02 et le 08 à Rhode-Sainte-Agathe : 1 à 3 ex. du 01 au 17.04, 5 à 10 ex. à partir du 18, 15 ex. le 25, 17 le 28, 54 ex. le 02.05, ± 40 le 05, 49 le 06, 24 le 07, 15 le 08, 4 le 09, 1 les 10, 13 et 15, absent ensuite (ABk, BVo, DE, DLa, FHa, FHe, JPJ, JaE, JoE, MLu, MWA, PCE, PGt, RML, TMi, TMq, DyWiel). Moins abondant ailleurs. Une seule observation ardennaise, la plus tardive aussi : 1 ex. le 23.05 à Thommen (HWe). **BÉCASSEAU MAUBÈCHE (*Calidris canutus*)** : Harchies 30.04, 4 ex., 01.05, 7 ex. (ML). **BÉCASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)** : Pecq 17.03, 1 ex. (PCq); Rhode-Sainte-Agathe 21.03, 05 et 11.04, 1 ex. chaque fois (RML, A). **CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*)** : quelques premiers ex. signalés en mars en Hainaut occidental : Obigies 15, 20 et 21.03, 12, 2 et 1 ex. (MLn); Pecq 17 et 20.03, 1 mâle + 1 femelle et 5 mâles (MLn, PCq), puis 3 mâles et 2 femelles le 01.04 à Oost-Maarland (PLe); les observations demeurent peu nombreuses et irrégulières ensuite : en Hainaut, seulement 8 + 4 ex. le 06 à Harchies (ML), puis 1 ex. le 12 (JaE, JoE), mais 2 ex. le 13 à Torgny (JPJ) et ± 30 ex. le 04 à Rhode-Sainte-Agathe (BVo) et encore 5, 1 et 1 ex. les 05, 06 et 09 (DyWiel). Plus répandu et régulier du 15.04 à début mai; derniers les 15 et 23 à Harchies-

Pommerœul (EC, YAm, DVe, LV) et le 18 à Gembloux (ELz). **AVOCETTE (*Avosetta recurvirostra*)** : une première observation assez remarquable : 2 ex. le 20.03 à Longchamps, en Ardenne (ABl). Ensuite 9 + 4 ex. le 04.04 à Rhode-Sainte-Agathe (BVo, FHa), 1 ex. le 09.04 à Obigies (MLn), 6 ex. le 25.04 à Gaurain (MCA) et enfin 1 ex. le 17.05 à Tirlémont (RLn). **ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*)*** : Harchies-Hensies-Pommerœul 11.04, 4 ex. adultes, 20.04, 2 ex. se posent (DLA, DVe, LV, ML, PWA, RML, RoP).

GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*) : Obourg 01.03, 1 ex. adulte (BA). **GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*)** : Herseaux 01.03, 2 adultes (JLc); Harchies-Pommerœul 02, 04, 05 et 15.04, 1 adulte (MAm, RoP, RV, B, Van Acker). **GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*)** : quelques groupes importants de passage début 03, puis observations irrégulières encore jusqu'à début mai, en nombre de plus en plus petit : Renaix 01.03, 314 ex. vers le NE, 02, 08 et 12.03, \pm 1.000 ex. de passage, 08.03, \pm 300 ex. (SP); Walem 15.03, \pm 40 ex. (FDm); 9 observations de 1 à 21 ex. en mars, en Hainaut et Brabant, 6 observations de 1 à 3 ex. en avril, dont 1 adulte le 05 à Godarville (JSe), enfin, 25 adultes et 13 immatures le 01.05 à Antoing (MLn) et 1 ex. le 03.05 à Nivelles (TDe). **GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*)** : quelques ex. encore sur la Meuse à Liège (Monsin) et Hermalle-sous-Argenteau le 12.03 (EC), 1 ex. le 04 à La Hulpe (MWA), au moins 1 ex. les 18 et 25.04 à Rhode-Sainte-Agathe (FHe, DyWiel). Sur les sites de nidification de la vallée de la Haine, 1 couple présent dès début mars à Harchies-Pommerœul, tentera de nicher (ML), 3 premiers ex. de retour à Obourg le 08.03, 11 ex. le 27 (BA), 2 ex. le 27.03 et le 11.04 à Saint-Ghislain (Baudour-Tertre) (BA, RML). **MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)** : encore \pm 3.500 ex. en pré-dortoir le 20.03 à Harchies où les colonies de nidification se stabilisent en mai (ML). Barrage de l'Eau d'Heure (Féronval) 08.03, \pm 1.000 ex. sur des prairies (Cl, CLy). Quelques observations de petits groupes ou d'isolés en Haute-Belgique chaque mois, notamment : Bomal-sur-Ourthe 02.05, 5 ex. de passage (YF); Longchamps (Lux.) 07.05, 1 ex. immature (ABl); Samart 15.05, 10 ex. de passage en altitude (PD, J. Terschuren); Gozée 10, 16 et 23.05, 7, 11 et 3 ex. (BB, CEAG). **MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*)** : deux premières observations très précoces les 15 et 20.03 à Harchies (ML), puis 1 ex. adulte le 07.04 à Neerijse (CVa, PWA); passage relativement fourni ensuite à Harchies-Pommerœul du 18.04 au 07.05, avec des maxima de 15 et 9 ex. les 01 et 03 (DV, LV, ML, YAm, CRBH); 2 et 1 ex. aussi les 06 et 08.05 à Rhode-Sainte-Agathe (ABk, DyWiel). **GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)** : une seule observation en avril, 3 ex. le 22 à Gozée (BB, CEAG); passage ensuite tout le mois de mai, surtout du 07 au 10 : maxima d'environ 20 et 13 ex. seulement les 07 et 09 à Harchies-Pommerœul (DVe, LV, ML); \pm 25 ex. le 08 à Rhode-Sainte-Agathe, 9 ex. le 09, encore 11 les 18 et 20, puis 5 derniers ex. le 31 (ABk, FHa, TMi, TMq, J.P. Kuyil, NG). Aucune donnée en Haute-Belgique. **STERNE CASPIENNE (*Hydroprogne caspia*)*** : Harchies 11.04, 1 ex. adulte (DLA, PWA, RML, RoP). **STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*)** : Harchies-Pommerœul 11.04, 2 ex., 06 et 08.05, 1 et 4 ex., 31.05, au moins 3 ex. (BVo, DVe, LV, ML, YAm, DH, CRBH); Rhode-Sainte-Agathe 30.04, \pm 9 ex. (Pierregarin ou [et?]) arctique, 05, 06, 08 et 09.05, 1, 3, 5 et 1 ex. (idem) (DLA, RML, J.P. Kuyil, ... DyWiel). **STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisea*)*** : Rhode-Sainte-Agathe 01.05, 10 ex. (VF), 06.05, 3 ex. adultes (PWA, PVm), 09.05, 1 ex. (TMi). **STERNE NAINE (*Sterna albifrons*)*** : Rhode-Sainte-Agathe 06.05, 1 ex. (MBA, TMi). **STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*)*** : Rhode-Sainte-Agathe 06.05, 6 ex. adultes (PVm, PWA).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : peu noté en général, mais 40 ex. le 10.03 à Overijse (SP); noté aussi, le plus souvent des isolés, à La Hulpe, Neerijse (Clinique), Walhain, Genappe, Villers-la-Ville, Dourbes (Viroinval), Auffe, Barbençon, Godarville, Gos-

selies et Harchies (MWa, SP, BDe, JBI, PRy, SIO, HG, JGu, JSe, LV). A Flobecq, occupe des nichoirs à Chouette chevêche (MMn). **PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)** : premier chant le 15.03 à Harchies (ML); quelques passages notés surtout en Haute-Belgique, assez abondant les 30.03 et 02.04 à Longvilly (ABI) et \pm 2.000 ex. en vol vers le SE (!) en 2 heures le 18.04 à Auderghem (FHe).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) : un premier retour très précoce le 14.03 à Neuville-en-Condroz (FBI), puis 1 ex. le 26.03 à Nothomb (ACo), le 31.03 à Boitsfort (GDS) et Luigne (1 ex. en vol vers le NE à 10 m du sol) (JLc), le 04.04 à La Hulpe et Gembloux (FHe, ELz) et le 05.04 à Modave (FBI). La majorité des premières données se situe entre le 10 et le 15.04, mais des arrivées tardives sont encore notées en Ardenne-Famenné (Hollange, Fronville, Bomal-sur-Ourthe, ...) dans la première décennie de mai, et même le 16 à Hartrival (EBo) et le 28 à Longvilly, premier chant dans la région de Bastogne (ABI). Abondance inaccoutumée à Uccle (CJo), ainsi qu'à Genappe, Harchies, Ransart (JBI).

HIBOU GRAND-DUC (*Bubo bubo*)* : Andrimont (Verviers) 29.05, 1 ex. observé dans un jardin arboré (EDg), recueilli quelques jours plus tard et mort en captivité (ASm, RLb); porteur d'une bague, il a pu être identifié comme un des oiseaux relâchés dans l'Eifel. **CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*)** : mauvaise nidification signalée dans les régions de Gouvry, Chevron et Bomal-sur-Ourthe (EC, PC, YF); à Tohogne, un adulte couve un seul œuf écrasé, comportement observé dans le même nichoir les années précédentes (YF).

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) : 1 seul ex. signalé, le 25.05 à Arlon (Lagland) (JPLa).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) : des isolés en avril, notamment le 14 à Woluwe-Saint-Lambert (AR) et le 17 à Doisches (PRy). Un retour généralisé se produit les 06 et 07.05 : plus des trois quarts des observations se situent à cette époque.

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) : trois couples nicheurs à Harchies-Pommerœul en 05 (ML).

GUËPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*)* : Wauthier-Braine 24.05, 3 ex. adultes (RDC). **ROLLIER D'EUROPE (*Coracias garrulus*)*** : Bertogne (Compogne) 24 au 29.05, 1 ex. (MCh, etc. ...).

PIC CENDRÉ (*Picus canus*) : Une femelle est notée régulièrement de janvier à mi-mars à Manderfeld (EMu) où 1 ex. est observé également le 01.05 (HWe); 1 ex. au lac d'Eupen le 12.04 (LSc). **PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*)** : 36 données. En mai, nidification réussie pour la troisième année consécutive à Ransart (JBI). Des cas de nidification probable à Rosières, La Hulpe (Solvay), Chanly et Halma (EP, SP, SIO). **PIC NOIR (*Dryocopus martius*)** : l'espèce continue à être observée régulièrement dans ses stations isolées du Brabant et du Hainaut : un « chanteur » à La Hulpe le 29.03 et à Ottignies (Lauzelle) le 01.04 (DLa), une femelle dans la vallée de la Dyle le 25.04 (ABk) et un mâle à Stambruges, près de Belœil, en mai (P. Bastien). **TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*)** : 7 observations. Premier le 19.04 à Gembloux (JTa, FTa) où 1 ex. est recueilli blessé à l'aile le 28 (PDW). A Ransart, 1 ex. noté régulièrement (chant) du 22.04 au 04.05, disparition ensuite (JBI), tandis qu'à Elsenborn 1 à 2 ex., dont 1 chanteur, sont observés durant la dernière décennie de mai (JD).

COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*) : Trois observations seulement; 1 ex. à Woluwe-Saint-Lambert le 07.04 et à Grand-Leez le 10.05 (PD, J. Terschuren, ELz). A Grievnée, 1 ex. le 14.05 au même endroit qu'en décembre 1980 (EC). **ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*)** : quelques petits groupes de passage comptant 5 ex. max. sont notés durant la première quinzaine de mars (ML, ABI). Des chanteurs sont observés en divers sites de Famenne dès la fin mars : 3 chanteurs à Wavreille (Belvaux) le 29.03 (MPa), 1 chanteur cantonné à Marche (camp militaire) à la mi-avril (DE), 1-2 ex. à Ave-et-Auffe et Lessive début avril (SIO) et 1 ex. à Ponderôme les 10, 11 et 12.04 (BI). Deux mentions seulement en mai : une sur le site fréquenté par l'espèce à Arlon (Lagland) (JMo, JPLa), l'autre à Ochamps (Lux.) : 1 ex. le 17 dans des anciennes tourbières (DA). **ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)** : des groupes comptant parfois plusieurs centaines d'ex. sont notés en halte migratoire dans la région de Bastogne début mars (ABI, DA, RDt).

HIRONDELLE DE CHEMINÉE (*Hirundo rustica*) : une observation exceptionnellement précoce à Harchies le 07.03 (ML). Conséquence d'une température anormalement douce, plus de 30 observations durant la dernière décade de mars, surtout les 28 et 29. Beaucoup d'observateurs notent le retour des premiers nicheurs locaux à la mi-avril (à partir du 12 surtout). Les arrivées et la migration continuent début mai : 5 à 600 migrateurs à Grand-Leez le 07 (ELz). **HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*)** : encore une première très hâtive à Harchies le 21.03 (ML) et cinq autres mentions fin mars, dont 5 ex. à Roly le 24 (BTh). Les données s'étoffent un peu à partir du 13.04 avec les premiers retours au nid, notamment à Heinsch et Florival (PMe, MAm), mais ce n'est qu'aux environs du 06 et 07.05 qu'on constate un peu partout une arrivée importante des nicheurs locaux, coïncidant avec une hausse sensible de la température. **HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*)** : même schéma que pour les espèces précédentes avec une avant-garde très précoce (4 ex. dans la vallée de la Dyle le 14.03) (MPo), puis 6 mentions entre le 25 et le 30.03. Premiers retours aux colonies à la mi-avril dans la vallée de la Dyle (MWa, FHe), mais à Cibly une colonie est encore inoccupée au début mai alors qu'elle comptera 96 couples à la fin du mois (ADu).

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*) : un ex. de passage à Harchies le 20.04 (ML). **PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*)** : noté très tôt dans le Hainaut occidental : 1 ex. le 14.03 à Péronnes puis 5 ex. à Obigies le 20.03 (MLn); encore deux observations en Famenne fin mars, les 27 et 29 (MPa), mais le passage et le retour des nicheurs locaux n'augmentent progressivement qu'au courant de la première quinzaine d'avril. **PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)** : en Gaume, le passage, modéré, est noté surtout fin mars (JPJ) alors qu'en Brabant et Condroz, la migration est remarquée jusqu'à la mi-avril au moins (MWa, SP, RLi). **PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)** : 4-5 ex. dans la vallée de la Dyle durant la deuxième quinzaine de mars, mais 15 ex. le 20 (ELz, MPo, CHM, SP); encore 1 ex. le 11.04 (RML). Isolés aux environs de la mi-mars à Baudour, Hensies, Genval et La Hulpe (RoP, RML, SP). **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : premier passage dès début mars un peu partout, y compris en Ardenne (ABI, FRo, JD, HG, SP). A Achène (Taviet) le 19.03, 1 ex. albinos qui sera observé tout l'été (FH). **BERGERONNETTE GRISE DE YARREL (*Motacilla alba yarrellii*)** : Mont-Saint-Guibert 27.04, 1 femelle adulte (MLn). **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)** : 5 observations à la fin de la première semaine de mars mais premières mentions à l'est de la Meuse à partir de la mi-mars seulement. **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*)** : des isolés fin mars, le 22 à Overijse (SP), le 25 à Harchies (ML) et le 29 à Obigies et dans la vallée de la Dyle (MLn, VF). Alors que deux nicheurs locaux sont notés dès le 08.04 dans l'est, à Waimes (JD), les observations ne se généralisent qu'à partir des 11-12.04, principalement en Moyenne-

Belgique. Passage régulier jusqu'à mi-mai. Les effectifs nicheurs semblent plus nombreux que les années précédentes dans la région de Gosselies-Genappe (JBI). A signaler un cas de nidification exceptionnellement précoce : un couple nourrit des jeunes hors du nid le 02.05 à Gaurain (MCa). **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE NORDIQUE (Motacilla flava thunbergi)*** : Neerijse 15.04, 1 mâle adulte (MWe, D. Capart); Machelen 24.04, 1 ex. (VF).

PIE-GRIÈCHE GRISE (Lanius excubitor) : 48 données; en mars, encore quelques mentions en Moyenne-Belgique concernant probablement la fin d'hivernage ou l'erratisme. A Lillois notamment, 1 ex. présent depuis octobre disparaît le 16 (TDe) tandis que 3 ex. sont observés à Harchies le 15 (ML). Dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, plusieurs couples cantonnés dans la vallée de l'Eau Blanche dès la fin mars (JBI). En avril, des couples territoriaux sont notés dans la province du Luxembourg, à Etalle, Erneuville, Noville, Villers-la-Bonne-Eau et Bertogne (JLG, FDF, ABI, FLu). Mais plusieurs observations d'isolés en Famenne et dans les Fagnes peuvent concerner aussi bien du passage qu'un retour (YF, JD, SIO). A noter 2 ex. dans la vallée de la Dyle le 25.04 (RLn). **PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (Lanius collurio)** : une dizaine de mentions seulement, toutes en mai et à l'est de la Meuse. Premiers retours précoces : le 03, un mâle à Stoumont et une femelle à Messancy (CH, CMO), un mâle à Lamorteau le 07 (PD, J. Terschuren). A Nobressart, retour d'un mâle le 14 et de la femelle le 18 (JMo). Egalement des couples cantonnés à Thommen et Rocherath (Exc. Aves). **PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (Lanius senator)*** : 1 ex. à Frasnes-lez-Couvin le 22.05 (PD, J. Terschuren); Auderghem (Rouge-Cloître) 09.05, 1 ex. femelle D. Capart).

ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis) : construction d'un nid le 13.03 à Belœil (ED).

GRIVE DRAINE (Turdus viscivorus) : dans la région de Bastogne, le passage principal est noté entre le 20.03 et le 06.04 (ABI). **GRIVE LITORNE (Turdus pilaris)** : dans les environs de Bastogne et Thommen, des bandes pouvant compter plusieurs centaines d'ex. sont notées en mars, principalement après le 15, en halte migratoire ou de passage (ABI, RDI, JD). En avril, on observe des cas classiques de rémigration lors des dernières chutes de neige, notamment une bande de 1.000 ex. le 20 à Tavigny (ABI). La nidification débute tôt : plusieurs nids construits dès le 30.03 à Longvilly et Saint-Vith (Exc. Aves, ABI). Parmi les nombreuses données de nidification, retenons : environ 300 couples cantonnés dans le camp militaire de Marche-en-Famenne en avril (DE), couples isolés ou petites colonies ailleurs en Famenne (Eprave, Resteigne, Han-sur-Lesse, Lessive, Petit-Han) (SIO, YF), 1 nid isolé à Presgaux et près de Chimay (JHo). Les effectifs nicheurs demeurent très nombreux dans l'Est (Sourbrodt, Manderfeld) (CMn, Exc. Aves). **GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos)** : premiers chants notés un peu partout dès début mars. **GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus)** : notée en mars, la migration semble culminer vers le milieu du mois, principalement à l'est de l'axe Sambre-Meuse. Le passage est terminé début avril : seulement 8 mentions après le 10.04, dont 1 et 2 ex. à La Hulpe les 01 et 03.05 (EP, SP, MWa). **MERLE À PLASTRON (Turdus torquatus)** : une femelle à Lillois le 13.03 (TDe); 19 mentions en avril concernant souvent 1 ex. Un mâle et une femelle stationnent à Olne du 26.04 au 03.05 (DRa). Derniers le 07.05 à Theux et Lamorteau (ADx, PD). **MERLE NOIR (Turdus merula)** : construction du nid dès le 09.03 à Belœil (ED). Conséquence du refroidissement fin avril, des jeunes sont trouvés morts au nid, à Hanzinne et Gerpinnes notamment (CLy). **TRAQUET MOTTEUX (Eenanthe oenanthe)** : premier le 22.03 à Hérinnes (MLn); comme en 1980, le passage principal se situe durant la deuxième quinzaine d'avril et surtout la première décade de mai : le 03, 15 ex. aux décanteurs

de Genappe (TDe) et le 09, plusieurs groupes de 6-8 ex. dans les environs de Bastogne (MCh, FdF). A noter un couple séjournant quelques jours à Lierneux fin 05 (MDe). **TRAQUET PÂTRE (*Saxicola torquata*)** : un premier à Harchies le 08.03 (ML). Un couple cantonné dès le 14.03 à Eupen (JCDe), le 31.03 à Hotton où les jeunes quittent le nid le 10.05 (PBa). Le passage, très sporadique, se poursuit jusque début mai : un nicheur local revient le 10.05 à Gembloux (OPi). Retenons encore parmi les données de nidification probable : quelques couples cantonnés en Famenne début avril (Marche, Ave-et-Auffe, Lessive) (SIO), mais à Trooz un seul couple nicheur contre trois en 1980 (DRa) et absence à Liège (Chartreuse) où un à deux couples nichaient régulièrement avant (CKe, PK). **TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*)** : début du passage à la mi-avril : une donnée les 13 et 14, 5 données le 15 (PLe, DE, MCa, MWa, CLy, ELz). Des migrateurs seront notés jusqu'à la fin mai, 1 ex. de passage le 23 à Herve (EC). Un couple nicheur à Cherain (MDe). **ROUQUEUE À FRONT BLANC (*Phœnicurus phœnicurus*)** : à part 2 isolés très précoces le 15.03 à Theux et les 22.03 à La Calamine (ADx, Exc. Aves), le passage ne débute réellement qu'après le 10.04 et se poursuit jusqu'à la mi-mai au moins. Alors qu'un début de construction du nid est déjà observé le 12.04 à Habay-la-Vieille (FHe), le retour de nicheurs locaux n'est noté que le 08.05 à Namur et le 14.05 à Watripont et Braine-le-Château (FBI, LV, GN). A Theux, 1 mâle bague est repris au même endroit qu'en 1976 (ADx). A souligner qu'il y a apparemment très peu d'observations à l'ouest de l'axe Sambre-Meuse : 2 mentions en mai seulement ! **ROUGEQUEUE NOIR (*Phœnicurus ochruros*)** : 1 ex. le 01.03 à Habay-la-Vieille (ACo), le 04.03 à Bois-Borsu (DE). Le passage s'étoffe à partir des 11-12.03 avec des couples cantonnés dès le 22.03 à Anvaing et Messancy (MMn, CMO). Le passage culmine classiquement à la fin mars et durant la première quinzaine d'avril mais on note encore des migrateurs le 09.05 à Pailhe (RLi). **ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*)** : retour précoce en avril : premiers le 11 à Harchies (ML), le 13 à Fronville et Vierves (PDm, PRy), puis 8 mentions en différents sites entre le 14 et le 16. L'espèce est localement bien représentée, en Famenne notamment : nombreux chanteurs à Lavaux-Sainte-Anne le 07.05 (PD, J. Terschuren), 4 chanteurs le 09.05 sur le plateau du Gerny à Humain (ABI), 4 chanteurs à Pondrôme le 24.05 (Exc. Aves). Mais également ailleurs : une dizaine de chanteurs le 09.05 entre Romedenne et Hermeton-sur-Meuse (Exc. Aves), ± 15 chanteurs en 05 à Harchies et Hensies (ML), au moins 7 chanteurs à Antoing le 10.05 (MLn). **GORGEBLEUE (*Cyanosylvia svecica*)** : premier retour le 15.03 à Harchies (ML) où au moins 4 chanteurs sont notés début mai (DVe, LV). Un couple à Quaregnon fin 05 (ADu).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) : 2 chanteurs à Antoing durant la deuxième quinzaine de mars (PCq, MLn) et 1 chanteur à Baudour fin mars et à la mi-mai (BA, ADu). Dans le complexe Harchies-Hensies-Pommerœul, au moins 5 chanteurs en mai (JBI, DVe, LV). **LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*)** : une première exceptionnellement précoce le 27.03 à Harchies (ML). Les retours suivants ne sont notés qu'à partir du 09.04 : 6 données, dont 4 dans le Hainaut. Le passage bat son plein à la mi-avril : 9 chanteurs dans le camp militaire de Marche-en-Famenne le 14 (DE) et au moins 10 chanteurs dans de jeunes pessières à Vierves le 15 (PRy). Dans la région bruxelloise, un couple cantonné à Boitsfort dès le 22.04 et couples nicheurs à Auderghem et Genval (MWa, EP, SP). En mai, la majorité des données provient des régions de l'Est, Fagne-Famenne et Gaume. **ROUSSEROLLE TURDOÏDE (*Acrocephalus arundinaceus*)** : 1 chanteur à Harchies-Pommerœul à partir du 08.05 (ML, DH, DVe, LV) et 2 chanteurs à Ploegsteert le 09.05; également 1 ex. à Neerijse les 07 et 13.05 (RoP, ELz) et 1 ex. chantant dans des haies le 10.05 à Lessive, première observation dans la région (MPa). **ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*)** : premier retour le 16.04 à Gozée où 5, 7 et 9 chanteurs sont notés respectivement

les 20, 24.04 et 10.05 (CEAG). Encore du passage fin mai : 1 chanteur dans un milieu sec le 30.05 à Olloy-sur-Viroin (RoP). **ROUSSEROLLE VERDEROLLE (*Acrocephalus palustris*)** : retour normal en mai; premières les 09 et 10 à Harchies, Olné, Boitsfort, Uccle, Baugnies et Gozée (ML, DRa, RoP, RLn, MCa, BB). **PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schœnobaenus*)** : premier retour à Harchies le 28.03, 15 chanteurs à la mi-avril (ML, LV, DVe, CRBH). Quelques ex. dans la vallée de la Dyle en avril (MWa, CHm, FHe). A retenir encore 1 chanteur à Olloy-sur-Viroin le 23.04 ainsi qu'à Longchamps (Lux.) le 10.05 (PRy, Exc. Aveès) et un couple à Genval en 05 (EP, SP). **HYPOLAÏS ICTÉRINE (*Hippolaïs icterina*)** : comme en 1980, premier le 10.05 à Pommerœul (ML) mais le retour des nicheurs locaux n'est remarqué que le 28.05 à Herve (Bruyères) et Ransart, le 30.05 à Noisieux et Pailhe (EC, JBI, FMr, RLi). **HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolaïs polyglotta*)*** : un chanteur à Frasnes-lez-Couvin le 15.05 et transport de matériaux noté le 22 (PD, J. Terschuren). **FAUVETTE À TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*)** : retour précoce en mars; premier chant le 15 à Ombret et un mâle à Moulins-sous-Fléron le 16 (JF, PC), puis la brusque hausse de la température durant la dernière décade de mars provoque un afflux important à partir du 25 : une vingtaine de mentions un peu partout entre le 25 et le 29.03. Le retour est généralisé à la mi-avril. **FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*)** : une donnée anormalement précoce : 1 ex. le 25.03 à Bertrix (EBo). Premiers retours à partir du 09.04 (1 ex. à Hollange et Bruxelles) (ID, A. Baccart) mais il n'y a que 14 mentions en avril. Retour général à la fin de la première semaine de mai, coïncidant avec une hausse de la température. **FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*)** : premières le 12.04 à Ponderôme (BI) et le 14.04 à Ochamps, Orgéo et Romerée (ABI, EBo, PRy). A Vossem, début de construction du nid le 15.04, ce qui est exceptionnellement tôt (MWa). Comme pour l'espèce précédente, le retour n'est généralisé qu'à partir des 08-09.05. **FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*)** : première à Longchamps (Lux.) le 05.04 (MCh). Retour progressif à partir du 09.04 où l'espèce est notée à Sprimont, Olné, Bertrix, Uccle et Wavreille (BH, PC, EBo, CJo, SIO). Mais à Theux, la migration culmine à la mi-mai seulement (ADx). L'espèce semble localement bien répandue en mai, notamment en Famenne (Bomal-sur-Ourthe, Tohogne, Plateau du Gerny, Lavaux-Sainte-Anne) (YF, ABI, PD). **POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*)** : conséquence de la température très douce à la fin mars, l'espèce revient tôt : 1 chanteur dans la vallée de la Dyle le 15.03 (SP) et 6 chanteurs à Harchies le 18 (JLc). Une trentaine d'observations durant la dernière décade de mars, principalement à l'ouest de la Meuse. Des chanteurs sont notés sur les lieux de nidification dès la fin mars à Pommerœul, La Hulpe et Ombret (LV, MWa, JF). En Haute-Belgique, le retour s'échelonne durant la première quinzaine d'avril mais des migrateurs sont encore remarqués à Pailhe le 09.05 (RLi). **POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*)** : premiers chants le 07.03 à Harchies et La Hulpe (DV, ML, SP). Les observations deviennent nombreuses dès les 11-12.03, avec afflux généralisé à partir du 20, y compris en Ardenne. **POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*)** : retour précoce également; des chanteurs le 10.04 à Ham-sur-Sambre et Halma (BDe, SIO) et retour progressif dès ce moment dans tout le pays. Le retour est généralisé en forêt de Soignes le 25.04 et, fait exceptionnel, la construction d'un nid est déjà achevée le 22.04 à Hotton (PBa). **POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*)*** : un chanteur à Torgny le 08.05 (PD, J. Terschuren) et du 20.04 au 23.05 à Watermael-Boitsfort (Forêt de Soignes) (RoP, EWa MWa, etc.). **ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*)** : quelques chanteurs à La Hulpe à la fin mars (MWa), mais le passage est surtout remarqué à partir de début avril.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscapa striata*) : 15 données seulement; premiers début mai : le 03 à Tournai, le 04 à Namur (ED, PLt), les nicheurs locaux n'étant notés en général qu'à partir du 10.05. **GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*)** :

passage très peu fourni : moins de 20 oiseaux observés! Aucune mention en avril; premier le 01.05 à Arlon où un seul ex. est noté là où 31 oiseaux avaient été observés en 1980 (ABI). Par contre, plusieurs ex. cantonnés à Daverdisse le 07.05 (PD, J. Terschuren).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) : à Tournai, une nichée précoce comprenant 8 pulli âgés de \pm 10 jours est trouvée morte le 03.05 (ED). **MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*)** : un couple nicheur à Mouscron où l'espèce n'était pas nicheuse précédemment (DH). **GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*)** : présent en mai à Elsenborn et Mabompré (Engreux) (Exc. Aves, MCh). **GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*)** : fin avril à Florennes, construction d'un nid dans un mur en béton (JPSc).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) : données contradictoires; à Hérinnes, dans le Hainaut occidental, l'espèce est plus nombreuse qu'avant (5 chanteurs le 08.04) (MLn) alors que dans la région de Gosselies, une forte diminution est constatée (JBI). Quelques mentions intéressantes sur le « front sud-est » de l'espèce : 1 chanteur à Maffe (Condroz) le 29.04 (RL), 3 chanteurs à Olne à la mi-05 (DRa), 1 chanteur à Bomal-sur-Ourthe le 24.05 (YF, RT) et, plus étonnant, 1 chanteur sur le versant sud de l'Ardenne, à Hollange (Honville) le 15.05 (ID). **BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*)** : plusieurs observateurs soulignent que les effectifs nicheurs semblent assez abondants. A Tohogne, en bordure de Famenne, 6 chanteurs cantonnés sur environ 3 hectares de broussailles (YF). **BRUANT ZIZI (*Emberiza circlus*)*** : un chanteur à Frasnes-lez-Couvin durant la dernière décade de mai (PD, J. Terschuren). **BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*)** : 1 migrateur à Theux le 10.05 (ADx). **BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*)** : ayant commencé en février, le passage se poursuit partout en mars; notamment 30 ex. le 03 à Overijse, 150 ex. le 07 à Gozée, 30 ex. à Termes le 11, 50 ex. à Bastogne le 28 (SP, CEAG, JPLa, ABI). La migration continue en avril et même en mai : encore 1 mâle de passage à Olne le 03.05 (DRa).

GROS-BEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) : 45 données; encore des groupes importants jusqu'au début avril : 25 ex. le 30.03 à Chimay, 20 ex. à Modave le 05.04 et 25 ex. le 06.04 à Ave-et-Auffe (JPSc, FBI, SIO). En mai, l'espèce est entendue un peu partout en forêt de Soignes (HW). **VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*)** : retour des nicheurs locaux le 06.04 à Pailhe alors que 80 migrateurs sont notés le même jour à Gembloux (RLi, ELz). **CHARDONNET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*)** : le passage s'étale durant toute la période avec les groupes les plus importants à la fin mars : 40 ex. à Marche le 26, 30 ex. à Warcoing le 29 (DE, MLn). A Theux, le dernier migrateur est noté le 15.05 (ADx). Des nicheurs locaux sont remarqués à partir du début avril en Famenne (Ave-et-Auffe, Lessive, Chanly, Eprave, Resteigne) (SIO). **TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*)** : le passage est perçu jusqu'aux environs du 10.04. A noter 400 ex. à Chaumont-Gistoux le 08.03 (Exc. Aves). Cinq mentions en mai : 1 couple probablement nicheur à Orgéo (EBo), 1 mâle le 18 à Rochefort (MPa), 1 femelle à Harchies le 30 (ML), 3 ex. à Rocherath et 1 ex. à Elsenborn le 31 (Exc. Aves, JD). **LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*)** : quelques isolés à partir du 08.03, mais le passage ne commence réellement qu'à partir du 15.03. Encore de petits groupes de migrateurs le 04.05 à Longvilly (ABI). **SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flamma*)** : en mars-avril, une quinzaine d'observations d'isolés ou petits groupes en toutes régions. En mai, 30 ex. à Matagne-la-Grande le 06 (PRy) et 21 ex. en vol vers le NW le 09 à Ombret, dont plusieurs chanteurs (JF). Noté également fin mai sur les lieux probables de nidification à Elsenborn et à la Fagne de Malchamps (JD). **SIZERIN FLAMMÉ BORÉAL (*Carduelis flamma flamma*)*** :

Uccle (Kauwberg) 11.03, 1 ex. (MPo). **SERIN CINI (*Serinus serinus*)** : 5 observations en mars, dont 1 couple à Etalle le 01 et 1 chanteur à La Hulpe dès le 13 (JLG, SP, MWa). L'espèce est peu notée en avril-mai (moins de 20 mentions), les observations ne concernant le plupart du temps qu'un seul ex., sauf Hotton le 21.04, un groupe de ± 50 migrateurs (PBa). A Theux, le passage de printemps est trois fois moins abondant que les années précédentes (ADx). **BECCKROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*)** : en mars-avril, plusieurs couples à Recogne (rés. de Luchy) et nidification très probable (EBo, ABI). Peu noté ailleurs: quelques ex. à Villers-la-Bonne-Eau le 02.04, un couple à Bertrix le 06.04 (ABI, EBo). En mai, 10 ex. à Hatrival et 3 ex. à Freux le 16 (EBo), une troupe de 19 ex. le 31 à Elsenborn (JD). **PINSON DES ARBRES (*Fringilla cœlebs*)** : passage remarqué à partir de la mi-mars : le 14, groupes de 60 à 150 ex. à Lillois et une troupe de 2.000 ex. à Longvilly (TDe, ABI), plusieurs centaines à Thommen le 17 (JD). **PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*)** : maximum du passage entre le 12 et le 25.03 en Ardenne et Condroz; notamment plusieurs troupes de ± 1.000 ex. à Longvilly (ABI), plusieurs centaines à Hollange le 18 (ID), 500 ex. à Villers-la-Bonne-Eau le 20 (FDf), 200 ex. à Bastogne le 28 (RDt). A Pailhe, dernier le 11.04, mais encore 10 ex. à Antoing le 19.04 (PCq) et 1 ex. le 24.04 à Frandoux-Mont-Gauthier (MPa).

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) : un dortoir de ± 25.000 ex. à Arlon le 03.03 (PPI). Envol des premières nichées le 28.05 dans la région de Pailhe-Havelange (RLi). Curiosité peu banale, 1 ex. imitant parfaitement une poule domestique à Ransart (JBI)! **LORIOT (*Oriolus oriolus*)** : un isolé très précoce le 10.04 à Houtain-le-Val (PMI). Vingt-cinq mentions en mai, à partir du 06; seulement trois observations à l'est de la Meuse : premier ex. chantant le 09.05 puis 4 mâles se poursuivant à Pondrôme le 24 (Bl, Exc. Aves) et un couple à Hamoir (My) le 29 (CKe, PK). Retenons encore : 8 ex. à Hoegaarden le 17 (RLn), 4 mâles et 1 femelle à Hensies le 08 ainsi qu'à Harchies-Pommerœul le 23 (DH, DVe, LV).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)* : déjà présent tout l'hiver, un couple en forêt d'Anlier en mars (ABI); 1 ex. le 12.04 et 2 ex. le 19.05 à Habay (FHe, ACo); 1 ex. le 19.04 à Forêt (Lonhienne) (MLg). Premier œuf le 01.03 à Herbeumont (ACo). **CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*)** : construction du nid le 01.03 à Modave, le 02.03 à Longvilly (RLi, ABI). **CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)** : dans la région d'Ouvèrjise, passage important du 02 au 08.03 (SP). Quelques effectifs nicheurs signalés : 30 nids à Houdeng-Goegnies (Glaverbel) (CLe), 60 nids à Marche (GB Center) (DE), quelques nids à Harzé (nouvelle colonie?) (EC), 10 nids à Bastogne (Vieux Moulin) et 8 nids à Hompré (Clochimont), 2 nouvelles colonies (ABI). Une colonie détruite par l'abattage des arbres à Tavigny (ABI). **CASSENOIX MOUCHETÉ (*Nucifraga caryocactactes*)** : plusieurs observations venant du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse : 2 ex. à Vierves-sur-Viroin le 16.04 et 1 ex. à Nismes le 23.04 ainsi qu'un ex. à Oignies le 04.05 (PRy). L'espèce est notée régulièrement en mai à Stoumont dans les sites habituels (CH).

Outre celles qui sont citées ci-dessus, la Centrale Ornithologique Aves a reçu en nombre relativement élevé des données soumises à homologation noyées dans les rapports mensuels et n'ayant pas fait l'objet d'un rapport spécifique séparé destiné à la Commission d'Homologation. A son grand regret, ladite Commission ne pourra prendre ces observations en considération et, à partir de cette période, elles ne sont plus citées dans les chroniques ornithologiques. Il serait par conséquent heureux que ces rapports parviennent au plus tôt à la Commission d'Homologation, dont les rapports des années 1977 à 1979 seront publiés très prochainement.

EC.