

RÉSULTATS DU DIX-HUITIEME RECENSEMENT HIVERNAL DES OISEAUX D'EAU EN WALLONIE ET EN BRABANT, HIVER 1981-1982

par Jean-Paul JACOB (1)

Les deux recensements prévus cet hiver se sont respectivement déroulés le 15.11.1981 et le 17.01.1982.

Liste des observateurs ayant participé aux recensements

M. Ameels, A. Bas-Perez, M. Cantraine, D. Capart, J.M. Charlier, E. Clotuche, B. Croisier, P. Croisier, M.N. de Bellefroid, J. de Borman, B. de Briey, A. Delaunois, R. de Liedekerke, F. De Muynck, G. De Schutter, F. Dewitte, Doglos, J. Dumont, Exc. Aves-Lux. et Aves-Namur, N. Goetghebeur, A. Habsch, L. Hector, F. Héla, F. Hidvegi, J. Houbart, C. Istasse, J.P. Jacob, R. Lambert, P. Lamotte, M. Languy, C. Lefebvre, P. Leprince, M. Loison, M. Luy, L. Matthias, T. Michiels, M. Moncousin, G. Nève de Mévergnies, L. Noulard, P. Orban, G. Ortmann, W. Ortmann, M. Peero, W. Pfeiffer, P. Pimpurniaux, D. Rabosée, J.P. Reginster, P. Rivez, Romain, M. Rousseau, P. Schaeken, L. Schmitz, J.P. Scohy, V. Schumacher, J. Sedek, P. Simon, J. Teheux, J. Vandervelden, P. Van Dijk, Ja. van Esbroeck, Jo. van Esbroeck, C. Vansteenwegen, F. Vassem, D. Voituron, M. Walravens, H. Wiesemes. Nous les remercions de leur collaboration.

Conditions climatiques

La première quinzaine de novembre est marquée par un régime anticyclonique prononcé et un rafraîchissement à partir du 08; la seconde partie du mois, peu froide, connaît des pluies continues, excédentaires dans certaines régions. Après un mois de décembre froid, un redoux précède une nouvelle vague de froid, sévère, qui s'abat sur le pays du 06 au 15 janvier. De ce fait, les étangs sont évidemment gelés le 17 janvier.

Résultats

Les tableaux 1 (novembre) et 2 (janvier) fournissent la synthèse des comptages de cet hiver et permettent, en ce qui concerne les totaux généraux, une cer-

(1) Allée des Marronniers 2/22 - B-5800 Gembloux.

taine comparaison avec les résultats des hivers précédents. Les relevés de laridés, trop partiels, ne sont pas repris sur les tableaux. Par ailleurs, la ventilation des données en zones géographiques diffère quelque peu de celle retenue auparavant. Certains sites tels Roly, Baudour-Douvrain, Ploegsteert et des étangs du Brabant flamand n'ont malheureusement pas été visités.

Les sites prospectés sont :

1. - Agglomération bruxelloise : étangs d'Ixelles, du Parc Léopold, du square Marie-Louise, du bois de la Cambre, de Boitsfort (Grand-Etang, Ten Reuken), d'Auderghem (Rouge-Cloître, Val-Duchesse), de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert.
2. - Vallée de la Dyle, de Wavre à Louvain.
3. - Reste du Brabant : Genappe, Sart-Dames-Avelines, région de Nivelles-Ronquières à Ruisbroeck, Groenendael, Hoëilaert, Tervueren-Vossem, Rhode-Saint-Genèse, La Hulpe, Weerde, Hofstade et le Brabant oriental.
4. - Hainaut : Lessines, Gaurain-Ramecroix, Escaut de Péronnes à Antoing, Erbisœul, complexe marécageux de Harchies, Strépy-Bracquegnies, Vaulx-lez-Tournai, Godarville, Gozée, Barbençon, Rance, Virelles, barrages de l'Eau d'Heure.
5. - Meuse, de Heer-Agimont à Visé.
6. - Province de Namur, hors Meuse : Grand-Leez, Gembloux (décanteurs et Bertinchamps), Boneffe, lac de Bambois.
7. - Province de Liège, hors Meuse : vallée de l'Ourthe en aval de Hamoir, Coö, barrages de la Gileppe, Butgenbach, Robertville et Eupen, Thommen, La Calamine, Waremme.
8. - Province de Luxembourg : Recogne (Luchy), Les Epioux, Ethe, Latour, Orval, Habay-la-Neuve, Mellier, barrage de la Vierre.

Les observations de Walem et Oost-Maarland, limitrophes des cinq provinces, mais régulièrement visités par des avésiens, sont reprises en annexe.

Faits saillants

- Grèbes, Plongeurs, Cormorans, Hérons : Le nombre de Grèbes huppés est particulièrement élevé en novembre; deux groupes en rassemblent la majorité : 25 ex. à Harchies et 43 ex. à Hofstade. En janvier, on note une concentration assez remarquable de 50 Grèbes huppés sur les barrages de l'Eau d'Heure. Les totaux de Grèbes castagneux sont pour leur part influencés par les relevés méticuleux de D. Rabosée sur l'Ourthe inférieure : 59 ex. en novembre et 70 ex. en janvier. Parmi les raretés : un Grèbe jougris* en novembre à Harchies, un Plongeur arctique* en novembre sur la Meuse en aval de Liège, un Butor étoilé le 17 janvier à Strépy-Bracquegnies et un autre à Harchies, ce même jour sept Grands Cormorans à Coö et deux sur la Meuse entre Huy et Liège.

* Observations soumises à homologation.

- Anatidés : Le recensement de novembre a la plus faible diversité spécifique depuis longtemps et les totaux observés sont dans l'ensemble peu élevés. Par contre, en janvier, des afflux très nets de Canards colverts et de Sarcelles d'hiver ont permis d'en observer des nombres records pour nos régions : 24.220 Canards colverts et 1.147 Sarcelles d'hiver se concentrant sur quelques canaux, cours d'eau et étangs partiellement gelés. Le total des Colverts, pratiquement le double de la normale, a donné lieu à quelques concentrations remarquables : 2.588 sur la Meuse, 1.451 sur la basse Ourthe, 1.500 à Hofstade, 2.528 dans la région de Ronquières, 2.638 à Obourg, 2.000 à Gaurain-Ramecroix, 2.500 sur les barrages de l'Eau d'Heure et 3.200 à Harchies. Les Sarcelles d'hiver sont davantage rassemblées en Hainaut (± 400 à Harchies, ± 350 sur les barrages de l'Eau d'Heure), secondairement en Brabant et à Grand-Leez. Les fuligules sont assez peu nombreux par rapport aux années précédentes. Parmi les autres espèces, on relève la régularité d'un petit hivernage de Harles piettes et de Garrots sur la Meuse et en Hainaut; l'hivernage annuel de quelques Tadornes se répète également.

- Rallidés, limicoles : Un score assez élevé de Foulques en janvier et de Poules d'eau en novembre. Les Bécassines des marais sont à nouveau peu observées. Les Vanneaux ne sont pour leur part réellement dénombrés qu'en Brabant wallon où plus de dix mille stationnaient en novembre. Deux données inhabituelles : 2 Chevaliers arlequins le 15 novembre dans la Dyle et 1 Chevalier guignette le 17 janvier à Obourg.

- Laridés : Les relevés transmis ne sont pas repris en tableaux car leur somme reste trop éloignée de l'importance réelle de l'hivernage des espèces communes : plusieurs dizaines de milliers de Mouettes rieuses et vraisemblablement de 10.000 à 20.000 Goélands argentés. On retiendra cet hiver un afflux de Goélands cendrés lié aux froids de janvier et qui rappelle nettement celui de début 1979. A mi-janvier, les Goélands cendrés étaient répandus et nombreux en Moyenne-Belgique (par exemple 700 au déversoir de Mont-Saint-Guibert et un échantillon de 174 pour seulement 11 Goélands argentés à Bruxelles), réguliers dans les vallées de la Sambre, de la basse Ourthe et de la Meuse avec entre autres 80 ex. en Meuse namuroise. Quelques mentions de grands goélands : 1 Goéland à pattes jaunes (*Larus argentatus/L. cachinnans*) le 15 novembre à Wauthier-Braine, 1 Goéland marin et 2 le 17 janvier à Mont-Saint-Guibert, 3 Goélands bruns le 15 novembre à Mont-Saint-Guibert ainsi que 20 à Gaurain-Ramecroix et 8 à Péronnes/Antoing.

ANNEXE : Observations à Oost-Maarland et Walem.

- Oost-Maarland (B - NL) : Le 15.11.1981, 21 Grèbes huppés, 3 Grèbes castagneux, 810 Canards colverts, 71 Sarcelles d'hiver, 930 Fuligules milouins, 35 Fuligules morillons, 1 Harle bièvre, 1 Tadorne de Belon, 410 Foulques, 1 Courlis cendré. Le 17.01.1982, 20 Grèbes huppés, 16 Grèbes castagneux, 1 Grèbe à cou noir*, 3.000 Canards colverts, 80 Sarcelles d'hiver, 2 Canards siffleurs, 1 Canard pilet, 2 Canards souchets, 400 Fuligules milouins, 130 Fuligules morillons, 3 Garrots, 42 Harles piettes, 31 Harles bièvres, 2 Tadornes de Belon, 500 Foulques.

- Walem : Le 15.11.1981, 9 Grèbes huppés, 10 Grèbes castagneux, 1 Grèbe jougris*, 2 Grands Cormorans, 57 Sarcelles d'hiver, 8 Canards chipeaux, 17 Canards souchets, 11 Fuligules morillons, 37 Fuligules milouins, 1 Garrot, 230 Foulques, 1 Bécassine sourde, 3 Goélands bruns. Le 17.01.1982, surtout 9 Grèbes huppés, 280 Sarcelles d'hiver, 2 Tadornes de Belon, 2 Garrots et 7 Goélands marins.



Photo : Fr. le Hardij de Beaulieu.

Canard colvert, juillet 1976.

Tableau 1	15 novembre 1981								Totaux comparatifs					
	1	2	3	4	5	6	7	8	1981	1980	1979	1978	1977	1976
Canard colvert	1.062	299	1.749	3.130	507	167	1.285	360	8.559	9.809	10.377	8.292	9.186	10.811
Sarcelle d'hiver	30	66	221	337	-	13	77	70	814	1.138	607	794	1.350	514
Canard chipeau	-	-	-	-	-	2	-	-	2	15	52	40	93	64
Canard siffleur	-	-	1	8	-	-	-	-	9	2	20	13	20	39
Canard pilet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	8	8	1
Canard souchet	-	-	50	46	-	-	-	-	96	65	131	202	66	127
Fuligule morillon	11	25	44	42	6	-	-	-	128	178	79	171	303	220
Fuligule milouin	50	27	224	312	13	13	-	90	729	927	933	816	1.526	628
Fuligule milouinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
Fuligule nyroca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Garrot à œil d'or	-	-	1	3	-	-	-	-	4	3	5	3	2	5
Nette rousse	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	-	-	-	-
Macreuse brune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Macreuse noire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	1	8
Eider à duvet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	-
Harle bièvre	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	11	-
Harle huppé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	2	-
Harle piétte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1
Tadorne de Belon	-	-	1	1	-	-	-	-	2	13	6	-	20	15
Cygne tuberculé	17	7	23	20	19	2	1	4	93	99	105	113	145	110
Cygne sauvage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Cygne de Bewick	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	12
Oie sp.	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	3	-	-	-
Totaux Anatidés									10.441	12.277	12.349	10.462	12.744	12.559

Tableau 1 (suite)	15 novembre 1981								Totaux comparatifs					
	1	2	3	4	5	6	7	8	1981	1980	1979	1978	1977	1976
Grèbe huppé	5	1	71	35	4	1	2	-	119	76	78	76	90	60
Grèbe jougris	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Grèbe esclavon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Grèbe à cou noir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Grèbe castagneux	4	6	18	46	16	1	61	29	181	55	107	96	118	245
Héron cendré	5	19	33	37	-	-	18	3	115	112	89	149	133	170
Râle d'eau	-	7	3	12	-	-	-	-	22	1	11	18	5	23
Poule d'eau	171	43	406	843	56	5	77	17	1.618	661	685	2.925	604	1.211
Foulque macroule	336	98	-	1.855	205	52	83	62	2.691	3.303	2.378	2.714	2.825	3.446
Vanneau huppé	-	41	10.350	1.801	-	-	200	-	12.392	627	8.235	5.039	5.397	4.920
Pluvier doré	-	-	53	-	-	-	-	-	53	-	5	9	-	-
Bécassine des marais	14	-	51	25	-	-	-	2	92	82	235	555	310	229
Bécassine sourde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-
Courlis cendré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chevalier culblanc	-	1	9	1	-	-	-	-	11	5	5	14	8	15

Tableau 2	17 janvier 1982								Totaux comparatifs				
	1	2	3	4	5	6	7	8	1981	1980	1979	1978	1977
Canard colvert	1.355	1.096	5.045	12.134	2.588	43	1.959	-	13.543	13.743	8.583	7.606	10.537
Sarcelle d'hiver	9	9	111	875	2	140	-	-	957	962	268	591	418
Canard chipeau	-	-	-	4	-	-	-	-	13	20	23	17	1
Canard siffleur	-	-	-	4	-	-	3	-	53	6	8	3	6
Canard pilet	-	1	-	2	-	-	-	-	18	6	5	29	8
Canard souchet	-	-	3	14	-	-	-	-	25	8	2	62	11
Fuligule morillon	-	-	27	59	65	-	2	-	362	224	285	120	76
Fuligule milouin	-	-	67	301	194	1	7	-	1.080	920	1.390	1.031	1.185
Fuligule milouinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Fuligule nyroca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Garrot à œil d'or	-	-	5	10	1	-	1	-	20	3	52	7	3
Nette rousse	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Macreuse brune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Macreuse noire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eider à duvet	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Harle bièvre	-	-	-	-	-	-	2	-	3	10	271	10	1
Harle huppé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-
Harle piette	-	-	-	6	12	-	-	-	32	22	239	4	3
Tadome de Belon	-	-	18	8	-	-	-	-	8	6	24	14	2
Cygne tuberculé	14	2	20	69	29	-	4	-	89	85	137	50	88
Cygne sauvage	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	13	-
Cygne de Bewick	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	6	-	-
Oie sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	180	-	-
Totaux Anatidés								26.325	16.210	16.024	11.489	9.559	12.341

Tableau 2 (suite)	17 janvier 1982								Totaux comparatifs					
	1	2	3	4	5	6	7	8	1981	1980	1979	1978	1977	
	Grèbe huppé	-	-	14	53	9	-	-	-	76	97	63	168	93
Grèbe jougris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Grèbe esclavon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Grèbe à cou noir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grèbe castagneux	2	-	3	21	18	-	70	1	115	71	51	98	86	86
Héron cendré	10	7	30	13	4	1	13	-	78	69	78	71	96	111
Râle d'eau	3	1	2	1	-	-	-	-	7	9	10	16	-	33
Poule d'eau	121	11	84	16	21	-	96	-	349	726	481	339	586	810
Foulque macroule	561	-	841	1.180	471	-	435	-	3.488	3.969	2.177	3.310	1.569	3.567
Vanneau huppé	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	288	-	734	200
Pluvier doré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Bécassine des marais	2	-	14	4	-	-	-	-	20	56	36	10	132	76
Bécassine sourde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Courlis cendré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Chevalier culblanc	-	-	2	1	-	-	-	-	3	2	3	-	6	28