

COMPORTEMENT DETRITIPHAGE PARTICULIER
D'UNE BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)

Ce 03 août 1982, mon petit-fils logeait sous la tente contre une haie épaisse de thuyas située à 20m de la villa que nous occupions, à 500 m de l'église de Alle-sur-Semois. De l'autre côté de cette haie, passe une petite route bordée de cultures maraîchères la séparant d'un bois à 100 m.

Au petit matin, il fut éveillé par un chat, du moins le croyait-il, qui démolissait le sac poubelle déposé de l'autre côté de la haie. Il se leva pour faire cesser ce tapage. Contournant la haie, il se trouva en face d'une buse perchée sur le sac dans lequel elle avait pris uniquement et un à un les os d'une carcasse de poulet, les déposant à l'extérieur.

Bien que cela n'ait pu être observé directement, tout porte à croire que la Buse avait elle-même déchiré le sac. Il avait été fendu, dans le sens de la verticale, partant du dessus vers le milieu, par déchirures successives de huit à dix centimètres, et deux déchirures de cette longueur se trouvaient en parallèle de la déchirure principale. De nombreuses traces de serres se trouvaient de part et d'autre de cette ouverture. Une ouverture de ce genre n'aurait pu, me semble-t-il, être accidentelle ou faite, par exemple, par un chat.

Jean Delannay
Rue Albert Allard, 12
7500 Tournai

OBSERVATION D'UN BECASSEAU TACHETE (*Calidris melanotos*) A
LEUZE-LONGCHAMPS LE 18 MAI 1980

Un bécasseau tacheté a été observé le 18 mai 1980 sur les bassins de décantation de Leuze-Longchamps (Namur). Les autres données belges ont été notées en été et en automne : du 1 au 14 octobre 1967 à Baudour-Douvain (Hallard *et al.*, 1967), du 6 au 16 octobre 1979 à Turnhout (Vermeyen *et al.*, 1979), le 25 juin 1981 à Knokke (Lippens *et al.*) et du 2 au 7 août 1982 à Zeebrugge (Furnelle et Lafontaine, *in litt.*) (Les deux dernières n'ont pas encore été examinées par le Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité ou la Commission d'Homologation).

Les observations de printemps sont exceptionnelles; ainsi en Grande-Bretagne et Irlande, entre 1958 et 1972, sur 488 données, une douzaine seulement s'y rapportent (Sharrock, 1976).

Sur ces bassins étaient présents : un Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*), une dizaine de Petits Gravelots (*Charadrius dubius*), un Chevalier gambette (*Tringa totanus*), un Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*) et un Bécasseau falcinelle (*Limicola falcinellus*) en compagnie duquel le Bécasseau tacheté se tenait constamment, tant en se nourrissant qu'à l'envol.

La description, faite sur place, est la suivante : le Bécasseau tacheté est un peu plus petit que le Grand Gravelot mais beaucoup plus élancé et haut sur pattes. Les ailes et la queue sont fort longues. Il est beaucoup plus grand que le Bécasseau falcinelle. Le bec, de longueur à peine supérieure à celle de la tête, est à peu près droit, et foncé sauf à la base, surtout sur la mandibule inférieure. Le profil de la tête est fuyant. La calotte très finement striée de brun - noir, peu tranchée sur la nuque; elle est plus claire que chez les oiseaux en plumage d'automne. Le sourcil est crème - beige et s'élargit vers la nuque. Lorum et haut de la joue plus foncés que la joue beige légèrement striée. Le front est foncé. Le menton est clair, sans stries et la gorge est légèrement teintée de beige. Le manteau est couvert de striures foncées, plus grandes que celles de la calotte. Les scapulaires sont foncées, presque noires, chaque plume étant liserée de clair, et non de roux; elles forment de grosses «écailles» disposées en V. Ces deux V beiges sont moins nets qu'en automne. Les scapulaires noires, vues sur le terrain, contrastent avec le manteau et les couvertures. Couvertures brunes et liserées. Les rémiges sont foncées et légèrement liserées. Sur la gorge et la poitrine : petites stries rectilignes grossissant vers le bas et s'y arrêtant de façon très nette et horizontale, sans pour autant y former une bande brun - noir comme sur certains oiseaux en automne. Sur le haut des flancs, quelques stries assez grosses et désordonnées dépassent la poitrine tachetée. Les stries de la poitrine se détachent sur un fond beige, celles des flancs sur du blanc. Le ventre est blanc, très contrasté par rapport à la poitrine. La coloration générale est claire et assez terne, beige - brun, sans marques rousses. Les pattes sont jaunâtre - orange.

BIBLIOGRAPHIE

HALLARD, J., POURTOIS, A., TRICOT, J. (1967) : Observation d'un Bécasseau tacheté, nouvelle observation pour la Belgique. *Aves* : 125 - 133.

LIPPENS, L., BURGGRAEVE, G. et TRIO, R. (1982) : Natuurreservaat Het Zwin. Belangrijke ornithologische waarnemingen in 1981. *De Wielewaal* 48 : 321 - 323.

SHARROCK, J.T.R. et E.M. (1976) : *Rare birds in Britain and Ireland*, Poyser, Berkhamsted.

VERMEYEN, R., HERROELEN, P. et MEEUS, H. (1979) : Tweede waarneming en eerste ringvangst in België van de Amerikaanse Gestreepte Strandloper (*Calidris melanotos*). *De Wielewaal* 45 : 339 - 344.

R.M. LAFONTAINE
Boulevard Brand Whitlock 95
1200 Bruxelles

D. van der ELST
Dieweg 62
1180 Bruxelles

N.d.I.R. : Le Bécasseau tacheté est une de ces espèces nord - américaines dont des migrants égarés sont observés plus ou moins régulièrement en Europe, surtout dans les Iles Britanniques. Il niche dans l'Arctique américain et le nord - est de la Sibérie et hiverne en Amérique du Sud.