AVES 20 (2), 1983 : 106-114

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1982/3
JUIN, JUILLET, AOUT

par A. BAS-PEREZ (1), D. VAN DER ELST (2) et R. POTVLIEGE(3)

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées durant la période considérée.

ABl:	A. Blondlet	FHe:	F. Héla	MLg:	M. Laguesse
ABu:	A. Bauvir	FMr:	F. Maréchal	MLn:	M. Languy
ADn:	A. Dumont	FXD:	F.X. Dupret	MMn:	M. Moncousin
ADr:	A. Dernier	GDS:	G. De Schutter	MWa:	M. Walravens
ADu:	A. Delaunois	GRa:	G. Rasson	NS:	N. Storms
ADx:	A. Doneux	HB:	H. Bedoret	OB:	O. Bourlon
ALt:	A. Lamotte	HSt:	H. Stiévenart	OM:	O. Matgen
APr:	A. Périkel	HW:	H. de Wavrin	PC:	P. Collette
ARm:	A. Remacle	HWe:	H. Wiesemes	PD:	P. Devillers
BGu:	B. Guevorts	ID:	I. Degrez	PDa:	P. Dachy
BI:	B. Iweins	JBl:	J. Bultot	PFe:	P. Feller
BPh:	B. Philippart	JaE:	Ja. van Esbroeck	PGl:	P. Gall
BT:	B. Tricot	JoE:	Jo. van Esbroeck	PLo:	P. Limbourg
CD:	C. Dehem	JF:	J. Fouarge	PLt:	P. Lamotte
CDM:	C. De Mori	JFN:	J.F. Noulard	PMl:	P. Melon
CH:	C. de Harenne	JFR:	J.F. Richard	PN:	P. Neuray
CJ:	C. Istasse	JHo:	J. Houbart	PPi:	P. Pierre
CJo:	C. Joukoff	JJS:	J.J. Strijckmans	PRy:	P. Ryelandt
CLa:	C. Langhendries	JLBo:	J.L. Bodeux	PS:	P. Simon
CLe:	C. Lefèvre	JLG:	J.L. Gillet	PVDa:	P. Van Damme
CLy:	C. Lemy	JMDu:	J.M. Daulne	PW:	P. Wyckaert
CMo:	C. Moïs	JMLe:	J.M. Leprince	RD:	R. Dascotte
CRBH:	C. Rech. Biol. Harchies	JMo:	J. Moïs	RDC:	R. De Coster
CS:	C. Sturbaut	JPHe:	J.P. Herman	RDt:	R. Detaille
DE:	D. van der Elst	JPJ:	J.P. Jacob	RL:	R. Lambert
DLa:	D. Lafontaine	JPLa:	J.P. Launois	RLi:	R. de Liedekerke
DRa:	D. Rabosée	JPR:	J.P. Reginster	RLn:	R. Langhendries
DVe:	D. Verroken	JPSc:	J.P. Scohy	RML:	R.M. Lafontaine
EBo:	E. Bossart	JPVh:	J.P. Verhaegen	RoP:	Rob. Potvliege
EC:	E. Clotuche	JRo:	J. Rossi	RSn:	R. de Schaetzen
ECu:	E. Cuvelier	JSe:	J. Sedek	SP:	S. Peten
ED:	E. Delmée	JT:	J. Tricot	TBr:	T. Charles de la Brousse
EDg:	E. Degros	LG:	L. Gée	TDe:	T. Dewitte
EP:	E. Peten	LSc:	L. Schmitz	TMq:	T. Maniquet
EVe:	E. Verhegghen	LV:	L. Verroken	VD:	V. Degrelle
FDf:	F. Dufey	MAm:	M. Ameels	VF:	V. Furnelle
FH:	F. le Hardy	MDe:	M. Deroanne	YF:	Y. Fanon
FHa:	F. Halot	ML:	M. Loison	YR:	Y. Robert

M.C. Archambeau, G. de Bonhome, M. Collet, De Gauquier, D. Degives, J. Fairon, B. Marchal, M. Massagé, P. Pêcheur, C. Pirenne, C. Poswick, L. Rivet, S. Sorbi, J. Van de Borne, D. Van der Vennet.

(1) Av. J.B. Charbo 61, B-1040 Bruxelles.

(2) Dieweg 62, B-1180 Bruxelles.

(3) Rue Maximilien 25, B-1050 Bruxelles.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Dans l'ensemble, l'été est plus chaud qu'en moyenne, mais sans canicule, et marqué par une série d'orages violents, notament dans la première moitié de juin.

FAITS SAILLANTS

Parmi les données parvenues à la Centrale Ornithologique, épinglons l'abondance nouvelle (mais toute relative) du Busard cendré, la découverte d'un nid de Râle de genêts et de nombreuses données de Cailles. La Huppe et le Torcol sont présents mais restent marginaux, tandis que le statut du Sizerin et du Tarin devient inquiétant. Quant aux migrateurs, le nombre de Balbuzards observés est très bas, peut-être suite à de mauvaises conditions climatiques sur les lieux de nidification; peu de chevaliers sont notés en halte. Le passage de passereaux (bergeronnettes, petits turdidés, gobemouches) est sensible à partir de la mi-août.

Sauf l'observation de deux Grues cendrées en juin, aucun phénomène remarquable n'est signalé cet été.

Pendant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes: 06:06, 13, 20 et 27; 07:04, 11, 18 et 25; 08:01, 08, 15, 22 et 29.

DETAIL DES OBSERVATIONS

GREBE HUPPE *(Podiceps cristatus)*:2 couples au Rouge-Cloître à Auderghem (FHe); nouvelles implantations à Couture-Saint-Germain (1 couple - TDe), Seneffe (1 couple - PVD), région du Haut Escaut (2 ou 3 couples dont 1 sur l'Escaut même, fin juin - MLn), Buvrinnes (3 juv. + 1 ad. le 04.07 - VD, HB) et Strépy-Bracquegnies (1 couple - CLe). Aussi quelques oiseaux estivants au Bois de la Cambre (Bruxelles-PN) et à Latour (JPJ). Un juvénile à Bütgenbach le 29.07 (FVs). **GREBE A COU NOIR** *(Podiceps nigricollis)* *:1 juv. à Pommerœul le 31.07 et 3 ex. à Grand-Leez le 03.08 (DE, JPJ, MAm). **GREBE CASTAGNEUX** *(Tachybaptus ruficollis)*: nidification signalée à quelques endroits, notamment à Labuissière (HB), Bonnert (OM) et Latour, où un seul couple niche sans succès mais où 5 autres sont présents (JPJ, DE *et al.*).

GRAND CORMORAN *(Phalacrocorax carbo)*:1 imm. blessé reste à Harchies pendant toute la période. En outre, 1 ad. à Hensies le 27.06 (RDC), 1 ex. à Walem le 30.06 (EP, SP) et à Grand-Leez le 28.07 (C. Poswick), 1 imm. à Ronquières le 02.08 (TDW), 1 imm. à Baudour le 29.08 (DVe, LV) et un deuxième imm. à Harchies les 26 et 29.08 (JPJ).

HERON CENDRE *(Ardea cinerea)*:il n'y a que deux «colonies» connues dans le sud du pays, à Nivelles (2 nids avec jeunes - JHo) et à Pailhe (1 nidification réussie et 1 tentative - RLi), mais d'autres implantations restent peut-être à trouver. Rappelons que le Héron cendré est en forte augmentation en Belgique (van Vessem, J., Draulans, D. et de Bondt, A.F. (1982) : De status van de Blauwe Reiger (*Ardea cinerea*) als broed-

* Donnée soumise à la Commission d'Homologation, citée dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.

vogel in België. *Le Gerfaut, 72 : 327-335*). Seul le site de Harchies abrite des concentrations postnuptiales significatives, par exemple 42 ex. le 18.07 et environ 35 ex. mi-août (LV, DVe). Le **HERON POURPRE** *(Ardea purpurea)* n'est signalé qu'au mois d'août : dans la première décade à Boneffe, Gaurain-Ramecroix et Rhode-Sainte-Agathe (chaque fois 1 imm. - MAm, PS, FHa, GRa), le 15 à Papignies (1 ex. - MMn) et le 21 un autre immature à Gaurain-Ramecroix (PS). Plus original, 1 ex. en Gaume, à Latour, le 16 (PPi). **AIGRETTE GARZETTE** *(Egretta garzetta)**:1 ex. à Harchies le 04.07 (ML). **BLONGIOS NAIN** *(Ixobrychus minutus)*:le complexe marécageux d'Hensies-Harchies-Pommerœul abrite 4 à 5 couples (ML); ce site reste la seule station connue du Blongios dans le sud du pays. **GRAND BUTOR** *(Botaurus stellaris)*:présent à Harchies en juin et début juillet (FHe, CRBH); 1 ex. à Etalle le 30.07 (JLG).

Des **CIGOGNES BLANCHES** *(Ciconia ciconia)* de passage à Dinez les 05 et 06.06 (C. Pirenne), à Uccle le 11.06 (FHe), à Etalle le 08.07 (FHe), chaque fois 1 ex., et 2 ex. à Montrœul-sur-Haine le 28.08 (ED). **CIGOGNE NOIRE** *(Ciconia nigra)**:3 ex. du 30.05 au 01.06 à Neuville-en-Condroz (M. Deflandre), 3 ex. le 02.08 à Bras-Séviscourt (PLo) et 1 ex. à Attert le 14.08 (F. Adam, ABl, PPi).

SPATULE BLANCHE *(Platalea leucorodia)*:1 ex. à Harchies du 03 au 05.07 et un autre au même endroit le 09.07 (CRBH).

SARCELLE D'HIVER *(Anas crecca)*:aucune nidification rapportée. A part quelques oiseaux par-ci par-là - essentiellement des mâles - en juin et début juillet, l'espèce n'apparaît que vers la mi-juillet à Harchies; on y passe ainsi d'une vingtaine d'individus fin-juillet à 215 ex. le 30.08 (CRBH), seule troupe d'importance notable dans le sud du pays. **SARCELLE D'ETE** *(Anas querquedula)*:nidification prouvée à Grand-Leez et à Gembloux (chaque fois 1 couple - JPJ). Jusqu'à 22 ex. observés en été à Rhode-Sainte-Agathe (le 29.07 - EP, SP). En août, notée aussi à Latour (1 ex. le 08 et 4 le 19 - PPi), Gaurain-Ramecroix (7 ex. le 17 - MLn) et Gozée (1 ex. le 25 - CI). **CANARD CHIPEAU** *(Anas strepera)*:seules observations rapportées:à Harchies, un mâle le 26.06, 1 ex. les 12 et 17.07, 2 ex. le 18.07, 13 ex. le 26.08 (ML, MMn, LV, JPJ). De plus, 1 ex. à La Hulpe le 26.07 (EP, SP). **CANARD PILET** *(Anas acuta)*:une seule observation, 1 femelle à Machelen le 26.08 (VF). **CANARD SOUCHET** *(Anas clypeata)*:entre autres, stationnement de quelques ex. toute la période à La Hulpe (EP, SP, MWa); 2 mâles et 2 femelles à Latour le 21.06, et 6 ex. au Lac de Bambois le 29.06 (PPi, PLt). Jusqu'à 60 ex. à Harchies et 20 ex. à La Hulpe fin août (JPJ, EP, SP). Le **FULIGULE MORILLON** *(Aythya fuligula)* niche notamment à Oost-Maarland (2 couples avec jeunes - PSc). L. Rivet observe aussi une femelle sur la Woluwe, à Bruxelles. **FULIGULE MILOUIN** *(Aythya ferina)*:3 nichées observées à La Hulpe, 1 à Rosières, 16 à Rhode-Sainte-Agathe, 16 à Grand-Leez (probablement 20 à 23), 25 à 30 à Harchies (Voir article de Jacob dans ce bulletin), 1 à Sart-Dames-Avelines et 1 au moins à Gozée (EP, SP, JPJ, PN, CI). **HARLE PIETTE** *(Mergus albellus)*:un mâle adulte arrivé en hiver avec d'autres exemplaires reste, blessé, pendant tout le printemps sur un tronçon de l'Escaut à Espiennes-Hérinnes; il disparaît entre le 13 et le 20.06 (MLn). Un couple de **TADORNE DE BELON** *(Tadorna tadorna)* niche à Hensies (ML, seule station dans la zone considérée); 1 imm. à Vieux-Genappe du 28.08 au 01.09 (PN, YR).

Un reflet de l'augmentation générale de l'**EPERVIER** *(Accipiter nisus)* dans nos régions:un cas de nidification à Aineffe; l'espèce n'aurait plus niché en Hesbaye liégeoise depuis plusieurs décennies (LG). **AUTOUR DES PALOMBES** *(Accipiter gentilis)*:seule donnée de Moyenne Belgique:1 ex. à Rhode-Sainte-Agathe le 29.08 (PWy). **MILAN ROYAL** *(Milvus milvus)*:en dehors des zones de nidification du sud Luxem-

bourg et de l'est du pays (trois aires controlées fin mai - début juin dans les cantons de l'Est - 1, 2 et 3 jeunes - HWe) signalé en juin-juillet seulement à Sprimont (MDe) et Forges (PGl). A Elsenborn, N. Paquay observe un groupe de 22 oiseaux le 11.07. Deux migrateurs à Harchies le 21.08 (ML), seule mention au nord du sillon Sambre-et-Meuse. **MILAN NOIR** *(Milvus migrans)*:deux jeunes sur l'aire déjà occupée depuis deux ans dans la région d'Arlon (PPi). Les familles observées à Montquintin (ABP, RoP) et Latour (JPJ) proviennent peut-être du territoire français; l'espèce n'est par ailleurs pas rare en Gaume en juin-juillet, une augmentation se remarquant par rapport à 1981. Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, 1 ex. à Virelles le 01.06, 1 ex. les 02 et 06.06 à Florennes et 2 ex. à Cerfontaine, nicheurs probables (JHo, OB, JBl). Aussi 1 ex. les 05 et 07.06 à Wardin (D. Degisves) et 1 ex. à Elsenborn le 03.07 (WP). **BONDREE APIVORE** *(Pernis apivorus)*:en Moyenne Belgique, nidification prouvée à Bousval, (YR), suspectée à La Hulpe, Casteau et Belœil (EP, SP, PVD, ED). Observée çà et là ailleurs en Brabant et en Hainaut occidental. En migration, un oiseau isolé le 01.08 à Ransart (JBl), et un peu partout après le 10. **BUSARD DES ROSEAUX** *(Circus aeruginosus)*:présence d'un couple à Virelles (JPSc), reproduction dans la vallée de la Dyle (TMq) et à Harchies (1 couple avec succès - ML). Egalement des estivants:1 couple à Grand-Leez (JPJ, MAm), 1 femelle et 1 imm. à Lillois (TDe), 2 ex. d'un an du 11.05 à fin juin à Faimes (LG), des observations répétées en juin dans les régions de Braine-l'Alleud (BGu), Fleurus (JBl) et Hérinnes (MLn). Aucune mention de Gaume. Les contacts deviennent assez nombreux à partir de la dernière décade de juillet, surtout en Moyenne Belgique. Un **BUSARD SAINT-MARTIN** *(Circus cyaneus)* les 12 et 25.06 à Erneuville (PFe); un mâle adulte le 02.08 à Aineffe (LG) puis un mâle le 24.08 à Longvilly et une femelle le 29 à Athis (RDt, HSt) marquent le début du passage d'automne. Le **BUSARD CENDRE** *(Circus pygargus)* n'est observé que dans l'extrême sud du pays:au moins 3 couples nicheurs en Gaume, peut-être 4, dont 2 se reproduisent avec succès (au total 5 jeunes élevés) (JMo, JPJ *et al.*). Aussi 1 ex. à Villers-sur-Semois les 06.07 et 28.08 (JFR).

BALBUZARD PECHEUR *(Pandion haliaetus)*:très peu d'observations:1 ex. le 17.07 à Sivry (MLn), 1 ex. le 11.08 à Florival (FHa) et 1 juv. le 29.08 à Oud-Heverlee (HW).

FAUCON HOBEREAU *(Falco subbuteo)*:5 couples nicheurs en Forêt de Soignes (HW, MWa), peut-être un aussi dans la région d'Overijse (EP, SP). Un couple est cantonné à Attert (ABl, PPi, OM, Exc. Aves). Des oiseaux isolés à Wauthier-Braine 05.06 (RDC), Yvoir 11.06 (RL), Etterbeek 18.06 (Nicolas Rasson et GRa), Arquennes 24.06 (J.M. Charlier), La Roche 01.07 (GDS), Harnoncourt 13.07 (JaE, JoE), Bütgenbach 13 et 17.07 (WP), Genappe 18.07 (JBl), Aineffe le même jour (LG), Châtillon 19.07 (JLG), Bullange 29.07 (FVs), Harchies les 04. 05 et 19.08 (HSt, CRBH), Béclers 06.08 (PDa), Gosselies 12.08 (JBl), Wannebecq 15.08 (MMn) et Seilles courant août (MAm). Le **FAUCON CRECERELLE** *(Falco tinnunculus)* semble augmenter en Lorraine, notamment dans la vallée de l'Attert (JMo, PPi). La densité est normale en Hesbaye liégeoise (Huy-Waremme), mais la nidification médiocre, avec abandon des sites (LG). A Lierneux, un couple niche dans le même clocher qu'un couple de **CHOUETTES EFFRAIES** *(Tyto alba)* (MDe); ceci n'est pas exceptionnel (HW, com. pers.).

GELINOTTE DES BOIS *(Bonasa bonasia)*:une seule donnée:1 juv. à Ethe (Croix-Rouge) (DE). La situation de la **PERDRIX GRISE** *(Perdix perdix)* devient plus inquiétante chaque année. D'après LG, elle reste rare en Hesbaye où les chasseurs ne la tirent plus et la considèrent comme espèce en voie de disparition; HC trouve une nichée à Evelette, peut-être la seule de cette région, et elle continue à se reproduire à Chertal (une nichée - PC). Il est regrettable qu'aucun autre observateur ne semble s'intéresser

à cet oiseau, pourtant en diminution rapide. La **CAILLE DES BLES** *(Coturnix coturnix)* est remarquée en d'assez nombreux endroits cet été; elle se porte bien en Hesbaye d'après LG. Relevée (en général 1 chanteur) à Bomal-sur-Ourthe, Rixensart, Fagne, Nivelles, Bienne, Uccle, Gembloux, Merbes-le-Château, Gennevaux, Lobbes, Mussy la Ville, Walhain-Saint-Paul, Aineffe et Houtain-le-Val (TDe, HW, CLy, YF, GRa, Nicolas Rasson, JPJ, VD, HB, DE, APr, JaE, JoE, LG, PMl et M. Massagé).

GRUE CENDREE *(Grus grus)*:une donnée exceptionnelle:2 ex. en vol vers le SE le 30.06 à Bressoux (JFN).

RALE D'EAU *(Rallus aquaticus)*:niche à Cortil-Wodon (HW), Genval (GRa); hormis quelques sites habituels, signalé aussi à Heinsch en 06 (OM), Spontin (sur le Bocq) en 07 (CJX) et à Labuissière (HB). La **MAROUETTE PONCTUEE** *(Porzana porzana)* est signalée à Harchies, Hensies (le 26.07 seulement) et Baranzy (MMn, GDS, MLn, JPJ). **RALE DE GENETS** *(Crex crex)*:1 chanteur à Torgny début juin (JaE). A Fagnolle, M. Lambert trouve une nichée et la sauve de la faucheuse (bravo!).

FOULQUE MACROULE *(Fulica atra)*:Retenons la nidification à Latour, première locale (3 nichées et une douzaine d'adultes - PPi, JPJ *et al.*), à Pailhe, Orval, Heinsch, Orgeo et Ciney (RLi, JMo, OM, EBo).

VANNEAU HUPPE *(Vanellus vanellus)*:noté partout par petits groupes de 10 à 50 ex. dès début juin; en outre, présence journalière, à partir du 02, de 200 à 500 individus entre Chimay et Couvin, en bandes de 50 à 150 ex. (JPSc). Le passage important commence aux environs du 15.07. Deux **PLUVIERS DORES** *(Pluvialis apricaria)* à Seilles le 04.08 (MAm) et à Aineffe le 13.08 (LG) Le **GRAND GRAVELOT** *(Charadrius hiaticula)* n'est trouvé qu'en août, à Harchies-Pommerœul, Vieux-Genappe et Gaurain-Ramecroix (HB, DVe, LV, PN, MLn). La distribution du **PETIT GRAVELOT** *(Charadrius dubius)* sera précisée par l'enquête organisée en 1983; des nidifications probables ou certaines sont signalées à Nivelles, Grand-Bigard, Baudour, Latour et Athus (JHo, MWa, AD, PPi, JLG, FDf, CMo).

BECASSINE DES MARAIS *(Gallinago gallinago)*:aucune donnée avant le 15.07, où elle apparaît à Harchies (CD), puis en quelques autres localités. **COURLIS CENDRE** *(Numenius arquata)*:Sainte-Marie-sur-Semois 27.06, Labuissière 09.07, Biesmes 11.07, chaque fois 1 ex. (JFR, HB, CLy); fin août, 2 ex. à Bierwart le 21, 1 ex. à Tervuren le 24, 1 ex. à Overijse le 28 et 4 ex. le 30 à Gaurain-Ramecroix (ARm, PWT, EP, SP, MLn). Trois **COURLIS CORLIEUX** *(Numenius phaeopus)* à Harchies le 24.07, 18 en vol le 05.08 à Auderghem puis des oiseaux isolés à Blaton le 20, Harchies le 26 et Gaurain-Ramecroix le 30 (ML, DE, CRBH, JPJ, MLn). **BARGE A QUEUE NOIRE** *(Limosa limosa)*:observée seulement à Harchies, à partir de début juillet, au plus 5 ex. le 16.08 (DVe, LV). **CHEVALIER CULBLANC** *(Tringa ochropus)*:1 ex. au bord de la Warche à Bullange le 06.06 (FVs), 1 ex. à Ohey le 08.06 et à Latour le 18.06 (JPJ, JLG). Le passage se développe ensuite dans tout le pays. Un **CHEVALIER SYLVAIN** *(Tringa glareola)* à Waremme le 05.06 (DRa), puis un peu partout en Moyenne Belgique à partir des derniers jours de juin. **CHEVALIER GUIGNETTE** *(Tringa hypoleucos)*:1 ex. à Bütgenbach le 05.06 (FVs) et 1 à Pommerœul le 12.06 (FHe). Passage à partir de début juillet. **CHEVALIER GAMBETTE** *(Tringa totanus)*:1 ex. le 27.06 à Antoing (MLn) puis présence à Harchies-Pommerœul à partir des premiers jours de juillet (1 ex. le 03.07, jusqu'à 11, le 26.08 - CRBH, JPJ). Pas plus de huit localités en juillet et août (chaque fois 1 ou 2 oiseaux). Des **CHEVALIERS ARLEQUINS** *(Tringa erythropus)* isolés sont notés à Seilles

(25.06 - BPh), Harchies (18.08 - HB), Nivelles (19.08 - JHo), Hoegaarden (28.08 - Exc. Aves) et Baudour (29.08 - TMq, DVe, LV). **CHEVALIER ABOYEUR** *(Tringa nebularia)*:1 ex. à Harchies le 03.06 (LV), puis le passage postnuptial commence dans la deuxième décade de juillet:au maximum 6 ex. à la fois (Tirlemont 22.08 - DLa, RML). **BECASSEAU MAUBECHE** *(Calidris canutus)* *:1 ex. à Harchies le 16.08 et à Tirlemont le 28.08 (CRBH, Exc. Aves). **BECASSEAU MINUTE** *(Calidris minutus)*:1 ex. à Pommerœul les 31.07 et 13.08 (DE, LV), 1 ex. à Nivelles du 14 au 19.08 (JHo, TDe) et 1 ex. à Wanze le 26.08 (RLi). Des **BECASSEAUX DE TEMMINCK** *(Calidris temminckii)* (*) isolés sont repérés à Eghezée (Longchamps) début août (JJS, MAm) et à Hoegaarden le 26.07 (JaE, JoE). **BECASSEAU VARIABLE** *(Calidris alpina)*:de 1 à 3 ex. à Pommerœul entre le 26.07 et le 19.08 (GDS, MLn, DVe, LV, CRBH, HB). Aussi à Eghezée (Longchamps) (1 ad. le 07.08 et 2 ex. le 28.08 - DLa, RMl, FHe), à Seneffe (1 ex. les 14 et 15.08 - CLe) et à Genappe (1 ex. le 29.08 - YR). **BECASSEAU SANDERLING** *(Calidris alba)* *:1 ex. à Péronnes le 28.08 (MLn). **COMBATTANT** *(Philomachus pugnax)*:1 ex. à Bernissart le 27.06 (RDe), puis des oiseaux isolés ou de petits groupes (jusqu'à 17 ex. à Harchies, le 13.08 - LV) un peu partout en Moyenne Belgique:Genappe, Gaurain-Ramecroix, Antoing, complexe d'Hensies-Harchies-Pommerœul, Grand-Leez, Eghezée (Longchamps), Tirlemont. **AVOCETTE** *(Recurvirostra avosetta)*:à Gaurain-Ramecroix, 4 ex. le 10.07 et 29 ex. s'arrêtant quelques instants le 26.08 (MLn).

GOELAND BRUN *(Larus fuscus)*:présence continue de quelques individus à Mont-Saint-Guibert (JPJ, GDS), 1 ad. à Wauthier-Braine le 03.07 (RDC), 2 ad. le 13.07 à Harchies (MIn); ailleurs, l'espèce n'est remarquée que dans le Tournaisis (Antoing, Gaurain-Ramecroix):1 ad. le 01.06, 1 imm. le 27.06, quelques oiseaux en juillet et août. Leur nombre augmente dans la dernière quinzaine d'août pour atteindre 17 ex. à Gaurain-Ramecroix le 30.08 (MLn). Rares données de **GOELAND ARGENTE** *(Larus argentatus)*: environ 200 ex. à Mont-Saint-Guibert le 29.07 (GDS). Le **GOELAND CENDRE** *(Larus canus)* n'est signalé qu'à Pommerœul (pas plus de 2 ad.), Antoing (1 ad. le 25.07 - MLn), Seneffe (1 juv. le 30.07 - CLe) et Gaurain-Ramecroix (1 juv. le 30.08 - MLn). **MOUETTE RIEUSE** *(Larus ridibundus)*:en juin, 3 ex. à Virelles le 01, 3 ex. à Lessines le 27, et observations fréquentes à Lobbes à partir du 06 (JHo, CD, JPHe). **MOUETTE PYGMEE** *(Larus minutus)*:1 imm. à Harchies du 28.07 au 05.08, un deuxième ce dernier jour, 1 ex. à Hoegaarden le 09.08 et 2 ex. à Grand-Leez à la fin du mois (GDS, DE, CRBH, DVe, LV, NS, Y. Gerbehaye, YR, MAm, JPJ). **GUIFETTE NOIRE** *(Chlidonias niger)*: 1 ex. à Virelles le 01.06 (JHo) et 1 ex. à Harchies le 26.06 (ML). L'espèce est notée régulièrement en juillet-août à Harchies-Pommerœul (moins de 10 oiseaux, sauf 46 ex. le 29.08 - DVe, LV) mais aussi à Latour (1 ex. le 16.07 et 8 ex. le 25.07 - JLG) et à Rhode-Sainte-Agathe (4 ex. le 29.08 - PWy). **GUIFETTE MOUSTAC** *(Chlidonias hybrida)* *:1 ex. à Harchies le 07.06 (ECu, JPVh). **STERNE PIERREGARIN** *(Sterna hirundo)*:2 ex. à Gaurain-Ramecroix le 27.06 et 1 ex. à Strépy-Bracquegnies le 02.07 (MLn, VD, HB). **STERNE NAINE** *(Sterna albifrons)* *:2 ex. à Harchies le 13.06 (De Gauquier) et 3 ex. à Virelles le 02.07 (PD, RoP).

PIGEON COLOMBIN *(Columba œnas)*:en dehors de son aire de distribution classique, un individu le 01.08 à Orgeo (EBo) et un chanteur le 20.08 à Pailhe (RLi). La **TOURTERELLE DES BOIS** *(Streptopelia turtur)* est abondante en juin à Bomal-sur-Ourthe (YF); un groupe de 75 ex. à Tirlemont le 07.08 et 40 ex. à Overijse le 31.08 (DLa, EP, SP).

Le **COUCOU GRIS** *(Cuculus canorus)* est encore régulièrement signalé dans le Hainaut au mois d'août.

CHOUETTE EFFRAIE *(Tyto alba)*:en Brabant et Hainaut, la nidification accuse au moins un mois de retard par rapport à 1980 et 1981; seuls quelques couples ont des jeunes d'âge habituel en juin dans la région d'Ath (HW). **CHOUETTE CHEVECHE** *(Athene noctua)*:dans la région de Flobecq, sur six nichoirs occupés antérieurement, un seul l'est encore en 1982, les autres sont envahis par des Pigeons colombins (MMn).

ENGOULEVENT D'EUROPE *(Caprimulgus europaeus)*:un chanteur cantonné en juin à Vierves-sur-Viroin (PRy), des chanteurs le 23.07 à La Hulpe (HW) et le 08.08 encore à Châtillon (JPJ). Présence aussi à Tervuren le 01.06 (PWy) et le 08.08 à Ottignies (J. Fairon).

MARTINET NOIR *(Apus apus)*:départ de tous les martinets de la région de Chimay dès la dernière semaine de juillet (JPSc); entre le 03 et le 05.08, des bandes importantes se rassemblent et quittent les lieux de nidification (JPJ, EVe, RDt). Des individus isolés et des petits groupes sont observés partout jusqu'à la fin du mois, dont 50 ex. le 25 à Membach et 60 ex. le 26 à Elsenborn (LSc).

MARTIN-PECHEUR *(Alcedo atthis)*:observé en 26 localités et bien recensé en Gaume. Pas de nidification en basse Méhaigne (LG).

HUPPE FASCIEE *(Upupa epops)*:1 ex. en juin et début juillet à Bleid (JLG).

PIC MAR *(Dendrocopos medius)*:une seule mention:Attert, 11.08 (OM). Une donnée exceptionnelle de **PIC EPEICHETTE** *(Dendrocopos minor)* en Hautes-Fagnes:une femelle le 12.08 dans l'Algemeine Venn (LSc). Deux ex. le 27.06 dans un verger à Lessines, région où l'espèce est rare (CD). **PIC NOIR** *(Dryocopus martius)*:présence d'un exemplaire le 04.06 à Rixensart (GRa) et nidification à Seilles (MAm). Le **TORCOL** *(Jynx torquilla)* reste très rare:1 ex. le 27.06 à Elsenborn (Exc. Aves), un couple niche en juin dans un pylône en bois à Latour (ABl, FDf, PPi) et un chanteur le 11.07 à Romedenne (PRy).

ALOUETTE LULU *(Lullula arborea)*:un couple à Elsenborn (WP), 1 ex. le 06.07 à Villers-sur-Semois (JFR) et 2 ex. le 24.07 à Nismes (JHo).

Le 14.07, un dortoir de 400 **HIRONDELLES DE CHEMINEE** *(Hirundo rustica)* à Genval (EP, SP) et 1.000 ex. à Virelles le 18.08 (DVe, LV); 1 individu albinos le 19 à Lobbes (JPHe). **HIRONDELLE DE FENETRE** *(Delichon urbica)*:à Gosselies, le 10.08, de nombreux oiseaux sont trouvés morts sur les lieux de nidification (JBl).

PIPIT DES ARBRES *(Anthus trivialis)*:premiers mouvements signalés le 13.07 à Theux (ADx). **BERGERONNETTE PRINTANIERE** *(Motacilla flava)*:en juillet, un dortoir de 30 ex. est établi à Harchies (CRBH, ML). En août, le passage s'amorce partout vers le 15 et est surtout noté le dernier week-end avec des groupes de plusieurs dizaines d'individus. Un ex. appartenant à la sous-espèce *thunbergi* est identifié à Uccle le 29.08 (CJo).

PIE-GRIECHE GRISE *(Lanius excubitor)*:neuf sites recensés en Gaume. En Moyenne Belgique, observée seulement à Bernissart le 29.07 et 18.08 (MMn, HB) et Rhode-Sainte-Agathe le 13.08 (FHa). **PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE** *(Lanius senator)**: un couple nicheur en Gaume (JaE, JoE, JPJ, Exc. Aves), près de la frontière française. L'espèce n'est plus trouvée dans le site habituel de Ruette, malgré des recherches. **PIE-GRIECHE ECORCHEUR** *(Lanius collurio)*:en dehors de la Lorraine où l'espèce est bien représentée et recensée, une vingtaine d'autres cas de nidification nous sont

signalés dans les Cantons de l'Est, dans la région de Vielsalm, à Theux, Mormont et Hollange. Disparition locale à Grandhan (FMr). Aucune donnée de migrateurs.

Important passage d'**ACCENTEURS MOUCHETS** *(Prunella modularis)* le 31.08 à Overijse (EP, SP).

GRIVE LITORNE *(Turdus pilaris)*:l'enquête, réalisée en 1982, sur la distribution de cette espèce montre qu'elle s'étend en Brabant, dans le nord de l'Entre-Sambre-et-Meuse et en Hesbaye (P. Leprince, com. pers.; article détaillé à paraître). **TRAQUET MOTTEUX** *(Œnanthe œnanthe)*:une seule donnée en période de nidification:le 09.06 à Membach (FVs). Le passage est noté à partir du 15.08 et surtout le dernier week-end d'août, avec un maximum de 8 ex. le 31 à Overijse (EP, SP). Pendant la saison de nidification, le **TRAQUET TARIER** *(Saxicola rubetra)* est signalé en Lorraine, où son déclin se poursuit (JPJ), ainsi qu'à Saint-Vith (1 couple nourrissant - HWe) et en Hautes-Fagnes (9 couples dans la vallée de la Schwalm - JaE, JoE, Exc. Aves). Des migrateurs apparaissent le 03.08 en Moyenne Belgique (JHo) et le passage se développe vers la fin du mois, au plus 6 ex. ensemble (JM). **ROUGEQUEUE A FRONT BLANC** *(Phœnicurus phœnicurus)*:quelques migrateurs sont notés à partir du 14.08. **GORGEBLEUE** *(Cyanosylvia svecica)*:22 ex. bagués à Baudour entre le 13 et le 29.07 (CS). Premiers **ROUGEGORGES** *(Erithacus rubecula)* migrateurs le 31.08 à Chertal (PC).

La **BOUSCARLE DE CETTI** *(Cettia cetti)* reste très rare depuis l'hiver 1981-82. Nouvelle implantation à Strépy-Bracquegnies:un mâle est présent depuis le 18.04 et, le 24.07, une femelle et un jeune sont bagués (CS). La **LOCUSTELLE LUSCINIOIDE** *(Locustella luscinioides)* n'est plus rencontrée qu'à Harchies (2 ex. en 07) et à Baudour (1 ad. capturé le 13.07) (LV, DVe, MLn, CS). **ROUSSEROLLE TURDOIDE** *(Acrocephalus arundinaceus)*:à Harchies, deux chanteurs le 12.06, un le 03.06 sur l'ancien canal et 1 ex. le 12.07 à Hensies (MMn, FHe, LV). **ROUSSEROLLE EFFARVATTE** *(Acrocephalus scirpaceus)*:un migrateur chante dans un jardin d'Ixelles, en milieu sec, le 03.06 (PN). Passage de la **ROUSSEROLLE VERDEROLLE** *(Acrocephalus palustris)* observé le 12.08 à Ransart et le 28 à Noiseux (JBl, FMr). **PHRAGMITE DES JONCS** *(Acrocephalus schoenobaenus)*:outre Harchies, cette espèce en diminution dramatique n'est signalée qu'à Labuissière (2 ex. le 01.07), Strépy-Bracquegnies (3 ad. et 3 juv. le 02.07), Antoing (1 ex. le 10.08) et Florival (2 ex. le 14.08) (VD, MLn, FHa). **HYPOLAIS ICTERINE** *(Hippolais icterina)*:en juin et juillet, chante ou niche entre autres à Rémicourt, Forêt, Herve et Ayeneux (DRa, EC, JRo) l'espèce est rare en Pays de Herve. Un premier migrateur le 29.07 à Plombières (EDg). Les déterminations d'Hypolaïs, même ictérine, demandent la plus grande prudence, vu l'avance importante de l'**HYPOLAIS POLYGLOTTE** *(Hippolais polyglotta)* * vers le nord dans notre pays. Le nombre de données pour cette dernière espèce se multiplie, voir l'article de Jacob *et al.* dans ce bulletin. **POUILLOT FITIS** *(Phylloscopus trochilus)*:mouvements migratoires importants le 13.07 à Theux (ADx). **POUILLOT DE BONELLI** *(Phylloscopus bonelli)* *: un couple nicheur à Torgny (JPJ).

GOBEMOUCHE NOIR *(Ficedula hypoleuca)*:nidification notée à Theux (ADx); un premier migrateur le 12.07 à Harchies (MMn, CD), ensuite surtout à partir du 24.08.

BRUANT PROYER *(Emberiza calandra)*:en bordure de l'aire de distribution, 1 chanteur à Mesnil-Saint-Blaise le 11.06 (RLi). **BRUANT DES ROSEAUX** *(Emberiza schoeniclus)*: un chanteur à Maransart dans des céréales (BGu). L'espèce est aussi répandue en Gaume, entre autres dans des milieux secs (PPi, DE).

GROS-BEC CASSE-NOYAUX *(Coccothraustes coccothraustes)*:nidification notée seulement à Saint-Aubin, Ransart et Aineffe, où il est rare (OB, JBI, LG). **CHARDONNERET ELEGANT** *(Carduelis carduelis)*:distribution bien documentée en Gaume seulement, où il se trouve en petit nombre partout (PPi, DE). **TARIN DES AULNES** *(Carduelis spinus)*:en juin, environ 50 ex. de passage le 01 à Bolland (PSc) et une présence à Rocherath (M. Peters), des individus isolés à La Hulpe, Grand-Leez et Florennes (EP, SP, JPJ, OB). En août, 10 ex. le 31 à Lobbes (JPHe). La situation de cette espèce en Wallonie s'est fortement dégradée depuis cinq ans. **SIZERIN FLAMME** *(Carduelis flammea)*:peu nombreux et moins fréquents à Eupen, Membach et Elsenborn qu'en 1981 (Exc. Aves, LSc). Sans doute en raison de la pression exercée par la tenderie, cette espèce diminue aussi dans d'importantes proportions. Aussi 2 ex. à Goé le 08.07 (EDg). **SERIN CINI** *(Serinus serinus)*:des couples entre autres à Merbes-le-Château, Labuissière et Harmignies (VD, HB, AD). L'espèce ne paraît en général guère abondante cette année (CJo, RoP). Le **BECCROISE DES SAPINS** *(Loxia curvirostra)* est observé à partir du 13.07 dans les Fagnes et en Haute Ardenne liégeoise (MDe, EDg, EBo, LSc, WP). En dehors de cette région, 8 ex. le 22 et 12 ex. le 29.08 à Pailhe (RLi).

MOINEAU DOMESTIQUE *(Passer domesticus)*:nidification sur une antenne de télévision à Hachy, où les cas de nidification à l'air libre sont rares (PPi).

LORIOT *(Oriolus oriolus)*:assez nombreux en Gaume et dans la vallée de la Haine, jusqu'à la fin du mois d'août (DVe, LV).

CASSENOIX MOUCHETE *(Nucifraga caryocatactes)*:présence régulière à Stoumont, Francheville, Wanne et Bra-sur-Lienne (CH, CI, MDe, BT, JT).

ERRATUM:chronique ornithologique 1982/2 - Aves 20(1), 57. **PIPIT DES ARBRES** *(Anthus trivialis)*:LSc nous signale que c'est suite à une erreur de transcription dans ses fiches que l'observation de 4 groupes de 5 à 15 ex. à Membach le 27.03 a été rapportée à cette espèce; il s'agissait en fait de **PIPITS FARLOUSES** *(Anthus pratensis)*.