

PARASITISME EXERCE PAR LA CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*) A L'ENCONTRE DU FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*).

Dans la présente revue, ont été publiées plusieurs données relatives à des comportements alimentaires insolites de la Corneille noire : prédation de papillons (TAHON, 1967), bris d'œufs en les laissant tomber (GODIN, 1972) ou succédané (JORTAY, 1975), vol sur place (BASTIN, 1971).

Nous y ajouterons un cas de parasitisme qui mérite d'être rapporté.

Le 21 janvier 1984, un Faucon crécerelle chasse au-dessus d'une roselière du marais d'Harchies. Il se laisse tomber et capture un rongeur, qu'il emporte.

A ce moment, passe une Corneille noire qui prend immédiatement le faucon en chasse en zigzaguant comme un labbe poursuivant une sterne.

La corneille poursuit le faucon tout en croissant. Il finit par lâcher sa proie, celle-ci tombe à terre, la corneille la récupère et la consomme.

BIBLIOGRAPHIE

- BASTIN, G. (1971) : Chasse d'une corneille noire (*Corvus corone*). *Aves*, 8 (5-6) : 26.
GODIN, J. (1972) : Comportement d'une corneille noire (*Corvus corone*) en train de briser un œuf d'oie (*Anser sp.*). *Aves*, 9 (4-5) : 198.
JORTAY, A. (1975) : Un curieux comportement de la corneille noire (*Corvus corone*). *Aves*, 12 (2) : 93.
TAHON, J. (1967) : Prédation du papillon (*Jortrix viridana*) par des corvidés (*Corvus corone*) et (*Corvus monedula*). *Aves*, 4 (5-6) : 166-167.

Reçu le 03.04.1984
Accepté le 18.04.1984

MARIUS LOISON
24B, rue de Ville
7358 Pommerœul

NDLR

Nous avons réalisé une observation similaire à peu près à la même époque dans la région de Herve. A peine posée sur le sol avec la proie (Merle, Grive ou Etourneau - *Turdus sp.* ou *Sturnus vulgaris*) qu'elle venait de capturer, une femelle d'Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) a été attaquée par deux Corneilles noires, espèce particulièrement abondante à cet endroit. L'Epervier a immédiatement abandonné sa proie que les Corneilles se sont empressées de déchirer et d'emporter.

EC

A PROPOS DES DONS D'IMITATION DE LA FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*).

Le 20 avril 1984, je me rends au marais de Berg (Brabant) avec l'espoir d'entendre pour la première fois cette année la Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*).

A peine arrivée près de la roselière, j'en perçois nettement le chant, mais il est assez bref et tout de suite dominé par la ritournelle éclatante de la Fauvette à tête noire.

Une minute après, la Rousserolle recommence son «KareKarekiet» et la Fauvette intervient à nouveau de la même façon.