

# CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1983/3 JUN, JUILLET, AOUT

par Jean-Paul JACOB (1)

Elaboration du fichier : André MONMART et Pierre DAHIN

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées au cours de la période considérée.

ABl : A. Blondlet	FHe : F. Héla	JPCq : J.P. Coquette
AD : A. Demaret	FHi : F. Hidvegi	JPHe : J.P. Herman
ADg : A. Degros	FLu : F. Lutgen	JPJ : J.P. Jacob
ADr : A. Dernier	FMr : F. Maréchal	JPR : J.P. Reginster
ADu : A. Delaunois	FVs : F. Vassen	JPSc : J.P. Scohy
ADx : A. Doneux	FXD : F.X. Dupret	JPY : J.P. Yernault
ALo : A. Lombart	GGa : G. Gast	JSe : J. Sedek
AMo : A. Monmart	GGc : G. de Guchteneere	JT : J. Tricot
AP : A. Pourtois	GK : G. van der Kelen	LG : L. Gée
APr : A. Périkel	GN : G. Nève	LMc : L. Mercier
BA : B. Amory	GRa : G. Rasson	LN : L. Noulard
BT : B. Tricot	GTNS : Gr. Trav. Namur Sud	LSc : L. Schmitz
BVo : B. Votron	HB : H. Bedoret	LV : L. Verroken
CD : C. Dehem	HG : H. Guerriat	LVa : L. Vaussort
CEAG : C. Etudes Aves Gozée	HSt : H. Stiévenart	MAm : M. Ameels
CGe : C. Geyer	HW : H. de Wavrin	MDe : M. Deroanne
CGo : C. Goblet	HWe : H. Wiesemes	ML : M. Loison
CH : C. de Harenne	JB1 : J. Bultot	MMn : M. Moncousin
CI : C. Istasse	JCDe : J.C. Dechamps	MPa : M. Paquay
CJo : C. Joukoff	JD : J. Dumont †	MV : M. Vanderhoeven
CLa : C. Langhendries	JDa : J. Delarue	MWa : M. Walravens
CLe : C. Lefebvre	JaE : Ja. van Esbroeck	NG : N. Goetghebeur
CLy : C. Lemy	JoE : Jo. van Esbroeck	NPa : N. Paquay
CRBH : C. Rech. Biol. Harchies	JF : J. Fouarge	NR : N. Rasson
DCa : D. Capart	JHo : J. Houbart	OB : O. Bourlon
DH : D. Hubaut	JLc : J. Leclercq	OM : O. Matgen
DV : D. Voituron	JLBo : J.L. Bodeux	PAn : P. Anrys
DVe : D. Verroken	JLG : J.L. Giltet	PB : P. Bastien
ED : E. Delmée	JMDu : J.M. Daulne	PBc : P. Bucquoye
EDg : E. Degros	JMLe : J.M. Leprince	PC : P. Collette
EVe : E. Verroken	JMo : J. Moïs	PDa : P. Dachy
EWa : E. Walravens	JMT : J.M. Tricot	PDe : P. Demaret
FDf : F. Dufey	JPB : J.P. Bivort	PDh : P. Dahin
FHa : F. Halot	JPC : J.P. Chauffouraux	PGI : P. Gall Schuon

Reçu le 10.04.1984. Accepté le 18.04.1984.

(1) Rue de Petit-Leez 76, B-5938 Grand-Leez

PLI :	P. Lamotte	PVDa :	P. Van Damme	RT :	R. Thomas
PN :	P. Neuray	PWt :	P. Wyckaert	SSo :	S. Sorbi
PPi :	P. Pierre	RD :	R. Dascotte	TDw :	T. Dewitte
PR :	P. Remmerie	RDC :	R. De Coster	TT :	T. de Thier
PRv :	P. Rivez	RDt :	R. Detaille	VD :	V. Degrelle
PS :	P. Simon	RLi :	R. de Liedekerke	WOr :	W. Ortman
PSc :	P. Schaeken	RLn :	R. Langhendries	YF :	Y. Fanon
				YR :	Y. Robert

Deleau, B. Beauduin, C. de Coune, P. Demanet, D. Demortier, A. Emontspohl, J. Gallez, A. Georges, A. Houdart, G. Isaac, G. Margraff, F. Nef, A. Paye, P. Tellier, D. Vancoppenolle, J. van de Borne, B. Verbruggen.

## CONDITIONS CLIMATIQUES

Au printemps pourri que nous avons connu, succède le premier bel été depuis 1976. Certaines valeurs enregistrées en juillet-août représentent même des records depuis le début des observations météorologiques, il y a 150 ans.

Le mois de juin est dans l'ensemble normal, avec toutefois d'assez fréquents orages, surtout en fin de mois. Le mois de juillet est exceptionnellement beau et chaud. Les températures enregistrées à Uccle sont même supérieures à celles de 1976 et juillet 1983 apparaît comme le plus chaud enregistré à ce jour. Pour fixer les idées, la température moyenne à Uccle est de 21,2°, 21 jours voient le maximum dépasser 25° et l'insolation est nettement excédentaire : 272h contre 195h en moyenne. Les températures restent élevées en août tandis que la pluviométrie est la plus basse jamais enregistrée : 10,4mm (précédent record 12,3mm en 1936; normale 74,4mm).

## FAITS SAILLANTS

Une invasion majeure de Becroisés des sapins se développe à partir de juin tandis que deux autres afflux notés concernent des nicheurs : Caille des blés et Râle de genêts.

Parmi les oiseaux d'eau, on note une nouvelle nidification du Canard chipeau à Harchies, le maintien de la Sarcelle d'été, la poursuite de l'expansion du Grèbe huppé et des fuligules. A Harchies, l'augmentation du Blongios nain et de la Rousserolle turdoïde ainsi que le cantonnement du Grand Butor résultent avant tout de la gestion appliquée, notamment de la création de roselières. En Haute-Belgique, la Cigogne noire donne lieu à diverses observations dont certaines, bien que non transmises, sont attribuées à des nicheurs.

La nidification des rapaces, d'abord prometteuse, connaît un succès variable; elle semble exceptionnellement bonne chez la Chouette effraie. Des espèces rares telles que le Faucon hobereau, les Busards des roseaux et cendrés se maintiennent, le Milan noir niche à nouveau, de même que le Hibou Grand-duc et la population wallonne de Milans royaux peut être estimée à 10-15 couples. Les reproductions de Hiboux des marais sont exceptionnelles. Il convient par ailleurs d'attirer l'attention sur les observations estivales de Busards Saint-Martin en Hainaut où une nidification pourrait se produire, notamment compte tenu du retour de l'espèce dans le Nord/Pas de Calais.

Parmi les passereaux, on relève la poursuite de la progression de l'Hypolais polyglotte et de la Grive litorne qui se répand en Moyenne-Belgique. Si certaines espèces menacées comme la Pie-grièche écorcheur se maintiennent, il n'en va pas de même pour le Traquet tairier qui poursuit son déclin, ou de la Locustelle luscinioidé qui n'a apparemment plus niché en Wallonie en 1983. Des espèces comme la Bouscarle, le Sizerin flammé ou le Tarin des aulnes restent rares. La nidification du Cassenoix a pu être prouvée en Thiérache.

## DETAIL DES OBSERVATIONS

**GREBE HUPPE** (*Podiceps cristatus*) : les informations reçues concernent une soixantaine de couples et confirment la bonne santé de l'espèce dans notre région. Des mouvements d'été sont signalés à partir des 26-28.06, 1 ex. en Meuse à Jambes (AMo). **GREBE JOUGRIS** (*Podiceps grisegena*) \* : le grèbe présent à Latour fin mai y séjourne jusqu'au 01.06 (JMo) ; en août, 1 ex. le 21 à Luttre (JPC) et 1 adulte le 30 à Genappe (LVa), le même oiseau peut-être. **GREBE A COU NOIR** (*Podiceps nigricollis*) \* : 2 ex. le 01.06 et 1 ex. jusqu'au 11.06 à Latour (ABI, FDF, JMo, PPI), 1 couple le 04.06 à Pommerœul (ML), 1 ex. le 28.08 à Machelen (DE) et 1 adulte les 30-31.08 à Genappe (LVa). **GREBE CASTAGNEUX** (*Tachybaptus ruficollis*) : près de 40 nidifications ont été signalées. Parmi elles, une première installation à Erbisœul (JPB), plusieurs couples nicheurs en Haute-Ardenne liégeoise à la Gileppe, Elsenborn et Robertville (LSc) ainsi que des couples produisant trois couvées à Pommerœul (ML) et Gérompont (RML). Quelques mouvements sont décelés en juin-juillet; ils sont plus particulièrement évidents à Latour à partir de fin juillet : 3 ex. jusqu'au 17.07, 24 ex. le 30.07, 33 ex. le 02.08, 47 ex. le 12.08, 35 ex. le 15.08, 45 ex. le 23.08 et 55 ex. le 28.08 (PPI, JPJ, JLG, OM).

**GRAND CORMORAN** (*Phalacrocorax carbo*) : poursuite du séjour à Harchies d'un oiseau blessé (CRBH). Peu d'indications de passages : 1 juv. du 17 au 24.07 à Jambes (AMo, PLt), 1 juv. vers le sud-ouest le 30.07 à La Hulpe (MWA), 2-3 ex. entre le 13 et le 31.08 à Harchies (CRBH, LV, DVe, ML, MMn, JPJ).

**HERON CENDRE** (*Ardea cinerea*) : répandu; maxima mensuels à Harchies de 33 ex. le 28.06, 41 ex. le 17.07 et 44 ex. le 21.08 (CRBH, JPJ). Ailleurs, les groupes les plus importants comptent 26 ex. le 26.07 et 14 ex. le 21.08 à Sart-Dames-Avelines (LVa), 14 ex. le 26.08 à Attert (JLG) et 16 ex. le 28.08 à Thommen (Exc. Aves). A noter le séjour prolongé, de juillet à l'automne, de deux juvéniles originaires de Zonhoven (bagues colorées) aux décanteurs de Gembloux (LSc, JPJ). **HERON POURPRE** (*Ardea purpurea*) : trois sites donnent lieu à des observations en juillet : 1 imm. le 01 à Vieux-Héverlée (FHa), 1 ex. vers le sud-est le 13 à Rosières (GRa), 3 juv. le 22 puis un seul le 23 à Harchies (LV, DVe, CLe, MMn). Seule donnée, inhabituelle, en août : 1 ex. séjourne du 07 au 28 aux étangs de Jannée (MPa). **AIGRETTE GARZETTE** (*Egretta garzetta*) \* : 1 ex.

---

\* Donnée soumise à la Commission d'Homologation, citée dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.

les 16-18.06 à Harchies (CRBH). HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*)\* : 2 juv. le 19.07 à Andenne-Seilles (CGo). BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*) : lente progression dans les marais d'Harchies : 5-6 couples en 1983 (CRBH); 1 ex. entendu le 01.07 à Gozée (BB). GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*) : pas d'observation en dehors du complexe marécageux d'Harchies où un couple a peut-être niché (CRBH).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : 3 ex. à Hotton les 10-11.07 (GTNS), 1 ex. le 16.07 survolant Quaregnon (PAN), 2 ex. en halte le 19.07 à Bouillon (RDt), 1 ex. le 20.07 à Compogne (FLu), 1 ex. le 10.08 à Havelange (Deleau), 1 ex. le lendemain à Braine-l'Alleud (GN) et 7 ex. en halte le 25.08 à Andrimont; l'un de ces derniers, bagué en RFA, s'électrocute contre une ligne à haute-tension (EDg). CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)\* : dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, 1 ex. le 19.06 à Sosoye (MAM), 1 ex. le 14.07 à Franchimont (Philippeville - YR) et 5 ex. le 18.08 à Biesme (T. de Thier). Les informations d'été du Luxembourg n'ont pas été communiquées. SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) : 7 ex. vers le nord-est le 28.07 à Luigne (D. Vancoppenolle).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) : 1 femelle avec 4 jeunes le 06.08 à Robechies (JPSc). Des observations de nicheurs probables proviennent en juin des vallées de la Haine et de la Dyle ainsi que de Rosières (CRBH, MG, FMa, GRa); 1 mâle le 19.06 et 1 couple le 01.07 à Villers-devant-Orval (RDt). Migration observée à partir du 25.07, surtout au cours de la dernière décade d'août quand des groupes atteignent 20 ex. le 31 à Ronquières (JMo) et 30 ex. le 21 à Pommerœul (en partie des locaux? - JPJ). SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*) : observations de 1-5 ex. en juin-début juillet à Harchies, Gozée, Rosières, Ploegsteert et Oost-Maarland (CRBH, JPJ, MG, GRa, BB, DH, JDa); plusieurs de ces données se rapportent sans nul doute à des nicheurs. Début de migration d'automne au même moment que la Sarcelle d'hiver. CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) : 1 femelle accompagnée de 7 pulli le 07.06 et de 5 pulli le 19.06 à Pommerœul où 3 adultes sont notés le 21.06 (CRBH, ML, JPB); 1 mâle le 02.07 à Latour (PPI, OM, JLG). CANARD PILET (*Anas acuta*) : 1 ex. le 28.08 à Boneffe (Exc. Aves). CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) : au moins 2 couples nicheurs à Ploegsteert, et à Baudour-Douvrain, reproductions à Saint-Ghislain et Harchies; 2 mâles le 19.06 à Vilvorde, 3 ex. le 30.06 à Grand-Leez (CRBH, PAN, JPJ, MAM, MWa, DH). Rares migrateurs en août à Latour, Gozée, Thommen et Athis; parallèlement, le stationnement d'Harchies se renforce et atteint 160-170 ex. le 21 (CRBH, JPJ). FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) : 1 ex. les 14-15.08 au barrage de la Gileppe (LSc). FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) : informations très partielles sur la nidification : au moins 16 couples à Neerijse «Grote Bron» et 2-3 à Neerijse «Kliniek» (FHi), 29 familles regroupant 164 pulli le 16.07 à Vieux-Héverlée, 1 nichée à Tervueren (MWa), 2 à Harchies-Pommerœul (CRBH), 1 à Oost-Maarland (JDa). Un nouveau site est colonisé en Meuse liégeoise : 1 famille le 21.07 à Chertal (PC). Quelques individus non nicheurs çà et là, notamment 1 couple séjournant jusqu'en juillet à Longchamps, Luxembourg (RDt). FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) : également assez peu d'indications sur la reproduction. La situation est stable aux étangs du Long-Pont à Grand-Leez où une quinzaine de femelles suivées sont observées sur un total de 20-22 couples présents en mai; les éclosions se poursuivent tardivement jusqu'au 10.08 (LSc, LN, JPJ *et al.*). Confirmation de la nidification à Sart-Dames-Avelines (LVa), 18 nichées à Harchies-Pommerœul le 21.06 (CRBH) et une nouvelle installation : 2 femelles suivées le 15.06 à Ploegsteert (DH). Pour le reste, on retiendra notamment les observations de 9 ex. le 19.06 à Virelles (JSe) et des séjours intermittents en été au lac de Bambois, au plus 12 ex. le 18.06 (PLt, A. Houdart, JPJ *et al.*). TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) : à Harchies-Pommerœul, les 3 couples non nicheurs sont encore présents début juin; le dernier oiseau est vu le 19.06 (CRBH, ML, RD).



*Milan noir, août 1977 (Photo Fr. le Hardy de Beaulieu).*

**BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*)** : les mauvaises conditions météorologiques du printemps expliquent l'échec de la reproduction à Bra-sur-Lienne, Rocherath et Membach (BT, JT, ADg, EDg). Progression locale : 3 aires avec jeunes à Buissenal (bois Hamaide - PB). Quelques migratrices fin août à Harchies (CRBH) et Boitsfort (MWa *et al.*).

**EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*)** : confirmation de l'augmentation dans la région de Huy avec notamment nidification à Antheit, Ben-Ahin et 2 couples à Vinalmont (JF, JLD, R. Polet). Au nord du sillon Sambre et Meuse, les observations en début de période sont assez fréquentes mais sans preuve de reproduction toutefois : Godarville, Flawinne, Ransart, Aineffe, Warnant-Dreye, Athis, Bousval et La Hulpe (PLt, JSE, JBI, LG, HSt, YR, MWa). A partir de mi-juillet, des erratiques ou migrateurs apparaissent en de nouvelles localités.

**AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*)** : reproduction catastrophique à Rocherath (ADg, EDg). Deux observations d'août en dehors des zones de reproduction : 1 ex. le 11 à Warnant-Dreye et le 13 à Gembloux (LG, CGe).

**MILAN ROYAL (*Milvus milvus*)** : la nidification est établie à Clairefontaine (éclosion le 09.06 - B. Bauduin), Weiler (famille sur l'aire le 15.07) et à Macquenoise (PGI), outre cinq couples dans l'est de la province de Liège (HWe). Pour le reste, observations courantes de 1-5 ex. en Lorraine et dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Seules autres données : 1 ex. à Viemme le 02.06 et à Warnant-Dreye le 27.07 (LG).

**MILAN NOIR (*Milvus migrans*)** : nidification à Sterpenich (PPi). Douze autres mentions reçues de Lorraine jusqu'au 23.07 et des isolés ailleurs le 02.06 à Wauthier-Braine (GN), le 05.06 à Lavaux-Sainte-Anne (MPa), les 06 et 16.06 à Lierneux (MDE), le 04.07 à Auffe (Stage Aves), le 17.07 à Virelles, le 27.07 aux barrages de l'Eau d'Heure (HG) et les 15-16.08 à Lobbès (JPHe).

**BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*)** : encore 12 ex. vers le nord-est le 07.06 à Boitsfort (MWa). En Brabant, un couple niche en forêt de Soignes et des individus sont notés en été à Boitsfort, La Hulpe, Rixensart, Bousval et en forêt de Meerdael (MWa, EVe, CGe, GRa, YR, NR). Le passage postnuptial est extrêmement faible en août.

**BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*)** : 3 couples nicheurs à Harchies et 1 à Baudour-Douvrain, tentative aux «Marionville» à Saint-Ghislain (CRBH, PAn, JPJ). La reproduction à Virelles n'est pas établie cette année. Ailleurs quelques estivants non nicheurs sont observés à Latour, Heppignies, Wagnelée, Marbais, Mellet, Fleurus, Boneffe, Seraing-le-Château, Aineffe et Duisbourg (JPJ, DE, JBI, LVa, MWa, LG, FHHe). La migration débute apparemment fin juillet (1 mâle le 26 à Saint-Léger-Lux. - et 1 juv. le 29 à Longchamps-Lux. - FHHe, AD, PDe) mais reste très peu sensible courant août.

**BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*)** : 1 mâle le 11.06 à Forges, où une femelle avait été précédemment notée en mai, ainsi qu'une femelle le 19.06 à Harchies (JPB). Ces observations doivent attirer l'attention sur l'éventualité d'une nidification dans nos régions; rappelons que le Busard Saint-Martin s'est réinstallé comme nicheur dans le Nord/Pas-de-Calais. En août, 1 ex. le 16 à Rouveroy (AP).

**BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*)** : en Gaume, 3 couples nicheurs à Harnoncourt (JPJ, PPI *et al.*), 1 femelle le 08.06 à Vance (B. Bauduin); pas de nidification à Baranzay. Autres données : 1 femelle le 03.07 à Jemelle (MPa, Stage Aves), 1 ex. vers le sud le 06.08 à Colpach (B. Bauduin) et 1 mâle les 19-20.08 à Sauvenière (BDe, JPJ).

**BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*)** : peu d'observations : 1 ex. les 14-15.07 puis les 25 et 31.08 à Harchies (CRBH, ML), 1 ex. également le 04.08 à Mont-Saint-Guibert (CHR), le 23.08 au-dessus de la fagne du Steinley (Eupen) (LSc) et le 30.08 à Virelles (JPC).

**FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*)** : Virelles 17.07, spectacle rare d'un Faucon pèlerin houspillé par deux Faucons hobereaux (JaE, JoE).

**FAUCON HOBEREAU (*Falco subbuteo*)** : 3 couples nicheurs et 2 autres possibles en forêt de Soignes (MWa, HW *et al.*), 1 couple avec au moins 2 jeunes volants à Rhode-Sainte-Agathe (HW) et 1 couple

nicheur à Attert (JLG). Des observations répétées à Harchies, Flobecq, Rosières et Torgny permettent de supposer des reproductions locales (MMn, LV, DVe, GRA, JPC, HSt, CRBH, ML). D'autres mentions éparées de juin-juillet proviennent de Hollogne-sur-Geer, Seraing-le-Château, Elsenborn et Meyerode (HWe, LG, Exc. Aves). En août, quelques observations du 16 au 28 se rapportent vraisemblablement à des migrants.

**GELINOTTE DES BOIS** (*Bonasa bonasia*) : 5 ex. le 11.08 à Saint-Hubert (GRA).

**CAILLE DES BLES** (*Coturnix coturnix*) : l'afflux de cette année n'est plus détecté après le mois de mai en Ardenne-Lorraine, à l'exception de 5 chanteurs le 26.06 à Elsenborn (Exc. Aves). Quelques chanteurs sont repérés au nord de l'Ardenne à Maffe, Bomal, Wellin, Auffe, Lessive et Saint-Aubin (RLi, JMo, Stage et Exc. Aves, OB). La Caille est par contre assez répandue au nord du sillon Sambre et Meuse : elle n'est pas rare en Hesbaye (par exemple 4 chanteurs sur 2 km<sup>2</sup> à Gembloux - JPI, RML), 35 chanteurs à Zaventem début juillet dont des concentrations de 12 et 9 chanteurs sur des surfaces de 1 km<sup>2</sup> (MWa, FHi), d'autres chanteurs en Brabant à Rixensart, Neerijse et Winksele (LMe, JT, BT, TDw, MWa), plusieurs contacts en Hainaut à Ogy, Tournai, Gaurain-Ramecroix, Béciers, Nivelles et Fleurus (MMn, PR, PB, PS, ED), ainsi qu'une reproduction prouvée à Rouveroy (poussin le 09.08 - AP). On notera la persistance de chants dans les derniers jours d'août à Boneffe (Exc. Aves), Saint-Aubin (OB) et Gaurain-Ramecroix (PS).

**RALE D'EAU** (*Rallus aquaticus*) : en dehors de sites bien connus, mentionnons 1 ex. le 11.07 à Buzenol (FHe), 1 ex. le 16.07 à Aublain (DE), et un oiseau de passage, très hâtif, du 06 au 09.07 sur l'île de Dave, en Meuse (AMo, PDh). **MARQUETTE PONCTUÉE** (*Porzana porzana*) : à nouveau présente en été dans la vallée de la Haine : 1 ex. le 14.07 à Pommerœul, 1 ex. dans une roselière sèche d'Harchies le 21.07 et 1 ex. bagué le 29.07 aux «Marionville» à Saint-Ghislain (CRBH, HSt, ML, PAn). Aucun renseignement de Gaume. **RALE DE GENETS** (*Crex crex*) : le nombre de chanteurs est le plus élevé noté depuis longtemps en Wallonie; cet afflux pourrait être lié à la baisse soudaine observée localement en France (e.a. par suite des inondations en Val de Saône). Des chanteurs ont été décelés à Elsenborn, Gozée (LSc, BB), Logbiermé, Marche-en-Famenne (DE) et surtout dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse où pas moins de 23 furent repérés à l'occasion de prospections systématiques (PRy, TDe, JHo).

**HUITRIER-PIE** (*Haematopus ostralegus*) : 1 ex. les 03 et 09.06 à Harchies (CRBH).

**VANNEAU HUPPE** (*Vanellus vanellus*) : occupation d'une nouvelle localité en Ardenne : 3 couples dont au moins une nidification à Bra-sur-Lienne (BT, JT). Amorcé en mai, le passage d'été ne se développe que lentement en juin; seuls quelques petits groupes apparaissent avant le 20 (maximum 80 ex. le 15 à Hompré - RDi). Les bandes se multiplient et se renforcent par la suite mais, à l'exception de 1000 ex. les 04-06.07 à Wellin (Stage Aves), aucun des rassemblements signalés en été ne dépasse 500 oiseaux. Des reproductions assez tardives sont signalées, à relier aux mauvaises conditions météorologiques du printemps: nid contenant 2 œufs le 02.07 à Fleurus (JBI), 2 pulli le 25.07 à Dailly (TDw). **PLUVIER ARGENTE** (*Pluvialis squatarola*) : 1 ex. le 06.08 à Rocherath (HWe). **PLUVIER DORE** (*Pluvialis apricaria*) : premiers en août : 2 ex. le 08 à Grand-Reng (AP), 4 ex. le 12 à Fleurus (JBI), un groupe fin août à Boneffe (RML) et 2 ex. vers le sud le 29 à Aineffe (LG). **GRAND GRAVELOT** (*Charadrius hiaticula*) : Harchies-Pommerœul, 6 ex. le 03.06, 7 ex. les 06-07.06 et 2 ex. au moins le 17.07 (CRBH, LV,

DVe). **PETIT GRAVELOT** (*Charadrius dubius*) : la synthèse sur le statut nicheur de cette espèce paraîtra dans un prochain fascicule ou bulletin.

**BECASSINE DES MARAIS** (*Gallinago gallinago*) : deux couples à Cortil-Wodon, bêlement le 02.07 (DE). Quelques-unes observées fin juin-début juillet dans la vallée de la Haine, à Florival, Vance et Habay-la-Vieille (CRBH, J. van de Borne, J. Gallez, FHe). Le passage s'amorce le 19.07 (2 ex. à Gembloux - LSc); 15 données ensuite jusqu'à la fin du mois dont de petits groupes de 10 ex. à Saint-Ghislain et Harchies (PAn, CRBH). Migration bien marquée en août, surtout du 20 au 26; la plus grosse bande compte 60 ex. le 25 à Fleurus (JBI, LVa). **BECASSE DES BOIS** (*Scolopax rusticola*) : en forêt de Soignes, au moins 5 mâles (croûle) et 2 femelles au bois des Capucins en juin-juillet (MWa) et 1 ex. le 21.08 aux «trois Fontaines» à Auderghem (FHe). **COURLIS CENDRE** (*Numenius arquata*) : seulement trois mentions : 1 ex. vers le sud le 21.06 à Pailhe (RLi), 4 ex. avec des Vanneaux le 23.07 à Vellereux (FLu) et 1 ex. le 18.08 à Harchies (ML). **COURLIS CORLIEU** (*Numenius phaeopus*) : trois observations à Harchies-Pommerœul : 1 ex. les 11 et 25.07, au moins 2 ex. le 04.08 (VD, ML, LV, DVe). **BARGE A QUEUE NOIRE** (*Limosa limosa*) : quelques observations limitées au bassin de la Haine : 2 ex le 15.06 à Harchies puis 1-4 ex. entre le 14.07 et le 04.08 à Harchies et Saint-Ghislain (CRBH, PAn, LV, DVe, HSt). **CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*) : les premiers migrateurs s'arrêtent le 06.06 à Pommerœul (ML), le 07.06 à Villers-le-Bouillet (5 ex. - LG), le 13.06 à Rosières (GRa, NB) et le 15.06 à Harchies où pas moins de 17 ex. sont présents. Une vague de migration est décelée du 18 au 29.06 avec des groupes atteignant 7 ex. le 19 à Eghezée et 17 ex. le 24 à Harchies (JPR, CRBH). Observations sporadiques début juillet et reprise du mouvement à partir du 17.07, mais sans concerner de groupes importants : 1-5 ex. à la fois sauf 7-8 ex. les 26-27.07 à Warcoing (FXD), 10 ex. le 03.07 à Longchamps (DE), 11 ex. le 24.07 à Genappe (TDw), au plus 15 ex. à Harchies (CRBH) et 30 à Saint-Ghislain (PAn). Le passage semble assez discret en août (aucune observation dépassant 5 ex. ensemble après le 02). **CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*) : début du passage observé le 19.06, plusieurs à Pommerœul (JPB). Par la suite, 3 ex. le 25.06 et 4 ex. le 29.06 à Warcoing (JLe, FXD), 1-3 ex. début juillet à Harchies (CRBH) et un très faible passage à partir du 18.07, se résumant à quelques observations de 1-4 ex. **CHEVALIER GUIGNETTE** (*Tringa hypoleucos*) : en juin, 1 ex. le 03 à Gaurain-Ramecroix (JPCq), 1 ex. le 11 à Sart-Dames-Avelines (LVa); les observations de 2 ex. le 19 à Harchies (RD) et 4 ex. les 23-24 à Florival concernent plutôt les premiers migrateurs. Le passage reste faible jusqu'au 17.07. De ce jour au 04.08, les Guignettes se rencontrent fréquemment un peu partout mais sans former de groupes importants. De manière générale, le passage devient étonnamment discret après le 04.08 et des bandes dépassant 6 ex. ne sont mentionnées qu'à quatre reprises, au plus 31 ex. à Harchies le 02.08 (CRBH). **CHEVALIER GAMBETTE** (*Tringa totanus*) : à Harchies, 2 ex. séjourner de fin mai au 07.06; 1 ex. y est revu le 19.06 et 2 ex. sont notés le même jour à Saint-Ghislain (CRBH, ADu, JPB, ML). Migration réduite de fin juin à août : 17 observations, au plus 15 ex. le 23.07 à Gaurain-Ramecroix (JPCq). **CHEVALIER ARLEQUIN** (*Tringa erythropus*) : faible passage : un premier oiseau le 19.06, quatre migrateurs isolés du 23 au 30.07, un le 07.08 et quatre autres du 28 au 31.08, tous en Moyenne-Belgique. **CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*) : les premiers également autour du 20.06 : 1 ex. le 19.06 à Vilvorde (MWa), le 20.06 à Harchies (CRBH) et le 24.06 à Longchamps (Namur - MAm). Début juillet, 15-20 ex. le 03 à Saint-Ghislain (ADu), 1 ex. du 04 au 11.07 à Aineffe (LG) et 1-5 ex. à Harchies (CRBH). Les oiseaux en halte restent très peu fréquents jusqu'en août, au cours duquel on enregistre 23 observations de 1-6 ex. Certains séjournent assez longtemps sur place : à Fleurus, 4 ex. de mi-juillet à août dont 1 ex. bague le 27.07 et contrôlé le 08.08; ces chevaliers capturaient de nombreuses Epinoches dans les bassins de décantation (JBI, LVa). **BECASSEAU MINUTE** (*Calidris*



*minuta*) : seulement 1 ex. le 26.07 à Harchies (HB). BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*)\* : 2 ex. le 17.07 à Fleurus (JBI). BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) : trois isolés en août : Fleurus le 01 (LVa), Pommerœul le 11 (CRBH) et Saint-Ghislain le 13 (PAn). CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) : premier le 02.07 à Zaventem (FHi) puis 2-3 à partir du 09.07 à Harchies et un passage un peu plus sensible du 15.07 au 04.08 avec comme plus grand groupe 11 ex. le 17.07 à Pommerœul (LV, DVe). Après le 04.08, seulement 1 ex. le 28.08 à Tirlemont (RDc). AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*) : 1 ex. le 23.06 à Harchies (CRBH) et 6 ex. le 21.08 à Gaurain-Ramecroix (JPCq).


GOELAND MARIN (*Larus marinus*) : 1 ad. et 1 imm. le 23.06 à Wauthier-Braine (GN). GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) : 4 ex. le 06.06 et 1 ex. le 12.06 à Wauthier-Braine (GN); quelques observations en Hainaut : 1 ex. le 06.06 à Pommerœul (ML), de 2 à 28 ex. du 13 au 31.08 à Gaurain-Ramecroix (JPCq) et 1 ad. le 14.08 à Helchin (LV, DVe). GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) : en juin, 1 ex. le 25 à Florennes (OB), jusque 200 ex. le 19 sur le dépôt de Vilvorde (MWa) et 260 ex. le 12 sur celui de Wauthier-Braine (GN); après la mi-juillet, quelques individus sont en outre signalés à Pommerœul et Gaurain-Ramecroix (LV, DVe, JPCq). Le 26.08, 5 ex. en vol à Vierves-sur-Viroin (TDe). GOELAND CENDRE (*Larus canus*) : en dehors de la vallée de la Haine, deux observations intéressantes en Basse-Meuse : 8 adultes le 02.06 à Chertal (PC) et une dizaine d'oiseaux le 27.06 à Oost-Maarland (JDa). MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) : entre autres 3-4000 ex. le 19.08 à Gaurain-Ramecroix (JPCq), passage d'au moins 700 ex. vers leur dortoir le 11.08 à Huy (LSc) et des observations de Haute-Belgique notamment à Virelles (JPSc. Exc. Aves), Bertogne (RDT), Wanlin (MPa), Rocherath (HWe), Latour (JLG, PPI) et Plombières (première le 10.07 - EDg). MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*) : Harchies-Pommerœul, 1 imm. les 16, 19 et 29.06, 1 ad. le 23.07, 1 ex. les 02 et 28.08, 1 imm. le 21.08 (CRBH, CD, HSt, LV, DVe, JPI). GUFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) : derniers migrants pré-nuptiaux en juin : 31 ex. le 05 à Virelles (CLY, JHo) et le 06 à Harchies, puis 1 ex. le 16, 6 ex. le 21 et un oiseau en plumage d'hiver le 29 toujours à Harchies (ML, CD, CRBH). Dans la vallée de la Haine, 1 ex. le 29.07 précède une petite série d'observations de 1-2 ex. en août (PAn, CD, CRBH); ailleurs, 5 observations de 1-8 ex. du 07 au 21.08. STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) : 1 ex. aux marais d'Harchies les 03-04.06 (ML, CRBH). STERNE NAINNE (*Sterna albifrons*)\* : 2 ad. du 31.05 au 02.06 à Harchies (CRBH).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : un recensement partiel en forêt de Soignes donne 14 couples sur 5 km<sup>2</sup> en juillet (MWa); en Lorraine, où il n'est pratiquement jamais signalé, 1 ex. le 03.07 à Etalle et 2 ex. le 11.07 à Habay-la-Vieille (FHe). TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) : signalée comme nombreuse en 1983 au nord de Charleroi (JBI) et à Bomal (JMo); aucun groupe notable en août et départs apparemment rapides (presque aucune après le 17.08).

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) : nidification exceptionnellement bonne en Brabant-Hainaut suite à la prolifération des petits rongeurs : quasi tous les couples amènent quatre jeunes à l'envol. Nidification dans un nouveau site périurbain à Uccle (HW). Ailleurs, nidification mentionnée à Celles (PB, PDa), Buissonville (MPa) et Vierves (TDe), observations à Guirsch, Evelette, Mouscron, Lobbes, Auffe, Blaugies, Harchies et Pailhe où l'espèce réapparaît en août après plusieurs années d'absence (APr, CH, DH, Stage Aves, JPB, CRBH, RLi). CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) : succès reproductif souvent médiocre après un bon début de nidification. En forêt de Soignes, 45 couples sont dénombrés sur 25 km<sup>2</sup> (MWa). CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*) : dans l'ensemble, redevenue assez fréquente. HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) :

23 reproductions trouvées dans la région de Rochefort (MPa), ailleurs nidifications signalées entre autres à Châtillon, Seilles, Zaventem, Aubain, Pommerœul, Spa, Pailhe, Bomal, Rhode-Sainte-Agathe, Ottignies et Winksele; 1 ex. de passage le 28.08 à Boitsfort (MWa). HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) : nidification à Elsenborn et probable à Spa-Malchamps, 1 ex. le 03.07 à Raeren et le 01.07 à Clermont-lez-Walcourt (NPa, JD, PBc, A. Emontspohl, B. Gilles); 1 ex. aussi fin juin à Châtillon - Lagland (RML *et al.*).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) : passages importants à partir des 24-25.07, grande vague de départs les 01-02.08, en petit nombre les jours suivants, sporadiques après le 10.08.



Chouette effraie, juin 1972 (Photo Fr. le Hardy de Beaulieu).

MARTIN-PECHEUR (*Alcedo atthis*) : signalé d'une trentaine de localités avec nidification prouvée en Brabant à Boitsfort, Auderghem (Rouge-Cloître), La Hulpe et Rhode-Sainte-Agathe (MWa, FHe). Réapparition à partir du 07.07 en Meuse (AMo, PDh) et du 20.07 à Gembloux; indices de déplacements les 15-20.08 au barrage de la Gileppe (LSc).

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*) : 1 ex. en juin à Luïngne (JLe).

PIC VERT (*Picus viridis*) : à noter, 6 cantons sur 23 km<sup>2</sup> en forêt de Soignes (MWa) et retour à partir du 24.07 à Ransart d'oiseaux qui se fixent ensuite pour l'arrière-saison (JBl). PIC CENDRE (*Picus canus*)\* : 1 femelle le 02.08 à Membach, près du canton trouvé au printemps (LSc); 1 ex. le 30.08 à Bonnert (OM). PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*) : trois mentions de nids creusés à faible hauteur; 1,2 m au-dessus du sol dans un robinier à Ghlin (ADu), 1, 2 et 2 m à Tervueren (PWT). Un recensement partiel en forêt de Soignes permet de localiser 32 couples sur 23 km<sup>2</sup> (MWa). PIC NOIR (*Dryocopus martius*) : dans l'est, nichées âgées de huit et quinze jours le 05.06 à Membach et Rocherath (EDg). En Brabant, observations à Nethen (Beaumont), au village de Rhode-Sainte-Agathe et en forêt de Soignes à Auderghem (MG, FMa, FHa, CGe). TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) : en Gaume, 4 cantons à Latour (JPJ *et al.*), 1 à Ruelle (PD) et 1 ex. le 30.07 à Mussy-la-Ville (JLG). Dans l'est, 1 couple le 11.06 à Elsenborn (Exc. Aves), un couple nicheur dans les fagnes de la Baraque Michel et du Signal de Botrange (FHi) confirment le maintien de la petite population en Haute-Ardenne. Quelques migrateurs comme à l'accoutumée fin août : 1 ex. le 23 à Boitsfort (MWa *et al.*), le 27 à Butgenbach (FVs), le 30 à Membach (LSc) et le 31 à Jupille (GGa, PC).

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) : 1-2 ex. en juin au Collège Jean XXIII à Woluwe-Saint-Pierre (HW), un des tout derniers sites bruxellois encore occupés. ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) : en dehors de Lagland où la population semble se maintenir, observée en juin-juillet à Resteigne, Ave-et-Auffe, Jemelle (Gerny), Nismes, Frasnes-lez-Couvin, Elsenborn et, plus inhabituel, un chanteur le 29.07 à Athis en Hainaut (HSt).

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) : une quinzaine de colonies sont renseignées, parmi elles environ 170 couples à Châtillon (JPJ, OM), 49 nids dans un poussier près d'Obourg (JPCq) et une dizaine dans un teruil de résidus de pâte à papier à Mont-Saint-Guibert (JPJ).

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*) : observation rare en juin d'un oiseau le 29 à Hensies (CD); 1 ex. le 22.08 à Grand-Reng (AP). PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) : rare en forêt de Soignes où seulement 18 cantons sont trouvés dans une zone de 23 km<sup>2</sup> (MWa). Amorce de la dispersion postnuptiale à partir du 25.07 à Châtillon (JPJ), quelques passages à partir des 05-06.08 et migration sensible dans la dernière décade d'août, surtout après le 24. BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*) : sites renseignés pour la population des prés humides de Haute-Belgique : Elsenborn, Amel, Bastogne (zone industrielle et Isle-les-Prés), Sibret, Athus et Ave-et-Auffe (NPa, RDt, PPi, FDF, Exc. et Stage Aves). Premières migratrices les 12-14.08 (troupe de 60 ex. le 12 à Casteau - BA), puis passage se développant au cours de la dernière décade d'août avec des bandes d'au plus 30 ex. le 26 à Harchies (CRBH) et 25 ex. le 28 à Hoegaerden (RDC). BERGERONNETTE FLAVEOLE (*Motacilla flava flavissima*)\* : 1 ex. le 12.06 à Rocherath (Exc. Aves) et le 25.08 à Doel (SL). BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) : dans l'agglomération bruxelloise, 2 couples à Boitsfort (forêt et Grand Etang), 3 à Auderghem (forêt 1, Rouge-Cloître 2) et 1 mâle le 15.07 au moulin de Lindekenwaele dans la vallée de la Woluwe (CGe, MWa).



**PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*)** : 4 familles le 11.06 à Elsenborn (Exc. Aves), 1 famille le 18.06 à Butgenbach (NPa), 2 familles le 16.07 à Aublain (DE), à Lessive (Stage Aves), 4 couples nicheurs à Longvilly et 3 à Bastogne (ABI); 13 autres sites donnent lieu à des observations en Haute-Belgique; ailleurs, 1 ex. les 12.07 et 28.08 à Hensies (ML, MMn). **PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*)\*** : pas de nicheurs en Belgique cette année, ce qui ne signifie pas l'abandon du versant septentrional des côtes bajociennes car un couple se reproduit tout contre la frontière à Gorcy (France). **PIE-GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*)** : la situation reste stable en Lorraine avec dans l'ensemble une bonne production de jeunes (JPJ *et al.*). En Ardenne luxembourgeoise, 1 ex. le 26.06 à Morhet (CGe). Dans la région de Rochefort, couples cantonnés à Wanlin (MPa) et Lessive (Stage Aves), une famille à Auffe (YR). Dans le nord du Luxembourg et dans l'est de la province de Liège, 4 couples nicheurs à Mormont (JMDu), 3 à Membach (LSc), au moins 2 à Elsenborn (JD), 2 au Signal de Botrange et 1 à Cowan près de Houffalize (AD, PDe). Plusieurs autres données ne permettent pas de conclure à des nidifications. A Theux, 1 mâle observé le 30.06 et des captures, peut-être de migrateurs les 26-27.07 et les 11-12.08 (ADx); un couple le 23.07 à Niverlé (CJo). Une femelle de passage le 15.08 à Chapon-Seraing (LG); les nicheurs ont pratiquement disparu après le 17.08 (encore 2 juv. le 31.08 à Sterpenich - PPi).

**CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*)** : observations reçues de Lorraine où l'espèce est traditionnellement peu abondante : sur l'Attert, nidification sous le pont de Colpach à Grendel et 1 ex. le 16.06 à Shadek; 1 ex. en été à l'étang de Bologne à Habay-la-Neuve, 1 ex. le 02.07 à Ethe (bois d'Aquet), 1 ex. au moulin de Beauregard, 1 ex. le 09.07 à Buzenol et une famille le 14.07 à Rulles (PPi, OM, J. Gallez, FHe).

**GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : poursuite de l'expansion en Hesbaye où la présence de couples isolés ou de petites colonies se généralise (JPJ, LSc). Outre les nicheuses de la Dyle, des Litornes sont également signalées en Moyenne-Belgique à Seneffe, Mont-Saint-Aubert et Harchies en juin ou juillet; un oiseau est de passage le 23.07 à Ransart (JHo, CRBH, MWa, JBI, FHa). En Gaume, elle est devenue omniprésente dans les secteurs non forestiers de la vallée de la Vire et s'installe à Châtillon (JPJ). **TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*)** : seuls nicheurs potentiels notés : 1 mâle le 18.06 à Elsenborn (NPa) et 1 femelle le 10.07 à Herchies (Mons) (ADu). Les premiers migrateurs, 6 ex. à Etalle le 20.07 (JLBo), précèdent de vingt jours les observations suivantes. Le passage est surtout sensible à partir du 20.08, mais sans être très important. **TRAQUET PATRE (*Saxicola torquata*)** : quelques nidifications de cette espèce en forte diminution ont été communiquées : 1 couple à Saint-Ghislain, Lobbes, Monceau-sur-Sambre, Flawinne, Chertal, Matagne-la-Petite, Frasnes-lez-Couvin, Lavaux-Sainte-Anne, Halma, Baillonville (nouveau site), Noiseux et Athus, 2 couples à Nismes et Spa-Malchamps, 3 à Membach et Engis, 6 à Latour et 6-10 au circuit automobile de Nivelles. Plusieurs données de nicheurs probables à Houdeng-Goegnies, Bois d'Haine, Seneffe, Zaventem et Woluwe-Saint-Pierre. **TRAQUET TARIER (*Saxicola rubetra*)** : nicheur en petit nombre en Gaume où un inventaire partiel donne 9 couples sur la planchette IGN 71 - 3 (JPJ). En Ardenne, 7 cantons à Elsenborn, 1 couple au nord de Saint-Vith, 4 à Vaux-sur-Sûre, 3 à Sibret (ruisseau de Brul) et 1-2 à Membach; en outre, observations de juin-juillet à Rocherath, Bastogne, Longvilly et Morhet (GM, Exc. Aves, RDt, ABI, FDF, CGe, LSc). Une famille le 16.07 à Aublain (DE). Dans la vallée de la Haine, 1 mâle le 11.06 à Erbisœul (ALo). Passage à partir du 04.08, isolément ou par petits groupes atteignant 12 ex. le 31.08 à Polleur (LSc). **ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*)** : diminution apparente dans la région de Rochefort (MPa); en forêt de Soignes, un recensement partiel le trouve en 23 sites sur 23 km<sup>2</sup> (MWa). **ROUGEGORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*)** : premiers migrateurs le 17.08 à Jupille (GGa) et le 19.08 à Chertal (PC).

**BOUSCARLE DE CETTI** (*Cettia cetti*) : seulement 4-5 cantons aux marais d'Harchies (CRBH, ML, LV, DVe); seul autre site renseigné : un chanteur en juin au lac de Bambois (PLt, JPJ). **LOCUSTELLE TACHETEE** (*Locustella naevia*) : bonne fréquence cet été. En Moyenne-Belgique, elle est bien représentée à Pommerœul (ML), 6 cantons le 01.06 à Bonsecours (JaE, JoE), 5 chanteurs le 11.08 à Labuissière (HB), 2 cantons à Steenokkerzeel, 2 à Zaventem dont un dans une parcelle de froment, 1 à Rosières (MWa, FHi). Près de Namur, on note la réapparition à Floreffe (PLt) ainsi que des chanteurs à Flawinne (PDh) et Erpent (MAM). En Haute-Belgique, elle est particulièrement bien détectée de nuit dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse (TDe, JHo, PRy), forte densité dans la région de Rochefort (MPa, Stage Aves), au moins 6 chanteurs à Spa-Malchamps (JD, JDa, NPa), 12 sur une partie du champ de tir à Lagland (JPJ), etc. **ROUSSEROLLE TURDOIDE** (*Acrocephalus arundinaceus*) : 4 postes de chant aux marais d'Harchies (CRBH) et 1 à Baudour-Douvraïn (PAN). **ROUSSEROLLE EFFARVATTE** (*Acrocephalus scirpaceus*) : à l'est de la Meuse, des nicheurs au bord de rivières à Barvaux-sur-Ourthe (JMDu) et au confluent de la Lesse et de la Lhomme (Stage Aves). **ROUSSEROLLE VERDEROLLE** (*Acrocephalus palustris*) : dernière le 30.08 à Chertal (PC). **PHRAGMITE DES JONCS** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : en dehors de la vallée de la Haine, seulement 1 ex. rapporté le 11.07 à Latour (FHe) et le 07.08 à Gozée (VD). **HYPOLAIS ICTERINE** (*Hippolais icterina*) : aucun nicheur en 1983 à Ransart (JBI); parmi les autres notes, un chanteur le 25.06 à Jemelle (MPa) et un chanteur de passage le 02.08 à Goé (LSc). **HYPOLAIS POLYLOTTE** (*Hippolais polyglotta*)\* : poursuite de la progression; détail des données wallonnes de cette année dans l'article de Jacob et Paquay publié dans ce même bulletin. **CISTICOLE DES JONCS** (*Cisticola juncidis*)\* : 1 ex. le 30.07 à Saint-Ghislain (PAN). **FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*) : migration bien marquée à partir du 10.08 à Ransart (JBI); dernières locales le 28.08 à Boitsfort (MWa *et al.*). **FAUVETTE GRISETTE** (*Sylvia communis*) : fort passage le 25.08 à Saint-Aubin (OB). **POUILLOT SIFFLEUR** (*Phylloscopus sibilatrix*) : 50 cantons minimum sur 23 km<sup>2</sup> de hêtraie en forêt de Soignes (MWa); un migrateur le 26.07 à Boneffe (LSc). **POUILLOT DE BONELLI** (*Phylloscopus bonelli*)\* : 4 cantons à Torgny (ABI, JPJ *et al.*) et un chanteur le 09.06 à Spa (PBc). **ROITELET HUPPE** (*Regulus regulus*) : première apparition postnuptiale le 21.08 à Boitsfort (MWa *et al.*).

**GOBEMOUCHE GRIS** (*Muscicapa striata*) : en progression à Jambes (AMo), bonne réussite des secondes nichées en août à Ransart (JBI), par contre poursuite de la diminution à Boitsfort, rare en forêt de Soignes (2 sites trouvés sur 23 km<sup>2</sup> - MWa *et al.*). **GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*) : nidification en juin à Peutie/Vilvorde (*Ornis Flandriae* 4 : 126-130). Le début du passage postnuptial est précoce : 2 ex. le 28.07 à Cheratte (JDa), noté le 04.08 à Ransart (JBI) et Membach (LSc); migration se développant ensuite, surtout au cours de la dernière décade d'août.

**MESANGE HUPPEE** (*Parus cristatus*) : en Hainaut, 1 ex. est observé pour la première fois à Ransart le 29.06 (JBI) et 1 ex. est capturé le 30.07 à Béclers, fait rare dans le Tournaisis (PDa).

**BRUANT PROYER** (*Miliaria calandra*) : en Gaume, occupation de sites traditionnels sauf 1 ex. le 06.08 à Vance (J. Gallez). Présence devenue régulière à Maffe (1 chanteur) et Bomal (3 chanteurs) ainsi que Wanlin (4 chanteurs le 05.06) (RLi, JMo, MPa). **BRUANT ORTOLAN** (*Emberiza hortulana*) : 1 femelle capturée le 31.08 à Theux (ADx).

**GROSBEC CASSENOYAUX** (*Coccothraustes coccothraustes*) : parmi les observations au nord du sillon Sambre et Meuse, on relève particulièrement celle de 2 ex. le 07.06 à Mouscron (DH) où l'espèce est normalement absente. **CHARDONNET ELEGANT** (*Car-*

*duelis carduelis*) : la grande majorité des données provient des provinces de Namur-Luxembourg; les petites bandes s'étoffent en août, avec au plus 30 ex. le 02.08 à Latour (PPi) et le 30.08 à Pommerœul (CRBH). TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) : dans l'est de la province de Liège, des chanteurs sont localisés en juin à Elsenborn et Rocherath (Exc. Aves); apparition de jeunes à partir du 11.07 à Sourbrodt puis La Calamine (EDg); en août maximum 19 ex. le 27 à Heusy (LSc). Ailleurs, dix observations à partir du 03.07 dans les provinces de Namur et Brabant. LINOTTE MELODIEUSE (*Carduelis cannabina*) : deux observations à noter : un dortoir d'environ 4000 ex. à partir du 15.06 à Profondeville (MV) et un nid contenant 5 œufs, à terre dans un champ de pommes de terre le 03.08 à Rouveroy (AP). SIZERIN FLAMME (*Carduelis flammea*) : vol nuptial le 26.06 à Morhet (Lux.) (CGe). Les autres mentions proviennent, à l'exception d'un oiseau le 03.08 à Wavreille (MPa), de l'aire de reproduction de l'est de la province de Liège : fagnes de Malchamps et de la Baraque Michel, Elsenborn, Rocherath, Sourbrodt, Bütgenbach et Raeren; premiers jeunes volants le 11.07 (EDg, JDa, FHi, LSc,



*Beccroisé des sapins, juin 1974 (Photo Fr. le Hardy de Beaulieu).*



FVs, Exc. Aves). **SERIN CINI** (*Serinus serinus*) : indices de diminution à Pailhe, Huy et Boitsfort (RLi, MWa). **BECCROISE DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*) : amorcée fin mai, une invasion majeure, analogue à celle de 1973-74, se développe en juin. Au début de ce mois, les Beccroisés se rencontrent en Haute-Belgique, particulièrement dans l'est où ils sont déjà répandus par groupes de 2-20 ex.; des individus sont également signalés à Bonsecours et Beloeil, où un vol de 30 ex. est noté dès le 02 (JaE, JoE). Les observations se multiplient à partir des 18-20.06 avec dispersion accrue touchant entre autres le Namurois et le Brabant. La présence est généralisée en juillet-août; très nombreuses bandes comptant le plus souvent quelques individus, rarement plus d'une vingtaine. Au total, sans doute plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux. En dehors des conifères, ils sont aussi observés à la recherche de pucerons dans des pruniers à Longvilly ou notés dans des cerisiers à Mormont, dans des jardins à Heusy et Francorchamps en juillet, dans une hêtraie en août à Membach (ABI, JMDu, LSc, JD). Une diminution est rapportée par plusieurs observateurs liégeois courant août; à ce moment, l'espèce augmente par contre près de Bruxelles. Une synthèse plus complète sera publiée ultérieurement dans le Bulletin Aves. Enfin, on ne peut s'empêcher de mentionner ici la razzia effectuée par les tendeurs, en toute illégalité et impunité semble-t-il.

**LORIOT D'EUROPE** (*Oriolus oriolus*) : en dehors des zones les plus habituelles, une femelle le 01.06 à Bastogne, 1 chanteur les 10, 25 et 30.06 à Longvilly (ABI, FDI), 1 chanteur temporairement le 16.06 au Sart-Tilman (PDe), 1 chanteur les 08-09.06 à Ave-et-Auffe (MPa), 1 couple cantonné le 18.06 à Elsenborn (DE), 1 juvénile de passage le 21.08 à Boitsfort (MWa).

**CASSENOIX MOUCHETE** (*Nucifraga caryocatactes*) : la nidification a pu être confirmée cette année à Oignies-en-Thiérache : un nid contenant trois jeunes (PS, ED et PDa in Le Gerfaut 73 : 207-211; CJo, JaE, JoE, TDe). Nidification probable à Stoumont (CH), observations à Bra-sur-Lienne : 2 ex. le 26.06, 1 ex. le 24.07 et 1-2 ex. en août (BT, JT).