

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1984/1 DECEMBRE 1983, JANVIER, FEVRIER

par Michel PEERO ⁽¹⁾ et Laurent-Henri GEE ⁽²⁾

Elaboration du fichier : Michel PEERO et Laurent-Henri GEE.

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées pendant la période considérée.

A:	Anonyme	EC:	E. Clotuche	JJS:	J.J. Strykmans
ABI:	A. Blondlet	ED:	E. Delmée	JLc:	J. Leclercq
ADg:	A. Degros	EDg:	E. Degros	JLG:	J.L. Gillet
ADr:	A. Dernier	EVe:	E. Verhegghen	JMDu:	J.M. Daulne
ADu:	A. Delaunois	FDf:	F. Dufey	JMLa:	J.M. Lacheron
ADx:	A. Doneux	FH:	F. le Hardy de B.	JMLc:	J.M. Leprince
AGo:	A. Georges	FHa:	F. Halot	JMo:	J. Mois
AHd:	A. Houdart	FHe:	F. Hela	JMTe:	J.M. Testaert
AMo:	A. Monmart	FHi:	F. Hidvegi	J&N:	Jeunes & Nature
APr:	A. Périkel	FMr:	F. Maréchal	JPCq:	J.P. Coquette
AR:	A. Rappe	FRo:	F. Rosillon	JPJ:	J.P. Jacob
BB:	B. de Brier	FVs:	F. Vassen	JPR:	J.P. Reginster
BBa:	B. Beauvain	FXD:	F.X. Dupret	JPSc:	J.P. Scohy
BC:	B. Chiwy	GBf:	G. de Bellefroid	JPY:	J.P. Yernault
BCL:	B. Clesse	GOB:	Gr. Orn. Bastogne	JSe:	J. Sedek
BDe:	B. Deceuninck	GOR:	Gr. Orn. St-Roch	JVa:	J. Vandervelden
BI:	B. Iweins	GRa:	G. Rasson	JYS:	J.Y. Scohy
BVo:	B. Votron	HB:	H. Bedoret	LG:	L. Gée
CGe:	C. Geyer	HG:	H. Guerriat	LMe:	L. Mercier
CI:	C. Istasse	HMr:	H. Mardulyn	LN:	L. Noulard
CJo:	C. Joukoff	HSt:	H. Stiévenart	LSc:	L. Schmitz
CLf:	C. Lefèvre	JBl:	J. Bultot	LV:	L. Verroken
CLy:	C. Lemy	JBn:	J. van de Borne	MBa:	M. Baguette
CRBH:	C. Rech. Biol. Harchies	JCDe:	J.C. Dechamps	MC:	M. de Croy
CS:	C. Sturbaut	JDa:	J. Delarue	MCA:	M. Cantraine
CVa:	C. Vansteenwegen	JDe:	J. Delvaux	MCAr:	M.C. Archambeau
DCa:	D. Capart	JaE:	Ja. van Esbroeck	MDe:	M. Deroanne
DDe:	D. Demortier	JoE:	Jo. van Esbroeck	MGe:	M. Gérard
DE:	D. van der Elst	JF:	J. Fouarge	MI:	M. Ittelet
DH:	D. Hubaut	JFB:	J.F. de Bruyne	ML:	M. Loison
DLa:	D. Lafontaine	JFl:	J. Fleron	MMn:	M. Moncousin
DRa:	D. Rabosée	JGa:	J. Galley	MNB:	M.N. de Bellefroid
DV:	D. Voituren	JHo:	J. Houbart	MPa:	M. Paquay

Reçu le 18.09.1984. Accepté le 18.09.84

⁽¹⁾ Rue Marconi 86, B-1180 Bruxelles.

⁽²⁾ Rue de la Champignotte 5, B-4383 Aineffe-Faimes.

MPo: M. Peero	PD: P. Devillers	RHr: R. Herman
MRu: M. Rousseau	PDa: P. Dachy	RL: R. Lambert
MV: M. Vanderhoeven	PDe: P. Demaret	RLi: R. de Liedekerke
MWa: M. Walravens	PDh: P. Dahin	RML: R.M. Lafontaine
MWt: M. Wathelet	PDv: P. Deviche	RoP: R. Potvliege
NG: N. Goetghebeur	PGI: P. Gall Schuon	RT: R. Thomas
NP: N. Percy	PLI: P. Lamotte	SB: S. Baugniet
NPa: N. Paquay	PN: P. Neuray	SL: S. Lhoest
NR: N. Rasson	PO: P. Orban	SSo: S. Sorbi
NS: N. Storms	PPI: P. Pierre	TD: T. Duthoit
OB: O. Bourlon	PR: P. Remmerie	TDe: T. Dewitte
OM: O. Matgen	PS: P. Simon	TVn: T. Vandenput
PAn: P. Anrys	PSc: P. Schaeken	VD: V. Degrelle
PBW: P. du Bus de W.	PTe: P. Tellier	VU: V. Ugen
PC: P. Collette	PVda: P. Van Damme	YAm: Y. Amand
PCi: P. Croisier	PWt: P. Wyckaert	YF: Y. Fanon
PCI: P. Claerhout	RDC: R. De Coster	
PCs: P. Collas	RDt: R. Detaille	

C. Bolly, G. Chapelle, J.M. Couvreur, A. Daschelet, M. Du Houx, P. Duruisseau, H. de Faily, P. Ghysel, Th. Gridlet, J.M. Hacheron, J. Hupperetz, J.M. Kalbusch, F. Kelmis, A. Lachapelle, P. Lachapelle, J. et M. Le-bailly, M. Levaux, P. Loly, T. Mercenier, Th. Mersch, M. Moudart, P. Pimpurniaux, S. Ryelandt, Y. Somville, P. Spapen, Ch. Thilmany, G. Vanackere, D. Vancoppenolle, M.L. van Hammée, M. Winbels.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Hiver doux, sans réelle vague de froid, mais très pluvieux en janvier-février.

En décembre, les vents soufflent d'ESE à SW et leur vitesse est normale. On enregistre 10 jours de gelée, tandis que des maxima supérieurs à 10°C sont relevés les 24, 25 et 26. En général, les températures ainsi que les précipitations sont normales.

En janvier, un vent quelquefois violent de SW à W est enregistré durant la première quinzaine et a pour conséquence le maintien des températures relativement douces. Des pointes supérieures à 100 km/h sont enregistrées à Uccle les 03, 13 et 16 du mois. Du 19 au 28, le vent tourne au NE à E, entraînant des gelées nocturnes en de nombreuses régions; des gelées diurnes sont constatées jusqu'au 25 en Ardenne. Des chutes de neige ne sont observées dans tout le pays que du 22 au 26. Par contre, les pluies sont particulièrement abondantes.

En février, la nouvelle prédominance des vents de SW se maintient jusqu'au 10, après quoi ils s'orientent au secteur E jusqu'à la fin du mois, sans toutefois provoquer une diminution très sensible des températures. Dans la première décade, les maxima atteignent parfois 10°C dans certaines stations. A Uccle, le seul jour d'hiver survient le 15 (maximum inférieur à 0°C), avec 10 jours de gelée pour le mois. Les précipitations sont nettement excédentaires, localement doubles de la normale. L'épaisseur de neige reste faible en Haute-Belgique.

FAITS SAILLANTS

Conséquence du départ précoce de la plupart des migrateurs en automne 1983, la présence de certaines espèces dont l'aire de répartition hivernale est proche de nos frontières s'avère assez réduite, et cela malgré un temps aussi doux que l'hiver précédent, sans aucune vague de froid marquée. C'est le cas notamment de la Linotte mélo-

dieuse, de la Fauvette à tête noire, du Pouillot véloce, du Roitelet triple-bandeau et du Chevalier guignette. Par contre, l'Alouette lulu, le Rougequeue noir et le Milan royal s'attardent dans nos régions. On observe aussi de manière tout à fait inhabituelle le Pipit des arbres, la Bergeronnette printanière, le Merle à plastron et un Busard des roseaux hivernant dans la vallée de la Haine.

On constate en général une grande dispersion des effectifs, sans mouvements remarquables, particulièrement chez les oiseaux d'eau (Grèbe castagneux, Héron cendré, Foulque macroule, Bécassine des marais, anatidés), qui peuvent occuper des sites d'Ardenne, gelés au cours d'un hiver normal. Aucune concentration remarquable n'est à signaler.

Les nombres habituels de Harles bièvres et piettes ainsi que de Busards Saint-Martin, semblent indiquer que les déplacements de ces espèces ne sont pas directement liés aux conditions météorologiques. La rareté des chutes de neige favorise l'hivernage des Alouettes des champs, des Grives litornes et des Vanneaux huppés, et la sédentarité chez la Pie-grièche grise. L'hivernage des Pipits spioncelles est particulièrement fourni dans la vallée de la Dyle, ainsi que celui des Tadornes de Belon dans la vallée de la Haine. Le Sizerin flammé, par contre, demeure rare.

Après l'invasion des Beccroisés des sapins en automne, l'espèce se retire petit à petit, sauf en Haute-Belgique.

A signaler enfin, une première mention de Goéland à ailes blanches pour la Wallonie à Mont-Saint-Guibert, un Goéland bourgmestre au même endroit, des Cormorans huppés en Meuse (voir JACOB, 1984; JACOB et DECEUNINCK, 1984, dans ce même bulletin) et le retour attendu d'un Pygargue à queue blanche dans la vallée de la Dyle.

Pendant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 04, 11, 18 et 25.12; 01, 08, 15, 22 et 29.01; 05, 12, 19 et 26.02.

DETAIL DES OBSERVATIONS

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*)* : 1 ex. fin janvier à Dudzele-Zeebruges (nombreux observateurs). ■ PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*)* : 1 ex. du 02 au 07.01 à Gullegem (LV, JLC, DH) et le 19.02 à Warneton (MV).

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) : en décembre, la plupart des grèbes sont cantonnés d'une façon classique en Hainaut et en Brabant, avec un maximum de 60 ex. le 11 à Hofstade (FHi). Jusqu'au 20 janvier, l'importance des groupes varie peu; par la suite, on constate un certain afflux dû au refroidissement, avec notamment 69 ex. le 15.01 sur la Meuse de Liège à la frontière hollandaise et 100 ex. le 23 à Oost-Maarland (JDa, PSc); les concentrations maximales sont observées à la mi-février à Hofstade, avec 80 ex. le 11 (J&N), et à Harchies, avec 32 ex. du 13 au 19 (CRBH). Signalons deux données de Haute-Ardenne : 4 ex. le 30.12 à Bütgenbach (FVa) et 2 ex. le 25.02 à Coe-Stavelot

* Donnée soumise à la Commission d'Homologation, citée dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire *ad hoc* (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.

(PCs, BCl). ■ GREBE JOUGRIS (*Podiceps grisegena*)* : 1 ex. du 05 au 13.12 à Harelbeke (DH, JLe) et 1 ex. du 31.12 au 26.02 à Ploegsteert (DH, PCI, JLe, Exc. Aves). ■ GREBES-CLAVON (*Podiceps auritus*)* : 1 ex. du 25 au 29.01 à Warneton (DH, PCI). ■ GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) : l'hiver doux fixe l'espèce sur de nombreux plans d'eau et rivières de Wallonie et de Brabant : Hofstade, Weerde, Harelbeke, Warneton, Harchies, vallée de la Dyle, de la Meuse, de l'Ourthe et de la Semois. Ainsi 47 ex. sont comptés le 19.01 de Chassepierre à Tintigny (PPi). Renseigné sur quelques étangs d'Ardenne où sa présence est parfois constante au cours de l'hiver : Libramont, Freux, Orval, Bévercé, La Gileppe, Vielsalm, Trois-Ponts et Coo-Stavelot (RDt, PPi, JLG, JCDe, J. Hupperetz, LSc, PCs, BCl, NPa, MDe).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : des exemplaires isolés le 04.12 à Hofstade, du 27.12 au 07.01 à Jambes, le 11.02 à Fronville et le 19 du même mois à Nimy (Exc. Aves, YF, AMo, PDh, JMDu, CLf). Un exemplaire blessé hiverne à Harchies (CRBH, HB, VD). De plus, 2 ex. le 12.02 à Malines et 6 ex. le 19.12 à Harchies (JMLe, CRBH). ■ CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*)* : les observations en Meuse sont détaillées par JACOB dans ce même bulletin.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) : fort répandu dans toutes les régions. Les rassemblements les plus importants sont notés aux endroits habituels : 87 ex. le 26.02 à Oost-Maarland (DRa), 36 ex. le 14.01 à Hofstade (RoP, PN), 26 ex. le 22 du même mois à Huldberg (FHe). Une recrudescence d'effectifs est notée en janvier dans la région de Mons-Borinage (ADu). ■ GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*) : 1 ex. jusqu'à mi-janvier à Harchies-Hensies (CRBH, ML, JMTe), 1 ex. le 08.01 à Neerijse (Grote Bron) (JBn) et 1 ex. du 22.01 au 06.02 à Rosières (NR, GRa).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) : peu de concentrations importantes dépassant le millier d'exemplaires; retenons 3 à 4.000 ex. le 19.12 à Harelbeke (DH). En Haute-Ardenne, le temps doux retient des troupes de 410 à 434 ex. du 03 au 29.12 à Membach et 226 ex. le 31.12 à Eupen (LSc). ■ SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) : concentrées essentiellement dans la vallée de la Haine, sur différents étangs du Brabant, à Grand-Leez et à Gozée. Plusieurs rassemblements de plus de cent exemplaires sont constatés en décembre : un maximum de 320 ex. le 04 à Harchies-Pommeroeul (DH), 530 ex. le 04 à Saint-Ghislain (PAn), 132 ex. le 04 à Walem (Exc. Aves), 130 ex. le 24 à Vieux-Héverlée (EVe) et plus de 100 ex. le 02 à Grand-Leez où l'espèce se raréfie au cours du mois suite à la remise sous eau de l'étang (LSc, BDe). En janvier, la population diminue dans la vallée de la Dyle, tandis que Gozée héberge un maximum de 150 ex. le 15 (BB). En février, Harchies reste le seul site où les effectifs recensés dépassent la centaine d'individus : 300 ex. le 05 (PCs, BCl). ■ CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) : 25 ex. hivernent à Harchies (CRBH, D. Vancoppenolle, VD, ML, DH, HB, Exc. Aves) et un autre groupe important de 20 à 27 ex. séjourne en février à Ploegsteert (DH). Ailleurs : un maximum de 12 ex. le 06.01 à Walem (PCI), 3 mâles et 2 femelles en décembre à Harelbeke (DH), 2 ex. le 11.02 à Hofstade (FHi) et 1 ex. en février à Roly (MI). ■ CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) : l'hivernage est remarqué principalement à Malines, où les effectifs passent de 7 ex. le 04.12 (Exc. Aves) à 15 ex. le 06.01 (PCI) et 26 ex. le 11.02 (J&N), ainsi qu'à Harchies avec un maximum de 14 ex. le 19.02 (ML); 10 ex. sont notés le 23.01 à Oost-Maarland (JDa) ainsi qu'à Walem le 11.02 (J&N). Neuf autres sites de Moyenne-Belgique hébergent de 1 à 5 ex. (BDe, FHe, CGe, DH, DRa, LSc, JPI, FXD). Enfin, une observation en Lorraine belge : 3 ex. le 28.12 à Latour (JLG). ■ CANARD PILET (*Anas acuta*) : en décembre et en janvier, l'espèce est surtout renseignée dans les vallées de la Dyle et de la Haine où Saint-Ghislain constitue le site le plus fréquenté, avec 4 mâles et 2 femelles le 18.12 puis 5 mâles et 2 femelles du 07 au 15.01 (PAn, ADu); 1 à 3

ex. durant ces deux mois à Harchies, Vieux-Héverlée, Malines, Walem et Ploegsteert. En février, au plus 8 ex. le 25 à Neerijse (CGe) et 7 ex. le 12 à Walem (JMLe). ■ **CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*) : concentration classique des effectifs sur les étangs de la vallée de la Haine, à Machelen et à Walem; des isolés ou des groupes de moins de 10 individus sont observés sur onze autres sites de Moyenne-Belgique. Les marais d'Harchies-Pommerœul accueillent le principal rassemblement : 150 à 200 ex. en décembre (ML) et une petite centaine d'individus y reste présente en janvier-février (CRBH, VD, PCs, BCl, A. Lachapelle, ML, HSt). A Saint-Ghislain, aucun souchet n'est observé début décembre (étang gelé), mais les effectifs se reforment progressivement avec 60 ex. le 30.12, 88 ex. le 07.01 et 115 ex. le 15 du même mois (PAn). ■ **NETTE ROUSSE** (*Netta rufina*) : une seule donnée : 1 mâle, peut-être échappé de captivité, les 14 et 18.01 à Habbay-la-Neuve (JLG, PPI). ■ **FULIGULE MILOUINAN** (*Aythya marila*) : une femelle immature présente tout décembre à Warneton (PCI, Exc. Aves, DH) et 1 mâle le 15.01 à Gedinne (MV). ■ **FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*) : les plans d'eau du Brabant et du Hainaut réunissent la majeure partie des hivernants avec des concentrations maximales de 30 à 90 ex. De 30 ex. en décembre, la population d'Harchies s'élève à 50 ex. en janvier et se stabilise en février avec cependant 66 ex. le 17.02 (CRBH, VD, DH, ML), sans qu'il y ait de désertion due au froid. Un schéma sensiblement identique est observé à Hofstade (Exc. Aves, FH, RoP, PN, BDe) avec néanmoins une décroissance dès la mi-février. L'hivernage dans la vallée de la Meuse d'Yvoir à Oost-Maarland compte 100 ex. lors du recensement hivernal du 15.01 (RL, JPR, PTe, ADr, PO, JDa, PSc, P. Loly) tandis que sur l'Ourthe, on ne recense qu'1 mâle et 1 femelle de Chênée à Comblain-au-Pont (PDe). ■ **FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*) : bien représenté dans toutes les régions de Wallonie jusqu'en Haute-Ardenne et en Lorraine où huit sites abritent de 1 à 5 ex. (FVa, LSc, JLG, AGo, MDe, JCDe, MPa, JMo, MWt, PPI, OM, PCs, BCl). Des regroupements pour lesquels il est difficile de suivre l'évolution sont observés fin décembre à Neerijse (139 ex.) et Walem (232 ex.); 125 ex. le 15.01 à Nimy (DV). La population d'Harchies, assez faible début décembre, s'élève à 150 ex. dès le 12 et atteint 250 ex. durant la dernière décade. Elle ne variera plus durant le reste de l'hiver et ne sera pas influencée par le refroidissement de fin janvier; ce dernier provoque par contre le départ des milouins de l'Île Monsin à Liège mais une augmentation de l'effectif à Oost-Maarland : environ 120 ex. la première quinzaine de janvier, 500 ex. le 23.01 (JDa), 700 ex. le 04.02 et 800 le 16 du même mois (JDa). ■ **FULIGULE NYROCA** (*Aythya nyroca*) : * 1 femelle le 11.12 et 1 mâle le 05.02 à Harelbeke (DH, Exc. Aves). ■ **GARROT A ŒIL D'OR** (*Bucephala clangula*) : hivernage remarqué tout le trimestre à Harchies : 1 mâle et de 2 à 13 femelles (Exc. Aves, CRBH, DV, ML, A. Lachapelle). Ailleurs, 1 mâle, 3 à 4 femelles et 1 à 3 immatures aux barrages de l'Eau d'Heure (CLy, CI, JPJ, CLe, OB); 1 à 2 ex. du 15.01 au 16.02 à Oost-Maarland (JDa) et, en Haute-Ardenne, 3 à 4 femelles tout décembre au barrage de la Gileppe (LSc). Des isolés le 28.01 à La Hulpe (NR, GRa), le 15.01 à Nimy, le 12.02 à Rhode-Sainte-Agathe (NG), le 20.02 à Harelbeke (DH) et le 25.02 à Ittre (Zennegroen 1984, n° 4 : 71). ■ **MACREUSE BRUNE** (*Melanitta fusca*) : 1 femelle du 30.12 au 04.01 à Pommerœul (J. et M. Lebailly) et 4 individus le 15.01 à Oost-Maarland (JDa, PSc). ■ **HARELDE DE MIQUELON** (*Clangula hyemalis*)* : 1 mâle immature est présent du 08.01 au 05.02 sur la Meuse, à l'Île de Godinne (RL, AMo, JPR, PLt, JPJ *et al.*). ■ **EIDER A DUVET** (*Somateria mollissima*) : deux femelles hivernent du 29.12 au 04.02 au barrage de la Gileppe à Membach (LSc, JCDe) et une femelle est observée les 07 et 28.01 à Weerde (RML, DLa, MBa, JaE, JoE). ■ **HARLE BIEVRE** (*Mergus merganser*) : présent dans les zones classiques d'hivernage : 3 à 7 femelles et 2 mâles durant le trimestre à Harchies (CRBH, ML, DV, VD, DH, A. Lachapelle), de 1 à 3 mâles et de 6 à 11 femelles dès janvier aux barrages de l'Eau d'Heure (CLy, CI, JPJ, OB), 2 à 5 mâles et 2 à 7 femelles à Oost-Maarland (LG, JDa, PSc, DRa). Autres données : 2 femelles le 11.12 à Nimy (DV), 3 femelles le 06.01 à Walem (PCI), 2 femelles le

15.01 à Gozée (BB), 1 femelle le 21 du même mois à Rhode-Sainte-Agathe (BVo), 1 femelle du 07.01 au 15.02 à Weerde (RML, DLa, JaE, JoE, MBa, J&N, RoP, PN). Enfin, 1 femelle le 05.02 sur la Meuse à Beez (LSc). ■ HARLE PIETTE (*Mergus albellus*) : hivernage de 1 à 2 mâles et d'un maximum de 10 femelles à Harchies (CRBH, ML, DV, DH, D. Vancoppenolle, A. Lachapelle), de 2 femelles dès le 15.01 aux barrages de l'Eau d'Heure (CI, CLy) ainsi que de 2 à 5 mâles et de 6 à 7 femelles à Oost-Maarland (NPa, JDa, PSc, DRa). En janvier, 2 femelles le 06 à Walem et 1 femelle le même jour à Malines (PCl) et enfin 1 ex. à l'Île des Béguines de Gives (PTe). En février, encore 1 mâle et 1 femelle le 11 à Walem (J&N) et 1 mâle et 3 femelles le 22 à Hofstade (Zennegroen 1984, n° 4 : 71). ■ TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) : l'hivernage de l'espèce est particulièrement fourni à Saint-Ghislain où jusqu'à 34 ex. sont notés ensemble le 30.12, 39 ex. le 30.01 et 30 ex. le 20.02 (PAn); 3 à 15 ex. sont également présents tout l'hiver à Harchies (DV, ML, CRBH, DH, D. Vancoppenolle, HB, VD). De 1 à 7 ex. fréquentent les étangs de la Dyle jusqu'au 05.02 (FHa, FHi, HW, JCDe, JFB, JBn, PWt, FHe, PN, MWa). En décembre, 13 ex. sont notés le 04 à Walem (Exc. Aves), 6 ex. le 28 à Ploegsteert (DH), 3 ex. le 30 au lac de Bambois (AHo). En janvier, 1 femelle le 19 à Péronnes et 1 ex. le 29 à Hérinnes (JPCq), 2 femelles le 25 à Ploegsteert (DH) et 5 à 8 ex. du 03 au 15 à Gozée (VD, BB). Une donnée ardennaise : 1 ex. le 03.12 à Membach (LSc).



Garrot à œil d'or - femelle, Texel, décembre 1982 (Photo B. Houziaux).

OIE CENDREE (*Anser anser*) : 4 ex. passent encore vers le sud-est le 23.12 à Grand-Leez (LSc). En janvier-février, 4 ex. le 07.01 à Weerde (RML, DLa, MBa), 1 ex. le 01.02 à Oost-Maerland (JDa) et 6 ex. le 12.02 à Malines (JMLe). ■ **OIE RIEUSE** (*Anser albifrons*) : un immature le 25.01 à Rosières (NR, GRa). ■ **OIE DES MOISSONS** (*Anser fabalis*) : 14 ex. en vol les 21 et 23.12 à Harchies (CRBH) et 3 ex. hivernant à Armentières (France) depuis le 01.12 sont observés à Ploegsteert le 11 du même mois (DH). Enfin, donnée peu commune, une mention ardennaise : 1 ex. le 19.01 au barrage de la Vierre à Suxy (PPi). ■ **OIE SP.** (*Anser sp.*) : en décembre, 16 ex. en vol le 03 à Nimy et 24 ex. « erratiques » le 28 à Harchies (DV, ML). En janvier, un vol de 70 ex. est aperçu le 17 à Hemptinne-Philippeville (CLy); en février, 4 ex. en vol le 17 à Harchies, 6 ex. le 11 à Ath et 38 ex. vers le nord le même jour à Renaix (CRBH, JPY, G. Vanackere). ■ **CYGNE DE BEWICK** (*Cygnus bewickii*) : dans la vallée de la Dyle, 2 adultes et 2 immatures sont présents le 31.12 à Rhode-Sainte-Agathe et le 07.01 à Neerijse (FHe, MWa, JFl, MPo); en outre, 2 ex. le 15.01 à Gozée (BB).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) : de 15 à 20 ex. sont notés les 26, 27 et 28.01 au nourrissage de Meyerode (Wallerode) (HWe). YF constate un apport d'hivernants pouvant se rapporter aux premiers déplacements : 15 ex. les 18 et 19.02 à Bomal et 7 à 8 ex. ce même 19 à Izier-Ozo. ■ **BUSE PATTUE** (*Buteo lagopus*)* : 1 ex. le 21.01 à Dhuy (LSc). ■ **AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*) : bien renseigné en général; 7 données d'isolés proviennent du nord du sillon Sambre-et-Meuse : Grand-Leez le 23.12 et Nil-Saint-Vincent le 28.12 (LSc), Neerijse le 23.12 (FHa), Rhode-Sainte-Agathe les 23 et 24.12 (FHi, PN), Walhain Saint-Paul le 30.12 (BDe), Pommeroeul le 20.01 (ML) et Woluwe-Saint-Pierre le 09.02 (CGe). ■ **EPERVIER D'EUROPE** (*Accipiter nisus*) : à nouveau fort répandu cet hiver avec un total de 175 données réparties sur l'ensemble du trimestre. ■ **MILAN ROYAL** (*Milvus milvus*) : l'hivernage en Wallonie de cette espèce se confirme d'année en année. Décembre totalise 7 observations mais celle d'un ex. volant vers le sud le 10 à Sterrebeek (FH), par exemple, doit de nouveau attirer notre attention sur la difficulté à discerner les migrateurs tardifs des réels hivernants. Quatre données en janvier dont deux fois deux exemplaires et 17 données en février, dont certaines se rapportant aux premiers migrateurs observés dès la dernière décade en Ardenne et en Lorraine (C. Bolly, JGa, BBa, MPa, ADx, HWe). ■ **MILAN NOIR** (*Milvus migrans*) : deux mentions d'hivernants : 1 ex. le 17.12 à Bruxelles (PWt) et une autre au vol le 26.02 à Suarlée (Namur) (FHe). ■ **PYGARGUE A QUEUE BLANCHE** (*Haliaeetus albicilla*)* : 1 immature du 04.12 au 14.01 dans la vallée de la Dyle (nombreux observateurs). ■ **BUSARD DES ROSEAUX** (*Circus aeruginosus*) : une femelle hivernante observée du 18.12 au 24.01 aux Marionville (Saint-Ghislain) puis à Harchies (PAn, ADu, CRBH). Comme pour le Milan noir, la présence de cette espèce reste exceptionnelle en hiver dans nos régions. ■ **BUSARD SAINT-MARTIN** (*Circus cyaneus*) : 39, 42 et 21 données pour chaque mois d'hiver, enregistrées principalement en Hesbaye, en Hainaut et en Condroz où les hivernages concernent toujours de 1 à 3 individus; même le dortoir de Lagland ne semble pas en héberger plus. Les données de Haute-Ardenne ne concernent que 5% des observations.

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) : 13 données d'isolés. L'hivernage d'un mâle est noté à Harchies (ML, CRBH). En décembre, 1 mâle le 21 à Wervicq (DH), 1 ex. le 21 à Lamontzée (Cva), 1 femelle le 30 à Walhain Saint-Paul (BDe). En janvier, 1 femelle le 09 à Gembloux (LSc), 1 mâle le 17 à Niverlée (TD), 1 femelle le 20 à Polleur (LSc). Enfin, en février : 1 ex. le 07 à Béciers (PDa), 1 ex. les 11 et 12 à Vance (JGa), 1 femelle le 19 à Pommeroeul (ML) et 1 mâle le 29 à Berg (Zennegroen 1984, n° 4 : 71).

TETRAS LYRE (*Tetrao tetrix*) : 6 mâles et 2 femelles le 18.12 en Fagne Wallonne

(FHe) et 1 mâle et 2 femelles régulièrement du 18.12 au 18.02 dans les Fagnes de l'Est (JCDe). A Elsenborn, 10 coqs et 5 poules le 11.02 et 10 coqs le 18.02 (RHr).

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) : quelques exemplaires, le plus souvent isolés, sont signalés à Plogsteert, Rosières, Harchies, Strépy-Bracquagnies, Grand-Leez, dans la vallée de la Dyle et la région bruxelloise (DH, NR, GRa, ML, CRBH, PPM, BDe, JaE, JoE). En Haute-Belgique, 1 ex. hiverne du 01.12 au 29.02 à Stavelot (NPa), 1 ex. le 04.12 à Attert (OM) et 1 ex. tué le 26.02 à Bouillon (JMo). ■ **FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*)** : grâce au temps doux, plusieurs groupes relativement importants séjournent sur quelques plans d'eau d'Ardenne : 77 et 84 ex. les 23 et 25.12 à Orval (PPI, JLG), 53 ex. le 15.01 à Bévercé (J. Hupperetz) et 120 ex. le 26.02 à Freux (FRo). Les recensements effectués sur les cours d'eau fournissent 175 ex. sur la Meuse de Huy à Andenne, 746 ex. toujours sur la Meuse de Liège à la frontière hollandaise et 139 ex. sur l'Ourthe de Chênee à Comblain-au-Pont (JDa, PSc, PDe).

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) : la première quinzaine de décembre semble marquée par la rareté des effectifs hivernants, ceux-ci ne dépassant que rarement la centaine d'individus. Dès la fin du mois et jusqu'au 20 janvier, des groupes importants se reforment : 900 ex. le 28.12 à Walhain-Saint-Paul (LSc), 1.500 ex. le 29.12 à Temploux (CLy), 1.070 ex. les 14 et 15.01 à Nivelles (TDe, JHo, M. Du Houx, PVD), 1.000 ex. le 15.01 à Saint-Ghislain (PAn). Le refroidissement de fin janvier entraîne la disparition des groupes importants. En février, alors que les retours aux sites de reproduction sont enregistrés le 19 à Juseret (RDt), quelques groupes de 5 à 700 ex. sont encore observés à Harchies, Court-Saint-Etienne et Beuzet (PCs, BCl, FHe, LN). ■ **PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*)** : signalé uniquement en Brabant et dans le nord de la province de Namur. Les groupes les plus fournis comptent 100 ex. les 14 et 15.01 à Nivelles (TDe, JHo, M. Du Houx, PVD), environ 50 ex. vers le SSE le 01.12 à Gembloux (LSc), environ 55 ex. le 19.01 à Boneffe (PLt) et 40 ex. posés le 20.01 à Herseaux (M. Winbels).

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) : relativement bien renseignée surtout dans les vallées de la Haine et de la Dyle, ainsi que dans quelques sites du Namurois. Les groupes dépassent rarement la dizaine d'individus ; à signaler, un maximum de 29 ex. les 23 et 24.12 à Vieux-Héverlée (EVe, BVo), 14 ex. le 02 du même mois à Grand-Leez (BDe) et 35 à 40 ex. les 17 et 28.02 à Harchies (CRBH). Sept données en provenance d'Ardenne et de Lorraine, dont cinq en décembre. ■ **BECASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*)** : en janvier, 1 ex. le 07 à Woluwe-Saint-Etienne (RML, DLa, MBa) et 1 ex. les 07 et 14 à Berg (Zennegroen 1984, n° 4 : 71). ■ **BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*)** : des individus isolés sont renseignés en décembre à Vieux-Héverlée, Harelbeke, Mouscron, Gosselies, Marneffe et Namur (JMLe, DH, JBl, CVa, J.M. Hacheron) et en janvier et février à Bierbeek, La Hulpe, Vieux-Héverlée, Mellery, Mouscron et Neerijse (FHe, DCa, JFI, MWa, MPo, PLt, JMTe). A noter cependant 4 ex. le 26.02 à Vieux-Héverlée (MWa) et, surtout un groupe de 9 ex. le 31.12 à Huccorgne (MNB, GBf). ■ **COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*)** : 8 mentions dont une en Ardenne : Izel-Moyen, 1 ex. au bord de la Semois le 11.12 (MGe). Ailleurs, des isolés à Harchies, aux barrages de l'Eau d'Heure, à Nivelles et Warcoing (ML, CI, TDe, JHo, M. Du Houx, PVD, JMTe) ainsi que 8 ex. le 24.12 à Oost-Maerland (NPa), 4 ex. le 15.01 à Gaurain-Ramecroix (JPCq) et enfin 6 ex. les 13, 18 et 19.02 à Seilles (PTE). ■ **CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*)** : 4 ex. le 29.01 à Neerijse (PWT). ■ **CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*)** : la majorité des données sont fournies en décembre, en provenance principalement de la vallée de la Dyle et de cinq sites hennuyers. Elles concernent toutes de 1 à 3 individus, sauf 5 ex. le 17 à Rhode-Sainte-Agathe et 4 ex. le 24 à Vieux-Héverlée (MWa, BVo, EVe). En janvier et février, 17 fois 1-2 ex., excepté 5 ex. le 15.02 à

Wagnelée (BDe). Quatre observations d'isolés proviennent de Lorraine : Latour et Sterpenich en décembre-janvier (JLG, PPi) et Termes en février (MGe). ■ BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) : un individu du 23 au 26.12 à Vieux-Héverlée (FHa, HW). ■ CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) : 1 ex. est présent sur la Lys du 11 au 19.02 entre Lauwe et Menin (JMTe).



Goéland argenté juvénile, Texel, décembre 1982 (Photo B. Houziaux).

GOELAND MARIN (*Larus marinus*) : quelques données de 1 à 4 oiseaux en décembre et janvier à Hofstade, Walem, Vilvorde, Harchies-Pommeroeul, Gaurain-Ramecroix, Péronnes et Cherq-Antoing (Exc. Aves, PD, CRBH, JPCq, DH). Un peu plus nombreux à Harelbeke : de 7 à 12 adultes et de 1 à 3 immatures en décembre-janvier (DH). ■ GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) : présence devenue classique en Brabant, en Hainaut et dans le sud de la Flandre occidentale. De 2 à 7 adultes sont observés en décembre-janvier à Harchies (ML, CRBH, D. Vancoppenolle) ainsi qu'à Cherq-Antoing où 30 à 50 ex. sont vus dans le courant de décembre et 13 ex. à la mi-janvier (DH, DDe). ■ GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) : aucun groupe vraiment important n'est renseigné. Présence de 5 à 600 ex. en janvier à Harchies (CRBH). Sur la Meuse, plusieurs centaines d'individus sont comptés de Huy à Andenne le 15.01 (ADr, PO) et environ 600 ex. sont présents le 05.02 à la nouvelle écluse d'Andenne (PTE); cette concentration nouvelle s'explique par le développement d'un important dépôt d'immondices à Sclayn. Enfin, retenons 1 adulte et 1 immature le 24.02 à Coo-Stavelot (A. Daschelet) et 2 ex. le 07.01 à Henri-Chapelle (F. Kelmis). ■ GOELAND BOURGMESTRE (*Larus hyperboreus*)* :

1 ex. le 10.02 à Mont-Saint-Guibert (SB, SL, FHi) ■ GOELAND A AILES BLANCHES (*Larus glaucooides*)* : 1 ex. du 04 au 10.02 à Mont-Saint-Guibert (JPJ, SB, SL, FHi) (voir article dans ce même bulletin). ■ GOELAND CENDRE (*Larus canus*) : assez bien représenté en Brabant, en Hainaut et dans le bassin de la Meuse. Des isolés ou des petits groupes sont observés un peu partout en Hesbaye en janvier-février, indépendamment des Mouettes rieuses; ce phénomène semble assez neuf (JPJ). D'autres rassemblements restreints sont observés en décembre à Hofstade et à Walem, en janvier à Gastuche, Nimy et Ploegsteert et en février à Walhain, Basse-Wavre et Hofstade (Exc. Aves, CVa, ADu, DH, BDe, FHe, BVo); environ 100 ex. à la fin du mois à Harchies (ML), 50 ex. le 15 à Péronnes et à Cherq-Antoing (DH) et 100 ex. le 23.02 à Seilles (Pte). ■ MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) : un ex. recueilli épuisé le 15.01 à Gaurain-Ramecroix (PDa, PS, ED, PR, MC).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : des groupes sont surtout renseignés dans la province de Namur : environ 50 ex. le 14.12 à Gembloux et à Liernu (LSc), 60 ex. le 27.12 à Grand-Leez et un maximum de 85 ex. le 27.01 à Dhuy-Rion (JPJ). En région bruxelloise et dans la Dyle, 501 individus sont recensés le 07.01 (nombreux observateurs); en pays hennuyer, 40 ex. le 14.01 à Thulin (ML). En février, alors que les premiers chants sont entendus le 04 à Woluwe-Saint-Pierre, le 10 à Wavreille et le 11 à Flobecq (G. Chapelle, S. Ryelandt, MPa, MMn), 33 ex. sont encore observés le 04 à Ottignies et 50 ex. le 20 à Ernage (BDe). ■ PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) : l'hivernage assez important est illustré par des rassemblements en janvier et février dans l'Entre-Sambre-et-Meuse : 1.000 ex. le 25.01 à Gerpennes (CLy), 2.000 ex. le 09.01 à Mettet (JBI), 2.000 également le 26.02 à Biesme (CLy) et plusieurs milliers le mois à Fosses-la-Ville (M. Moudart). Les passages semblent reprendre dès le 05.02 à Pailhe (RLi).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) : quelques dortoirs sont renseignés : 7 ex. le 11.12 à Saint-Mard (TVn), 4 à 7 ex. en décembre et janvier à Mouscron (DH), 8 ex. le 07.01 à Evere (SL, NS), 6 ex. le 06.02 à Zemst-Spuikom (Zennegroen 1984, n° 4 : 71), de 4 à 6 ex. du 09 au 21.01 à Mormont (JMDu) et enfin, le plus important, 23 ex. dans des mêlèzes le 28.01 à Manhay (JPCq). ■ HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) : signalé seulement en Hesbaye : 2 ex. le 29.12 à Othée (MGe) et 1 ex. du 06 au 10.02 à Lamontzée (LG, CVa).

MARTIN-PECHEUR (*Alcedo atthis*) : 79 données réparties sur les trois mois, dont seulement 8 en provenance d'Ardenne; notons 6 ex. en janvier à Harchies (ML).

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) : observations brabançonnaises : 1 ex. les 07, 14 et 15.12 à Rhode-Sainte-Agathe (FHa), 2 ex. le 07.01 à Elewijt (JaE, JoE, J.M. Couvreur), 1 ex. le 29.01 à La Hulpe (NR, GRa), 1 ex. le 22 du même mois à Boitsfort et Nethen (NG, DCa) et à nouveau 1 ex. le 09.02 à Elewijt (Zennegroen 1984, n° 4 : 72). ■ PICEPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) : espèce signalée presque uniquement en Brabant et dans une bien moindre mesure en Hainaut; une seule donnée au sud du sillon Sambre-et-Meuse : 1 ex. le 08.12 à Mormont (JMDu).

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) : seulement 1 ex. signalé dans la région bruxelloise les 26.12 et 07.02 à Woluwe-Saint-Pierre (T. Mersch, JaE, JoE). ■ ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) : fait assez rare, un petit hivernage est décelé à Uccle-Linkebeek (4 ex.) et dans la région liégeoise (CJo, CVa, MNB, GBf, LG, JDa), où l'on compte un maximum de 7 ex. le 28.01 à Dalhem (JDa). ■ ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) : le temps doux favorise un hivernage important, notamment en Hesbaye (LSc, BDe); à la suite des chutes de neige, un certain départ se manifeste cependant du 15 au 25.01 (TD, LSc, MV). Les premiers chants surviennent dès le début de février, les retours sont très progressifs et aucun groupe important n'est noté au cours du mois.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) : une observation de 2 ex. se rapportant à cette espèce le 14.02 à Ghlin (YAm). ■ **PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*)** : présent dans toutes les régions en groupes de maximum 30 ex., excepté la concentration remarquable de Latour : 250 à 300 ex. le 10.12 et environ 150 ex. le 09.01 (PPi). Il se raréfie à partir de la fin janvier. ■ **PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*)** : en décembre et janvier, l'espèce est surtout signalée dans la vallée de la Dyle et sur le plateau avoisinant, avec des nombres encore élevés de 46 ex. le 04.12 à Leefdaal et de 40 ex. au dortoir le 21.12 à Pécrot (Mwa, FHa). Un autre groupe de 41 ex. est noté le 08.01 à Hensies-Pommeroeul (ML); environ 5 ex. séjournent également en janvier à Rosières (NR, GRa). En février, l'effectif hivernant de la vallée de la Dyle augmente encore, avec un maximum de 141 ex. le 19 au dortoir de Vieux-Héverlée (Mwa). Signalons quatre observations à l'est de la Meuse : encore 5 ex. le 10.12 à Latour (PPi), 1 ex. le 01.01 à Membach (LSc), le 19.02 à Vaux-sur-Sûre (RDt) et 1-2 ex. de novembre à fin février à Herve (EC); sept autres données de 1 à 3 ex. proviennent de Moyenne-Belgique. ■ **BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*)** : une quarantaine de données d'hivernage, dont cinq concernent la Haute-Belgique (FMr, BI, DRa, PPI). En décembre et janvier, il s'agit de groupes de 5 ex. au maximum, mais quatre bandes plus importantes sont notées dans les deux premières décades de février : 22 ex. le 04 à Hofstade (BVo), 15 ex. le 09 à Oost-Maarland (JDa), 17 ex. le 12 à Malines (JMLe) et 20 à 30 ex. le 19 à Mont-Saint-Guibert (PN). Le passage de retour ne s'amorce réellement que dans la dernière semaine du mois (YF, JMö, BI, JLG, C. Bolly). ■ **BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava*)** : deux mentions exceptionnelles en février dans le Tournais : 1 ex. le 05 à Braffe et le 29 à Baugnies (MC). ■ **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*)** : 36 données concernent l'hivernage classique en Moyenne-Belgique, mais l'espèce est peu signalée dans le nord du Hainaut. Sa présence est détectée pendant toute la période dans plusieurs localités de Gaume et d'Ardenne, y compris dans l'est : Bütgenbach, Membach et Heusy (FVa, LSc, HWe).

PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*) : au nord du sillon Sambre-et-Meuse, elle est présente en décembre et février dans la vallée de la Dyle, en décembre dans le nord du Hainaut et en janvier-février dans la région bruxelloise (FHe, FHa, FHi, Mwa, HW, PAn, DDe, PN, RoP, T. Mersch, JaE, JoE). Une quarantaine d'autres données concernent principalement les lieux de reproduction de Haute-Belgique, où une stricte sédentarité est parfois mise en évidence : par exemple, 1 ex. sur son site de nidification tout l'hiver à Villers-la-Bonne-Eau (RDt). Déjà un couple en parade le 22.02 à Longvilly (ABl, FDF).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) : trois chanteurs en décembre à Pailhe, Harchies et Genappe (RLi, ML, JPI). Le seul groupe important d'hivernants compte 40 ex., le 14.01 à Oost-Maarland (MNB, GBf). Les chants reprennent brusquement le 01.02 et des passages sont notés dans la première quinzaine du mois. ■ **GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*)** : les groupes sont peu fournis en décembre, sauf dans le Luxembourg; l'espèce reste assez rare dans la région de Mons-Tournai jusqu'au 22.01 (DH, HSt, MMn, CRBH). Un premier afflux est noté du 03 au 05.01 à Dolhain (ADg, EDg) et le 05 à Arlon (PPi), mais c'est surtout du 22 au 31.01 que l'on observe une fuite massive devant les chutes de neige, avec des maxima de plusieurs milliers d'individus le 25 à Harchies (CRBH) et de 20.000 ex. passant le 26 à Profondeville (MV). En janvier, l'abondance est exceptionnelle en Gaume (PPi). En février, l'espèce demeure très abondante, avec une plus grande dispersion des effectifs, et le retour se généralise dans la région de Bastogne après la fonte des neiges (RDt, ABl, FDF). ■ **GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*)** : des isolées sont notées en décembre et janvier, principalement en Hesbaye et dans la région

bruxelloise (JPJ, LSc, EVe), sauf 16 ex. le 03.01 à Auderghem (FHe). Quelques observations proviennent cependant de l'est de la Meuse : 1 ex. les 12, 14 et 15.12 à Mormont (JMDu), le 30.12 à Polleur, les 03.01 et 11.02 à Wegnez (LSc) et tout janvier à Forrières (MPa). Plusieurs chanteurs dès le 24.12 à Woluwe-Saint-Lambert (JaE, JoE) et un autre le 31.01 à Mouscron (DH). Les retours débutent dans la première décade de février, les chants devenant alors assez fréquents. A signaler, une bande mixte de litornes et de musiciennes, d'environ 250 ex., le 25.02 à Polleur (ADx). ■ **GRIVE MAUVIS** (*Turdus iliacus*) : les groupes les plus fournis sont rencontrés dans la région bruxelloise : 150 ex. les 31.12 et 15.01 à Woluwe-Saint-Pierre (T. Mersch) et 200 ex. le 18.01 à Auderghem (FHe); en outre, 150 ex. le 04.02 à Sainte-Marie (JLG). Sa rareté relative est signalée à Uccle, Bomal, Lamorteau, Mormont et Rochefort (CJo, YF, PPI, JMDu, MPa). Elle paraît absente de la région de Verviers en décembre et de l'Entre-Sambre-et-Meuse en janvier (LSc, JBI). ■ **MERLE A PLASTRON** (*Turdus torquatus*) : une femelle le 17.12 à Seloi-gnes (Y. Somville). ■ **MERLE NOIR** (*Turdus merula*) : un mâle transportant des matériaux pour le nid le 27.01 à Uccle (HW). Les premiers chanteurs sont entendus le 30.01 à Woluwe-Saint-Lambert (NG), le 31.01 à Woluwe-Saint-Pierre (JaE, JoE) et le 08.02 à Lobbes (APr). ■ **TRAQUET PATRE** (*Saxicola torquata*) : une femelle hiverne à Harchies, où un mâle et une femelle sont notés le 08.02 (CRBH, ML, LV, Exc. Aves, D. Vancoppenolle). ■ **ROUGEQUEUE NOIR** (*Phoenicurus ochruros*) : en décembre, 1 ex. le 04 à La Gleize (LSc) et le 11 à Bomal-sur-Ourthe (YF), 1 mâle et 1 femelle le 11 à Cerfontaine (CLY, OB) et 1 femelle le 23 à Neerijse (FHa); 1 femelle le 17.02 à Saint-Léger (Lux.) (C. Thilmany). ■ **ROUGEGORGE** (*Erithacus rubecula*) : premiers chants le 22.02 à Vance, le 28 à Stavelot et le 29 à Lobbes (JGa, NPa, APr).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) : à Harchies-Hensies, 1 chanteur en décembre-janvier et 2 chanteurs en février (DH, ML, JMTe, CRBH). ■ **FAUVETTE A TETE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*) : 1 mâle du 23.12 à fin janvier à Bilstain (ADg, EDg), 1 ex. du 01 au 14.01 à Bastogne (MCAR) et le 01.02 à Ferrières (GOR), 1 mâle le 28.02 à Auderghem (FHe). ■ **POUILLOT VELOCE** (*Phylloscopus collybita*) : quelques hivernants à Harchies en décembre et 1 ex. le 29.01 (DV, ML, DH, HB); 1 ex. le 04.12 à Lessines (MMn) et le 28.12 à Ploegsteert (DH). Dans la région de Burdinne, 1 ex. le 22.12 et présence de 1 à 4 ex. en janvier (CvA). Trois données de février : 1 ex. le 11 à Ath (JPY), les 16 et 17 à Woluwe-Saint-Pierre (Zennegroen 1984 n° 4 : 73) et le 22 à Marcinelle (CI). ■ **ROITELET TRIPLE-BANDEAU** (*Regulus ignicapillus*) : 14 données d'isolés, sauf 5 ex. le 14.12 à Forest (FHe), dont une seule en Haute-Belgique : 1 ex. le 29.12 à Mormont (JMDu).

MESANGE A MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*) : à Harchies, 1 ex. le 30.12, de 2 à 5 ex. en janvier et 1 mâle début février (HB, CRBH, VD). ■ **MESANGE NOIRE** (*Parus ater*) : l'invasion de l'automne laisse encore des concentrations inhabituelles, principalement en Ardenne orientale (Wibrin, Mormont, Membach, Eupen et Longchamps) (LSc, JMDu, ABI, FDF), mais aussi en bordure de la forêt de Soignes (JFI, MWa, MPo, FHe, DCa).

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*) : le dortoir de Berg totalise 200 ex. le 07.01 (JaE, JoE, J.M. Couvreur). Les autres observations proviennent de Hesbaye, avec des maxima de 40 ex. le 12.02 à Chapon-Seraing (LG) et de 22 ex. le 10.02 à Sauvenière (BDe); en outre, 1 ex. le 19.01 à Oost-Maerland (MNB, GBf) et 15 ex. de passage le 19.02 à Tournai (PR). ■ **BRUANT JAUNE** (*Emberiza citrinella*) : les bandes les plus importantes sont signalées en Hesbaye et dans le Luxembourg, avec respectivement des maxima de 140 ex. le 14.12 à Gembloux (LSc) et de 100 ex. en janvier-février à Longvilly (ABI, FDF). La reprise des chants se remarque le 19.02 à Villers-la-Ville, le 23 à Harchies et à Gembloux et le 25 à Grand-Leez (CRBH, LSc, BDe, PN). ■ **BRUANT DES ROSEAUX** (*Em-*

beriza schoeniclus) : 100 ex. sont présents le 07.01 au dortoir de Berg (JaE, JoE, J.M. Couvreur). Le seul autre groupe important concerne une bande mixte de Bruants jaunes et des roseaux de 150 ex. pendant la dernière semaine de décembre à Flobecq (MMn). Deux données de décembre proviennent de l'est de la Meuse : 1 et 2 ex. les 03 et 25 à Membach et 18 ex. le 31 à Eupen (LSc). Rappelons que cette espèce est en général trop peu signalée en hiver.

GROS-BEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) : les troupes les plus nombreuses sont observées dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et en Ardenne : par exemple, plusieurs bandes de 20 à 60 ex. fin janvier dans la région du Viroin (TD) et un maximum de 80 ex. le 22.01 à Mormont (JMDu). Egalement en Hesbaye, 55 ex. le 20.12 à Marneffe (CVa). L'espèce reste rare en Brabant, avec un maximum de 7 ex. le 11.12 à Uccle (CJo). Les seules mentions communiquées pour le nord du Hainaut sont une femelle baguée le 18.01 et un mâle bagué le 13.02 à Ghlin (CS). ■ **VERDIER D'EUROPE** (*Carduelis chloris*) : assez peu abondant cet hiver mais présent partout; les groupes ne dépassent pas 5 ex. en décembre. Une certaine concentration s'opère en janvier, avec des maxima de 50 à 60 ex. du 14 au 24 à Eghezée (JPJ) et environ 30 ex. tout le mois à Herbet-Bomal (RT). Un passage semble décelé le 19.02, avec notamment 150 ex. à Juseret (RDt) et 50 ex. de Lauwe à Menin (JMTe). ■ **CHARDONNET** (*Carduelis carduelis*) : présent dans toutes les régions, y compris en Haute-Belgique; peu de mouvements sont remarqués au cours des trois mois. Retenons 60 ex. du 15 au 23.01 à Lanay (JDa), un maximum de 40 ex. le 22.01 à Walhain (BDe), 30 ex. le 16.12 à Lobbes (APr) et le 21.12 à Noville (GOB). ■ **TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*) : l'espèce devient commune dans toutes les régions début décembre, avec des groupes parfois supérieurs à 50 individus. Aucun mouvement n'est repéré en janvier où la plus grosse bande atteint 200 ex. le 29 à Burg-Reuland (Exc. Aves). En février, sa présence est plus massive dans la région bruxelloise, ce qui est inhabituel (CJo, CGe); une bande de 150 ex. est observée à partir du 15 à Harchies (ML). C'est également en février que la plus grande troupe de la saison (au moins 500 ex.) est notée le 10 à Jalhay (ADg, EDg). De gros passages sont décelés à la fin du mois à Kraainem (SB, SL). ■ **LINOTTE MELODIEUSE** (*Carduelis cannabina*) : habituellement trop peu signalée en hiver. Sur 13 données, 10 proviennent de Hesbaye, 2 de Brabant et 1 de la région de Namur. Les chutes de neige de fin janvier chassent les quelques petits groupes hivernant : à Gembloux de 35 à 40 ex. le 21.12, 28 ex. le 17.01, absents par après (LSc). Une seule mention en février : une femelle baguée le 01 à Profondeville (MV). ■ **LINOTTE A BEC JAUNE** (*Carduelis flavirostris*) : 18 ex. le 04.12 à Malines (Exc. Aves) et 8 ex. le même jour à Mourcourt (PR). L'hivernage de 7 ex. est signalé en janvier-février à Mont-Saint-Guibert (DCa, JPJ). ■ **SIZERIN FLAMME** (*Carduelis flamma*) : comme en automne, très peu signalé : seulement huit mentions de 1 à 4 ex. ■ **SERIN CINI** (*Serinus serinus*) : 1 ex. le 21.01 à Auderghem (T. Mersch). ■ **BECCROISE DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*) : après l'invasion de l'automne, l'espèce se raréfie progressivement au nord du sillon Sambre-et-Meuse et dans le Condroz pour se fixer dans les zones de nidification de Haute-Belgique (RLi *et al.*). En janvier, dans la région de Rochefort notamment (MPa), les bandes diminuent d'importance, tandis que les comportements territoriaux et les chants sont régulièrement signalés (nombreux observateurs). En février, dans l'Hertogenwald, un apport consécutif à la vague de froid donne lieu à l'observation de groupes de 10 à 20 ex. (LSc). Le même mois, la disparition complète est constatée en Hesbaye liégeoise et hutoise (LG), tandis qu'ailleurs en Moyenne-Belgique, seuls quelques petits groupes sont encore signalés à Uccle, à Boitsfort et à Blaton (CJo, HW, DCa, ML). ■ **PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*) : la seule grosse troupe de l'hiver compte 500 ex. le 04.02 à Longvilly (ABl, FDF). Le début du passage de printemps est décelé les 18 et 19.02 à Villers-la-Bonne-Eau et Vaux-sur-Sûre (RDt). Les premiers chants sont entendus dès le 12.02 à Heusy et Dolhain (LSc, ADg, EDg) et sont réguliers par la suite. ■ **PINSON DU NORD** (*Fringilla*

montifringilla) : l'abondance est variable d'une région à l'autre : en décembre, l'espèce paraît plus nombreuse qu'à l'ordinaire dans la région bruxelloise (FHe, CJo) et dans l'est de la province de Liège, avec des groupes de 150 à 250 ex. (HWe, NPa, LSc, A. Daschelet). Par contre, l'hivernage est réduit en décembre à Recogne (RDt) et en janvier à Bomal et Tohogne (YF, RT). Un passage est décelé le 05.01 à Heusy et le 08 à Membach (LSc). Dans la région de Rochefort où ils sont assez abondants en janvier, un millier de Pinsons du Nord sont observés dans une hêtraie le 26.02 à Wavreille (MPa). Citons encore 300 + 500 ex. le 23.02 à Longchamps (Lux.) (ABI, FDF).

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) : un apport d'hivernants est décelé à partir du 13.02 à Gembloux : de 1 à 15 ex. jusqu'au 12.02, un maximum de 90 ex. du 13 au 29 (LSc). Aucune mention en provenance du sud du sillon Sambre-et-Meuse.

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) : parmi les dortoirs signalés, retenons 50 à 60.000 étourneaux en janvier à Arlon (PPi).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)* : 1 ex. le 31.12 à Habay-la-Neuve (AGo) et 1 ex. le 03.01 à Orval (PPi). ■ **CORNEILLE MANTELEE** (*Corvus corone cornix*) : 2 ex. observés le 16.12 à Walhain-Saint-Paul, plus qu'un le 15.01, revu le 11.02 (BDe, LSc). ■ **CASSENOIX MOUCHETE** (*Nucifraga caryocatactes*) : peu signalé : 1 ex. le 05.12 à Mormont (JMDu), 1 ex. le 26.12 à Meyerode (HWe), 1 ex. le 29.01 à Spa (la Vecquée) (A. Daschelet) et enfin un reflet de la population de Wanne : MDe observe 12 ex. le 04.02.

ADDENDUM décembre 1981 :

JASEUR BOREAL (*Bombycilla garrulus*) : 6 ex. près d'un point de nourrissage dans un jardin à Rotheux-Rimièr le 25.12.1981 (F. Degrave). C'est la seule mention dans notre région, au cours de l'hiver 1981-82, de cette espèce dont les apparitions sont restées quasi exceptionnelles depuis la dernière invasion, en 1965-66.



Jaseur Boréal (Photo Sloomaeckers). Visa ABPN-BVNF.