

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1984/2

MARS, AVRIL, MAI

par le Groupe de travail Mons-Tournai (1),
Michel PEERO (2) et Laurent-Henri GEE (3)

Elaboration du fichier : Luc VERROKEN

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées pendant la période considérée :

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|
| ABl: | A. Blondlet | DDe: | D. Demortier | Gra: | G. Rasson |
| ABP: | A. Bas-Perez | DE: | D. van der Elst | GTNS: | G. Trav. Namur Sud |
| ACo: | A. Collin | DH: | D. Hubaut | HB: | H. Bedoret |
| AD: | A. Demaret | DRA: | D. Rabosée | HC: | H. de Callatay |
| ADg: | A. Degros | DV: | D. Voituren | HDe: | H. Delvoye |
| ADx: | A. Doneux | DVe: | D. Verroken | HDu: | H. Dufourny |
| AHD: | A. Houdart | DVi: | D. Vieuxtemps | HG: | H. Guerriat |
| AGo: | A. Georges | EBr: | E. Branquart | HMr: | H. Mardulyn |
| ALc: | A. Lachapelle | EC: | E. Clotuche | HSt: | H. Stiévenart |
| AMo: | A. Monmart | ED: | E. Delmée | HW: | H. de Wavrin |
| AP: | A. Pourtois | EDg: | E. Degros | HWe: | H. Wiesemes |
| APr: | A. Périkel | EMu: | E. Murges | JB: | J. Bultot |
| AR: | A. Rappe | EVe: | E. Verhegghen | JBn: | J. van de Borne |
| BBa: | B. Bauduin | FBa: | F. Bathy | JCD: | J.C. Dechamps |
| BCl: | B. Clesse | FBi: | F. de Bellefroid | JCl: | J. Collard |
| BDe: | B. Deceuninck | FDf: | F. Dufey | JDA: | J. Delarue |
| BI: | B. Iweins | FHA: | F. Halot | JDo: | J. Doucet |
| BPh: | B. Philippart | FHe: | F. Héla | JaE: | Ja. van Esbroeck |
| BVo: | B. Votron | FHi: | F. Hidvegi | JoE: | Jo. van Esbroeck |
| CD: | C. Dehem | FLu: | F. Lutgen | JF: | J. Fouarge |
| CDM: | C. De Mori | FMa: | F. Mairy | JFi: | J. Finck |
| CGe: | C. Geyer | FMr: | F. Maréchal | JFl: | J. Fléron |
| CH: | C. de Harenne | FMz: | F. Mazy | JFN: | J.F. Noulard |
| CHa: | C. Hallet | FRo: | F. Rosillon | JGa: | J. Gallez |
| CJ: | C. Joiris | FVs: | F. Vassen | JHo: | J. Houbart |
| CI: | C. Istasse | FXD: | F.X. Dupret | JLe: | J. Lemaire |
| CJo: | C. Joukoff | GBf: | G. de Bellefroid | JLG: | J.L. Gillet |
| CLe: | C. Lefébvre | GGe: | G. de Guchteneëre | JLc: | J. Leclercq |
| CLf: | C. Lefèvre-Percy | GLe: | G. Lèbe | JMCu: | J.M. Couvreur |
| CLy: | C. Lemy | GNSM: | G. Nature St-Michel | JMDu: | J.M. Daulne |
| CRBH: | C. Rech. Biol. Harchies | GOB: | Gr. Orn. Bastogne | JMLo: | J.M. Lommaert |
| CS: | C. Sturbaut | GOE: | Gr. Orn. de l'Est | JMo: | J. Moïs |
| CVa: | C. Vansteenwegen | GOR: | Gr. Orn. St-Roch | JMTe: | J.M. Testaert |
| DCa: | D. Capart | GR: | G. Robert | J&N: | Jeunes & Nature |

Reçu le 15.02.1985. Accepté le 13.03.1985.

(1) D. HUBAUT, M. MONCOUSIN, M. LANGUY, P. VOET, Y. AMAND.

(2) Rue Marconi 86, B-1180 Bruxelles.

(3) Rue de la Champignotte 5, B-4383 Aineffe-Faimes.

séjourne du 08.03 au 27.04 à Ploegsteert (FXD, DH, HDe, JLc, JaE, JoE, PCI, MWi); 1 ex. du 24.03 au 11.04 à Bambois (PLt).


GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) : le passage se manifeste surtout dans les deux dernières décades de mars, avec des maxima de 57 ex. le 13 à Harchies, 71 ex. le 17 à Hofstade et 40 ex. le 27 à Bambois (CRBH, MWa, AHd). La dispersion des effectifs s'effectue au cours du mois d'avril, les derniers groupes importants en dehors d'Harchies étant signalés à Oost-Maarland, Roly et Bambois (JDa, HG, JPSc, APr, PLt, JPR). Une nichée exceptionnellement précoce le 18.03 à La Hulpe (MWa) tandis que 20 couples couvent dès le 23 à Harchies (ML, CRBH). Par la suite, les premiers jeunes sont signalés à l'époque habituelle, fin avril - début mai. ■ **GREBE JOUGRIS (*Podiceps grisegena*)*** : à Ploegsteert, l'individu présent depuis le 31.12.1983 disparaît le 19.03 (PCI, DH, FXD); 1 ex. le 17.03 à Hofstade (MWa); 2 ex. le 10.05 à Harelbeke (YBa). ■ **GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)*** : 1 ex. le 30.03 à Vance (JGa) et le 23.04 à Roly (TDe, MI); 3 ex. dont un couple, sont présents à Harchies dès le 28.04 (nombreux observateurs). En outre, 1 ex. le 28.05 au barrage de Coe (A. Daschelet). ■ **GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*)** : l'espèce est encore bien représentée en mars sur certains tronçons de rivière : par exemple 19 ex. le 01 sur l'Escaut de Péronnes à Calonne (PCq, JPCq) et 34 ex. le 18 sur la Semois de Termes à Herbeumont (PPI). Alors que les hivernants se dispersent progressivement au cours du mois, les premiers nicheurs sont de retour le 14.03 à Grand-Leez, le 18 à La Hulpe et le 24 à Ploegsteert (LSc, MWa, DH). De 8 à 9 couples sont signalés à Harchies, 6 ou 7 à Ploegsteert, 5 à 7 à Maubray, 5 à Rosières, 3 à Warnton, 2 à 3 à Rance (ML, CRBH, DH, MLn, GRa, DDe, APr, MI).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : la migration est remarquée dès le 04.03 jusque fin avril, avec un pic au cours de la dernière décade de mars et la première d'avril, période où sont observés les groupes les plus importants : 72 + 42 ex. vers le nord le 20.03 à Aineffe (LG), 48 ex. le 09.04 à Rhode-Sainte-Agathe (B. Forget), 26 ex. le 05.04 à Yvoir (RL) et 25 ex. le 30.03 à Genval (GRa, NR). A Harchies-Pommeroeul, de 1 à 9 ex. sont présents en avril et de 3 à 4 ex. en mai (nombreux observateurs). Un passage tardif d'environ 20 ex. le 20.05 à Genval (GRa, NR). ■ **CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*)*** : le prolongement des observations en Meuse a été détaillé par J.P. Jacob dans *Aves* 21 : 193-196.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) : nombreuses observations au cours des deux premiers mois, mais les groupes de plus de 10 ex. ne sont notés qu'en mars avec des maxima de 32 ex. le 18 à Oost-Maarland et 30 ex. le 25 à Harchies (JDa, HDu). On constate une recrudescence de données en mai dans toutes les régions par rapport aux années précédentes, avec des maxima de 13 ex. le 27 à Lanaye (JDa) et 10 ex. les 17 et 27 à Harchies-Pommeroeul (DH, HDu). La petite colonie de Pailhe compte 4 nids cette année (RLi). Celle d'Harelbeke continue son expansion : 51 couples nicheurs sont dénombrés le 29.04 et 62 fin mai (PVo, DH, YBa). ■ **HERON POURPRE (*Ardea purpurea*)** : une seule donnée : 1 ex. le 27.05 à Vance (AGo). ■ **GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*)*** : 1 ex. le 24.03 à Bambois (PLt). ■ **HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*)*** : 1 ex. le 07.05 à Lanaye (JDa). ■ **BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*)*** : 3 ex. sont de retour à Hensies le 27.05, date tardive (DE). ■ **GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*)** : 1 ex. est observé et entendu à partir du 14.03 à Harchies-Hensies (CRBH, DV, ML, MMn, DVe, LV, MWa, HDu); 1 ex. le 27.05 à Sart-Dames-Avelines (J.P. Romain). ■ **CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*)** : 1 ex. le 21.04 à Malmédy (MPs, A. Leloup) et à partir du 10.05 à Longchamps (Lux.) (RDI, ABI, FDI); 2 ex. le 20.05 à Libin (RLb, CHa). ■ **CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)*** : 1 ex. vers le NE le 31.03 à Eupen (RHR) et une autre migratrice le 15.04 à Rocherath (Exc. Aves).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) : en mars, les concentrations maximales atteignent 500 ex. le 04 à Harchies et le 18 à Oost-Maarland (HDu, JDa). Un fort passage à grande hauteur est remarqué le 11.03 à Celles (ED). Les premiers pulli n'apparaissent que le 25.04 à Gembloux, le 27 à Ploegsteert et Bas-Warneton (LSc, DH, PDB). ■ **SARCELLE D'HIVER** (*Anas crecca*) : peu de groupes importants en mars, l'effectif d'Harchies se réduit d'environ 170 ex. le 05 à moins de 50 à la fin du mois (JMTe, DVe, LV, FHe); 123 ex. le 17 à Walem (MWa). Par la suite, 100 ex. sont encore observés le 08.04 à Hautrage (DE), tandis qu'une concentration se forme à Florival, avec un maximum de 100 ex. le 14 (JBn); la plupart des autres sites hébergent moins de 20 ex. en avril. Après le 10.05, des oiseaux sont observés dans les zones de nidification des vallées de la Dyle et de la Haine ainsi qu'à Ploegsteert (2 couples - DH), Warcoing (1 couple - DH, JLC), La Hulpe (1 couple le 26 - MWa), Sart-Dames-Avelines (1 couple le 18, mâle le 27 - LVa), Rosières, Grand-Leez et Roly. ■ **SARCELLE D'ETE** (*Anas querquedula*) : premiers retours le 11.03 à Harchies, le 12 à Harelbeke et le 17 à Florival (ML, YBa, FHi), le passage se prolongeant jusque début mai, sans pic apparent. Les données tardives proviennent en majorité de la province de Hainaut, mais aucune preuve de nidification n'est rapportée. ■ **CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*) : la plupart des observations de mars proviennent d'Harchies et de Ploegsteert, avec des maxima respectifs de 18 ex. le 05 (CRBH, JMTe) et 4 ex. le 11 (PCI). Un passage est décelé dès la première quinzaine d'avril, avec un maximum de 18 ex. le 14 à Rosières (GRa, NR); après quoi l'espèce disparaît presque totalement, sauf un couple le 19.04 à Gozée (CI) et de 6 à 8 ex. qui demeurent tout le mois de mai à Harchies (nombreux observateurs). ■ **CANARD SIFFLEUR** (*Anas penelope*) : le passage est assez faible en mars - début avril et ne concerne que de petits groupes : maxima de 34 ex. le 17.03 à Malines (MWa) et de 20 ex. le 08.04 à Neerijse (FHa, MWa, FHi). De 4 à 7 ex. stationnent jusqu'au 12.04 à Harchies où un dernier couple est signalé le 13 (CRBH, DVe, LV, ML, JMTe, HDu, DV). Par la suite, une observation très tardive d'un mâle le 31.05 à Neerijse (TDe). ■ **CANARD PILET** (*Anas acuta*) : 20 mentions en mars-avril concernant en majorité 1 à 2 individus, avec des maxima de 10 ex. le 17.03 à Walem et le 12.04 à Harchies, ainsi que 23 ex. le 18.03 à Oost-Maarland (MWa, CRBH, JDa). Dernières données : 1 mâle le 21.04 à Neerijse et 3 mâles le 25 à Beho (MWa, PCs, BCI). A signaler, trois autres observations à l'est de la Meuse : 1 couple le 18.03 à Membach, 1 mâle le 24.03 à Roly et un couple le 11.04 à Sibret (JCDe, LSc, MI, FDF). ■ **CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*) : la seule concentration importante signalée en mars est celle d'Harchies : de 60 à 200 ex. le 10 (CRBH, FHe, HDu, JMTe, DVe, LV). Le passage se manifeste surtout dans la première quinzaine d'avril; ainsi, à Harchies, l'effectif augmente pour atteindre un maximum de 265 ex. le 09 puis il diminue rapidement : encore seulement 43 ex. le 23 (HDu, ML, CRBH, HSt). Des isolés ou des couples sont notés jusqu'à fin mai, y compris à l'est de la Meuse (1 mâle du 20 au 31 à Longchamps (Lux.); 1 couple le 29 à Latour - ABl, FDF, PPI), tandis que des données de nidification proviennent de Ploegsteert, de Bas-Warneton et d'Harchies (PVo, DH, HSt). ■ **NETTE ROUSSE** (*Netta rufina*) : 1 mâle le 12.03 à Harelbeke (YBa) et du 29.04 au 16.05 à Harchies (HDu, PCI, SB, SL, JoE, CRBH, ML, JLC). ■ **FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*) : les concentrations les plus importantes sont observées en mars à Harchies, Vieux-Héverlée et Neerijse, avec respectivement 64 ex. les 05 et 23, 90 ex. le 17 et 75 ex. le même jour (CRBH, JMTe, MWa). Le passage est surtout décelé pendant les deux premières décades d'avril, alors que les effectifs d'Harchies diminuent faiblement et que la vallée de la Dyle héberge de 172 à 183 ex. durant le mois (MWa). En mai, des attardés sont encore notés en Haute-Belgique, mais peu de précisions sont fournies concernant la nidification. ■ **FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*) : les grosses concentrations de l'hiver diminuent rapidement d'importance; les maxima pour la période consi-

dérée sont notés début mars : 300 ex. le 04 à Oost-Maarland (PSc), 168 ex. le 05 à Harelbeke (DH) et 156 ex. le 08 à Harchies (CRBH). Le départ se poursuit courant avril, avec 100 ex. le 08 à Oost-Maarland (JDa), 50 ex. le 09 à Harchies (HDu), ainsi que 83 ex. le 01 et 23 ex. le 21 dans la vallée de la Dyle (MWa). Les premiers pulli sont observés le 25.04 à Ploegsteert où 5-6 couples nicheurs sont recensés. ■ **GARROT A CŒIL D'OR** (*Bucephala clangula*) : à Harchies, 16 ex. le 08.03, 9 ex. jusqu'au 23.03, les trois dernières femelles le 21.04 (nombreux observateurs). Ailleurs, le passage est surtout sensible les deux premières décades de mars, avec 10 données de 1 à 7 ex. A signaler, les observations de Haute-Ardenne : 1 ex. le 18.03 à Vielsalm (PCs, BCl), 2 ex. le 10.04 à Bütgenbach (NPa, FVs) et un séjour prolongé d'un maximum de 7 ex. du 18.03 au 22.04 à La Gileppe (LSc, JCDe). L'espèce disparaît de Wallonie après cette date. ■ **MACREUSE BRUNE** (*Melanitta fusca*) : 1 ex. du 18 au 20.03 à Oost-Maarland (JDa, BPh). ■ **HARLE DE MIQUELON** (*Clangula hyemalis*)* : le mâle immature hivernant depuis fin décembre 1983 à Yvoir (îles de Godinne) est noté pour la dernière fois le 25.03 (JPR, RL, J.P. Fouarge). ■ **HARLE BIEVRE** (*Mergus merganser*) : dans les sites d'hivernage, encore 2 ex. le 11.03 aux barrages de l'Eau d'Heure (JSc), 10 ex. le 04 et 5 ex. le 18.03 à Oost-Maarland (JDa), 5 femelles jusqu'au 25.03 et une femelle jusqu'au 04.04 à Harchies (PCI, CRBH, ML, HSt, JMTe, DVe, LV, HDu). En outre, 2 mâles et 1 femelle le 03.03 à Yvoir (RL) et 2 ex. le 17.03 à Weerde (MWa). ■ **HARLE HUPPE** (*Mergus serrator*) : 1 mâle le 11.03 à Florival (NG) et 1 femelle le 22.04 à La Gileppe (LSc). ■ **HARLE PIETTE** (*Mergus albellus*) : observé uniquement dans le complexe Harchies-Hensies-Pommerceul : 2 mâles et 8 femelles jusqu'à la mi-mars, 1 femelle reste seule jusqu'au 10.04 (PCI, CRBH, ML, JMTe, DVe, LV, HDu, PVo). ■ **TADORNE DE BELON** (*Tadorna tadorna*) : présent dans le Hainaut à Harchies (avec un maximum de 27 ex. du 05 au 07.03), Baudour, Ploegsteert, Bas-Warnton, Gaurain-Ramecroix, Havinne et Warcoing (nombreux observateurs). En outre, 13 ex. le 17.03 à Walem (MWa), 1 ex. le 08.04 à Oost-Maarland (JDa), 2 ex. du 10 au 15.05 à Seilles (Pte) et 2 ex. le 15.05 à Florival (PLt). Trois couples cantonnés sont recensés au complexe d'Harchies-Pommeroeul, mais un seul réussit à se reproduire (CRBH, HDu, ML, DH, PAN).



Oie cendrée (*Anser anser*), Texel, printemps 1983 (Photo B. Houziaux).

OIE CENDREE (*Anser anser*) : passage faible en mars, avec 36 ex. le 02 à Harchies (CRBH), 9 ex. le 07 à Bambois (AHd), 1 ex. le même jour à La Hulpe (FHi), 24 ex. le 09 à Ploegsteert (DH), 5 ex. le 18 à Maubray (JPCq, PCq) et 65 ex. le 27 à Pétigny (TDe). Un dernier ex. le 23.04 à Bas-Warneton (PDB), tandis qu'un autre isolé séjourne du 16.03 au 04.04, puis du 04 au 13.05 à Harchies (CRBH, ML, DVe, LV, BDe, HB, HDu). ■ **OIE RIEUSE** (*Anser albifrons*) : 1 ex. posé avec 36 Oies cendrées le 02.03 à Harchies (CRBH). ■ **OIE SP.** (*Anser sp.*) : 8 données de vols migratoires du 11 au 26.03 à Harchies, Gembloux, Baugnies, Ath, Walhain, Bouvignies et à nouveau à Gembloux (ML, LSc, MCa, JPY, BDe, MMn). ■ **BERNACHE NONNETTE** (*Branta leucopsis*) : 2 ex. en avril (date non précisée) à Harchies (ML).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) : migration bien fournie tout mars avec pics au cours des première et troisième décades (DVe, LV, JMDu, HDu, JF, JLG, LG). L'espèce est bien représentée dans le bassin de la Mehaigne (5-7 couples) mais reste très rare sur le plateau hesbignon proprement dit (Huy-Waremme, Grand-Leez) (LG, JPJ). Il y a très peu de nidifications à Viroinval (PDa, PS, ED) et dans la région de St-Vith où 41 aires ne fournissent que 31 jeunes (HWe). ■ **EPERVIER D'EUROPE** (*Accipiter nisus*) : encore fort nombreux en mars au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Des migrateurs sont observés tout ce mois, jusqu'au 15.04 (PDh, LG, PVo, LVa, HW, MWa). L'espèce continue son installation en Hesbaye, des reproductions sont probables à Warnant-Dreye, Huccorgne, Moha et Villers-le-Bouillet (LG). En Hainaut, des individus isolés sont observés en mai à Pommeroeul, Warcoing et Mignault (HDu, JLc, CLc). ■ **AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*) : des mentions d'isolés en mars dans la Dyle et en Hesbaye : 1 ex. le 17 à Pérot (BDe), 1 femelle le 27 à Rhode-Sainte-Agathe (FHa) et un mâle tout le mois à Warnant-Dreye-Aineffe (LG). L'erratisme printanier de l'espèce en Hesbaye liégeoise dans des milieux favorables laisse espérer une reproduction prochaine : un mâle jusqu'à fin avril à Aineffe (LG), 1 ex. le 24.04 à Huccorgne (CVa). En outre, une femelle le 08.05 à Gembloux (LSc) et un mâle le 20.05 à Houtain-le-Val (J.P. Romain). ■ **MILAN ROYAL** (*Milvus milvus*) : un passage assez important est remarqué au cours de la première semaine de mars mais ce n'est que du 22 au 31 que le passage principal est observé. Un autre petit pic s'observe du 08 au 14.04, la migration se prolongeant pendant la première semaine de mai; plus tard, des oiseaux passent encore du 22 au 31.05. Comme d'habitude, c'est le nord du sillon Sambre-et-Meuse qui voit passer le moins de migrateurs : 9% des effectifs totaux. Sept sites occupés sont renseignés dans les cantons de l'Est (HWe), quatre à cinq en Lorraine (PPi, OM, JLG, Stage Aves) et un dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (TDe). ■ **MILAN NOIR** (*Milvus migrans*) : les deux premiers le 03.03 à Grivegnée (J.C. Clotuche) puis 1 ex. le 10 à Arlon (JLG). Le passage demeure très timide jusqu'à début avril; des pics migratoires bien fournis surviennent du 08 au 14.04 et du 22 au 30.04. Le couple reproducteur de Sterpenich est présent dès le 11.04 (PPi, Stage Aves); ailleurs, en Lorraine, un couple niche près de Virton (JPJ) et un autre couple le fait peut-être à Grendel-Attert (PPi, OM). ■ **BONDREE APIVORE** (*Pernis apivorus*) : l'espèce demeure exceptionnellement rare avant mai : il n'y a que trois données dans la dernière décade d'avril (MTi, FHa, Stage Aves). Elle n'apparaît timidement qu'après le 10.05 et reste peu observée avant le 20 (JMDu, Exc. Aves, A. Daschelet, LG, CRBH, HDu, ML, TDe, FHe). Dans la région de Viroinval, la reproduction est pratiquement nulle cette année (PDa, PS, ED). ■ **BUSARD DES ROSEAUX** (*Circus aeruginosus*) : la femelle hivernante d'Harchies est toujours observée en mars et probablement par après (CRBH, ML). La migration débute dès le 04.03 avec 1 ex. à Bambois (AHd) et augmente progressivement en nombre dès le 15, jusqu'au pic allant de la deuxième décade d'avril au 07.05. Un curieux dernier afflux à la fin de ce mois fut probablement engendré par le mauvais temps. Un seul couple nicheur à Harchies (CRBH). ■ **BUSARD SAINT-MARTIN** (*Circus cyaneus*) : migration en deux vagues : un passage sensible du 08 au 21.03

alors qu'il reste encore de nombreux hivernants fixés et un pic classique la seconde semaine d'avril. Les migrateurs sont particulièrement abondants ce printemps, notamment dans les Hautes-Fagnes (JMCu, JCDe, JPR) et des couples en halte paradent le 16.03 à Gouvy (ABI, FDI). Trois données de mâles en mai : le 06 à Elsenborn, (Exc. Aves), le 16 à Eupen (DRa) et le 18 à Mormont (JMDu) confirment cette année encore l'erraticisme tardif de l'espèce dans des zones de reproduction potentielles. ■ **BUSARD CENDRE** (*Circus pygargus*) : 1 ex. le 20.04 à Bertogne (FLu), un mâle le 23 à Hanzinne (CLy) et le 24 à Papignies (MMn). En mai, un mâle le 07 à Biesme (JBI) et une femelle le 17 à Polleur (LSc). Le couple d'Harnoncourt, présent dès le 27.04 (JLG) a abandonné prématurément le site. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y a donc pas eu de reproduction en Wallonie.

■ **BALBUZARD PECHEUR** (*Pandion haliaetus*) : premier migrateur le 31.03 à Harchies (RML). Un petit passage est enregistré du 08 au 21.04 (AHd, JPSc, MPa, DVe, LV, FVs, Exc. Aves) mais le mouvement culmine dans la première semaine de mai avant de s'estomper rapidement. Séjour de 2 ex. pendant tout ce mois à Harchies (CRBH, DVe, LV, JaE, JoE, DE, PCI, HDu), de 1 à 2 ex. fin avril – début mai à Roly-Virelles (TDe, JaE, JoE, MI, DE, JPSc) et peut-être de 1 ex. du 13.04 au 03.05 à Harelbeke (DVe, LV, YBa).

■ **FAUCON PELERIN** (*Falco peregrinus*) : 1 ex. le 25.03 à Spa (PBc) et le 20.04 à Treignes (JFN). Trois observations tardives en mai : 1 ex. le 06 à Harchies (ML), le 09 à Büllingen (FVs) et le 15 à Ferrières (SSo). ■ **FAUCON HOBEREAU** (*Falco subbuteo*) : les trois premiers ex. le 11.04 à Torgny (BVo, Stage Aves). Ensuite le passage s'amorce fin avril et culmine la première semaine de mai. Il sera par la suite ralenti par le mauvais temps et ne reprendra que le 21.05. Des futurs reproducteurs le 12 en Forêt de Soignes (1 couple) et le 25 à Grendel-Attert (MWa, PPI). ■ **FAUCON EMERILLON** (*Falco columbarius*) : seules données : 1 ex. le 31.03 à Harchies (FHe), un mâle le 09.04 à Overijse (SP) et une femelle le 17.04 à Auffe (Stage Aves). ■ **FAUCON KOBEZ** (*Falco vespertinus*)* : une femelle vers le NE le 27.04 à Pommeroeul et une femelle le 29.04 à Membach (Hertogenwald) (HDu, LSc).

■ **TETRAS LYRE** (*Tetrao tetrix*) : renseigné dans ses zones classiques de reproduction des Hautes-Fagnes, avec des maxima de 12 ex. le 18.03 à Elsenborn ainsi que de 7 à 9 mâles et une femelle le 20.04 en Fagne wallonne (RHr, JMCu). ■ **GELINOTTE DES BOIS** (*Bonasa bonasia*) : en mars, 1 ex. trouvé mort le 13 à Arlon, 2 ex. le 21 à Etalle ainsi que 2 et 3 ex. les 26 et 27 à Robelmont; en avril, 2 ex. le 04 à Gérouville et 1 ex. le 09 à Olloy-sur-Viroin; enfin, 2 ex. le 10.05 à Villers-devant-Orval (JMo, BI, JPSc). ■ **PERDRIX GRISE** (*Perdix perdix*) : 1 ex. le 25.03 à Büllingen, où l'espèce est normalement absente (U. Schumacker). En avril, 55-60 couples sont recensés sur environ 2000 ha dans la région de Pecq (DDe). Fin mai, les intempéries provoquent la mort des poussins à Celles (PS). ■ **CAILLE DES BLES** (*Coturnix coturnix*) : seulement trois données de mai : 1 mâle le 08 à Lillois (TDe), un chanteur le 27 à Heppignies (CDM) et le 28 à Gembloux (LSc). La Caille est restée très rare en 1984.

■ **GRUE CENDREE** (*Grus grus*) : comme à l'ordinaire, le passage se déroule essentiellement dans l'est du pays, dans les provinces de Liège et de Luxembourg. L'avant-garde est observée début mars : 36 ex. le 03 à Eupen (Aves Ostkantone), puis 60 ex. le 05 à Gérouville (BI). A partir de cette date, les observations sont quotidiennes jusqu'au 27.03. La migration s'amorce réellement le 10 avec 475 ex., atteint un maximum les 14, 15 et 16 avec respectivement 3176, 2258 et 2036 grues, puis décroît jusqu'au 22. Une seconde vague, plus faible, passe le 25 (547 ex.). Une seule mention en dehors de la route migratoire principale : 76 ex. le 16.03 à Woluwe-Saint-Lambert (JaE, JoE). En avril, en-

core 16 données de 1 à 27 ex. dans la première quinzaine, 11 ex. attardés le 25 à Malmedy (M. Lambert) et un dernier ex., vers le sud, le 28 à Tellin (J. Ide).

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) : noté au cours de la période à Berg, La Hulpe, Rosières, Cortil-Wodon, Gembloux, Lamontzée, Harchies, Virelles, Bambois, Stavelot, Serin champs, La Calamine, Vance, Musson et Arlon (nombreux observateurs). ■ **MAROUETTE PONCTUÉE** (*Porzana porzana*) : 1 ex. le 15.04 à Harchies (ML, MWa). ■ **FOULQUE MACROULE** (*Fulica atra*) : les maxima signalés en mars sont de 350 ex. le 18 à Oost-Maerland, 320 ex. le 17 à Walem et 281 ex. le même jour à Malines (JDa, MWa).

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) : 1 ex. le 05.03 à Vieux-Genappe (LSc). Une série d'observations en avril : 1 ex. le 10 à Rhode-Sante-Agathe, le 14 à Warcoing et le 21 à Harchies; 1, 3, 1 et 1 ex. les 08, 15, 20 et 22 à Oost-Maerland (SP, PVo, ML, CRBH, JDa, BPh). Enfin, 1 ex. le 14.05 à Gaurain-Ramecroix (JPCq).

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) : le passage se manifeste dès les 06-07.03 dans toutes les régions avec un pic du 14 au 20.03. Des stationnements importants sont notés : 1500 ex. le 14 à Hérinnes, 2000 ex. le 25 à Tavigny et environ 3000 ex. le 19 entre Chimay et Couvin (JPCq, ABI, FDF, JPSc). La migration se termine durant la première décade d'avril, période à laquelle plusieurs pontes sont notées. Premiers pulli signalés le 26.04 à Heppignies (JBI). Les premiers mouvements post-nuptiaux sont signalés fin mai, comme chaque année : une bande de 22 ex. le 26 à Harchies et 10 ex. le 31 à Yvoir (DVe, LV, A. Crespeigne). ■ **PLUVIER ARGENTE** (*Pluvialis squatarola*) : en mai, 1 ex. le 06 à Warneton (JLc), les 07, 08, 10, 29 et 30 à Seilles (PTE) et le 30 à Warcoing (JLc). ■ **PLUVIER DORE** (*Pluvialis apricaria*) : les premiers stationnements dépassant souvent la centaine d'ex. sont signalés en Hainaut occidental, avec un maximum de 1100 ex. à Lauwe le 16.03 (DH). Dès le 17, l'espèce est observée en plusieurs régions de Wallonie, principalement dans la région de Namur-Gembloux, avec notamment 380 ex. le 29 à Cortil-Noirmont (LSc), mais aussi à l'est de la Meuse où plusieurs petits groupes sont notés au maximum du passage (Membach, Elsenborn et la région de Bastogne) (LSc, NPA, ABI, FDF). Celui-ci se termine brusquement les 05 et 07.04 : 12 ex. le 05 à Cortil-Wodon (HW), 4, 6, 15 et 600 ex. le 07 à Bourslers, Lierneux, Angre et Lauwe (JPCq, MDe, HDu, PVo). Assez curieusement, 1 ex. le 30.05 à Burtonville (BCI, PCs). ■ **GRAND GRAVELOT** (*Charadrius hiaticula*) : uniquement observé en mai, avec 15 données (11 en Hainaut) de 1 à 5 ex. (PTE, MI, CRBH, ML, FHe, JPCq, DH, AP, MLn, JLc, BPh). ■ **PETIT GRAVELOT** (*Charadrius dubius*) : début des retours classiquement fin mars, les trois premiers ex. le 21 à Ploegsteert (MWi). Le passage culmine au cours de la troisième décade, quand de petits groupes apparaissent : 12 ex. le 25 à Seilles (PTE), 10 ex. le 27 à Latour (JLG), 7 ex. le 23 à Nivelles (TDe)... Il se poursuit jusqu'à fin mai, notamment à Seilles où de 6 à 12 ex. sont observés régulièrement (PTE), mais il décline rapidement après le 15. Notons 7 couples reproducteurs pour le complexe marécageux de Harchies-Hensies-Pommerœul (ML) et une dizaine de couples pour le Haut-Escaut (JLc *et al.*) ainsi qu'en haute Ardenne, 2 couples à Malmedy et un couple à Burtonville (EDG, ADg, BCI, PCs). ■ **GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU** (*Charadrius alexandrinus*)* : 1 ex. de cette espèce rarissime en Wallonie est observé le 12.05 à Pommerœul (VD, HB, ML). ■ **TOURNEPIERRE A COLLIER** (*Arenaria interpres*)* : en mai, 1 ex. les 09 et 12 à Pommerœul (CRBH, ML, PTE, BDe), le 19 à Warcoing (JLc) et le 30 à Anderlecht (OH).

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) : assez abondante en mars, principalement la deuxième décade avec des maxima de 70 ex. le 18 à La Buisnière et 50 ex. les 24 et 25 à Merbes-le-Château (HB), environ 50 ex. tout le mois à Harchies (ML). La situation se prolonge en avril avec un afflux la première décade : entre autres 76 ex. les 05 et

06 à Waimes, 40 ex. le 07 à Lauwe et le 10 à Dampicourt, 30 ex. le 07 à Viville (NPa, BVo, PVo, Exc. Aves). Dès le 20, l'espèce décroît en nombre jusqu'en mai. Parades signalées, entre autres, sur les lieux de nidification de Sourbrodt le 10.04 et de Cortil-Wodon le 20.04 (JCDe, LSc). ■ **BECASSINE SOURDE** (*Limnocyptes minimus*) : en mars, 1 et 3 ex. les 16 et 18 à Polleur (LSc, JCDe), 1 ex. le 22 à Cortil-Wodon (HW) et 1 et 2 ex. les 20 et 31 à Arlon (PPi, JGa). En avril, des isolés le 07 à Viville et à Hensies et le 25 à Berg (Exc. Aves, ML, JaE, JoE). ■ **BECASSE DES BOIS** (*Scolopax rusticola*) : 56 observations provenant principalement d'Ardenne, de Lorraine et de Brabant. Notons 4 «couple» + 1 ex. le 26.04 à Etalle (BI), 6 ex. le 06.04 à Maransart (GRA, NR) et 14 ex. en croûle sur 3 km de chemin le 06.05 à Romerée (TDe). ■ **COURLIS CENDRE** (*Numenius arquata*) : en mars, 1 ex. le 04 à Molembaix (JPCq), le 07 à Gerpinnes (CLy) et le 09 à Gué d'Hossus (CI); 7 ex. séjournent en outre à Seilles (PTE). En avril, 12 observations d'isolés dans le haut pays, ainsi que 4 et 3 ex. les 07 et 10 à Harchies (ML). Enfin, 1 ex. les 01, 12, 21 et 30.05 à Seilles (PTE) et 2 ex. en vol le 24.05 à Mouscron (DH). ■ **COURLIS CORLIEU** (*Numenius phaeopus*) : 1 ex. le 07.04 à La Buisserie (HB), 8 ex. vers le NE le 23 à Flobecq (MMn) et 1 ex. les 01 et 17.05 à Gaurain-Ramecroix (JPCq, MLn). ■ **BARGE A QUEUE NOIRE** (*Limosa limosa*) : les premiers retours sont constatés en Hainaut occidental : 2 et 9 ex. les 06 et 11.03 à Harchies (ML), 3 ex. le 11 à Gaurain-Ramecroix et un maximum de 17 ex. le même jour à Hérinnes (MLn), ... Les observations sont plus fréquentes à partir du 25.03 et concernent alors d'autres régions (Charleroi, vallée de la Dyle, Cantons de l'Est), mais aucune forte concentration n'est observée. Le passage diminue fortement après le 17.04 et se termine début mai en Hainaut avec 1 ex. le 04 à Harchies, 4 ex. le 07 à Bas-Warneton et 1 ex. le 12 à Warcoing (CRBH, ML, DH, JLC). ■ **BARGE ROUSSE** (*Limosa lapponica*)* : 1 ex. les 28 et 29.05 à Seilles (PTE). ■ **CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*) : les 27 observations de mars concernent toutes des isolés, sauf 2 ex. le 10 à Bas-Warneton (PDB). Le passage s'intensifie vers le 10.04, quand un maximum de 9 ex. est observé à Latour (Stage Aves). Il se prolonge jusqu'au 06.05, un dernier ex. ce jour à Recogne (MWt). ■ **CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*) : apparition fin avril : 1 ex. les 23 et 24 à Florival (FHa), le 26 à Roly (JPSc) et le 27 à Latour, 2 ex. le même jour à Bas-Warneton (JLG, DH) et 1 ex. le 28 à Nivelles (TDe). Le passage se poursuit début mai avec 9 observations de 1 à 3 ex. jusqu'au 12, principalement à Harchies-Pommerœul (CRBH, ML); un dernier ex. le 26.05 à Seilles (PTE). ■ **CHEVALIER GUIGNETTE** (*Tringa hypoleucos*) : 1 puis 2 ex. les 07 et 11.03 à Latour (AGO, JGa), ainsi qu'un ex. le 11 aux barrages de l'Eau d'Heure (JSe). Cette avant-garde est suivie de quatre autres observations jusqu'au 19.04, le mouvement ne s'amorçant réellement qu'à ce moment. Début mai, les groupes augmentent progressivement d'importance, le passage culminant dans la seconde décade, avec un maximum de 120 ex. le 12 sur 2 km de canal à Pommerœul (VD, HB, PTE, BDe, ML)! Les observations sont nettement moins nombreuses dès le 20.05. ■ **CHEVALIER GAMBETTE** (*Tringa totanus*) : les premiers migrants apparaissent durant la deuxième quinzaine du mois de mars, avec 9 observations totalisant 17 ex.. La migration prend de l'ampleur dès le 10.04 pour culminer vers le 20.25 du mois et se poursuivre jusqu'à la mi-mai. Quatre sites sont particulièrement fréquentés et hébergent les groupes les plus importants : Bas-Warneton avec un maximum de 15 ex. les 23 et 27.04, Warcoing avec de 2 à 11 ex. du 12 au 31.05 (JLC, MLn, DH), Harchies avec 3 à 10 ex. en avril et début mai (CRBH, ML, PTE) et surtout Seilles où l'espèce est notée du 21.04 à la fin mai, avec des groupes souvent supérieurs à 6 ex. et un maximum de 23 ex. le 23.04 et encore 14 ex. le 26.05 (PTE). Six observations en Ardenne à Recogne, Waimes, Faymonville, Membach, Raeren et Thommen (MWt, NPa, LSc, Exc. Aves, HWe). ■ **CHEVALIER ARLEQUIN** (*Tringa erythropus*) : seulement deux observations en mars : 1 ex. le 12 et le 21 à Bas-Warneton (DH). Par la suite, trois observations avant le 21.04, date du début du passage proprement dit. Un maximum de 11 ex. le 25.04 à Ploegsteert (DH) et dernière observation de 6 ex. le 13.05 à Roly (MI). ■ **CHEVA-**

LIER STAGNATILE (*Tringa stagnatilis*)* : 1 ex. le 05.05 à Hoegaarden (CVa). ■ **CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*)** : premier le 15.04 à Hoegaerde (CVa). Le passage se développe brusquement le 21 et se prolonge jusqu'à la mi-mai, où il s'arrête tout aussi subitement. Les maxima sont de 26 ex. le 27.04 à Seilles, de 8 ex. le 06.05 à Harchies (ML) et de 13 ex. les 23 et 27.04 à Bas-Warneton (PDB). Encore un ex. à la fin du mois à Harchies et le 28 à Warcoing (CRBH, ML, DVe, LV, MLn, JLC). ■ **BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*)*** : observé uniquement en mai : 1 ex. le 20 et un autre le 25 à Gaurain-Ramecroix (MLn, PCq, JPCq), 2 ex. le 26 à Antoing (DDe, MLn, JLC), 1 ex. le 31 à Warcoing (DH, JLC, MLn), 1 ex. les 29 et 30 à Seilles (PTE). ■ **BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*)** : des isolés renseignés en mai le 01 à Nivelles, du 10 au 12 à Harchies et du 26 au 30 à Antoing (TDe, VD, HB, CRBH, DDe, JLC, MLn). En Lorraine, 1 ex. le 06.05 à Sterpenich (JLG, Y. Destenay). ■ **BECASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*)*** : 1 ex. le 07.04 à La Buisnière (HB), 1 ex. le 12.05 à Longchamps (Na) (LSc) et 3 ex. le 10 à Harchies (CRBH). ■ **BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*)** : quelques données : 1 ex. du 27.03 au 02.04 à Harchies (CRBH), 2 ex. le 08.04 à Oost-Maarland (JDa), 2 ex. en vol le 07.05 à Ploegsteert (DH), 1 ex. le 08.05 à Houdeng (CLe), 1 ex. le 19 à Warcoing (JLe) et 3 ex. le 25 à Gaurain-Ramecroix (MLn). Une observation en Lorraine : 1 ex. le 08.04 à Latour (BI, AGo, Stage Aves). ■ **BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*)** : 1 ex. le 14.05 à Seilles (PTE). ■ **BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*)*** : 2 ex. le 19.05 à Gaurain-Ramecroix (PCq, JPCq, MLn). ■ **CHEVALIER COMBATTANT (*Philomachus pugnax*)** : les trois premiers séjournent du 09 au 11.03 à Merbes-le-Château (HB). Le passage s'intensifie légèrement fin mars mais un pic migratoire est surtout sensible fin avril, période où les plus gros groupes sont renseignés : 20 ex. le 27 à Seilles (PTE), 18 ex. le 28 à Ploegsteert (PCI, DH), 30 ex. le 23 et 46 ex. le 27 à Bas-Warneton (DH, PDB). Les observations sont fréquentes jusqu'au 12.05, trois mentions étant postérieures : 3 ex. le 17 à Harchies (DH) et 1 ex. les 19 et 29 à Warcoing (JLC, MLn).



Barge à queue noire (*Limosa limosa*), Texel, printemps 1983 (Photo B. Houziaux).

AVOCETTE (*Recurvirostra avosetta*) : huit observations sur la période, dont six en Hainaut occidental : 4 ex. vers le nord le 11.03 à Gaurain-Ramecroix (MLn), 1 ex. posé le 18.03 à Bas-Warneton (PDB), 2 ex. le 15.04 à Harchies (ML) et les 18-19 à Nivelles (JHo), 1 ex. le 28 à Ploegsteert (PCI), 2 ex. le 06.05 à Florival (JBn) et les 16 et 17.05 à Gaurain-Ramecroix (JPCq), enfin 1 ex. le 26.05 à Antoing (DDe, MLn, JLc). ■ **PHALAROPE A BEC ETROIT (*Phalaropus lobatus*)*** : 1 ex. les 29 et 30.05 à Seilles (PTE).

GOELAND MARIN (*Larus marinus*) : une observation ardennaise : 1 adulte vers le nord le 08.04 à Bra-sur-Lienne (JT). ■ **GOELAND BRUN (*Larus fuscus*)** : signalé à Gaurain-Ramecroix (10-15 ex. en mars et 1-5 ex. en mai – JPCq, MLn), Seilles (3 adultes le 05.04 et de 1 à 5 ex. du 12 au 18.05 – PTE), Harchies et Warcoing (ML, VD, JLc). A noter, une observation ardennaise : 11 ex. vers le nord-ouest le 01.04 à Waimes (NPa). ■ **GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*)** : 600 ex. passent en soirée du 01 au 10.03 à Belgrade, regagnant un dortoir mosan (PDh). L'espèce fréquente encore assidûment la réserve de Seilles en avril-mai, avec un maximum de 47 ex. le 24.04 (PTE). La plupart des autres données proviennent encore de la vallée de la Meuse et du Hainaut (nombreux observateurs). ■ **GOELAND A AILES BLANCHES (*Larus glaucoides*)*** : 1 immature le 15.04 à Nieuport (VD). ■ **GOELAND CENDRE (*Larus canus*)** : les groupes les plus importants sont mentionnés en mars : environ 200 ex. le 23 à Seilles, 100 ex. le 18 à Andenne (PTE) et 50 ex. le 03 à Harelbeke (DVe, LV). L'espèce se raréfie dès début avril, n'étant par la suite plus observée qu'en petit nombre dans le Hainaut occidental et à Harchies où aucune nidification n'est constatée (CRBH). ■ **MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*)** : de 800 à 850 nids sont dénombrés à Harchies (CRBH). ■ **MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*)** : 2 ex. à partir du 21.04 et 4 ex. le 30.05 à Harchies (ML, CRBH), 5 ex. vers le NNW le 23.04 à La Hulpe (FHi) et 1 ex. en vol le 06.05 à Roly (JaE, JoE). ■ **GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*)** : une première observation très précoce de 8 ex. le 04.04 et de 2 ex. le 06 à Harchies (ML). L'espèce n'est revue ensuite que le 22.04 à Grand-Leez (BDe) et le 24 à Seilles, Rhode-Sainte-Agathe et Harchies (PTE, PLt, FHa, CRBH). Le passage s'amorce à ce moment et se prolonge pendant tout le mois de mai, avec un pic au cours de la dernière décade. Des maxima de 30 ex. le 22.05 à Harchies, 12 ex. le 14 à Bambois et 11 ex. le 05 à Virelles (DH, PLt, DE). ■ **STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*)** : des isolés le 21.04 à Rhode-Sainte-Agathe (MWa) et le 27.04 à La Calamine (F.F.F. Kelmis), le 18.05 à Harchies (CRBH) et le 28 à Warcoing (JLc). De plus, un petit afflux est décelé le 31.05 : 1 ex. à Rhode-Sainte-Agathe et Vieux-Héverlée, 2 ex. vers le nord à Warcoing et 13 ex. vers le nord à Escanaffles (TDe, JLc, DH).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : notons quelques couples nicheurs fin avril à Meyerode (HWe) et 2 ex. le 29.05 à Longvilly (ABI, FDF). ■ **PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*)** : des passages importants sont notés en mars, notamment le 02 à Florennes, le 20 à Aineffe, le 21 à Gembloux et les 20 et 22 à Bastogne (RL, LG, LSc, ABI, FDF); par la suite, de petits groupes en migration sont observés jusqu'à mi-avril (MPa *et al.*). ■ **TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*)** : retour assez brusque dès la mi-avril : un premier ex. le 15 à Ogy, un autre le 16 à Olloy-sur-Viroin et cinq données le 17 (G. Vackere, JPSc, LSc, RL, PS, MMn, MPa). A signaler, un chanteur le 21.05 à Eupen, où l'espèce est normalement absente (LSc).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) : deux chanteurs hâtifs le 21.03 à Uccle et le 24 à Profondeville (FHe, MV). L'espèce n'apparaît ensuite que le 11.04 à Nismes, le 12 à Mormont, Harchies, Neuville-en-Condroz et Modave (TDe, JMDu, CRBH, MNB *et al.*). Le passage est intense les jours suivants, le retour se généralisant dans la dernière quinzaine d'avril, sauf dans le Luxembourg où il semble moins abondant que les années précédentes (BI, JMDu, OM, JGa).

HIBOU GRAND-DUC (*Bubo bubo*)* : 1 ex. le 16.04 dans une pinède à Wavreille (HDu, Stage Aves); il s'agit de l'oiseau relâché le 16.11.83 par MPa à Han-sur-Lesse. Voir JACOB et PAQUAY, *Aves* 21 : 55-56. ■ **HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*)** : encore 10 ex. le 18.03 au dortoir de Maubray (JPCq) et autant le 07.04 à Grand-Leez (BDe). ■ **HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*)** : en mars, un seul ex. renseigné : le 09 à Harelbeke (YBa). Plus tard, séjour inhabituel d'un isolé à Walhain-Saint-Paul d'avril à début juin et 1 ex. à Vieux-Héverlée le 31.05 (BDe, TDe). L'espèce aurait niché dans la vallée de la Dyle et certainement dans les Hautes-Fagnes où trois couples se sont cantonnés en Fagne wallonne (JCDe, CD, JMCu). ■ **CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*)** : nidification médiocre en Famenne-Calestienne et à Viroinval (MPa, PDa, PS, ED, YF); en Lesse-et-Lhomme, seulement 19 jeunes sont ainsi bagués contre 71 en 1983, pour les mêmes nichoirs (MPa). ■ **CHOUETTE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*)*** : seule mention de cette espèce : un chanteur le 20.04 à Robertville (RLb, PGa, MB).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) : les premiers sont signalés le 21.04 à Francorchamps, le 22 à Angre, Ploegsteert et Harchies, et le 24 à Woluwe-Saint-Pierre et Chantemelle (L. Remacle, HDu, HDe, J.P. Romain, CRBH, JaE, JoE, AGo). A partir du 25.04, le retour s'intensifie, surtout en Moyenne-Belgique, mais l'espèce reste rare en Ardenne jusqu'au 15.05 (ABI, FDF *et al.*).

PIC CENDRE (*Picus canus*)* : dans l'est de la province de Liège, renseigné en cinquantes dont un ancien réoccupé : 1 ex. le 25.03 et 2 ex. le 27.04 à Rocherath (WP, Exc. Aves), 1 ex. le 19.03 à Membach et un autre le 31.03 en un ancien site de la même commune (LSc), 1 chanteur le 20.05 et 2 ex. dont un chanteur le 22.05 à Eupen (DRa). ■ **PIC MAR (*Dendrocopos medius*)*** : un minimum de 6 cantons dans la région de Jalhay (LSc), 3 couples présents dans la Haute-Lesse (MPa, Stage Aves, Exc. Aves). ■ **PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*)** : bien renseigné, principalement en Brabant et en Famenne, mais aussi en Hainaut, en Pays de Herve et en Lorraine. En Ardenne, noté les trois mois à Mormont (JMDu) ainsi qu'à Harre le 01.04 (JMDu). Un couple également le 09.04 à Heusy (LSc). ■ **PIC NOIR (*Dryocopus martius*)** : principalement renseigné en Famenne-Calestienne et en Lorraine, durant les stages Aves, également en Brabant (HW, SB, SL, FHa, GRa, NR) et dans l'Hertogenwald avec, entre autres, 10 cantons minimum à Membach (LSc). Donnée intéressante : 1 ex. le 26.04 à Oteppe, en Hesbaye hutoise, où l'espèce n'a jamais été rencontrée (CVa). ■ **TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*)** : 1 ou 2 ex., sans doute en halte de migration, du 20.04 au 18.05 à Nismes, Robertville, Chanly, Cerexhe-Heuseux, Matagne-la-Petite, Hoegaarden, Boitsfort, Waremmes et Mouscron (JFN, JMCu, MPa, M. Evrard, PC, TDe, CVa, MWa, JLC). En mai, des chanteurs isolés le 06 à Elsenborn, le 22 à Lanaye, le 23 à Torgny et le 27 à Pondrôme; deux chanteurs le 06.05 à Latour (Exc. Aves, NPa, JDa, BI).

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) : un chanteur le 06.03 à Mont-Saint-Guibert (BDe) et 1 ex. le 12.04 à Woluwe-Saint-Pierre (L. Dubois). ■ **ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*)** : le passage est remarqué durant les deux premières décades de mars, principalement en province de Liège et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, avec des maxima de 30 ex. le 13 à Vaux-Borset (LG) et 29 ex. les 10 et 11 à Presgaux (JHo). Les couples se cantonnent à partir de la fin mars, notamment à Wellin, Nismes, Romedenne, Resteigne, Seilles et Frasnes-lez-Couvin (MPa, Stage Aves, PTe, BDe, PD). ■ **ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*)** : le passage se remarque durant tout le mois de mars et pendant la première décade d'avril, avec un pic migratoire entre le 10 et le 25.03 (RDt, VU, PSc, MCa, MPa, CVa, LSc, ABL, FDF, YF).

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*) : première le 16.03 à Petit-Dour (HSt) puis des isolées du 24 au 30.03 à Gembloux, Gosselies, Uccle, Harchies, Celles et

Vieux-Héverlée (LSc, CI, FHe, CRBH, ED, MWa), ainsi que 12 ex. le 30 à Merbes-le-Château (HB). Le passage ne s'intensifie vraiment qu'à partir du 15.04, date à partir de laquelle des oiseaux sont notés en dehors des plans d'eau (nombreux observateurs). Plusieurs centaines remontent la Meuse le 01.05, sous la pression du mauvais temps (CI). ■ **HIRONDELLE DE FENÊTRE** (*Delichon urbica*) : première le 29.03 à Bambois, puis respectivement 1 et 3 ex. le 31 à Ploegsteert et Houtaing (AHd, HDe, MMn). Jusqu'au 26.04, des individus le plus souvent isolés sont observés partout en Wallonie. Un passage plus intense est signalé fin avril-début mai; il faut cependant attendre le 23.05 pour constater un retour réellement généralisé, très tardif cette année : ainsi, certaines populations locales ne s'installent que dans la dernière semaine de mai (A. Crespeigne *et al.*). L'occupation des sites semble en forte baisse : 2-3 nids occupés à Mormont contre 30 en 1983 (JMDu)! ■ **HIRONDELLE DE RIVAGE** (*Riparia riparia*) : après 1 ex. le 25.03 à Vieux-Héverlée et le 30 à Nivelles (MWa, JHo), l'espèce n'est revue que le 13.04 à Harchies et Maubray (DVe, LV, DDe) et ne devient plus fréquente qu'à partir du 21, les sites de nidification de Fleurus, Maubray, Warneton, Ploegsteert et Vance étant occupés début mai. Cette dernière colonie est abandonnée après le 15.05, vraisemblablement à la suite des mauvaises conditions atmosphériques (JBl, CDM, DDe, DH, JGa).

PIPIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*) : trois données d'avril : 1 ex. le 08 à Theux et le 14 à Neerijse, 4 ex. le 23 à Marche-en-Famenne (LSc, MWa, DE). ■ **PIPIPIT DES ARBRES** (*Anthus trivialis*) : une série de retours précoces attribués à cette espèce les 10 et 11.03 à Sommethonne, Dampicourt et Torgny, le 12 à Tihange, le 16 à Theux, le 17 à Vielsalm et le 18 à Monceau-sur-Sambre (BI, BVo, ADx, BCl, PCs, VD). Aucun passage important ne semble être décelé par la suite, le retour se généralisant à partir de la mi-avril (MPa *et al.*) ■ **PIPIPIT FARLOUSE** (*Anthus pratensis*) : le premier chant est entendu le 04.03 à Fleurus (JBl), avec généralisation à partir de la mi-mars. Le passage reste peu remarqué et se poursuit jusqu'à la fin avril, avec un léger pic entre le 05 et le 17.04, fournissant des maxima d'une centaine d'ex. le 12 à Neupré, de 103 et 89 ex. les 05 et 06 à Heusy, ainsi que 90 ex. le 12 à Membach et le 17 à Faymonville (MNB, GBf, FBI, LSc, NPa). ■ **PIPIPIT SPIONCELLE** (*Anthus spinoletta*) : 14 mentions de 1 à 12 ex. jusqu'à la mi-avril dont six à l'est de la Meuse : Sterpenich, Ensival, Latour, Herve et Waimes (JLG, LSc, BI, Stage Aves, EDg, ADg, Exc. Aves); encore 80 et 70 ex. au dortoir de Cortil-Wodon les 04 et 05.04 (HW). Enfin, un dernier spioncelle, en plumage nuptial, le 27.04 à Bas-Warneton (DH). ■ **BERGERONNETTE GRISE** (*Motacilla alba*) : le passage amorcé fin février s'intensifie progressivement dans la première quinzaine de mars pour culminer fin mars-début avril, avec un maximum de 94 ex. le 25.03 à Meux (LSc) et 100 ex. le 07.04 à Etalle (ABl). De petits groupes sont encore notés tout le mois; dernier passage de 30 ex. le 07.05 à Seilles (Pte), tandis que 20 ex. fréquentent encore ce jour le dortoir de Heusy (LSc). ■ **BERGERONNETTE DE YARRELL** (*Motacilla alba yarrelli*)* : en mars, 1 ex. le 17 à Brasmenil (Mca), le 23 à Theux (VU) et le 27 à Anvaing (MMn). En mai, 1 ex. le 05 à Harelbeke (YBa) et 1 mâle le 23 à Warneton (DH). De plus, une femelle puis un couple hybride (femelle *yarrelli* X mâle *alba*) sont observés les 28 et 29.05 à Warcoing, mais sans suite (JLc, DH). ■ **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX** (*Motacilla cinerea*) : les retours sur les sites de nidification s'échelonnent courant mars, certains couples se cantonnant dans la première quinzaine du mois. En avril, la densité est estimée à un couple par km de rivière sur l'Aisne et ses affluents (JMDu). ■ **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE** (*Motacilla flava*) : une première observation d'un ex. le 20.03 à Gembloux (LSc). Des isolés sont notés début avril, le passage devenant plus fourni dans la seconde quinzaine du mois, avec notamment 12 ex. le 16 à Gembloux et 15 ex. le 17 à Büllingen (LSc, FVs). Après un ralentissement début mai, une nouvelle vague survient dans la deuxième décade avec des maxima de 100 ex. le 15 à Longvilly (ABl, Fdf) et 40 ex. le 12 à Pommeroeul, le 13 à Dolhain et le 16 à Gosselies (VD, ADg, EDg, JBl). Néanmoins, la

migration est considérée comme peu abondante cette année (MPa, CI, YF). ■ **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE NORDIQUE** (*Motacilla flava thunbergi*) : passage observé du 24.04 au 21.05; 16 données de 1 à 5 ex., à l'exception de 10 ex. le 05.05 à Nil-Saint-Vincent (BDe) et 40 ex. le 12.05 à Harchies (DVe, LV). ■ **BERGERONNETTE FLAVEOLE** (*Motacilla lutea flavissima*)* : 1 femelle le 13.05 à Harchies (JLc).

■ **PIE-GRIECHE GRISE** (*Lanius excubitor*) : en Moyenne-Belgique, un hivernant chante le 02.03 à Etterbeek, 1 ex. le 17.03 et le 01.04 à Neerijse (MWa) et le 08.04 à Vieux-Héverlée (FHa). Les autres données proviennent des sites de nidification du sud du sillon Sambre-et-Meuse. ■ **PIE-GRIECHE A TÊTE ROUSSE** (*Lanius senator*)* : 1 mâle le 24.05 à Houdrigny (Bl). ■ **PIE-GRIECHE ECORCHEUR** (*Lanius collurio*) : les deux premières sont signalées le 31.04 à Elsenborn (FVs). Il faut ensuite attendre la mi-mai pour revoir l'espèce : 1 mâle le 16 à Pailhe (RLi), etc. Les retours s'échelonnent à partir de cette date. Seulement donnée en provenance du nord du sillon Sambre-et-Meuse : 1 femelle le 23.05 à Grand-Leez (LSc).

■ **CINCLE PLONGEUR** (*Cinclus cinclus*) : première ponte le 01.04 dans la région de Bomal où 11 couples sont dénombrés dans la vallée de l'Aisne (JMDu); les jeunes naissent vers la mi-avril à Neupont et Lavaux-Sainte-Anne (MPa). Un ex., futur reproducteur, est observé le 13.04 à Wanze, sur la Mehaigne (LG). ■ **TROGLODYTE MIGNON** (*Troglodytes troglodytes*) : dans l'Hertogenwald, les retours se marquent à partir du 24.03 aux altitudes supérieures à 400 m. ■ **ACCENTEUR MOUCHET** (*Prunella modularis*) : passages notés surtout après le 15.03 à Moulins-sous-Féron (PC); en haute Ardenne liégeoise, premiers le 24.03 seulement (LSc).

■ **GRIVE DRAINE** (*Turdus viscivorus*) : une forte concentration est signalée en mars à Forges, avec un maximum de 200 ex. le 17; il en reste 30 ex. le 07.04 (PGI). Un faible passage est encore décelé les 02 et 03.05 à Lillois (TDe). ■ **GRIVE LITORNE** (*Turdus pilaris*) : un important stationnement d'environ 1000 ex. à Ploegsteert et à Warneton du 12 au 22.03 (DH). Le passage s'accroît d'ailleurs à partir du 12, culmine vers le 20.03, se poursuit durant la première quinzaine d'avril et se prolonge même dans les derniers jours du mois dans la région de Bastogne (RDt *et al.*). Le dortoir de Membach est déserté après le 13.04 (LSc). L'espèce continue son expansion en tant que nidificatrice en Moyenne-Belgique : Hesbaye namuroise et liégeoise, vallée de la Dyle, Sart-Dames-Avelines, Harelbeke (LSc, LG, TDe, MWa, LVa, DH, YBa). ■ **GRIVE MAUVIS** (*Turdus iliacus*) : fuite de 1000 ex. devant la neige le 03.03 à Moulins-sous-Féron (PC); la migration débute le 14.03, culmine entre le 25 et le 31.03 et se poursuit jusqu'à la mi-avril (RDt *et al.*). Après quoi l'espèce se raréfie rapidement; encore 4 ex. le 26.04 à Ensival, 1 ex. le 30.04 à Polleur et un tout dernier le 01.05 à Ransart (LSc, DRa, JBl). ■ **GRIVE MUSICIENNE** (*Turdus philomelos*) : au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les retours débutent à la fin de la première décennie de mars (LSc, MPa) et les premiers chants y sont entendus peu après, tandis que la migration s'échelonne jusqu'au début d'avril, avec un maximum entre le 15 et le 25.03 à Pailhe (RLi), le passage étant encore intense le 03.04 dans la région de Rochefort (MPa). Le gros des retours n'est constaté qu'entre le 31.03 et le 08.04 dans l'Hertogenwald, aux altitudes supérieures à 400 m (LSc). A Heppignies, un chanteur imitant à la perfection le cri de la femelle de Coucou et le chant de la Fauvette babillarde (JBl). ■ **MERLE A PLASTRON** (*Turdus torquatus*) : le passage s'amorce fin mars avec 1 ex. le 22 à Marchin, le 29 à Stavelot et dès le 31.03, jusqu'au 11.04, à Tavigny (BVo, MDe, MGs); il devient un peu plus intense vers la mi-avril et se termine début mai avec un mâle à Ere et un autre retardé du 07 au 14.05 à Nivelles (ED, JHo). Les groupes demeurent peu importants : un maximum de 4 ex. le 29.04 à Recogne (MWt). ■ **MERLE NOIR** (*Turdus merula*) : dans l'Hertogenwald, aux altitudes supérieures à 400 m,

les retours se font surtout entre le 31.03 et le 08.04, comme pour la Grive musicienne (LSc). En mai, suite au mauvais temps, aucune réussite de nichée n'est constatée à Ransart (JBI); elle est très faible à Ciergnon (GR). ■ **TRAQUET MOTTEUX** (*Oenanthe oenanthe*) : 1 mâle le 01.04 à Ensival et Braine-l'Alleud (LSc, HW); ensuite 1 mâle le 11.04 seulement à Viville (Stage Aves, PPI). Le passage s'amorce réellement le 14 pour culminer à la fin du mois avec des maxima de 15 ex. le 29 à Recogne et 10 ex. le 28 à Anderlecht (MWt, OH); il se poursuit encore activement au cours des deux premières décades de mai, avec 57 données de 1 à 6 ex. sauf 10 ex. du 01 au 16.05 à Heppignies (JBI). Des attendés à la fin du mois à Grand-Leez, Wareme, Mouscron, Wardin et Longchamps (Na) (BDe, DRa, DH, ABl, FDF, LSc). ■ **TRAQUET PATRE** (*Saxicola torquata*) : un premier mâle le 04.03 à Ampsin-Neuvville (PLY). Le passage est peu marqué; le cantonnement des couples s'effectue courant avril, principalement en Ardenne et en Gaume. La rareté des données semble confirmer la régression de l'espèce. ■ **TRAQUET TARIER** (*Saxicola rubetra*) : les premiers retours le 15.04 à Waimes, Theux et Honnay (Exc. Aves, ADx, MPa, B. Demblon). Le passage culmine fin avril - début mai et se poursuit au cours des deux premières décades de mai tandis que certains couples se cantonnent dès la dernière décade d'avril. ■ **ROUGEQUEUE A FRONT BLANC** (*Phoenicurus phoenicurus*) : un premier mâle très tôt, le 19.03 à Presgaux (TDe), puis un autre le 06.04 à Celles (ED) et deux femelles baguées le 07 à Ombret (JF). Le passage s'amorce réellement le 12, avec un maximum de 10 ex. à cette date à Waimes (NPa), et se poursuit jusqu'à la fin de mai. ■ **ROUGEQUEUE NOIR** (*Phoenicurus ochruros*) : les premiers le 16.03 à Profondeville et à Sourbrodt, le 17 à Godinne (MV, EDg, ADg, JPR). Le retour s'intensifie à partir du 23.03 et se poursuit au cours des deux premières décades d'avril (JT, PC, VU, RLi, ED, MMn, Stage Aves), voire plus tard encore : premier ex. bagué le 26 seulement à Béciers (PDa)! ■ **ROSSIGNOL PHILOMELE** (*Luscinia megarhynchos*) : à Harchies, arrivée d'un premier chanteur le 13.04, de 3 ex. le 15 et de 7 ex. le 21 (DVe, LV, CRBH, MWa). Les retours se remarquent également dès la mi-avril à Mariembourg, Dinant, Tohogne et Lessive (TDe, RL, YF, Stage Aves). L'espèce est particulièrement abondante à Pondrôme où 50 chanteurs sont dénombrés au cours d'une excursion le 27.05 (BI). ■ **GORGEBLEUE** (*Cyanosylvia svecica*) : 1 ex. bagué le 11.03 à Ploegsteert (V. Flamant, PCI), un mâle le 22.03 à Cortil-Wodon (HW), puis le retour se développe à partir de fin mars : à Harchies, 1 ex. le 25.03, 4 chanteurs le 31.03 et 12 chanteurs le 21.04 (CRBH, DVe, LV). Encore deux migrants le 17.04 à Heusy (JCI) et le 20 à Cortil-Wodon (LSc). La population est en progression dans le Tournaisis et occupe deux nouveaux sites : Bas-Warneton et Antoing, avec respectivement 2 et 1 couple (PDB, DH, MLn, JLC); 5 couples à Ploegsteert et 1 à Harelbeke (DH, PVo).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) : 4 cantons à Harchies (CRBH), 3 à Hautrage en avril (DE) ainsi qu'un oiseau le 11.03 à Ploegsteert (PCI) et un chanteur, de passage le 29.04 à Fumal (CVA). ■ **LOCUSTELLE TACHETEE** (*Locustella naevia*) : premiers retours le 17.04 à Harchies, le 20 à Cortil-Wodon, Péronnes, Froyennes et Ave-et-Auffe (CRBH, ML, LSc, JPCq, Stage Aves). Le retour ne se généralise qu'entre le 05 et le 15.05; l'espèce est cependant moins abondante qu'en 1983 dans la région de Rochefort (MPa). ■ **LOCUSTELLE LUSCINOIDE** (*Locustella luscinioides*) : 1 chanteur dès le 25.04 à Berg (JaE, JoE) et le 12.05 à Harchies (HB). ■ **ROUSSEROLLE TURDOIDE** (*Acrocephalus arundinaceus*) : au complexe d'Harchies-Pommeroeul, 1 chanteur le 29.04 et le 12.05, 2 chanteurs dès le 19, 4 par la suite (JPJ, BDe, HDu, CRBH, ML, DVe, LV, JaE, JoE). En outre, 1 chanteur dès le 18.05 à Sart-Dames-Avelines (LVa, TDe) et à partir du 25.05, pendant une semaine, à La Calamine (F.F.F. Kelmis, Exc. Aves). ■ **ROUSSEROLLE EFFARVATTE** (*Acrocephalus scirpaceus*) : premier retour le 17.04 à Harchies (ML, CRBH), le 23 à Ploegsteert (PCI), le 24 à Seilles (PTE), le 25 à Berg (JaE, JoE); fin avril - début mai, les chanteurs sont partout mais en petit nombre, le gros des migrants n'arrivant que vers

le 25.05. A l'est de la Meuse, elle est signalée en mai à Dampicourt, Vance et Pondrôme (PPi, JGa, BI). ■ **ROUSSEROLLE VERDEROLLE** (*Acrocephalus palustris*) : un premier migrateur très précoce le 26.04 à Auderghem (FHe), ensuite 8 données du 06 au 19.05. A partir du 20.05, les retours se généralisent rapidement. ■ **PHRAGMITE DES JONCS** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : un premier ex. le 10.04 et 6 chanteurs dès le 21 à Harchies (ML); en outre, des isolés le 21.04 à Vieux-Héverlée, le 25 à Berg et Rosières (MWa, JaE, JoE, GRa, NR). En mai, deux couples nicheurs à La Buissière et 1 couple à Bas-Warneton, nouveau site pour l'espèce (HB, DH, VD). Encore 1 ex. de passage le 19.05 à Theux (ADx). ■ **HYPOLAIS ICTERINE** (*Hippolais icterina*) : premiers chanteurs le 12.05 à Walzin et Harchies, le 13 à Namur, le 14 à Gembloux et Ans (RL, BDe, JPR, LSc, PLe). Le retour se généralise à partir du 25.05. ■ **HYPOLAIS POLYGLOTTE** (*Hippolais polyglotta*)* : la réoccupation des sites connus est signalée dès le 19.05 à Wavreille, le 22 à Noisieux, le 27 à Harre, le 28 à Frasnès-lez-Couvin et le 30 à Latour (MPa, FMr, JMDu, PD, BI). ■ **FAUVETTE A TÊTE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*) : 2 ex., probablement des hivernants, le 08.03 à Auderghem (FHe). Il faut attendre en effet le 01.04 pour entendre les premiers chants à Harchies (ML); ensuite 1 mâle le 07 à Forges et à Woluwe-Saint-Lambert (PGI, JaE, JoE). Les retours restent timides jusqu'au 15.04, la présence de l'espèce ne se généralisant qu'après le 20, ce qui est très tardif. ■ **FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*) : un premier chanteur le 14.04 à Vieux-Héverlée (MWa), puis 1 ex. le 17 à Dampicourt et Daverdisse (BI, Stage Aves). Les retours s'intensifient dès fin avril - début mai, mais restent relativement discrets car peu d'oiseaux chantent alors, en raison du mauvais temps. L'espèce est particulièrement abondante en mai dans la région de Bomal (YF). ■ **FAUVETTE GRISLETTE** (*Sylvia communis*) : 1 ex. précoce le 04.04 (AHD), suivi de deux chanteurs le 17 à Harchies et Floriffoux (ML, CRBH, PDh). L'espèce apparaît ensuite partout au cours de la dernière décade d'avril. ■ **FAUVETTE BABILLARDE** (*Sylvia curruca*) : premiers retours le 13.04 à Saint-Mard (JPJ), le 14.04 à Lessive (MPa), le 15 à Harchies et Belvaux (DVe, LV, Stage Aves) ainsi que le 17 à Ombret (JF). Le retour se généralise dans la dernière décade d'avril. L'espèce est abondante cette année en mai dans la région de Burdinne (CvA). ■ **POUILLOT FITIS** (*Phylloscopus trochilus*) : un chanteur exceptionnellement précoce le 07.03 à Flobecq (MMn), puis normalement le 29.03 à Lillois (J.P. Romain), le 31 à Noirmont, Quaregnon et Harchies (BDe, CRBH, ML, RML). Le passage reste très faible au cours de la première décade d'avril, puis s'intensifie brusquement du 10 au 20.04, date à laquelle les retours sont généralisés. ■ **POUILLOT VELOCE** (*Phylloscopus collybita*) : les observations de début mars concernent sans doute déjà des premiers migrants, étant donné l'hivernage très réduit : 1 ex. les 04 et 05 à Vierves-sur-Viroin (TDe, F. Migeotte), le 06 à Amay et Wegnez (FHe, LSc), le 09 à Namur (BDe), ... Les retours restent néanmoins timides jusqu'au 25.03, certaines premières observations locales, surtout en Ardenne, n'ayant lieu qu'à ce moment (ABl, FDf, RDt, YF, BI, PLe, ADx, CvA, MGe, PC, JBl, MMn, MPa). Le passage semble en général très réduit et se déroule avec une dizaine de jours de retard par rapport à 1983. ■ **POUILLOT SIFFLEUR** (*Phylloscopus sibilatrix*) : les arrivées se déroulent rapidement dans la dernière décade d'avril : un premier ex. le 20, 4 chanteurs le lendemain, retour généralisé dès le 22 dans la région de Rochefort (Stage Aves, MPa). Le passage ultérieur est peu décelé; l'espèce est abondante fin mai en Haute-Belgique. ■ **POUILLOT DE BONELLI** (*Phylloscopus bonelli*)* : les observations de l'oiseau cantonné à Engis sont détaillées par FOUARGE dans *Aves* 21 : 192-193. ■ **ROITELET HUPPE** (*Regulus regulus*) : un mâle chanteur le 21.03 à Mouscron, où l'espèce n'est pas nicheuse (DH). ■ **ROITELET TRIPLE-BANDEAU** (*Regulus ignicapillus*) : le passage s'amorce fin mars, se prolonge en avril avec un pic dans la seconde quinzaine du mois. Dans l'Hertogenwald, l'espèce est absente jusqu'au 12.04, 84 ex. dont 68 chanteurs sont recensés le 23, le nombre de contacts diminuant par la suite (LSc).

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) : premiers retours le 30.04 à Jehay-Bodegnée (E. Melin) et le 01.05 à Jemelle (MPa). Le passage, assez discret, se remarque surtout dans la première quinzaine de mai. A signaler 6 couples sur 2 km² en mai à Mouscron (DH). ■ **GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*) : cinq premiers retours sont renseignés dès la deuxième décennie d'avril : 1 ex. le 16 à Gembloux, le 17 à Vance et Halma, les 18 et 19 à Habay-la-Vieille (JGa, Stage Aves, ACo). Puis le passage prend de l'ampleur au cours des derniers jours du mois et pendant la première semaine de mai. L'afflux principal est décelé du 24.04 au 03.05. Des nidifications ne sont renseignées qu'à Saint-Hubert (plusieurs), Etalle et Namur (MWt, JLG, GR).

MESANGES DIV.ESP. (*Parus spp.*) : mauvaises reproductions un peu partout. ■ **MESANGE NOIRE** (*Parus ater*) : abondance très anormalement élevée en mars dans la région de Rochefort et dans l'Hertogenwald (MPa, LSc). ■ **MESANGE REMIZ** (*Remiz pendulinus*)* : premières observations de printemps de cette espèce en Wallonie : 2 ex. du 04 au 11.04 à Harchies (CRBH, ML), 4 ex. les 11 et 12.04 à Musson (La Cussinière) (Stage Aves, PPI) et 1 ex. bagué le 29.04 à Theux (ADx). ■ **MESANGE A MOUSTACHES** (*Panurus biarmicus*) : 1 ex. bagué le 11.03 à Ploegsteert (HDe).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) : un très faible passage d'oiseaux chanteurs est ressenti dans la deuxième décennie de mars ainsi que la première décennie d'avril. Les groupes sont rares : 19 ex. le 17.03 à Walhain-Saint-Paul, 13 ex. le 25 à Gembloux, 10 ex. le 08.04 à Angre (BDe, LSc, HDu). L'espèce semble rare en mai dans les régions de Bomal et Warcoing-Mouscron et en Lorraine (YF, JLc, BI). Par contre, elle demeure commune en Hainaut oriental et en Hesbaye (JBI, HB, LG, MGe). ■ **BRUANT JAUNE** (*Emberiza citrinella*) : la migration, assez fournie, débute dès les premiers jours de mars, culmine pendant la seconde décennie et se prolonge jusqu'à la fin avril en certaines régions. Des groupes de plusieurs dizaines sont communs, jusqu'à 200 ex. le 19.03 à Mabompré (FLU). La population nicheuse est en général bien représentée dans toutes les régions, surtout en Lorraine, en Ardenne méridionale, en Famenne, en Hesbaye et en Brabant (JGa, BI, JLG, MTi, MPA, Stage Aves, LG, MWa). ■ **BRUANT ORTOLAN** (*Emberiza hortulana*) : à la suite de la persistance d'un vent d'est, un afflux inhabituel de migrateurs est constaté du 10.04 au 07.05, avec 21 données de 1 à 3 ex. Les derniers isolés sont notés le 13.05 à Seraing-le-Château et à Lamontzée (LG, CVa). ■ **BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schoeniclus*) : un léger mouvement migratoire est décelé dès le 10.03; il prend de l'ampleur à la fin du mois puis décroît dès la première décennie d'avril. Parmi les groupes les plus fournis, citons (en mars) 100 ex. le 24 à Saint-Séverin, 75 ex. le 14 à Grand-Leez, 60 ex. le 20 à Fouches, 50 ex. le 15 à Vaux-sur-Sûre et le 20 à Oost-Maerland, etc. (MNB *et al.*, LSc, PPI, ABI, FDF, JDa). Au dortoir de Cortil-Wodon, plus de 100 ex. sont recensés le 22.03, 80 le 29, les 20 derniers y sont observés le 05.04 (HW).

GROS-BEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) : nombreuses données. L'espèce est notamment observée en nombre dans certaines contrées ardennaises en mars : 70 ex. le 02 à Mormont (JMDu), 50 et 57 ex. les 02 et 03 à Heusy (LSc), 40 ex. le 04 à Bomal (YF), 30 ex. le 03 à Liège (PC), ... Ces groupes importants disparaissent fin mars - début avril. ■ **VERDIER D'EUROPE** (*Carduelis chloris*) : fort peu renseigné; un passage est décelé de fin mars jusqu'au 15.04 (MPa) et une concentration de 400 ex. est notée le 08.04 à Roisin (HDu). L'espèce est très abondante au Pays de Herve et dans la région de Tournai (JDa, DDe). ■ **CHARDONNET ELEGANT** (*Carduelis carduelis*) : faible passage à partir de début mars, se poursuivant en avril avec un léger afflux de la dernière décennie d'avril au 15.05. Il demeure généralement rare ce mois et les groupes dépassent rarement 10 ex. : 10 à 25 ex. en mars-avril à Harchies, 20 ex. le 01.05 à Genappe et 16 ex. le 11.03 à Beauraing (HDu, ML, JMTe, DVe, LV, TDe, FHe). Des couples nicheurs sont

renseignés principalement en Hesbaye namuroise, en Lorraine et dans la région de Bastogne (LSc, BDe, TDe, BI, PPI, JGa, JLG, RDt). ■ **TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*) : le passage, peu fourni, est observé jusqu'à la mi-avril; aucun groupe important, au plus 50 ex. le 02.03 à Gembloux et le 08.04 à Virelles (BDe, JPSc), 35 ex. le 05.03 à Harelbeke (DH), 40 ex. tout mars à Harchies, plus que 20 le 07.04 et derniers le 12.04 (HDu, CRBH, DV). Derniers passages observés le 08.04 à Kraainem (SB, SL) et les 11 et 16 à Frandeux (MPa). Des chanteurs fixés sont entendus en avril-mai à Membach, Goé, Huy et Woluwe-Saint-Lambert (LSc, BVo). ■ **LINOTTE MELODIEUSE** (*Carduelis cannabina*) : la migration est observée durant tout le mois de mars, timidement la première quinzaine, plus régulièrement et d'une façon plus fournie la seconde. Cette situation se prolonge en avril avec un afflux plus important dès le 15. Les groupes demeurent restreints : 100 ex. le 21 à Pommerœul (ML), 120 ex. le 18 à Sourbrodt (NPa) et 250 ex. les 20 et 23 à Cortil-Wodon et Seilles (LSc, PTe). ■ **SIZERIN FLAMME** (*Carduelis flammea*) : fort peu renseigné : un petit passage est décelé de la mi-mars à la deuxième décade d'avril (JGa, PC, JT, RL, FDg, ADg, SB, SL, MI, FVs); seul petit groupe : 8 ex. le 19.03 à Bra-sur-Lienne (JT). Surtout des données en provenance des Hautes-Fagnes (LSc, DRa, G. de Potter). ■ **SERIN CINI** (*Serinus serinus*) : déjà un migrateur chanteur le 15.03 à Gembloux (BDe). Ensuite, un passage important est observé pendant toute la période et jusqu'à fin mai, culminant du 15.04 aux premiers jours de mai. Le plus souvent de 1 à 3 ex., jusqu'à 15 ensemble le 30.04 à Houdrigny (BI). En mai, de très nombreux chanteurs fixés entendus principalement en Lorraine, en Brabant, en Hainaut et en Hesbaye namuroise (nombreux observateurs). ■ **BOUVREUIL PIVOINE** (*Pyrrhula pyrrhula*) : très peu observé ce printemps, notamment en mars et mai; un tout léger passage est cependant décelé la deuxième décade d'avril. L'espèce est beaucoup plus rare que les années précédentes en Famenne selon MPa. ■ **BECCROISE DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*) : suite à l'hivernage consécutif à l'invasion de 1983, un passage printanier fourni se développe de la mi-février à la fin avril, avec un pic évident constaté uniquement dans l'Hertogenwald la dernière décade d'avril (LSc). Les toutes dernières observations de mars à l'ouest de la zone de reproduction sont enregistrées le 07 à La Hulpe (2 ex.), le 10 à Pailhe (2-3 ex.), le 18 à Rhode-Sainte-Agathe (1 couple); l'espèce est encore renseignée le 20 à Pailhe (FHi, FHa, RLi). Elle est alors fixée en Ardenne, en Lorraine et en Famenne. La nidification est dans l'ensemble tardive et les premiers jeunes n'apparaissent que le 11.03 à Membach et le 25 à Elsenborn (LSc, WP). Suit une dizaine de mentions de juvéniles en avril-mai en Ardenne méridionale et en Fagne-Famenne. ■ **PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*) : un passage important est observé dès le 10.03, culminant du 20 au 30 et se prolongeant jusqu'à la deuxième quinzaine d'avril. Les groupes les plus importants sont observés en mars : le 21 à Hompré (1.000 ex.), le 24 à Membach (400 ex.) et le 15 à Gembloux (320 ex.) (RDt, LSc). ■ **PINSON DU NORD** (*Fringilla montifringilla*) : suite à l'abondance de février, une migration très importante est remarquée en mars, au cours des première et dernière décades principalement, et surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Elle se poursuit localement avec intensité avant de s'estomper subitement le 15 avril. Parmi les groupes les plus remarquables, citons 60 à 70.000 ex. le 01.04 à Heppenbach et 6.000 ex. le 11.04 à Membach (Exc. Aves, LSc). Deux données de mai, les 12 et 13.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) : retard dans la nidification et petit nombre d'œufs par ponte en mai à Celles (ED, PDa, PS).

LORIOT (*Oriolus oriolus*) : premiers le 22.04 à Thoremçais (BDe), le 02.05 à Monceau-sur-Sambre (VD) et le 03.05 à Pommerœul (SB, SL, JoE). L'espèce devient plus fréquente dans la deuxième décade de mai. Sa rareté par rapport aux années précédentes est remarquée en Gaume.



Beccroisé des sapins (Loxia curvirostra), Houffalize, mars 1984 (Photo Olivier Small-Mo).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)* : 6 ex. vers l'ENE le 09.03 à Libin (RLi). En avril, 1 ex. les 03 et 29 à Sommethonne (BI) et le 07 à Attert (ABI, FDI). ■ **CORNEILLE MANTELEE (*Corvus corone cornix*)** : une observation exceptionnellement tardive d'un ex. le 28.05 à Frasnes-lez-Couvin (PD). ■ **CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*)** : des passages sont remarqués jusqu'au 23.03, principalement en Haute-Belgique et en Hesbaye (LSc, BDe, FDI, JMo, JDa, LG, JFi, FHi, FHe, JMDu, NPa). De nouvelles colonies s'installent à Flamierge, Buissonville, Dailly et Ohey; en outre, un couple isolé à Longchamps (Lux.) (FDf, MPa, MI, RLi, LSc). ■ **CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*)** : passages avec des Corbeaux freux les 18 et 23.03 à Mormont et les 20 et 21 à Aineffe (JMDu, LG). La réoccupation des nids se fait à la fin du mois; une colonie de 300 ex. sur une falaise le 17.05 à Seilles (PTe). ■ **CASSENOIX MOUCHETE (*Nucifraga caryocatactes*)** : observé dans la zone de reproduction classique de la haute Ardenne liégeoise : Stavelot, Lierneux, Hockai, Francorchamps et Bra-sur-Lienne (NPa, MDe, BVo, JCl, RLi, JT). En outre, plusieurs couples signalés en mai à Oignies (PDa, PS, ED); 1 ex. le 30.05 à Mormont (JMDu).