

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1984/3

JUIN, JUILLET, AOUT

par Denis et Marie-des-neiges VAN DER ELST (1)

Elaboration du fichier : D. DE BOECK, J.M. COUVREUR, C. DEHEM

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées pendant la période considérée : voir chronique précédente (p. 55-56 de ce bulletin).

CONDITIONS CLIMATIQUES

Les températures enregistrées au cours du mois de juin sont anormalement basses pour la saison. Un vent dominant du secteur ouest engendre un ciel couvert et un ensoleillement inférieur à la normale. Au cours du mois de juillet, le temps reste assez perturbé. Nous subirons quatre périodes de pluie dont une ininterrompue d'une semaine vers la moitié du mois. L'ensoleillement est légèrement inférieur à la normale. Ces conditions perturbées subsistent au début du mois d'août, avant de faire place au vent d'est, au soleil et à de hautes températures qui persisteront jusqu'à la fin de ce mois.

FAITS SAILLANTS

A la lecture des rapports d'observations, il apparaît que la saison de nidification fut très défavorable. Nombreux sont ceux qui signalent une arrivée très tardive des nicheurs, l'échec des premières pontes et le très faible nombre de jeunes à l'envol, ce que d'ailleurs des résultats de baguage auraient confirmé. L'importance du flux migratoire noté était également faible. Les observateurs imputent avant tout cette situation aux conditions atmosphériques déplorables : la pluie et le froid auraient empêché les oiseaux de mener à bien leurs nichées... mais aussi les ornithologues de se risquer dans les bourrasques. A part cette morosité, peu de changements marquants à signaler, les mêmes espèces restant toujours stables, en progression ou en recul.

C'est pourquoi nos commentaires, dans cette chronique d'été, sont généralement très succincts; très peu d'observations sont citées. Nous tenons toutefois à faire remarquer aux observateurs qu'ils ne doivent en aucun cas déduire que si leurs observations ne sont pas reprises, c'est parce qu'elles sont dépourvues d'intérêt.

A cet effet, nous voudrions rappeler à tous la raison d'être des rapports d'observations que nous vous demandons d'envoyer à la C.O.A. : le but principal n'est pas

Reçu le 24.03.1985. Accepté le 17.04.1985.

(1) Dieweg 62, B-1180 Bruxelles.

d'épingler les raretés ou anomalies, mais de rassembler un maximum de données pour nous permettre, par les chroniques mais aussi par des études spécifiques, de décrire le statut des espèces qui vivent dans nos régions et d'en surveiller l'évolution.


Voyons par exemple le cas de la Pie-grièche grise : depuis environ 1966, la C.O.A. a récolté de nombreuses données partout en Wallonie et dans le Brabant. Lors de l'enquête «Atlas des oiseaux nicheurs», pour la première fois, cette espèce a été recherchée de façon systématique partout. Les résultats de ce travail ont été publiés (LEDANT, JACOB et DEVILLERS, 1983). Depuis lors, son statut a pu évoluer : elle a pu disparaître, apparaître ou être découverte, ou encore augmenter dans certaines régions. Le rôle de la Chronique devrait être de suivre cette évolution et, par exemple, de publier chaque année une nouvelle carte de répartition des nicheurs. Cependant, une couverture idéale est loin d'être atteinte. En 1984, de vastes zones n'ont reçu la visite d'aucun ornithologue et nous savons que des régions importantes ont été visitées mais que les observateurs concernés n'ont malheureusement rien communiqué à la C.O.A. Les fichiers de la C.O.A. restent un outil très imparfait. En conclusion, nous ne remercions jamais assez ceux qui nous apportent leur collaboration mais nous devons aussi rappeler aux autres quelle est leur responsabilité lorsque, en empêchant la constitution de solides dossiers, ils ne permettent pas aux protecteurs de décrire et de comprendre par exemple le déclin d'une espèce et de tenter d'y remédier.

Pendant la période considérée, les dimanches tombent aux dates suivantes : 03, 10, 17 et 24 juin; 01, 08, 15, 22 et 29 juillet; 05, 12, 19 et 26 août.

DETAIL DES OBSERVATIONS

■ **GREBE HUPPE** (*Podiceps cristatus*) : par rapport aux recensements de 1980 et 1981 (J.P. JACOB, *Aves* 20 : 1-24), la nidification est notée en de nouveaux sites : Maubray, Bois de la Cambre (Bruxelles), Zétrud-Lumay (JPCq, HW, TMq) et, en Haute-Belgique, Yvoir et Coq (RL, MDe, MWt, J.P. Fouarge). Les premières nidifications auraient été mauvaises, notamment à Bernissart (ML). A noter l'importance prise par la darse de Lanaye : 28 ad. et 15 jeunes le 06.08 (DRa). Aucune mention de rassemblements post-nuptiaux. ■ **GREBE JOUGRIS** (*Podiceps grisegena*)* : 1 ad. en plumage nuptial du 03 au 17.06 à Pommeroeul (DVe, LV), 1 ex. à Weerde le 12.08 (FHi) et de 1 à 3 ex. à Bernissart à partir du 25.08 (CRBH, DVe, LV). ■ **GREBE A COUNOIR** (*Podiceps nigricollis*)* : 2 couples nicheurs à Bernissart, les derniers oiseaux y étant notés le 23.08 (CRBH, nombreux observateurs). La reproduction n'avait plus été prouvée en Wallonie depuis près de dix ans. Ailleurs, il est seulement signalé le 16.06 à Harelbeke (YBa) et le 30.07 à Lattour (JBl). ■ **GREBE CASTAGNEUX** (*Tachybaptus ruficollis*) : bien signalé dans son aire de répartition connue. En général les pièces d'eau n'abritent que 1 ou 2 couples, les plus grandes concentrations étant notées à Ploegsteert, Maubray et Harchies-Pommeroeul, avec de 6 à 8 couples (DH, JPCq, CRBH). Plusieurs mentions dans la région de Bastogne, Arlon et Libramont (PPI, MWi) et une nidification à Elsenborn (LSc).

* Donnée soumise à la Commission d'Homologation, citée dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.



Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis)
(Photo Sloomakers - Visa ABPN-BVNF).

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : l'estivage complet de quatre exemplaires est noté à Harchies-Pommerœul (CRBH, nombreux observateurs). A partir du 27.07, il est signalé en très petit nombre en Moyenne-Belgique.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) : un grand nombre de mentions proviennent de toutes les régions. Toutes concernent de très petites troupes. Seuls les marais d'Harchies abritent en permanence de 30 à 40 ex. (HB *et al.*). Aucun mouvement migratoire n'apparaît nettement. La nidification est signalée à Pailhe, Pessoux (RLi) et Howardries (PS, PR). ■ **HERON POURPRE (*Ardea purpurea*)** : trois observations : le 27.07 et le 06.08 à Bernissart (CRBH, MMn), le 29.07 à La Hulpe (FHi). ■ **HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*)*** : une observation le 20.06 à Ramillies (CJ). ■ **BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*)** : deux couples nicheurs probables à Bernissart (CRBH, ML, J&N, PAn) et nidification à Ploegsteert où 3 mâles sont notés le 18.06 (DH, MWi); un exemplaire le 16.08 à Nivelles (ALc). L'espèce est apparue moins fréquente qu'en 1983. ■ **GRAND BUTOR (*Botaurus stellaris*)** : observations d'un couple probablement nicheur en juin-juillet à Harchies (CRBH *et al.*); à Ploegsteert, 1 ex. les 26.06 et 07.07 (DH, J. Provost).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : présente dans l'extrême est du pays début juin (MPe, ABi). A partir du 21.08, un passage important est signalé dans les régions liégeoise et namuroise surtout (RLi, AMo, BI, RDt, B. Davreux). Plusieurs troupes, d'un maximum de 21 ex., passent la nuit sur des toits de maisons. ■ **CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*)*** : étonnamment peu signalée : seulement 1 ex. à Elsenborn le 24.06 (DRA) et 2 ex. à Villers-sur-Lesse le 30.06 (L. Meganck, M. Delisse).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) : l'espèce est principalement signalée dans le Hainaut et nous n'avons aucune donnée pour 14 des 23 sites occupés en 1980 ou 1981 en Wallonie et Brabant (J.P. Jacob, *Aves* 20 : 65-91). La nidification n'est prouvée qu'à La Hulpe (FHi, FHa) et à Ploegsteert (DH) et serait probable, un seul couple, à Harchies (CRBH). ■ **SARCELLE D'ETE** (*Anas querquedula*) : un couple nicheur à Esquelmes (DDe, JLc) et Ploegsteert (DH), trois couples probables à Bernissart (CRBH). La présence est régulière à Warcoing, La Buissière et Grand-Leez (DH, JLC, VD, BDe, JPJ). Aussi signalée en juin à Roly (MI). Ailleurs, un très faible passage est décelé à partir du 24.06 (3 sites seulement). ■ **CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*) : pas de preuve de nidification mais présence constante d'au moins un couple à Harchies (HDu, DVe, LV, CRBH); en juin, quelques oiseaux à La Buissière, Bas-Warneton et Roly (HB, DH, MI). ■ **CANARD SIFFLEUR** (*Anas penelope*) : présence étonnante d'un oiseau à Seilles les 01 et 04.06 (Pte) et de 2 ex. le 21.07 à Bernissart (LV). ■ **CANARD PILET** (*Anas acuta*) : un exemplaire le 26.08 à Pommerœul et le 31.08 à Neerijse (DVe, LV, FHa). ■ **CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*) : 1 couple nicheur à Bas-Warneton (DH), la reproduction étant aussi prouvée à La Hulpe. En juin, présence dans la vallée de la Haine ainsi qu'à Gozée, Roly, Warcoing, Andenne et Longchamps (Lux.) (HDu, FHe, DVe, LV, CI, MI, Pte, DH, JLc, ABi, FDi). En août, très peu d'observations, et uniquement en Basse et Moyenne-Belgique. Le maximum est noté ce mois à Pommerœul : 85 ex. (HDu). ■ **NETTE ROUSSE** (*Netta rufina*) : 1 ex. le 11.06 à Warcoing, 1 mâle + 4 femelles en août à Rhode-Sainte-Agathe et 3 femelles le 16.08 à Genappe (JLc, FHa, LVa). ■ **FULIGULE MILOUINAN** (*Aythya marila*) : 1 femelle les 16 et 28.08 au barrage de La Gilleppe et 1 mâle adulte le 30.08 à Latour (LSc, JBI). ■ **FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*) : la progression semble continuer : par rapport à 1981 la nidification est nouvellement constatée à Ploegsteert, La Buissière, Vossem, Hoegaerden et Lanaye (HB, CVa, MWi, JMTe, DRa), mais dans la Dyle, au lieu des 71 couples trouvés en 1981, MWa et FHa n'en retrouvent qu'une quarantaine. Il faut aussi noter sa présence en juin à Roly et surtout à Recogne, avec un maximum de 5 mâles et 2 femelles le 08 (CLy, HG, MI, MWt). ■ **FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*) : au moins 45 nichées ont été notées; Harchies-Pommerœul, Grand-Leez et Rhode-Sainte-Agathe abritent toujours les plus grandes «colonies». Plusieurs autres sites abritent des oiseaux cantonnés ou nicheurs, par exemple Sart-Dames-Avelines, Roly (1 nichée), Ploegsteert (5 nichées) (TDe, CI, CLy, HG, JMTe, DH). A l'est de la Meuse, noté à partir du 29.07 à Latour (JLG, PPI). ■ **TADORNE DE BELON** (*Tadorna tadorna*) : outre à Harchies, quelques couples sont aussi cantonnés à Warcoing et à Bas-Warneton (JPCq, DDe, PDB, MLn *et al.*). Dernière mention le 21.07 à Harchies (LV).

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) : parmi les observations reçues, on retient plus particulièrement 5 couples nicheurs dans le Parc naturel de la Burdinale (CVa) et des mentions près de Bruxelles dont 1 ex. en pleine ville, à Woluwe-Saint-Pierre, le 22.06 (CGe). En outre, 1 femelle le 02.06 à Gembloux (LSc). En dehors de l'aire de répartition déterminée par LEDANT *et al.* (1983), il est encore signalé régulièrement à Ransart (JBI). Deux couples sont trouvés dans la forêt de Soignes (FHi). Les premiers mouvements sont notés début août. ■ **AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*) : l'Autour est beaucoup moins signalé que l'Epervier. Au nord de l'aire déterminée par LEDANT *et al.* (1983), une nidification est notée à Ransart (CLy); 2 ex. vers le NW le 15.06 à Walhain (BDe). En août, la dispersion en Moyenne-Belgique se remarque en Hesbaye liégeoise, à Rhode-Sainte-Agathe et à Hoeilaart (LG, CVa, FHa, MWa). ■ **MILAN ROYAL** (*Milvus milvus*) : fréquemment rencontré dans l'est du pays. En Basse et Moyenne-Belgique, une observation le 04.06, les 01 et 29.08 à Bernissart (CRBH, DVe, LV), ainsi que le 05.08 à Bruxelles (JPJ). La rareté récente de l'espèce dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse semble se confirmer. A noter enfin, 1 ex. vers le NE le 02.06 à Avin (P. David). ■ **MILAN NOIR** (*Milvus migrans*) : 22 données en provenance du sud de l'Entre-Sambre-et-

Meuse, de Haute-Belgique et de Lorraine belge, où la population serait de 4 couples nicheurs (PPI). A signaler, 1 ex. les 16.06 et 01.08 à Pommerœul (HDu, CRBH, DH). ■ **BONDREE APIVORE** (*Pernis apivorus*): bien que principalement notée en Haute-Belgique, des données, notamment de nidification, proviennent de toutes les régions, y compris du Hainaut occidental (CRBH, J&N, HDu, ML, PS). ■ **BUSARD DES ROSEAUX** (*Circus aeruginosus*): sauf deux, toutes les observations proviennent du nord du sillon Sambre-et-Meuse. Il y a moins d'estivants que les années précédentes en Moyenne-Belgique et l'espèce ne semble pas avoir niché ailleurs qu'à Harchies. Le passage est peu marqué en août. ■ **BUSARD SAINT-MARTIN** (*Circus cyaneus*): quatre mentions d'août: 1 femelle du 04 au 18 à Bütgenbach (EBr), 1 mâle le 17 à Walhain (BDe) et le 22 à Acosse (P. David), 1 femelle le 25 à Aineffe (LG). ■ **BUSARD CENDRE** (*Circus pygargus*): un mâle la deuxième quinzaine de juillet à Schockville (EBr). ■ **BALBUZARD PECHEUR** (*Pandion haliaetus*): fin de la migration de printemps ou erratisme avec 1 ex. le 01.06 à Harchies, le 17 à Bousval et le 21.06 à Ransart (CRBH, HW, JBI). En août, il réapparaît à Bernissart le 03, le 09 à Rhode-Sainte-Agathe et le 28 à Roly (CRBH, DVe, LV, BDe, N. Kennis, FMa, FMz), mais il n'est repéré nulle part ailleurs. C'est très peu.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*): 1 ex. le 23.07 à Namur (FMn). Mais on peut se demander, comme pour la plupart des observations de cette espèce dans notre pays, s'il s'agit d'un oiseau sauvage ou de fauconnerie. ■ **FAUCON EMERILLON** (*Falco columbarius*): deux observations de mâles, rapportées par FMz à Gimnée et JLc à Saint-Léger (Hainaut), les 25 et 27.08. ■ **FAUCON HOBEREAU** (*Falco subbuteo*): assez bien signalé en Hautes-Fagnes et dans la région de Bastogne-Arlon, et bien suivi dans le Brabant où l'espèce semble plus commune que soupçonné. Enfin, quelques cas en Hainaut occidental, dont une nidification à Escanaffles (JLc). Très peu de migrateurs signalés. ■ **FAUCON CRECERELLE** (*Falco tinnunculus*): il n'a été recherché systématiquement que dans le Parc naturel de la Burdinale: 6-7 couples nicheurs (CVa).

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*): de nombreux échecs de couvées sont signalés dans le Parc naturel de la Burdinale (CVa). ■ **CAILLE DES BLES** (*Coturnix coturnix*): des chanteurs sont signalés en juin à Aineffe, Othée, Limbourg, Fronville, Ploegsteert et Warcoing mais leur cantonnement n'est pas noté (LG, MGe, ADg, EDg, DE, DH, JLc). Un migrateur nocturne à Woluwe-Saint-Lambert, le 11.06 (JaE, JoE). En août, 2 mentions seulement, le 14 à Corroy-le-Château et le 18 à Tintigny (L. Bernard, RDu). En 1984, le nombre de mentions est sensiblement inférieur à celui noté en 1983.

RALE DE GENETS (*Crex crex*): minimum 13 chanteurs ont été repérés; il se confirme donc que l'espèce n'est plus exceptionnelle chez nous. Le détail des observations fera l'objet d'une publication spécifique.

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*): en Hainaut occidental, 1 ex. à Bas-Warnton le 01.06 (PDB), à Harchies le 08 et le 14 (CRBH) et à Gaurain-Ramecroix le 25.08 (MLn). ■ **VANNEAU HUPPE** (*Vanellus vanellus*): bien signalé lors de la nidification; dès le mois de juin des rassemblements et des déplacements épars sont notés partout. Curieusement, les seuls rassemblements dépassant 1000 ex. ne sont pas notés en Hesbaye ou Hainaut mais dans la région de Saint-Vith et à Elsenborn (HWe, LSc). ■ **PLUVIER DORE** (*Pluvialis apricaria*): l'espèce réapparaît avec discrétion à partir du 09.08: 6 mentions dont une troupe de 34 ex. (CVa et al.). ■ **GRAND GRAVELOT** (*Charadrius hiaticula*): présence régulière de petits groupes comptant jusqu'à 5 ex. à Warcoing, Antoing, Bas-Warnton, Gaurain-Ramecroix (JPCq, DVe, LV, MLn, JLc) et à Seilles début juin et début août (P. Te, MNB); en outre, 2 ex. le 02.06 à Longchamps (Na.) et le 23.07 à Roly (P. Sommereyns, TDe). ■ **PETIT GRAVELOT** (*Charadrius dubius*): les cas de

nidification seront traités avec ceux réunis en 1983 à l'occasion de l'enquête spécifique. Très peu de données se rapportent à des migrateurs. ■ **TOURNEPIERRE A COLLIER** (*Arenaria interpres*)* : 1 ex. à Genappe le 16.08 (LVa) et à Gaurain-Ramecroix les 27 et 29.08 (MLn).

■ **BECASSINE DES MARAIS** (*Gallinago gallinago*) : nicheur possible à Ploegsteert et Bas-Warneton (JMTe, DH). Les premiers migrateurs apparaissent le 14.07 à Harchies (CRBH, ML), puis en août ailleurs. Les maxima sont notés à Genappe fin août (environ 40 ex.) et à Gaurain-Ramecroix le 15.08 (environ 75 ex.) (LVa, MLn). ■ **COURLIS CENDRE** (*Numenius arquata*) : onze mentions de 1 à 3 ex., surtout dans le Hainaut. A noter aussi la présence d'un ex. à Seilles et à Andenne les 04, 08 et 22.06. ■ **COURLIS CORLIEU** (*Numenius phaeopus*) : seulement à Harchies le 29.07 et le 24.08 et à Harelbeke les 15 et 28.08 (2 et 9 ex.) (CRBH, YBa). ■ **BARGE A QUEUE NOIRE** (*Limosa limosa*) : 1 ex. les 07, 08 et 21.07 à Harchies et Warcoing (CRBH, LV, MLn). Des six espèces de chevaliers passant régulièrement en Wallonie, le **CHEVALIER ARLEQUIN** (*Tringa erythropus*) a été le moins signalé : 1 ex. à Frasnes-lez-Couvin le 23.06 (MI), puis à partir du 27.07 et principalement dans le Hainaut (6 sites en tout). Le **CHEVALIER GAMBETTE** (*Tringa totanus*) est plus abondant, surtout en juin, et signalé sur 14 sites, y compris à Forges, Roly, Oost-Maarland et Sourbrodt (PGI, TDe, JDa, LSc). Pour le **CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*), il y a encore plus de mentions mais elles sont plutôt concentrées en août avec 21 données de 1 à 5 ex. Le **CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*) et surtout le **CHEVALIER GUIGNETTE** (*Tringa hypoleucos*) sont de loin les plus communs : présents pendant toute la période, ils ont été notés respectivement sur 45 et 70 sites répartis sur toute la Wallonie y compris en Ardenne et Hautes-Fagnes, grâce notamment à l'attraction que peut exercer pour ces espèces le moindre fossé ou ruisseau. Le **CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*) est surtout signalé en juillet; noté sur 18 sites, principalement des vasières et bassins de décantation. ■ **BECASSEAU MAUBECHÉ** (*Calidris canutus*)* : la fin de la migration de printemps est notée le 01.06 à Bas-Warneton et le 09.06 à Warcoing, 1 ex. chaque fois (PDB, MLn, JLC). ■ **BECASSEAU MINUTE** (*Calidris minuta*) : noté à partir du 27.07 à Warcoing, du 11.08 à Gaurain-Ramecroix et du 16.08 à Genappe où de 5 à 8 ex. séjournent (DH, MLn, LVa). ■ **BECASSEAU VARIABLE** (*Calidris alpina*) : quatre mentions d'isolés en août : le 13 à Seilles, le 19 à Genappe, le 22 à Hensies-Pommerœul et le 31 à Gaurain-Ramecroix (Pte, T. de Ryckel, HDu, DH, MLn). ■ **BECASSEAU COCORLI** (*Calidris ferruginea*) : quatre mentions en août : 3 ex. le 11 à Hoegaerden, 1 ex. le 12 à Seilles, 2 ex. le 24 à Warcoing et 1 ex. le 25 à Gaurain-Ramecroix (ECa, Pte, MLn). ■ **COMBATTANT** (*Philomachus pugnax*) : signalé sur six sites en Hainaut occidental ainsi qu'à Woluwe-Saint-Etienne et à Seilles. En étudiant ces observations de limicoles, il apparaît que Seilles (réserve de Sclaigieux) attire un grand nombre d'espèces et a une place importante dans le réseau de vasières – généralement artificielles – en Moyenne-Belgique. ■ **AVOCETTE** (*Recurvirostra avosetta*) : à part à Warcoing où elle a niché (D. HUBAUT, *Aves* 21 : 227-236), elle n'est observée que le 27.08 à Genappe (4 ex.) et les 30 et 31.08 à Gaurain-Ramecroix (16 puis 5 ex. – LVa, MLn).

Les grands goélands sont peu notés. Le **GOELAND MARIN** (*Larus marinus*) à Jambes les 02 et 14.08 (AMo) et quelques **GOELANDS BRUNS** (*Larus fuscus*) surtout en Hainaut occidental mais aussi à Andenne, à proximité du dépôt de Seilles (2 ex. le 08.06, 1 ex. le 04.08 – Pte). ■ **GOELAND CENDRE** (*Larus canus*) : seulement noté dans la vallée de la Haine en juin-juillet, cité en Hainaut occidental à partir du 20.08. ■ **MOUETTE PYGMEE** (*Larus minutus*) : un exemplaire traîne à Harchies les 23 et 24.06 (ML, DVe, LV) puis quelques oiseaux réapparaissent à partir du 11.08 (Harchies, Péronnes, Gaurain-Ramecroix – FHe, HDu, DVe, LV, MLn). ■ **GUIFETTE NOIRE** (*Chlidonias niger*) : en juin-juillet, quelques guifettes sont vues en Hainaut occidental et à Virelles. A partir de la fin juillet, cette espèce est aussi vue en très petit nombre ailleurs en Wallonie, notam-

ment à Latour (JBI). ■ **GUIFETTE LEUCOPTERE** (*Chlidonias leucopterus*)* : 1 imm. à Harchies les 25 et 26.08 (CRBH, DVe, LV, ML). ■ **GUIFETTE MOUSTAC** (*Chlidonias hybrida*)* : 1 ex. le 11 août à Péronnes-lez-Antoing (MLn). ■ **STERNE PIERREGARIN** (*Sterna hirundo*) : signalée en juin à Warcoing, Harelbeke, Roly et Sart-Dames-Avelines; par la suite, seulement 3 ex. le 28.07 à Harelbeke (LVa, MI, JMTe, MLn, JLc, YBa). ■ **STERNE NAINE** (*Sterna albigrons*)* : 1 ex. le 01.06 à Harelbeke (YBa) et le 16 à Harchies (JPJ).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : cette espèce passe toujours trop inaperçue. D'après LEDANT *et al.* (1983), son aire de répartition semble très morcelée dans l'est du pays. Quelques mentions remplissent certains trous : Pailhe, Saint-Hubert, Athus, Habay-la-Vieille, Arlon, Virton (RLi, FHe, PPI, RDU, JPJ). ■ **TOURTERELLE DES BOIS** (*Streptopelia turtur*) : l'espèce est à présent implantée depuis six ans à Elsenborn, où elle colonise les jeunes pessières (LSc). Elle se raréfie après le 26.08 en Hesbaye (JPJ).

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) : pour HW, la nidification est très mauvaise dans le Brabant et en Hainaut. En Famenne, pour 13 couples surveillés, la nidification n'est constatée que 4 fois (FBa). ■ **HIBOU PETIT-DUC** (*Otus scops*)* : un chanteur le 23.07 à Oignies-le-Mesnil (JPCq). ■ **HIBOU GRAND-DUC** (*Bubo bubo*)* : un chanteur à Yvoir le 04.08 (A. Crespeigne). ■ **CHOUETTE CHEVECHE** (*Athena noctua*) : trop peu de recensements sont effectués; parmi ceux-ci, une quinzaine de couples dans le Parc naturel de la Burdinale (CVa). ■ **HIBOU MOYEN-DUC** (*Asio otus*) : plusieurs cas de nidification sont rapportés, mais HW note une très mauvaise nidification dans le Brabant. ■ **HIBOU DES MARAIS** (*Asio flammeus*) : cantonnement de plusieurs individus en juin. Le statut de cette espèce rare chez nous fera l'objet d'une publication particulière.

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) : l'enquête lancée a permis, dans de très mauvaises conditions de recherche, de localiser près de 30 cantons (soit très peu) dont 3 en Brabant wallon et 3 en Campine hennuyère.

MARTINET NOIR (*Apus apus*) : début juin, le passage est encore noté et beaucoup de retours sont très tardifs. A partir du 03.08, des départs sont remarqués et l'espèce se raréfie fortement à partir du 15. Des nids ne sont abandonnés par les jeunes qu'à la fin du mois d'août (JMDu). ■ **MARTIN-PECHEUR** (*Alcedo atthis*) : environ 75 données, dont plusieurs se rapportent à la nidification. Ces sites sont à contrôler en 1985... pour ceux qui subsistent! Un erratisme ou une migration sont notés à partir du 26.06 en Meuse, près de Namur (AMo).


PIC NOIR (*Dryocopus martius*) : en août, une femelle est fréquemment observée dans la forêt de Soignes (FHi, MWa). ■ **TORCOL FOURMILIER** (*Jynx torquilla*) : des chanteurs en juin-juillet à Elsenborn, dans l'Hertogenwald, à Membach, Spa, Etalle, Latour et Baranzy (LSc, RHr, NPa, FVs, JPJ, JLG). A partir du 21.08, des migrateurs à Theux, Baudour et Uccle (ADx, PAN, MNB).

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) : fin juin - début juillet, un douzaine de chanteurs sont repérés en Lorraine en dehors de la lande de Lagland où la situation est normale. Des cantonnements sont notés également à Elsenborn, Werbomont, Olloy-sur-Viroin, Couvin, Noiseux et Doische (Exc. Aves, MDe, TDe, LSc, FMr). ■ **COCHEVIS HUPPE** (*Galerida cristata*) : a-t-il disparu? Personne ne l'aurait vu à Liège, Bruxelles ou ailleurs.

HIRONDELLE DE CHEMINEE (*Hirundo rustica*) : plusieurs observateurs sont pessimistes quant à la réussite des nichées (CVa, JBe, ED, PDA) mais dans deux rassemble-

ments (La Calamine fin juillet et Vance le 15 août), une forte proportion des jeunes est néanmoins constatée (ADg, EDg, JGa). ■ **PIPIT ROUSSELINE** (*Anthus campestris*): 1 ex. le 30.07 à Wavre (FHa). ■ **BERGERONNETTE DE YARRELL** (*Motacilla alba yarrelli*)* : trois isolés, le 22.06 à Warcoing (P. Veys), les 17 et 18.06 à Roisin (HDu), ainsi que les 04 et 09.07 à Bas-Warneton (DH). ■ **BERGERONNETTE PRINTANIERE** (*Motacilla flava*) : pas de nidification en dehors des zones signalées par LEDANT *et al.* (1983). Le passage d'automne démarre vers le 15.08 et est intense vers le 25. Des bergeronnettes de la forme *thunbergi* ont encore été identifiées le 02.06 à Pommerœul et le 09 à Hergenrath (HDu, LSc) et, au retour, le 27.08 à Hérinnes (JLc).

■ **PIE-GRICHE GRISE** (*Lanius excubitor*) : toutes les données proviennent de l'aire de nidification connue, mais celle-ci est mieux précisée dans l'Entre-Sambre-et-Meuse avec des couples cantonnés à Romerée, Aublain et Dailly (FMz, MI, TDe). Ailleurs, 1 ex. les 06.06 et 17.07 à Bernissart (CRBH). ■ **PIE-GRICHE A POITRINE ROSE** (*Lanius minor*)* : 1 ex. à Herpinnes le 10.06 (MLn, DVe, LV, JLc). ■ **PIE-GRICHE A TETE ROUSSE** (*Lanius senator*)* : 1 ex. le 01.07 à Halanzy (LSc). ■ **PIE-GRICHE ECORCHEUR** (*Lanius colurio*) : cette pie-grièche est, avec la Pie-grièche grise, une des plus belles espèces de Wallonie. En Europe occidentale, toutes deux sont en limite de leur aire de répartition et dans de nombreuses régions, elles sont en forte régression. C'est pourquoi une surveillance constante de leurs populations s'impose. Bien que l'espèce soit signalée par de nombreux observateurs, nous pensons que beaucoup de couples n'ont pas été recherchés, retrouvés ou signalés. Pour la Pie-grièche écorcheur, aucun abandon de site n'est signalé mais des sites nouvellement occupés sont mentionnés à Roly, Moulin-Manteau, Bomal-sur-Ourthe, Hour, etc. (TDe, YF, DE). Situation stable en Lorraine (JPJ *et al.*).



Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*), Pommerœul, juin 1979 (Photo D. Hubaut).

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) : au nord du sillon Sambre-et-Meuse, 1 adulte et 2 jeunes le 23.07 à Huccorgne, le long de la Mehaigne (LG, CVa).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) : des recherches systématiques dans la forêt de Soignes la présentent comme un nicheur rare : seulement 2 couples sur 400 ha (FHi, MWa). ■ **GRIVE LITORNE** (*Turdus pilaris*) : une colonie nouvelle est signalée à Fallais-sur-Mehaigne (LG) et deux exemplaires (nicheurs?) à La Buisnière, le 11.06 (HB). ■ **TRAQUET MOTTEUX** (*Oenanthe oenanthe*) : la nidification n'est prouvée qu'à Elsenborn (FVs, NPa), mais un couple est noté à Gimnée le 01.07 et 1 juvénile le même jour à Athus, sur un crassier (FMz, PPI). Les premiers migrateurs apparaissent le 08.08, à Ecaussines (PVD) puis, en masse, après le 15.08 (plus de 60 mentions). ■ **TRAQUET PATRE** (*Saxicola torquata*) : très peu remarqué, il serait quasi absent du Brabant, de la Hesbaye et du Condroz. Plusieurs mentions proviennent par contre de la région des Hautes-Fagnes. Cette disparition devrait être confirmée par des recherches sur le terrain. ■ **TRAQUET TARIER** (*Saxicola rubetra*) : quelques cas de nidification sont signalés dans l'extrême est du pays et au Luxembourg. Dans la province de Namur il n'aurait été trouvé qu'à Aublain et Gimnée (JBI, FMz). Cette espèce, qui devient très rare, devrait être beaucoup plus recherchée. Lors de la migration, le dernier est vu le 02.06 à Harchies (J&N) et le passage reprend ensuite à partir du 15.08 (maximum un groupe de 18 ex. le 18.08 à Neerijse - MWa). ■ **ROUGEQUEUE A FRONT BLANC** (*Phoenicurus phoenicurus*) : cet oiseau a fait l'objet de recherches plus spécifiques en forêt de Soignes : 21 couples sur environ 2.000 ha (FHi, MWa). Des passages sont décelés durant la seconde moitié d'août. ■ **ROSSIGNOL PHILOMELE** (*Luscinia megarhynchos*) : soulignons quelques concentrations locales : 3 chanteurs sur 250m de broussailles à Heure (RLi) et 4 chanteurs sur quelques hectares de broussailles à Tohogne (YF). A Gosselies, un chanteur se cantonne dans la végétation d'une berme d'autoroute (JBI). En Lorraine, la présence d'un chanteur dans la vallée de la Semois, à Etalle, n'est pas banale (JLG) car l'espèce est généralement limitée à l'extrême sud de la région. ■ **GORGEBLEUE A MIROIR** (*Luscinia svecica*) : en dehors des sites de nidification du Hainaut occidental déjà signalés, une donnée intéressante provient de Marneffe où 1 ex. alarme dans une friche arbustive au bord de la Burdinale (LG, CVa).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) : en plus des exemplaires signalés dans la chronique de printemps, un adulte bagueé est présent à Tertre (Marionville) le 24.07 (CS) et un chanteur à Antoing le 27.08 (MLn). ■ **LOCUSTELLE TACHETEE** (*Locustella naevia*) : elle est essentiellement signalée en Ardenne, Fagne-Famenne et Lorraine. Ailleurs, des chanteurs sont notés en Hainaut occidental et dans le Parc naturel de la Burdinale (3 - CVa). Apparemment moins abondante qu'en 1983. ■ **ROUSSEROLLE TURDOIDE** (*Acrocephalus arundinaceus*) : les marais d'Harchies-Pommerœul sont encore occupés le 18.08, après menée à bien d'une nichée. A Sart-Dames-Avelines, l'exemplaire présent depuis le 18.05 est encore observé le 27.06, mais ne chante plus (TDe, JHo). A Ploegsteert, où l'espèce n'avait plus été vue depuis plusieurs années, un mâle chanteur est signalé du 06.06 au 14.07 (DH). ■ **ROUSSEROLLE EFFARVATTE** (*Acrocephalus scirpaceus*) : encore quelques chanteurs en halte migratoire, en milieu sec, le 01.06 à Noiseux et Fronville (DE). Bien signalée dans les roselières de Moyenne-Belgique et de Gaume. Cinq couples nicheurs à La Buisnière, de sept à huit chanteurs à Bambois (VD, HB, PLt). ■ **ROUSSEROLLE VERDEROLLE** (*Acrocephalus palustris*) : à signaler, cinq couples dans des champs de blé et d'orge le 16.06 à Roisin (HDu). ■ **PHRAGMITE DES JONCS** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : en dehors du Hainaut, une seule nidification est signalée, à Etalle, Mortinsart (JLG). Serait-ce le signe d'une raréfaction extrême en Wallonie? ■ **HYPOLAIS ICTERINE** (*Hippolais icterina*) : la majorité des données provient du Hainaut et du Brabant. En juin, cependant, des chanteurs sont également signalés à l'est de

la Meuse, dans la région de Verviers et le Pays de Herve (EC, LSc), à Pailhe (RLi) et à Thommen (EC). ■ **HYPOLAIS POLYGLOTTE** (*Hippolais polyglotta*) : l'espèce continue son expansion. Elle est signalée jusqu'à Waimes (NPa) et Harchies (CRBH). L'espèce est également capturée à Béciers le 04.08 (PDa, PS). Une nouvelle synthèse sera prochainement publiée par JPJ. ■ **FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*) : des migrateurs sont encore notés le 10.06 à Havelange (RLi), tandis qu'à Oteppe, des jeunes déjà à l'envol sont capturés le 26.06 (CVa). A Ransart, passages à partir du 12.08 (JBI). ■ **FAUVETTE GRISETTE** (*Sylvia communis*) : les observateurs notent en général de bonnes densités, voire une augmentation des effectifs, notamment au nord de Charleroi (JBI), à Theux (ADx) et Oppagne-Wéris (YF). A Bomal-sur-Ourthe, elle paraît très rare (YF). ■ **FAUVETTE BABILLARDE** (*Sylvia curruca*) : localement, l'espèce paraît plus abondante que les années précédentes, comme à Ransart où après 2 ans d'absence de l'espèce un exemplaire est à nouveau signalé (JBI) et à Gembloux-Grand-Leez où LSc note sensiblement plus d'exemplaires qu'en 1983. ■ **FAUVETTE A TÊTE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*) : JBI signale très peu de migrateurs dans le courant du mois d'août, les captures ne concernent que des oiseaux sortis depuis peu du nid. ■ **CISTICOLE DES JONCS** (*Cisticola juncidis*)* : 1 ex. le 17.07 à Warcoing (DH, JLC). ■ **POUILLOT SIFFLEUR** (*Phylloscopus sibilatrix*) : les observateurs signalent une bonne densité de cette espèce; des recherches intensives dans la forêt de Soignes donnent 43 couples sur environ 400 ha (MWa, FHi). Une quinzaine de couples sont recensés dans le Parc naturel de la Burdinale (CVa). ■ **POUILLOT DE BONELLI** (*Phylloscopus bonelli*)* : un chanteur du 26.06 au 08.07 à Ligneuville (NPa). Par contre, l'espèce est totalement absente à Torgny.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) : l'arrivée des nicheurs est localement très tardive : Uccle, le 20.06 (DE). Les observateurs considèrent dans l'ensemble que l'abondance de cette espèce est normale. ■ **GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*) : aucune mention en juin-juillet. Des migrateurs à partir du 11.08 (DE) mais surtout au cours de la dernière semaine du mois.

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) : quelques mentions sont rapportées comme concernant la race nordique *caudatus*. A tort, car chez les oiseaux de notre sous-espèce *europaeus*, on peut constater des variations individuelles et notamment l'absence de bandeaux foncés sur la tête. C'est surtout vrai quand l'oiseau «nordique» est membre d'une famille d'*europaeus*. Une mention de *caudatus* ne pourrait être acceptée dans l'Avifaune belge que par la reprise d'un oiseau bague dans le nord de l'Europe.

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*) : peu de mentions, mais il est décelé un peu partout, même en Ardenne (Bomal-sur-Ourthe, Libin - YF, JMTe). Très sensiblement moins fréquent que les années précédentes en Gaume (JPJ *et al.*). ■ **BRUANT ORTOLAN** (*Emberiza hortulana*) : 1 ex. le 02.07 à Sterpenich, le 14.08 à Gaurain-Ramecroix et le 16 à Harchies (PPi, MLn, MDu). ■ **BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schoeniclus*) : bien connu dans la plupart des roselières du pays, il est aussi décelé dans des milieux secs (prairies, champs de froment, d'escourgeon - RLi, LSc) où il est sans doute beaucoup plus commun que nous ne l'imaginons.

GROS-BEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) : trop peu de mentions de nicheurs et aucun rassemblement post-nuptial. Une seule donnée originale : 1 ex. le 12.08 à Irchonwelz, près d'Ath (OB). ■ **CHARDONNERET ELEGANT** (*Carduelis carduelis*) et **SERIN CINI** (*Serinus serinus*) : une recherche entreprend de comparer leur statut en 1984 par rapport aux années antérieures et ainsi de surveiller ces oiseaux tant convoités par les tendeurs et braconniers. La plus grosse bande de Chardonnerets signalée compte

30-35 ex. à Jupille (DVi). ■ **TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*) : semble rare et limité à la région des Hautes-Fagnes. Seulement quatre observations en Moyenne-Belgique, en juin et juillet (OB, HG, CS). ■ **SIZERIN FLAMME** (*Carduelis flammea*) : signalé uniquement dans les Hautes-Fagnes et régions limitrophes. ■ **BECCROISE DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*) : noté surtout en Ardenne liégeoise, dans la région de Bastogne et en Gaume. Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, à Erbisœul et à Fumal seulement (CS, CVa). LSc prépare une synthèse. ■ **PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*) : au parc de la Burdinale, échec généralisé des premières pontes (CVa).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*)* : toujours limité au Sud-Luxembourg : Herbeumont, Mabompré, Jamoigne et Pin (PPi, RDu, RL, JGa, FLu). ■ **CASSENOIX MOUCHETE** (*Nucifraga caryocatactes*) : plusieurs observations de l'espèce à Mormont (JMDu) et à Vielsalm le 26.08 (MDe).



Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) (Photo D. Arnhem - Visa ABPN - BVNF).