

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1985/4 SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE

par Pascal PIERRE ⁽¹⁾ et Emile CLOTUCHE ⁽²⁾

Elaboration du fichier : Rudy Dujardin, Alain Georges et Luc Quéré.

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées pendant la période considérée :

A	Anonyme	DV	D. Voituren	JaE	Ja. van Esbroeck
ABP	A. Bas-Perez	DVe	D. Verroken	JoE	Jo. van Esbroeck
ACr	A. Crespeigne	DVi	D. Vieuxtemps	JF	J. Fouarge
ADu	A. Delaunois	ED	E. Delmée	JF1	J. Fléron
ADx	A. Doneux	EH	E. Heymans	JGa	J. Gallez
AGo	A. Georges	EVe	E. Verhegghen	JGr	J. Grimont
ALa	A. Lambotte	FG	F. Gijs	JHo	J. Houbart
AMo	A. Monmart	FH	F. le Hardj	JLc	J. Leclercq
AR	A. Rappe	FHa	F. Halot	JLoC	J.Lo. Coppée
BCl	B. Clesse	FHi	F. Héla	JLuC	J.Lu. Coppée
BDe	B. Deceuninck	FLu	F. Lutgen	JMCh	J.M. Charlier
BGi	B. Gillès	FRe	F. Renard	JMCu	J.M. Couvreur
BI	B. Iweins	FRu	F. Rouchet	JMDu	J.M. Daulne
BPh	B. Philippart	GJ	G. Jérosme	JMo	J. Moïs
CA	C. Ancelet	GLe	G. Lèbe	JMTe	J.M. Testaert
CD	C. Dehem	GN	G. Nève	JPCq	J.P. Coquette
CF	C. Fesler	GOR	Gr. Orn. St Roch	JPF	J.P. Fouarge
CGe	C. Geyer	GTNS	Gr. Trav. Namur sud	JPJ	J.P. Jacob
CH	C. de Harenne	HB	H. Bedoret	JPL	J.P. Ledant
CHa	C. Hallet	HDu	H. Dufourny	JPSc	J.P. Scohy
CI	C. Istasse	HG	H. Guerriat	JPV	J.P. Verhaegen
CJ	C. Joiris	HP	H. Pellegrin	JRo	J. Rossi
CLy	C. Lemy	HSt	H. Stiévenart	JSe	J. Sedek
CMo	C. Moïs	HW	H. de Wavrin	JVa	J. Vandervelden
CRBH	C. Rech. Biol. Harchies	HWe	H. Wiesemes	JYB	J.Y. Bagnée
CVa	C. Vansteenwegen	HWi	H. Wies	JYS	J.Y. Scohy
DCa	D. Capart	JAb	J. Abeloos	LG	L.H. Gée
DE	D. van der Elst	JBl	J. Bultot	LN	L. Noulard
DH	D. Hubaut	JCl	J. Collard	LPi	L. Pion
DRa	D. Rabosée	JDa	J. Delarue	LQ	L. Quéré
DTe	D. Testaert	JDo	J. Doucet	LSc	L. Schmitz

⁽¹⁾ Rue de Diekirch, 98 B-6700 Arlon.

⁽²⁾ En Wez, 5 B-4650 Herve.

MCA	M.C. Archambeau	PAn	P. Anrys	PVo	P. Voet
MDe	M. Deroanne	PBW	P. du Bus de W.	PWt	P. Wyckaert
MGs	M. Guesquière	PC	P. Collette	RAD	D. Raes
MLb	M. Lambert	PCd	P. Collard	RDI	R. Detaille
MLu	M. Luy	PCi	P. Croisier	RDu	R. Dujardin
MMn	M. Moncousin	PCJ	P. Claerhout	RLi	R. de Liedekerke
MNB	M.N. de Bellefroid	PCs	P. Collard	RML	R.M. Lafontaine
MPa	M. Paquay	PDa	P. Dachy	RSn	R. de Schaetzen
MRu	M. Rousseau	PDd	P. David	SB	S. Baugniet
MTi	M. Tichon	PDh	P. Dahin	SC	S. Carion
MWa	M. Walravens	PDW	P. De Wolf	SCo	S. Cordier
MWt	M. Watelet	PGl	P. Gall Schuon	SL	S. Lhoest
NG	N. Goetghebeur	PLc	P. Lachapelle	SLD	D. Slabbinck
NPa	N. Paquay	PLI	P. Loly	SSo	S. Sorbi
NSe	N. Selosse	PLx	P. Lacroix	TDe	T. Dewitte
NIS	S. Niveau	PPi	P. Pierre	VD	V. Degrelle
OB	O. Bourlon	PQ	P. Quévy	VLs	V. Leirens
OLu	O. Luminet	PR	P. Remmerie	XL	X. Lambin
OM	O. Matgen	PS	P. Simon	YBa	Y. Baptiste
OPi	O. Picard	PSo	P. Sommereyns	YBe	Y. de Beul
PAF	F. Pattijn	PVD	P. Van Dijk	YF	Y. Fanon

M. Artoisenet, C. Cornet, A. Daschelet, L. Derouf, D. Devos, J.L. Doucet, P. Etesse, R. Fraipont, P. Ghijsel, F. Gustin, R. Herbecq, E. Leprince, M. Lestrade, C. Martin, E. Matagne, T. Mersch, F. Paulus, D. Picard, R. Ponsen, P. Sacré, F. Salié, A. Sauvage, M. Scanu, M. Schram, P. Stassin, R. Viteux, J. Vandervelden et les nombreuses personnes ayant collaboré au suivi de la migration des grues en province du Luxembourg.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Septembre fut marqué par une zone de haute pression centrée sur l'Europe occidentale ayant comme conséquence des températures généralement excédentaires et un déficit très anormal des précipitations. Les vents furent principalement orientés dans le secteur sud à sud-ouest.

Ce type de temps persiste jusqu'au 6 octobre. Des courants maritimes, circulant sur le flanc nord de l'anticyclone des Açores, envahissent alors notre pays. A partir du 10, une zone de haute pression située sur l'Europe occidentale influence à nouveau notre temps jusqu'au 30. Les moyennes des précipitations sont toutes inférieures à la normale et la durée d'insolation est très anormalement excédentaire; les vents furent principalement orientés dans le secteur nord-est et sud-sud-est à sud.

Le temps du début du mois de novembre fut déterminé par des courants perturbés associés à des dépressions situées sur la Scandinavie et les Iles Britanniques. Du 13 jusqu'au 29, des courants continentaux puis polaires ont influencé nos régions, y imposant des conditions climatiques franchement hivernales. Il y eut en tout 18 jours de gel et les précipitations ont été de neige ou accompagnées de neige durant 24 jours. A Botrange, l'épaisseur maximale de la neige a atteint 40 cm le 29. Le déficit de l'insolation fut important. Le 30, une dépression située à l'ouest de l'Islande a ramené des courants plus doux.

FAITS SAILLANTS

Aucun événement particulièrement marquant n'a été noté cet automne. Les conditions climatiques très défavorables du début de l'été ayant retardé la nidification de certaines espèces et le début d'automne étant clément, on note quelques nidifications ou départs tardifs, chez les Grèbes huppé et castagneux, la Bondrée, le Pigeon ramier et le Martinet par exemple.

En novembre par contre, l'arrivée précoce de l'hiver provoque quelques mouvements de fuite (Vanneau, Pluvier doré, Chevalier culblanc, Grue, Faucon émerillon) ou l'arrivée d'hivernants en nombre inhabituel à cette époque (Garrot, harles); rien d'extraordinaire toutefois. A noter aussi, l'importance du passage du Grand Cormoran, ainsi que de la Grue.

Un fait non ornithologique mais d'ordre «administratif» doit être souligné car il est préoccupant : une part importante des observations devant être soumises à la Commission d'Homologation n'a pas fait l'objet de rapports spéciaux. Ces observations n'ont donc pu être publiées ici, à notre grand regret.

DETAIL DES OBSERVATIONS

Nombreuses observations de plongeurs à partir de fin octobre. ■ **PLONGEON IMBRIN** (*Gavia immer*)* : 1 ex. à partir du 16.11 à Obourg (HDu *et al.*) et 1 ex. à l'écluse de Pommerœul à partir du 23.11 (ML, PAn *et al.*). ■ **PLONGEON ARCTIQUE** (*Gavia arctica*)* : 1 ex. le 20.10 à Saint-Ghislain (Marionville) (PAn), 1 ex. le 31.10 au barrage de la Gileppe (LSc), 2 ex. le 16.11 et 1 ex. le 17.11 à Obourg (HDu), et 1 ex. le 17.11 à Latour (BI, LQ). ■ **PLONGEON CATMARIN** (*Gavia stellata*)* : des isolés à Nimy (Grand-Large) le 11.11 (VLs), à Jambes les 17-18.11 (AMo *et al.*) et à Coo le 30.11 (BCI, PCs); en outre, trois autres mentions pour lesquelles les demandes d'homologation n'ont pas été introduites. ■ **PLONGEON SP.** (*Gavia sp.*) : 1 ex. à Nismes le 16.11 (MLb).

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*) : plusieurs familles sont encore signalées en septembre, et même en octobre : par exemple 1 jeune nourri par un adulte le 05.10 à Ghlin (VLs) et 2 jeunes encore en duvet le 06.10 aux barrages de l'Eau d'Heure (JLoC, JLuC); aussi 2 ex. en parade le 11.10 à Nimy (HDu). La seule concentration vraiment importante est notée à Harchies où l'effectif est de 60 à 81 ex. en septembre et de 40 à 50 en octobre (avec toutefois d'assez fortes fluctuations - CRBH, DVe, LV *et al.*). La majorité des observations en novembre sont antérieures au 15, traduisant sans doute des départs quasi généralisés provoqués par le gel mais bien mis en évidence à Harchies seulement : encore 35 ex. le 17, plus que 2 le 24 (HDu). A Oost-Maarland, la tendance semble à la hausse à ce moment, mais la capacité d'accueil du site est loin d'être atteinte : maximum de 35 ex. les 17 et 29.11 (JDa). ■ **GREBE JOUGRIS** (*Podiceps grisegena*) : 1 juvénile du 04 au 24.09 à Harelbeke (JMTe, YBa, JLC), 1 ex. à Latour du 14

* Donnée soumise à la Commission d'Homologation, citée dans les chroniques ornithologiques sans préjuger de l'avis de ladite Commission. Rappelons que les données qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport détaillé spécifique, rédigé de préférence sur le formulaire ad hoc (demande d'homologation), ne peuvent être prises en considération par la Commission, à son grand regret. Seules les données ayant fait l'objet d'un tel rapport spécifique sont citées dans les chroniques.

au 17.09 (BI, LQ, CMo) et 4 ex. le 03.11 à Grand-Leez (JYB). ■ GREBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*)* : 1 ex. du 30.11 au 08.12 à Nimy (PAn, VLs, JPV *et al.*). ■ GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) : 3 adultes et 1 juv. le 01.09 à Harchies et Pommerœul (CRBH, JLc, HDu); 2 puis 1 ex. du 09 au 19.09 à Latour (nombreux observateurs). En octobre, 1 ex. le 11 à Harchies (CRBH) et les 21 et 31 à Nimy (HDu). ■ GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) : comme pour le Grèbe huppé, des poussins sont encore signalés en septembre/octobre (jeunes nourris par les parents le 12.10 à Grand-Leez (BDe). Les mouvements post-nuptiaux sont pourtant bien entamés : dès le 02.09 Latour accueille plus de 30 ex., l'effectif culminant à 47 ex. le 05.10; les mentions sont fréquentes ailleurs, mais seulement des isolés ou de petits groupes, sauf à Harchies où l'on atteint quand même 20 à 25 ex. en septembre et une quinzaine en octobre. Quelques hivernants apparaissent sur les cours d'eau (Meuse, Semois, ...) en octobre (AMo, RDu), mais surtout à la mi-novembre : le maximum est alors signalé le 17 sur la Semois à Chassepierre (PPI); Harchies et Latour sont quasi désertés.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) : le passage est à nouveau bien marqué cet automne. En septembre, la majorité des observations concerne des oiseaux en halte, parfois prolongée, surtout en Hainaut où Harchies accueille 15 à 20 ex. tout le mois (CRBH). Une augmentation des vols migratoires est perceptible le 29.09 et le 12.10, et d'une façon générale en octobre (aucun à l'est de la Meuse). A Woluwe-Saint-Pierre, le passage se déroule comme suit : 33 ex. le 07.09, 10 le 21, 93 le 29 et 44 le 30, 251 en octobre, dont 102 le 12 (MWa, DCa, FHi, MLu); le 12.10 aussi, plusieurs autres vols totalisent 48 ex. à Angre et plus de 70 ex. à Harelbeke (HDu, YBa, JLc). Le passage culmine finalement les 02 et 03 novembre, mais il touche alors surtout la Haute-Belgique, avec par exemple 150 ex. le 02 à Modave (DE, MNB), 50 ex. le 03 à Meyrode (WP) et 38 + 52 + 130 ex. à Ougrée de 11h à 13h30 (R. Fraipont); un vol de 54 ex. est noté aussi le 02 à Vieux-Héverlée (BDe). L'espèce se raréfie par la suite, mais notons encore des passages de 90 et 30 ex. les 09 et 11.11 à Belgrade (PLx) et, en fin de mois, 6 ex. le 22 et 5 le 29 à Oost-Maarland (JDa). ■ CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*)* : 1 ex. en vol le 16.11 à Yvoir (JPF), sans doute la dernière observation du cormorran arrivé en Meuse début 1985.

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) : très commun durant les trois mois (en tout cas jusqu'à la mi-novembre), le plus souvent par petits groupes. De 30-35 ex. début septembre, l'effectif d'Harchies culmine à 50 ex. en fin de mois et à 54 ex. en octobre, puis diminue après le 20 jusqu'à 32 ex. en novembre (CRBH, HDu *et al.*). Seules autres concentrations dans la vallée de la Haine, 15 à 25 ex. de fin octobre à mi-novembre à Saint-Ghislain (Marionville), Obourg et Saint-Denis (PAn, VLs, HDu). L'augmentation est très nette en novembre dans la vallée de la Dyle : 22 ex. le 02 et 67 ex. ensemble le 09 à Rhode-Sainte-Agathe, 35 ex. dans toute la vallée le 17 (BDe, MWa, Exc. Aves). A noter aussi, 30 ex. le 06.10 à La Buisserie (HB). En Ardenne, le passage et l'hivernage semblent moins importants que les années précédentes, mais on observe tout de même quelques groupes importants à la mi-novembre dans les vallées : 19 ex. le 11 à Wegnez (Vesdre) et 42 ex. le 17 à Ligneuville (Amblève) (un nourrissage a lieu dans cette région, alimenté par les déchets d'une pisciculture) (LSc). ■ HERON POURPRE (*Ardea purpurea*) : 1 ex. en migration à Ramillies le 04.09 (CJ) et 1 ex. le 03.10 à Florival (SC). ■ HERON BIHOREAU (*Nycticorax nycticorax*)* : 1 immature de première année le 04.10 à Harchies (CRBH). ■ BUTOR ETOILE (*Botaurus stellaris*) : 1 ex. le 06.10 à Pommerœul (VLs), et le 19.10 à Harchies (CRBH) et le 30.11 à Harelbeke (YBa).

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) : 2 ex. en migration le 03.09 à Daussoulx (M. Lestrade), 7 ex. en migration à Rhode-Sainte-Agathe et Woluwe-Saint-Etienne le 17.10

(nombreux observateurs) et 1 ex. le 23.10 à Jehonville (MWt). ■ **CIGOGNE NOIRE** (*Ciconia nigra*)* : une mention : demande d'homologation non reçue. ■ **SPATULE BLANCHE** (*Platalea leucorodia*)* : même remarque que pour l'espèce précédente.

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) : outre une série de groupes de quelques centaines d'exemplaires signalés sur de nombreux plans d'eau, quelques concentrations de 500 à 2000 ex. dès septembre, surtout en Hainaut. En novembre, l'augmentation est sensible dans toutes les régions. ■ **SARCELLE D'HIVER** (*Anas crecca*) : pas rare en septembre-octobre, mais le plus souvent par groupes inférieurs à 10 ex., sauf à Harchies (maxima de 100-150 ex.) et dans la vallée de la Dyle, en particulier à Florival. En novembre, nette augmentation des effectifs et du nombre de sites occupés, les groupes de 20 à 50 ex. deviennent assez fréquents, par exemple : 230 à 250 ex. le 02 dans la vallée de la Dyle (BDé), environ 80 ex. les 17 et 24 aux barrages de l'Eau d'Heure (MLb, PLc), 180 ex. à Saint-Ghislain (Marionville) (PAN), 80 ex. les 16 et 17 à Ronquières (PVD), 40 ex. le 03 et 34 le 24 à Orval (PPI, RDu). ■ **SARCELLE D'ETE** (*Anas querquedula*) : comme toujours, très peu d'observations en automne : seulement 2 ex. début septembre à Harchies (HDu, PCd) et un groupe culminant à 30 ex. à Harelbeke, dernière observation (2 ex.) le 02.10 (YBa). ■ **CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*) : l'effectif d'Harchies augmente progressivement durant la période pour atteindre 80 ex. fin novembre. Ailleurs, quelques données de 1 à 10 ex., principalement en novembre. Notons également 25 ex. le 15.11 à Virelles (JPSc, BPh). ■ **CANARD SIFFLEUR** (*Anas penelope*) : en septembre, 1 ou 2 ex. dès le 07 à Harchies (DVe, LV) et 2 observations ailleurs en fin de mois. Des isolés ou des groupes de 2 à 10 ex. sont signalés sur neuf sites en octobre-novembre, surtout à partir du 15, au plus une quinzaine le 20.10 à Harelbeke (JLc, YBa) et jusqu'à 85 ex. (le 17) à Harchies en novembre (HDu *et al.*). ■ **CANARD PILET** (*Anas acuta*) : 4-5 ex. en tout à partir de mi-octobre à Harchies, Harelbeke, Saint-Ghislain (Marionville) et Menin (HDu, DVe, LV, CRBH, NSe, YBa, PAN, JMTe). Très légère augmentation en novembre : noté alors dans d'autres régions, les 18 et 19 à Virelles (BPh), le 23 à Neerijse (2 ex. - CGe) et le 17 à Orval (2 ex. - PVo, C. Martin). ■ **CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*) : observé pendant les trois mois dans toutes les régions mais principalement dans les vallées de la Haine et de la Dyle et à Harelbeke. Les groupes se limitent le plus souvent à 4-5 ex., atteignant parfois 20 à 30 ex. dans la Dyle, mais frôlent les 300 ex. dans la Haine : Saint-Ghislain (Marionville) environ 150 ex. le 13.10, 295 ex. le 20.10 et 40 ex. le 17.11 (PAN); Harchies, 50 ex. dès début septembre, 200 ex. en fin de mois et début octobre, diminution jusqu'à environ 70 ex. le 20, puis nouvelle augmentation en novembre jusqu'à 230 ex. le 18 (HDu, VLs, DVe, LV, CRBH *et al.*).

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) : 1 femelle sur la Meuse, à Lanaye, le 12.10 (E. Leprince) et 1 ou 2 ex. à Oost-Maerland le 17.11 (OLu, PCd, JDa). ■ **FULIGULE MILOUINAN** (*Aythya marila*) : 1 ex. à Harelbeke du 20 au 22.10 (YBa) et à Vance le 16.10 (JGa). ■ **FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*) : l'espèce reste peu répandue en septembre-octobre, avec un maximum de 44 ex. seulement début septembre à Harchies, diminuant rapidement jusqu'à une dizaine (HDu). Augmentation à partir de fin octobre et apparition sur un plus grand nombre de sites; on note alors quelques groupes de 20 à 53 ex., à Harchies, Harelbeke, Hofstade, Woluwe et dans la vallée de la Dyle. ■ **FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*) : presque aussi rare que l'espèce précédente en septembre et début octobre. L'augmentation est sensible durant la seconde quinzaine d'octobre, mais seuls huit sites, surtout en Hainaut, dépassent les 20 ex., le maximum étant de 82 ex. le 30 à Harelbeke (YBa). Le mouvement s'amplifie en novembre, mais le gel provoque l'abandon de certains sites : les groupes de 50 à 150 ex. deviennent plus fréquents et la population hivernant en aval de Liège atteint environ 450 ex. au cours de la seconde

décade (PCd). ■ **FULIGULE NYROCA** (*Aythya nyroca*)* : outre 1 ex. signalé sur la Meuse à Wépion le 23.11 (AMo, FRo *et al.*), une observation non soumise à la Commission d'Homologation, tout comme celle d'un exemplaire identifié comme hybride **FULIGULE NYROCA X MILOUIN** (*Aythya nyroca X ferina*)*. ■ **GARROT A ŒIL D'OR** (*Bucephala clangula*) : présent dès la mi-octobre à Harchies avec 8 ex. le 16 puis 2 à 5 ex. (CRBH, HDu). Durant ce mois, également observé aux barrages de l'Eau d'Heure et à Membach (JLoC, JLuC, LSc). En novembre, petits afflux avec des données de 6 sites en Hainaut (notamment 11 ex. le 28 à Gaurain-Ramecroix - JPCq), 2 observations dans la Dyle et à Rhode-Saint-Genèse et à l'est de la Meuse, à Membach et à Latour (SC, PAF, LSc, BI, LQ). ■ **MACREUSE NOIRE** (*Melanitta nigra*) : 1 ex. à Gaurain-Ramecroix le 17.10 (JPCq), à Marche-les-Dames le 16.11 (PLx) et à Godinne du 25 au 27.11 (JPF). ■ **MACREUSE BRUNE** (*Melanitta fusca*) : un groupe de 18 ex. le 17.11 à Oost-Maarland! (Sse, PCd) et 2 ex. le 30.11 à Harelbeke (YBa). ■ **EIDER A DUVET** (*Somateria mollissima*) : 1 ex. les 17 et 18.10 à Godinne (JPF), 1 ex. le 20.10 à Ampsin (PLI), puis quelques-uns à Yvoir les 28-29.11 (PLx). ■ **HARLE BIEVRE** (*Mergus merganser*) : à part la femelle présente à Nimy depuis mi-août (HDu, VLs, ADu), apparition de 1 à 9 ex. sur cinq sites à partir du 09.11 : Virelles, barrages de l'Eau d'Heure, Oost-Maarland, Bambois et Harchies (BPh, PLc, JLoC, JLuC, MLb, OLu, PCd, Opi, HDu, CRBH). ■ **HARLE PIETTE** (*Mergus albellus*) : premières arrivées également lors de la vague de froid en novembre : 1 ex. à Harchies le 11.11 puis 3 ex. les 17 et 24 (DVe, LV, HDu), 1 ex. à Vielsalm le 15 et 1 ex. à Godinne le 23 (BCI, PCs, AMo). ■ **ERISMATURE ROUSSE** (*Oxyura jamaicensis*)* : 1 femelle à Harchies-Pommerœul du 11 au 13.11 (HDu, PAn, R. Petit). ■ **TADORNE DE BELON** (*Tadorna tadorna*) : trois observations en septembre dans le Hainaut, puis noté sur six sites différents après le 10 novembre; un groupe de 10 ex. à Saint-Ghislain (Marionville) le 17.11 (PAN). ■ **OIE CENDREE ET SP.** (*Anser anser* et sp.) : un vol dès le 03.09 à Celles, suivi de quelques mentions fin septembre et début octobre (ED). Le passage se développe nettement en octobre et durant la première quinzaine de novembre, surtout en Hainaut, en quatre vagues principales : 12-13.10 (environ 450 ex.), 19-20.10 (950 ex.), 03.11 (1200 ex.) et 11.11 (2100 ex.). ■ **OIE RIEUSE** (*Anser albifrons*) : 2 ex. le 19.10 et 32 ex. le 15.11 à Harelbeke (YBa), 3 ex. le 02.11 à Neerijse (BDe). ■ **OIE DES MOISSONS** (*Anser fabalis*) : 16 ex. à Angre le 13.10, 27 ex. à Dampicourt le 11.11 et 1 ex. à Vance le 16.11 (ADu, LQ, JGa). Quatre mentions se rapportant aux espèces suivantes, n'ont pas fait l'objet des demandes d'homologation requises : **OIE A BEC COURT** (*Anser brachyrhynchus*)*, **OIE NAINE** (*Anser erythropus*)* et **OIE DES NEIGES** (*Anser caerulescens*)* ■ **BERNACHE CRAVANT** (*Branta bernicla*) : 2 ex. en vol vers l'ouest le 15.10 à Clermont-lez-Walcourt (JDo). ■ **CYGNE DE BEWICK** (*Cygnus bewickii*) : 2 ex. dans la Dyle les 16 et 17.11 (FHa, CF, JFI); 3 ou 4 ex. à Pommerœul le 24.11 (HDu). ■ **CYGNE SAUVAGE** (*Cygnus cygnus*)* : 1 ex. à Harchies du 20 au 23.11 (M. Scanu, A. Verhaegen *et al.*).

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) : passage modéré de début septembre à début novembre, avec très peu de groupes importants signalés. Deux chiffres concernant le passage : Rhode-Saint-Genèse, 76 ex. en tout en octobre (RAD); Woluwe-Saint-Etienne, octobre, passage les 01, 05 et du 12 au 25, en tout 29 ex. (DCa, FHi, MLy, MWa). Notons aussi 18-20 ex. le 24.11 au nourrissage alimenté par HWe à Meyrode. ■ **BUSE PATTUE** (*Buteo lagopus*)* : 1 ex. signalé dès le 01.11, demande d'homologation non reçue. ■ **EPERVIER D'EUROPE** (*Accipiter nisus*) : en tout 411 données pour la période (107 + 180 + 124); le passage semble se dérouler surtout de la mi-septembre à la fin octobre, les nombreuses mentions de novembre concernant plutôt l'hivernage (très peu d'oiseaux signalés comme migrateurs et d'observations multiples). A Woluwe-Saint-Etienne, 32 migrateurs au total en octobre, dont 8 ex. le 01 (DCa, FHi, MLy, MWa); passage considéré par contre comme le plus faible depuis cinq ans dans la région de Gosselies-Ransart (JBI). ■ **AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*) : le passage migratoire, s'il existe, n'est pas souvent mis en évidence; seulement par quelques rares men-

tions en dehors des zones de nidification. ■ MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) : faible passage principalement en Haute-Belgique durant les trois mois, mais nettement moindre après la mi-novembre. Seuls groupes importants : 9 ex. à Tillet le 02.10, 15 ex. à Couvreur le 05.10 et 13 ex. à Arlon le 15.10 (RDt, OM, LQ). ■ MILAN NOIR (*Milvus migrans*) : encore deux fois 1 ex. en septembre, deux fois deux et un isolé en octobre et un dernier le 17.11 à Membach (LSc). ■ BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*) : petit passage en septembre, avec entre autres 7 ex. le 27 à Cerexhe-Heuseux (PC); encore trois mentions le 06.10, puis le 20, le 23 et le 31, suivies d'un dernier ex., fort tardif, le 10.11 à Vance (JGa). ■ BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) : fins de séjours estivaux et petit passage signalés en septembre et début octobre essentiellement au nord et à l'ouest de la Meuse, puis trois mentions fin octobre et quatre en novembre : le 11 à Rhode-Saint-Genèse, le 14 à Izel, le 17 à Clermont-lez-Walcourt (2 ex.) et le 30 à Maubray (SLD, PAF, RDU, BGi, JPCq). ■ BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) : quelques exemplaires sont signalés en septembre et début octobre, puis les observations se multiplient à partir du 25 octobre; le maximum est atteint autour du 10 novembre, puis la vague de froid provoque une très nette diminution : seulement 8 observations après le 17.11 pour plus de 40 sur tout le mois. Les observations concernent presque toujours des isolés, une seule fois 3 ex. (le 26.10 à Elsenborn - JCI); à Rhode-Saint-Genèse, 8 ex. en migration au total en novembre, dont 5 ex. le 03 (PAF, SLD). ■ BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*) : 1 ex. le 02.09 à Vichenet et 1 femelle le 13.10 à Harelbeke (FG, YBa).

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaetus*) : observé uniquement en septembre, une vingtaine de données (deux fois 2 ex. en même temps) sur 13 sites différents.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) : en septembre, 1 ex. le 14 à Vance et le 17 à Harelbeke; en octobre, 1 ex. le 09 à Jehonville, le 01 et le 16 à Woluwe-Saint-Etienne; enfin 1 ex. le 06.11 à Ferrières (JGa, YBa, RML, MWt, DCa, FHi, MLY, MWa, GOR). ■ **FAUCON EMERILLON** (*Falco columbarius*) : après 1 ex. le 14.09 à Latour et le 17.09 à Izel (LQ, RDU), un passage assez abondant se développe durant la dernière décade de septembre (10 observations), puis 14 données en octobre et 9 en novembre, dont 7 après le 14. ■ **FAUCON HOBREAU** (*Falco subbuteo*) : passage modéré noté dans toutes les régions durant le mois de septembre (26 observations) se terminant, avec quatre données, en octobre, la dernière le 13 à Woluwe-Saint-Etienne (DCa, FHi, MLY, MWa).

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) : quelques groupes importants sont signalés en Hainaut et Brabant sans doute suite à une bonne reproduction, mais peut-être aussi à des repeuplements : 50 ex. à Neerijse, 42 ex. à Erbisœul, 50 ex. (9 compagnies) sur 0,65 km² à Angre et 24 ex. à Gosselies (DE, VLs, HDu, JBl). A Louvain-la-Neuve, 1 couple avec 4 jeunes encore incapables de voler le 01.09 (PCd). ■ **CAILLE DES BLES** (*Coturnix coturnix*) : encore quatre mentions durant la première quinzaine de septembre à Neerijse, Bihain, Seraing-le-Château et sur le plateau de la Dyle (DE, MNB, LG, F. Salié).

GRUE CENDREE (*Grus grus*) : un premier vol hâtif de 5 ex. le 26.09 à Bousval (XL). Il est suivi de deux vols de 50 ex. le 12.10 à Vance (JGa) puis de quelques groupes le 17; ces derniers précèdent un premier pic migratoire de quelques centaines d'exemplaires du 24 au 26.10. Mais le gros du passage se déroule sous la pression de la vague de froid de novembre : plusieurs milliers d'exemplaires survolent notre région entre le 14 et le 18.11. Comme ces dernières années, la grande majorité des observations (229 mentions pour le mois de novembre) provient de la province du Luxembourg et plus particulièrement de la région de Bastogne, où la surveillance est manifestement bien organisée. Six mentions de petits groupes seulement à l'ouest de la Meuse : trois de

l'Entre-Sambre-et-Meuse et trois du Brabant. Plusieurs groupes sont signalés en perte dans le brouillard et des oiseaux blessés ou tués par des fils électriques sont retrouvés à Bastogne et Arlon (RDt, PPI). Une dizaine de groupes sont encore signalés après le 20, le dernier (50 à 60 ex.) le 28 à Remouchamps (NPa).

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) : de 7 à 15 mentions par mois, dans une quinzaine de sites en tout; chaque fois 1 ou 2 ex., sauf 6 ex. le 05.10 à Rosières (SLD). ■ **MARQUET-PONCTUEE** (*Porzana porzana*) : 1 ex. trouvé mort à Aublain le 08.09 (JD) et 1 ex. à Rosières le 23.10 (RML). ■ **POULE D'EAU** (*Gallinula chloropus*) : le recensement des oiseaux d'eau de la mi-novembre semble confirmer la tendance, déjà signalée, à une très nette diminution de cette espèce : 242 ex. seulement pour l'ensemble des sites habituels du Brabant, de Hainaut (sans la vallée de la Haine) et de la province de Namur (sans la Meuse et la Sambre). Sur ces deux cours d'eau, notons toutefois environ 144 ex. sur la Sambre de Namur à Tergnée et environ 33 sur la Meuse de Namur à Godinnee (le 23.11 - AMo *et al.*). ■ **FOULQUE MACROULE** (*Fulica atra*) : seul Harchies regroupe une concentration importante cet automne avec 500 à 900 ex. en septembre-octobre et 1100 à 1500 ex. en novembre, Oost-Maarland en accueillant environ 500 ex. le 29.11 (JDa); ailleurs, les groupes dépassent rarement 50 ex.

HUITRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) : 1 ex. à Harelbeke le 30.10 (YBa).

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) : en septembre, quelques groupes de 200 à 500 ex., surtout en Moyenne-Belgique, mais le seul groupe très important est signalé à Sterpenich : environ 2500 ex. le 10 (PPI); l'espèce est quasi absente du Condroz (RLi). Passage modéré en octobre-début novembre, peu de groupes dépassant 300 ex.; retons cependant 1100 ex. le 12 à Angre et plusieurs milliers à Grand-Leez le 08 (HDu, HC). Fuite devant la vague de froid bien marquée les 16 et 17.11; l'espèce devient ensuite très rare. ■ **PLUVIER ARGENTE** (*Pluvialis squatarola*) : quatre mentions d'un exemplaire en octobre : le 04 à Genappe, le 06 à Lauwe, du 10 au 12 à Harchies et le 12 à Woluwe-Saint-Etienne (XL, JMTe, DTe, DCa, FHi, MLy, MWa, DVe, LV); en novembre, 1 ex. le 14 à Harelbeke et le 17 à Falemprise (YBa, MLb). ■ **PLUVIER DORE** (*Pluvialis apricaria*) : très faible passage en septembre-octobre; le mouvement s'accroît à partir du 08.11 et s'amplifie nettement les 16 et 17.11, où un total de 470 oiseaux seulement est observé, le plus souvent en vol migratoire; deux mentions d'isolés par la suite. ■ **GRAND GRAVELOT** (*Charadrius hiaticula*) : petit passage en septembre : 6 et 3 ex. les 12 et 13 à Gaurain-Ramecroix (JPCq), 3 ex. le 14 à Tirlémont (JaE, JoE), 15 ex. le 18 à Harchies (CRBH), 1 ex. le 24 à Louvain-la-Neuve (BDe) et 1 ex. blessé à Latour du 26 au 28 (JPJ, PPI). ■ **PETIT GRAVELOT** (*Charadrius dubius*) : dernière mention : 1 ex. le 22.09 à Donstienne (JLoC, JLuC). ■ **GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU** (*Charadrius alexandrinus*)* et **TOURNEPIERRE** (*Arenaria interpres*)* : chacun une mention : demandes d'homologation non reçues.

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) : présente un peu partout durant les trois mois, mais toujours en petit nombre. Les seules concentrations notables sont : Harchies, 20 à 30 ex. en septembre et octobre, mais seulement 3 ex. en novembre (CRBH); Bas-Warneton, 35 ex. le 17.09 (JMTe); Menin, 30 ex. le 26.10 (DTe); Audegarde, 20 ex. le 13.10 (LV, DVe); Ronquières et Senefte, 23 et 24 ex. les 16 et 17.11 (MWa, PVD) et Dampicourt, maximum de 53 ex. le 11.11 (LQ, BI, RDu). ■ **BECASSINE SOURDE** (*Lymnocyptes minimus*) : 1 ex. à Mormont le 09.11 (JMDu) et à Grendel le 16.11 (JMo). ■ **COURLIS CENDRE** (*Numenius arquata*) : sept observations de 1 à 5 ex., toutes au nord de la Meuse. ■ **COURLIS CORLIEU** (*Numenius phaeopus*) : 13 ex. le 04.09 à Harelbeke, 1 ex. le 05.10 à Gaurain-Ramecroix et 2 ex. le 09.10 à Grand-Leez (YBa,

JLc, LSc, JPCq, JYB). ■ **BARGE A QUEUE NOIRE** (*Limosa limosa*) : 1 ex. les 26.09 et 05.10 à Oost-Maarland (JDa, OLu). ■ **BARGE ROUSSE** (*Limosa lapponica*)* : 1 ex. les 04 et 05.09 à Harelbeke, 1 ex. le 28.09 à Oost-Maarland et 1 ex. le 02.10 à Gaurain-Ramecroix (PCd, JPCq) (plus une mention non soumise à la CH.). ■ **CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*) : nombreuses observations de 1 à 10 ex. au nord de la Meuse jusqu'au 17.11 et seulement deux observations au sud de la Meuse : 2 ex. à Vance le 04.09 et 1 puis 2 ex. à Breuvanne les 13 et 20.10 (PPi, RDu). ■ **CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*) : 1 ex. début septembre à Wareme, Warcoing et Genappe, 5 ex. le 11 à Longchamps (LG, JLc, XL, BDe); un dernier le 02.10 à Wauthier-Braine (NIS). ■ **CHEVALIER GUIGNETTE** (*Tringa hypoleucos*) : abondant en août, le passage se poursuit en septembre et durant la première quinzaine d'octobre, mais sans donner lieu à des concentrations (rarement plus de 5 ex. après le 10.09). Encore sept mentions d'isolés durant la première quinzaine de novembre, dont six dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. ■ **CHEVALIER GAMBETTE** (*Tringa totanus*) : huit observations d'isolés en Moyenne-Belgique début septembre, puis 1 ex. le 19 à Harchies (CRBH) et le 06.10 à Seilles (MTi); une seule donnée à l'est de la Meuse : 1 ex. à Latour le 09.09 (LQ). ■ **CHEVALIER ARLEQUIN** (*Tringa erythropus*) : passage relativement fourni, par rapport à la fin de l'été : 7 mentions de 1 à 5 ex. jusqu'à la mi-septembre à Donstienne, Harelbeke, Tirlemont, Franes-lez-Couvin, Latour et Genappe (JD, YBa, BDe, JaE, JoE, MLb, PPi, XL); 1 ex. le 26.10 à Thommen (BCI, PCs) puis à nouveau trois observations en novembre : 1 ou 2 ex. du 09 au 11 à Rhode-Sainte-Agathe, 1 ex. le 13 à Elouges et 3 ex. le 26 à Harelbeke (JFI, CFI, FHe, HW, HSt, YBa). ■ **CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*) : passage modéré pendant la première quinzaine de septembre, se poursuivant plus discrètement jusqu'à début octobre : en tout 33 données de 1 à 6 ex. et une de 10 ex. Deux observations seulement à l'est de la Meuse : 1 ex. à Libramont-Recogne le 04.09 et 1 ex. à Butgenbach les 15-17.09 (MWt, NPp). Derniers les 13 et 20.10 à Saint-Ghislain (Marionville) (PAN). ■ **BECASSEAU VIOLET** (*Calidris maritima*)* : 1 observation, non soumise à la Commission d'homologation. ■ **BECASSEAU MINUTE** (*Calidris minuta*) : en septembre, de 1 à 6 ex. à Harchies, Warcoing, Gaurain-Ramecroix, Harelbeke, Donstiennes et Tirlemont (CRBH, JMTe, JLc, JPCq, YBa, JLoC, JLuC, JaE, JoE). Encore 7, puis 3 ex. les 05 et 08.10 à Gaurain-Ramecroix et 3 ex. le 13.10 à Saint-Ghislain (Marionville) (JPCq, HDu). ■ **BECASSEAU VARIABLE** (*Calidris alpina*) : neuf données en septembre et dix en octobre, de groupes de 1 à 6 ex., essentiellement en Moyenne-Belgique, et une observation en Ardenne : 2 ex. le 19.09 à Thommen (NPp); 1 ex. est encore noté le 16.11 à Spy, sur un bassin d'orage d'autoroute (PLx) et les derniers séjournent aux barrages de l'Eau d'Heure jusqu'au 24.11 (JLoC, JLuC, PLx, MLb). ■ **BECASSEAU COCORLI** (*Calidris ferruginea*) : 1 ex. à Eghezée-Longchamps le 11.09 (BDe); 5 puis 4 ex. à Tirlemont les 13 et 14.09 (BDe, JaE, JoE); 1 ex. à Bas-Warneton le 17.09 (JMTe) et 1 ex. à Harchies le 19.09 (CRBH). ■ **CHEVALIER COMBATTANT** (*Philomachus pugnax*) : sept observations en septembre en Moyenne-Belgique; dernier le 05.10 à Harchies (Exc. Aves).

LABBE SP. (*Stercorarius sp.*)* : 7 observations de labbes à l'intérieur du pays nous ont été signalées, mais aucune demande d'homologation n'a été introduite!

GOELAND MARIN (*Larus marinus*) : à Harchies, 7 ex. le 02, 1 ex. le 03 et 2 ex. le 07.09 (HDu, PCd, PLc, F. Paulus); 1 ex. à Harelbeke du 26 au 30.11 (YBa) et 4 ex. le 20.11 à Gaurain-Ramecroix (JPCq). ■ **GOELAND BRUN** (*Larus fuscus*) : présence de concentrations, devenues habituelles, en Hainaut, surtout à Gaurain-Ramecroix avec un maximum de 160 ex. en septembre (JPCq) et à Harchies avec des maxima de 61 ex. en septembre, 237 ex. en octobre et plusieurs centaines début novembre, diminuant ensuite (nombreux observateurs); observé également en petit nombre en Brabant et dans la

vallée de la Meuse. ■ **GOELAND ARGENTE** (*Larus argentatus*) : peu nombreux avant le mois de novembre où l'apport d'hivernants est très important en Hainaut et Brabant. ■ **GOELAND LEUCOPHEE** (*Larus cachinnans*)* : 2 mentions, non soumises à la Commission d'homologation. ■ **GOELAND CENDRE** (*Larus canus*) : des isolés en septembre et octobre à Harchies, Virelles, Lanaye, Oost-Maarland et Woluwe-Saint-Etienne. L'apport d'hivernants correspond au début de la vague de froid de mi-novembre : entre autres 200 ex. le 25.11 à Mont-Saint-Guibert (GN). ■ **MOUETTE MELANOCEPHALE** (*Larus melanocephalus*)* : une mention, non soumise à homologation. ■ **MOUETTE RIEUSE** (*Larus ridibundus*) : apparemment peu fréquente en septembre, bien qu'un dortoir de 1400 ex. se constitue déjà le 27.09 à Ampsin (PLI). Plus fréquente en octobre-novembre où des dortoirs sont signalés à Ampsin (2000 ex. le 08.10), Obourg (2000 ex. le 20.10), Flawinne (1000 ex. le 11.11) et Beez (3500 ex. le 19.11) (PLI, VLs, PLx). ■ **MOUETTE PYGMEE** (*Larus minutus*) : 1 immature du 02 au 06.09 à Harelbeke (YBa), 2 immatures du 16 au 20.09 à Harchies (CRBH, YBa, JLC), 1 adulte le 04.11 à Harelbeke (YBa), 1 adulte et 1 immature le 02.11 aux barrages de l'Eau d'Heure (JLoC, JLuC) et 1 adulte le 11.11 à Lessines (MMn). ■ **GUIFETTE NOIRE** (*Chlidonias niger*) : net passage durant les deux premières décades de septembre, avec 23 groupes de 1 à 13 ex., uniquement en Hainaut et à Latour. Encore 6 données en octobre, dont les deux dernières les 12 et 19.10 à Grand-Leez (JPJ). ■ **STERNE PIERREGARIN** (*Sterna hirundo*) : des isolés le 05.09 à Harelbeke et le 15 à Rhode-Sainte-Agathe (JLC, YBa, FHa, DE, MNB, F. Soliez), puis une dernière le 07.10 à Harelbeke (YBa). Deux STERNES SP. (*Sterna sp.*) aussi en vol vers l'ouest le 19.09 à Izel (RDu).

MERGULE NAIN (*Plautus alle*)* : 1 ex. trouvé mourant le 03.11 à Genval (JVa).

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) : quelques faibles passages dans la région de Verviers; des stationnements notés surtout durant la deuxième quinzaine d'octobre, avec des groupes de 50 ex. à Grand-Leez, 200 ex. à Hensies, 25 ex. à Nimy et 60 ex. à Gentines (JPJ, CRBH, ADu, BDe). Six mentions en novembre, dont 80 ex. le 17.11 à Grand-Leez (JPJ). Quelques observations en Lorraine en septembre à Aubange, Sterpenich et Vance (PPi, JGa). ■ **PIGEON RAMIER** (*Columba palumbus*) : encore des pulli à Lasne le 15.09 et le 07.10 ainsi qu'un ex. couvant 2 œufs le 27.09 à Gembloux (FH, LN). Les premiers passages sont signalés fin septembre, mais la migration se déroule surtout du 15.10 au 18.11 avec des pics du 19 au 21.10 et du 03 au 16.11. Parmi les groupes les plus importants signalés, retenons 2757 ex. en une matinée le 09.11 à Nismes, 1600 ex. le 02.11 et 2000 ex. le 07.11 à Roly, 2000 ex. en 15 minutes le 06.11 à Mariembourg, 1500 ex. le 13.11 à Fagnolles et plus de 8000 ex. le 11.11 à Gimnée (SCo, MLb). ■ **TOURTERELLE TURQUE** (*Streptopelia decaocto*) : faible passage du 07.09 au 04.10 à Woluwe-Saint-Etienne (DCa, FHi, MLy, MWa) et à partir du 21.10 à Angre (152 ex. en 5 jours - HDu).

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) : 8 observations en septembre, puis une dernière, très tardive, le 22.10 à Harelbeke (YBa).

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) : 1 ex. à Harchies-Pommerœul le 13.10 (CRBH, HDu), 1 ex. les 02 et 12.10 à Woluwe-Saint-Etienne (DCa, FHi, MLy, MWa), 1 ex. le 02.11 à Angreau (HDu), 1 ex. le 07.11 à Recht (NPa), 1 ex. le 24.11 à Froidchapelle (Plate Taille - JDo) et 1 ex. les 26-27.11 à Harelbeke (YBa).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) : le séjour de cette espèce est exceptionnellement tardif, sans doute en raison de nidifications retardées par le mauvais temps en juin. Enco-

re observé très régulièrement en septembre, y compris en Haute-Belgique, avec des groupes de 30 à 50 ex. durant la première décade. Deux derniers exemplaires le 14.10 à Tournai (PR) et le 21.10 à Harelbeke (YBa). ■ **MARTIN PECHEUR** (*Alcedo atthis*) : signalé sur 23 sites en septembre, 10 en octobre et 19 en novembre, mais très peu en Ardenne. ■ **HUPPE FASCIEE** (*Upupa epops*) : 1 ex., tardif, le 26.10 à Gerpinnes (CLy).

■ **PIC CENDRE** (*Picus canus*)* : 1 ex. à Elsenborn le 28.09 (JCl). ■ **PIC MAR** (*Dendrocopos medius*) : 1 ex. à Jalhay le 12.10, 1 ex. à Membach le 18.10 (LSc) et 1 ex. à Ferrières le 27.11 (GOR). ■ **TORCOL FOURMILIER** (*Jynx torquilla*) : 4 données de migrateurs en septembre : Theux le 02, Houdrigny et Spa le 28, Saint-Mard le 29 (ADu, BI, LSc).

■ **ALOUETTE LULU** (*Lullula arborea*) : faible passage du 28.09 au 26.10 par petits groupes de 1 à 15 ex., puis encore 1 ex. le 11.11 à Mormont et 3 ex. le 17.11 à Ampsin-Neuville (JMDu, PLI). ■ **ALOUETTE DES CHAMPS** (*Alauda arvensis*) : les premiers passages sont généralement signalés à partir du 27-28.09, parfois bien plus tard : le 12.10 par exemple à Cerexhe-Heuseux (HP); ils restent relativement modérés durant la première moitié d'octobre, culminent au début de la troisième décade et restent assez importants au cours des premiers jours de novembre, se prolongeant parfois au-delà du 10.

■ **HIRONDELLE DE CHEMINEE** (*Hirundo rustica*) : des passages importants sont signalés pendant tout le mois de septembre, à des dates variant quelque peu selon les régions, mais surtout du 10 au 25. La migration devient alors sporadique, avec toutefois quelques pics locaux au cours de la première semaine d'octobre. Après la mi-octobre, les observations deviennent occasionnelles, quelques attardées étant encore notées en Hainaut occidental début novembre (six observations de 1 à 4 ex. du 01 au 06.11). ■ **HIRONDELLE DE FENETRE** (*Delichon urbica*) : quelques nidifications tardives sont classiquement signalées fin septembre et début octobre, par exemple des envols le 03.10 à Mormont (Laforge), le 05.10 à Lierneux et le 14 ou 15.10 à Ampsin-Neuville (JMDu, MDe, PLI). Le passage se poursuit pourtant de façon classique en septembre, surtout au cours de la deuxième décade, se prolongeant un peu début octobre. Après le 10.10 les observations ne sont plus qu'occasionnelles (8 mentions) et le dernier exemplaire est noté le 10.11 à Wanze (PLI). ■ **HIRONDELLE DE RIVAGE** (*Riparia riparia*) : rare dès début septembre : seulement 9 mentions du 01 au 08, puis 10 ex. le 15 à Harchies et «nombreux exemplaires» le 23 à Frasnès-lez-Buissenal (HDu, MMn).

■ **PIPIT ROUSSELIN** (*Anthus campestris*) : petit passage en septembre : 1 ex. à Aineffe du 03 au 06 (LG), 1 ex. le 10, 2 ex. le 22 et 6 + 1 ex. le 24 à Heusy-Séroule (LSc), 5 ex. le 10, 1 les 19, 20 et 21, 6 le 22 et 1 le 20 à Seraing-le-Château (LG) et 1 ex. le 21 à Walhain-Saint-Paul (BDe). ■ **PIPIT DES ARBRES** (*Anthus trivialis*) : passage principal entre le 10 et le 25.09; derniers le 13.10 à Neerijse et le 21.10 à Leval-Chaudeville (DE, MNB, HG). ■ **PIPIT FARLOUSE** (*Anthus pratensis*) : à quelques exceptions près, le passage commence les 24-25.09 et culmine nettement au cours de la première semaine d'octobre, avec par exemple 1289 ex. le 05 à Woluwe-Saint-Etienne (DCa, FHi, MLy, MWa). Il diminue fortement dès le 15.10 et, après le 20, seuls de petits groupes séjournent encore. ■ **PIPIT SPIONCELLE** (*Anthus spinoletta*) : deux premières observations dès les 14 et 22.09 à Nimy et Baudour (ADu). Quelques ex. sont ensuite notés début octobre puis plus fréquemment à partir de la deuxième décade et en novembre. Des dortoirs et des rassemblements sur des vasières sont signalés dès le début de cette période : par exemple 12 ex. le 19.10 et 41 ex. le 03.11 à Walhorn, puis seulement 17 ex. le 15.11 (LSc), 21 ex. le 21.10 à Bossut-Gottechain (MWa), 38 ex. le 26.10 et 12 ex. le 23.11 à Sint-Joris-Weert (MWa); 27 et 34 ex. les 02 et 16.11 à Pérot (MWa). Notons aussi 1 ex. attribué à la sous-espèce *littoralis** le 19.10 à Overijse (JV). ■ **BERGERONNETTE GRISE** (*Motacilla alba*) :

nombreux rassemblements signalés dès début septembre et passage faible à partir du 10, s'intensifiant classiquement en fin de mois pour culminer en octobre, aux environs du 05 et du 12 : ce jour, par exemple, 232 ex. de passage en deux heures à Angre (HDu). La migration cesse quasi entre le 20 et le 25, mais des isolés ou très petits groupes sont encore notés pendant tout le mois de novembre. Deux dortoirs sont signalés : à Waterloo, environ 70 ex. le 21.09 dans des robiniers, sur un parking, et à Theux : ici l'effectif varie de 142 ex. le 07.09 à un maximum de 469 ex. le 21.09 puis 200 ex. le 02.10, encore 50 à 60 ex. le 17.10 et enfin zéro le 31.10 (LSc). ■ **BERGERONNETTE DES RUISSEAUX** (*Motacilla cinerea*) : faible passage en septembre-octobre, puis une vingtaine d'isolés notés dans toutes les régions en novembre. ■ **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE** (*Motacilla flava*) : passage important en septembre, surtout pendant la deuxième décade et nettement réduit après le 25 ; il est quasi spectaculaire le 04 à Ombret, où environ 2000 ex. passent durant la matinée par groupes de 3 à 50 ex. (JF). Onze mentions du 01 au 08.10, puis encore une le 12 à Harelbeke, le 18 à Bellefontaine et le 22 à Heusy (JLc, RDU, LSc). ■ **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE NORDIQUE** (*Motacilla flava thunbergi*) : quelques exemplaires rattachés à cette sous-espèce sont signalés : 2 le 07.09 à Mariembourg (MLb), 1 le 14.09 à Sibret (RDT), 2 le 08.09 et 1 les 20 et 22.09 à Woluwe-Saint-Etienne (DCa, FHj, MLY, MWA).

PIE-GRIECHE GRISE (*Lanius excubitor*) : observée sur 50 sites durant les trois mois, principalement en Haute-Belgique. Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, mentions à Harchies, Sint-Joris-Weert, Korbeek-Dijle et Vieux-Héverlée (HDu, VLs, CRBH, MWA, CGe, BDe). ■ **PIE-GRIECHE ECORCHEUR** (*Lanius collurio*) : 1 mâle avec 3 juv. à Messancy les 08-09 et 1 ex. le 20.09 à Ethe (CMo).

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) : arrivée sensible d'hivernants dès le début de novembre sur l'Ourthe, dans la région de Bomal (YF), et hivernage de 2 ex. à partir du 11.11 au bord du lac de la Gileppe (LSc). A Vielsalm, le 03.11, 1 ex. observé nageant en surface du plan d'eau, comme un canard (BCI, PCs).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) : passage marqué du 10-15.09 à fin octobre, avec un pic fin septembre et au cours de la première décade d'octobre.

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) : passage faible, comme toujours assez discret, durant toute la période. Seulement trois groupes importants : 32 ex. à Angre le 14.09, 50 ex. à Howardries le même jour et 50 ex. aussi à Erbisœul le 02.10 (HDu, CA, VLs). ■ **GRIVE LITORNE** (*Turdus pilaris*) : peu signalée en septembre, même en Haute-Belgique. Généralement peu observée directement, la migration est surtout mise en évidence par l'apparition de l'espèce en bandes parfois importantes à partir de fin septembre, en Hainaut et Brabant notamment ; par exemple, plus de 1000 ex. le 13.10 à Vieux-Héverlée, moins de 50 ex. le 19 (SC). La vague de froid ne provoque pas de mouvement bien marqué. ■ **GRIVE MUSICIENNE** (*Turdus philomelos*) : passage modéré principalement du 10.09 à la mi-octobre : notons plus particulièrement 150 ex. en halte le 28.09 à Sart-lez-Spa et 207 ex. sur la matinée du 11.10 à Pétigny (LSc, TDe). Très rare après le 20.10, 13 mentions en novembre. ■ **GRIVE MAUVIS** (*Turdus iliacus*) : premières, hâtives, le 07.09 à Harelbeke et Courtrai (YBa, JLe), puis quelques-unes à partir du 22.09. Début octobre, l'espèce est toute proche de notre région (environ 10 000 ex. sont en effet notés du 03 au 15.10 à Brasschaat), mais la migration ne débute réellement chez nous qu'à la mi-octobre et semble culminer par une fuite devant le froid du 14 au 17.11 : par exemple une dizaine de groupes de 50 à 100 ex. sur la matinée du 16 à Tontelange (PPI). L'espèce ne disparaît toutefois pas complètement après la mi-novembre. ■ **MERLE A**

PLASTRON (*Turdus torquatus*) : 1 ex. à Ochamps le 19.09 (MWt) et 1 ex. à Rhode-Saint-Genèse le 13.10 (PAF). ■ **TRAQUET MOTTEUX** (*Oenanthe oenanthe*) : passage modéré en septembre, jusqu'aux premiers jours d'octobre (au maximum 6 ex. ensemble). A Woluwe-Saint-Etienne, il culmine du 21 au 24 avec 15 à 26 ex. par jour, pour un total mensuel de 163 ex. (DCa, FHi, MLY, MWa). Ensuite trois attardés le 04.11 à Bierwart (FRo). ■ **TRAQUET PATRE** (*Saxicola torquata*) : très faible passage en septembre et début octobre; à Woluwe-Saint-Etienne, le maximum n'est que de 3 ex., le 19.09 (DCa, FHi, MLY, MWa). Dernier le 13.10 à Baranzy (PPI). ■ **TRAQUET TARIER** (*Saxicola rubetra*) : passage durant le mois de septembre, avec un pic du 19 au 22, entre autres 15 ex. à Mariembourg le 19, 14 ex. et 11 ex. les 19 et 22 à Woluwe-Saint-Etienne (MLb, DCa, FHi, MLY, MWa). Encore quatre observations début octobre, derniers le 13.10 à Sérou-Forville (FRo). ■ **ROUGEQUEUE A FRONT BLANC** (*Phoenicurus phoenicurus*) : encore quelques migrants surtout du 15 au 25 septembre, mais aussi un chanteur à Vance le 10.10 (JGa) et une observation très tardive le 16.11 à Vielsalm (BCI, PCs). ■ **ROUGEQUEUE NOIR** (*Phoenicurus ochruros*) : migration et départs en septembre et octobre, surtout du 21.09 au 14.10. Encore neuf données en novembre, la plupart à la fin de la seconde décade, les deux derniers le 22 à Arlon et le 26 à Franes-lez-Couvin (JGa, MLb). ■ **ROUGE GORGE** (*Erithacus rubecula*) : passage à partir de la mi-septembre, très bien marqué les 28 et 29.09 ainsi que le 13.10 (PDa, JPJ, HDu, HP *et al.*). En novembre, peu nombreux dans la région de Verviers (LSc).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) : 14 mentions en septembre, puis deux dernières données le 05.10, à Harchies et Harelbeke (Exc. Aves, JLC). ■ **ROUSSEROLLE VERDEROLLE** (*Acrocephalus palustris*) : une seule mention, 1 ex. le 07.09 à Pommerœul (HDu). ■ **PHRAGMITE DES JONCS** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : encore 1 ex. le 21.09 à Pommerœul (VLs). ■ **HYPOLAIS ICTERINE** (*Hippolais icterina*) : trois données très tardives : 1 ex. les 28 et 29.09 à Cerexhe-Heuseux (PC), le 02.10 à Merbes-le-Château (HB) et le 05.10 à Harelbeke (JLC). ■ **HYPOLAIS POLYGLOTTE** (*Hippolais polyglotta*) : 1 mention début septembre en Hainaut, à soumettre à homologation. ■ **FAUVETTE A TETE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*) : passage de mi-septembre à mi-octobre avec un pic noté les 28-29.09 en Gaume, à Woluwe-Saint-Etienne et à Cerexhe-Heuseux (JPJ, PPI, HP, DCa, FHi, MLY, MWa). Quelques observations encore fin octobre, puis 1 ex. le 11.11 à Dampicourt et le 28.11 à Ombret (LQ, JF). ■ **FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*) : passage noté en général jusqu'au 20.09 puis 1 ex. le 05.10 à Forges (JYS), le 13.10 à Cerexhe-Heuseux (HP) et trois captures en octobre à Ransart, la dernière le 18 (JBI). ■ **FAUVETTE GRISETTE** (*Sylvia communis*) : quelques-unes jusque fin septembre, la dernière le 28 à Latour (JPJ, PPI). ■ **FAUVETTE BABILLARDE** (*Sylvia curruca*) : seulement onze mentions, essentiellement pendant la première décade de septembre, la dernière le 20 à Heusy (LSc). ■ **POUILLOT FITIS** (*Phylloscopus trochilus*) : fin du passage vers le 20 septembre, puis quelques attardés; les derniers à Woluwe-Saint-Etienne : 1 chanteur du 04 au 06.10 et 2 chanteurs le 26 (DCa, FHi, MLY, MWa). ■ **POUILLOT VELOCE** (*Phylloscopus collybita*) : le passage débute vers le 10.09, culmine dans la troisième décade du mois et reste régulier jusqu'au 13-14.10, les derniers exemplaires étant le plus souvent notés entre les 20 et 24.10. Quelques attardés sont encore signalés en Moyenne-Belgique jusqu'au 17.11. ■ **POUILLOT SIFFLEUR** (*Phylloscopus sibilatrix*) : un attardé à Eupen le 06.10 (HWe). ■ **POUILLOT A GRANDS SOURCILS** (*Phylloscopus inornatus*)* : année d'afflux marqué, détecté essentiellement à la côte; 1 ex. capturé et bagué le 24.09 à Spa (JFi), 1 ex. le 07.10 à Rixensart (SP) et 1 ex. le 24.11 à Harchies (HDu). ■ **ROITELETS HUPPE ET A TRIPLE-BANDEAU** (*Regulus regulus et R. ignicapillus*) : passage assez peu marqué, à partir de la mi-septembre pour le Roitelet à triple-bandeau, de la fin du mois pour le Huppé. Celui-ci passe toutefois en assez grand nombre durant la dernière décade d'octobre

(HP, PC). Le dernier Triple-bandeau local est noté le 29.10 à Heusy (LSc).

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*): passage discret généralement signalé pendant les deux dernières décades de septembre, se prolongeant quelque peu jusqu'à début octobre, puis un dernier exemplaire le 20.10 à Mortier (PC). ■ **GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*): passage principalement durant les deux premières décades de septembre, important le 02 à Cerexhe-Heuseux (HP). Encore deux données début octobre, puis un dernier oiseau le 20 à Mortier (PC).

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*): passage important en octobre, culminant du 12 au 27 à Woluwe-Saint-Etienne et à partir du 19 à Cerexhe-Heuseux (DCa, FHi, Mly, MWa, HP). Dans la région liégeoise, il continue en novembre et laisse beaucoup d'exemplaires aux nourrissages. Lors du baguage, on remarque la présence de 66% de femelles (n = 132 ex.), surtout des juvéniles. Ceci semble indiquer que les mâles auraient arrêté leur mouvement migratoire plus au nord ou à l'est (PC). ■ **MESANGE BLEUE** (*Parus caeruleus*): migration dense en région liégeoise pendant une assez courte période en octobre (aux environs du 20), puis disparition brusque. Les individus au nourrissage en novembre sont moins nombreux que les autres hivers (PC). ■ **MESANGE NOIRE** (*Parus ater*): passage important à partir de la troisième décade de septembre et en octobre, avec de nombreuses données de régions de Moyenne-Belgique où l'espèce est normalement absente. La migration s'arrête en novembre et laisse peu d'exemplaires sur place (HP, PC, JBl, MMn, HDu, CRBH *et al.*). ■ **MESANGE REMIZ** (*Remiz pendulinus*)* : 1 puis 2 ex. les 26 et 28.11 à Harchies (JPV, PAN, W. Roggeman).

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*): une mention intéressante, en dehors de l'aire de nidification connue : le 30.10, reprise à Clermont-lez-Walcourt d'un exemplaire capturé au même endroit deux ans auparavant (JDo).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*): quelques passages notés en Hainaut et Brabant d'octobre à mi-novembre : par exemple, 85 ex. sur 19 jours en octobre et 28 ex. en 55 minutes le 11.11 (sans doute fuyant devant le froid) à Angre (HDu). A Sint-Joris-Weert, dortoir non occupé le 13.10, 5 ex. le 19, 30 ex. le 26 et 8 ex. le 23.11 (MWa). Relevons aussi deux observations ardennaises : plusieurs exemplaires à Longchamps (Lux.) le 18.09 (P. Sacré) et 1 ex. à Robertville (Mont-Rigi) le 20.10 (HDu). ■ **BRUANT JAUNE** (*Emberiza citrinella*): très faible passage noté fin septembre et en octobre; plus fréquent en novembre où quelques groupes importants sont signalés : 60 ex. à Fouches le 02, 50 ex. à Attert le 16, 100 ex. à Korbeek-Dijle le 23 (PPi, JaE, JoE, MWa). ■ **BRUANT ORTOLAN** (*Emberiza hortulana*): quelques migrants (1 à 5 ex.) notés uniquement à Heusy les 13, 16 et 19.09 (LSc) et à Woluwe-Saint-Etienne du 15 au 30.09, suivis d'un dernier exemplaire le 12.10 (DCa, FHi, Mly, MWa). ■ **BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schoeniclus*): passage généralement signalé comme assez faible, sauf peut-être fin septembre à Harchies et Angre (HDu), et à Woluwe-Saint-Etienne début octobre (maximum journalier de 101 ex. - DCa, FHi, Mly, MWa). Quelques groupes importants sont toutefois signalés fin octobre, par exemple 60 ex. à Mortier et 160 ex. le 26 en Fagne de Steinley (Exc. Aves). L'espèce se raréfie ensuite très fortement, le maximum de novembre (très peu après le 16) étant de 10 ex. ensemble (Bomal le 03 - YF). ■ **BRUANT DES NEIGES** (*Plectrophenax nivalis*): 1 ex. le 31.10 à Houdrigny (BI).

GROSBEC CASSENOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*): les observations sont relativement nombreuses mais les groupes en général petits et le passage, surtout renseigné fin septembre et durant la première décade d'octobre ainsi que du 25.10 au 03.11, reste faible. Il y a très peu de mentions au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Les princi-

poux groupes rassemblent 27 ex. à Mormont le 14.09, 50 ex. le 31.10 à Dampicourt, 100 ex. par petites bandes à Barvaux-en-Condroz et 70 ex. à Maffe le 03.11 (JMDu, LQ, RLi, SSo). ■ **VERDIER D'EUROPE** (*Carduelis chloris*) : le passage devient régulier aux environs du 25.09 et reste en général modéré, voire très faible (Heusy - LSc). A Woluwe-Saint-Etienne, le pic principal se situe au cours de la première semaine d'octobre et des pics secondaires sont notés les 19-20 et 25-26 (DCa, FHi, MLg, MWa), tandis que le passage culmine le 21 à Angre et les 21 et 29 à Cerexhe-Heuseux (HDu, HP). ■ **CHARDONNET ELEGANT** (*Carduelis carduelis*) : passage assez modéré du 25.09 au 20.10. Seule la Gaume abrite des concentrations notables, e.a. 50 à 60 ex. à Latour en 09, un dortoir de 200 ex. à Houdrigny en septembre-octobre, 400 ex. de passage à Couvreur le 05.10 et 70 ex. à Termes le 20.10 (PPi, BI, LQ, RDu). L'espèce est également fréquente dans l'Entre-Sambre-et-Meuse avec en septembre 20 à 70 ex. à Mariembourg, 25-30 ex. à Frasnes-lez-Couvin et 40 + 25 ex. le 04.10 à Fagnolles (MLb, TDe). ■ **TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*) : présent début septembre dans certaines régions d'Ardenne, parfois en nombre (Bihain - LG). Ailleurs, le passage commence aux environs du 20.09 et est régulier en octobre, mais plutôt modéré, la plupart des groupes ne dépassant pas 20 à 30 ex.. Il s'accroît en novembre, avec des groupes plus importants, notamment 60 à 80 ex. à Flobecq, Woluwe-Saint-Lambert, Virelles, Godinne, Tontelange (MMn, PPi, BPh, JPF, AMo). ■ **LINOTTE MELODIEUSE** (*Carduelis cannabina*) : très fréquente en septembre avec des bandes de plus de 100 ex., notamment à Latour, Jurbise, Aineffe et Vaux-sur-Sûre (PPi, JPJ, VLs, LG, RDt). La migration proprement dite semble commencer vers le 25.09 et est régulière jusqu'au 20.10 au moins. L'espèce reste assez commune jusque fin novembre, mais en plus petit nombre. ■ **LINOTTE A BEC JAUNE** (*Carduelis flavirostris*) : 1 ex. le 26.10 à Ocquier et 1 ex. le même jour à Estinnes-au-Mont (SSo, S. Dupont). ■ **SIZERIN FLAMME** (*Carduelis flammea*) : observations régulières en très petit nombre, presque exclusivement en Haute-Ardenne, jusqu'à la mi-octobre. Un petit passage se développe ensuite dans toutes les régions. Seuls groupes relativement importants : environ 30 ex. le 06.10 à Eupen, environ 35 ex. en 10 à Membach, environ 40 les 05 et 11.10 à Petigny et plusieurs dizaines le 30.11 à Dave et Godinne (HWe, LSc, TDe, JPF). ■ **SERIN CINI** (*Serinus serinus*) : passage très faible; la Gaume regroupe les trois quarts des observations, dont les deux seuls groupes notables : 16 ex. le 08.09 à Athus et 30 ex. le 12.10 à Dampicourt (PPi, LQ). Dernier le 17.11 à Gives (PLI). ■ **BOUVREUIL PIVOINE** (*Pyrrhula pyrrhula*) : assez commun à l'est de la Meuse avec e.a. 30 ex. le 06.10 à Dampicourt et 18 ex. le 16.10 à Saint-Vincent (LQ, RDu). Passage faible dans les autres régions. ■ **BECCROISE DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*) : l'espèce est très répandue en Ardenne pendant toute la période, surtout en septembre où l'on note des groupes jusqu'à 80 ex. Elle est également présente en petit nombre dans les autres régions de Haute-Belgique et est très rare au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Sauf dans l'est de la province de Liège (LSc), très peu de passage proprement dit. ■ **PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*) : le passage démarre réellement fin septembre et culmine très nettement début octobre avec e.a. 8172 ex. à Woluwe-Saint-Etienne entre les 04 et 06 et des totaux quotidiens de l'ordre du millier d'ex. à Vance et Angre (DCa, FHi, Mly, MWa, JGa, HDu). Il diminue très nettement pendant la seconde quinzaine d'octobre, puis une petite reprise a lieu durant la première décade de novembre. ■ **PINSON DU NORD** (*Fringilla montifringilla*) : sauf à Heusy où deux observations sont déjà signalées les 10 et 13.09 (LSc), l'espèce est notée à partir du 25.09, parfois seulement bien plus tard. Le passage reste en général peu abondant en octobre (sauf à Harchies les 04-05 - CRBH); quelques rassemblements importants sont toutefois signalés, dont 300 ex. le 12 à Thommen (BCl, PCs). Les mouvements s'accroissent nettement début novembre (Cerexhe-Heuseux, Barvaux-en-Condroz, Vielsalm - R. Ponsen, RLi, PBW) et les premiers exemplaires apparaissent aux mangeoires dans la seconde quinzaine du mois.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) : passage régulier en octobre, important les 12 et 13 à Cerexhe-Heuseux (HP). Quelques bandes de 100 à 200 ex. le 12.10 à Howardies, le 26.10 à Mortier, le 27.10 à Saint-Remy (Lux), le 01.11 à Bellefontaine et le 02.11 à Saint-Vincent (CA, PCd, PPI, RDu).

ETOURNEAU (*Sturnus vulgaris*) : en octobre, dortoir de 6000 ex. à Roly, 15.000 ex. à Arlon, plusieurs milliers à Charleroi et 300.000 à Bastogne (A. Sauvage, JGa, JBI, P. Sacré). Passages à Woluwe-Saint-Lambert surtout à partir du 16.09 et du 05 au 26.10 (DCa, FHi, MLY, MWA). Nette diminution des effectifs en Gaume pendant la période de froid en novembre (JGa).

LORIOT (*Oriolus oriolus*) : présent à Harchies jusqu'au 09.09 (CRBH), puis une observation fort tardive le 20.10 (D. Devos).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) : en dehors des sites habituels, 1 ex. à Mormont le 04.09 et à Marcourt le 27.10 (JMDu, HC). ■ **CORNEILLE MANTELEE** (*Corvus corone cornix*) : 1 ex. à Luïngne le 21.10 et à Rhode-Sainte-Agathe le 02.11 (JLc, BDe). ■ **CORBEAU FREUX** (*Corvus frugilegus*) : quelques mouvements sont déjà signalés dans la troisième décade de septembre, mais ils restent insignifiants jusqu'à la mi-octobre. Ils deviennent ensuite réguliers jusqu'à la mi-novembre, mais d'importance assez variable selon les régions, culminant le plus souvent vers le 23-24.10 ou pendant la première décade de novembre. Le passage du **CHOUCAS DES TOURS** (*Corvus monedula*) suit classiquement à peu près la même chronologie; plusieurs centaines d'exemplaires stationnent fin-octobre au bord des plans d'eau d'Harchies (maximum 500 ex. le 24 - CRBH). ■ **PIE BAVARDE** (*Pica pica*) : plusieurs observateurs signalent l'abondance et/ou l'augmentation de l'espèce, notamment à Erbisœul et dans la région de Ransart (VLs, JBI). Dans un autre domaine, quelques observations valent la peine d'être rapportées : 1 ex. totalement albinos le 26.10 à Mouscron et le 02.11 à Rhode-Sainte-Agathe (DTe, FHa); le 20.09 à Mormont, 4 ex. «taquinent» un lièvre en lui becquetant le dos ou la queue, sans qu'il en semble très affecté (JMDu); plus habituel, quelques-unes viennent régulièrement, depuis des mois, enlever le mastic des fenêtres, même durci, d'une maison de Heusy (JCI). ■ **CASSENOIX MOUCHETE** (*Nucifraga caryocatactes*) : une petite invasion a touché l'Europe occidentale; elle s'est arrêté pratiquement en Hollande et seul un petit nombre de Cassenoix est arrivé en Belgique. En dehors de l'aire de nidification habituelle : des isolés à Mormont le 04.10, Brasschaat le 19.10, Barvaux le 23.10, Orval le 25.10, Gosselies le 31.10, Rulles le 01.11 et Braine-le-Château le 16.11 (RSn, JMDu, LQ, JBI, RDu, GN). L'espèce est également assez commune dans son territoire de l'est du pays. ■ **GEAI DES CHENES** (*Garrulus glandarius*) : passage dès début septembre dans la région des Hautes-Fagnes (LSc), s'intensifiant et s'étendant aux autres régions à la fin du mois et durant la première quinzaine d'octobre.