

SUR LE STATUT DU JASEUR BOREAL (*Bombycilla garrulus*) EN WALLONIE ET A BRUXELLES

L'apparition de Jaseurs boréaux à Bruxelles, relatée par E. et L. Brasseur, a été considérée par de nombreux observateurs, surtout parmi les plus jeunes, comme un événement exceptionnel. Le statut de cette espèce dans nos régions a-t-il réellement changé depuis l'époque où TRICOT (1965) publiait son étude sur le Jaseur en Belgique?

Afin de répondre à cette question, nous avons traité les 45 données rassemblées par la Centrale Ornithologique Aves de la fin 1966 au printemps 1985. L'histogramme, le graphique et la carte ci-dessous en font la synthèse. Nous avons constaté que les séjours sont peu fréquents (5 cas), qu'ils durent d'une semaine à un mois et qu'ils se déroulent de la mi-décembre à la mi-février. Les dates de première observation varient grandement d'une année à l'autre : 6 octobre, 4, 7, 19 et 27 novembre; 2, 3 et 24 décembre. Les dernières dates notées sont les 20, 26 et 29 mars.

Par rapport à la période étudiée par TRICOT, de 1900 à 1964, il est manifeste que le Jaseur est devenu, en Wallonie, un migrateur et hivernant sensiblement plus rare et irrégulier, et que ses invasions se sont singulièrement espacées : la dernière qui ait réellement atteint la Wallonie date de 1965-1966 (LIPPENS & WILLE, 1972). Par contre, la concentration des données dans la province de Liège est confirmée.

Nous avons pu établir quelques comparaisons entre le statut en Wallonie et dans des régions limitrophes. Ainsi, dans le Limbourg hollandais, juste au nord de la province de Liège, le nombre d'observations et d'oiseaux est très semblable et les années de présence sont à peu près les mêmes que chez nous, sauf en 1981-1982. De plus, des invasions importantes qui ont atteint une grande partie des Pays-Bas en 1969-1970 et 1972-1973, n'ont été remarquées ni au Limbourg ni en Wallonie (GANZEVLES *et al.*, 1985).

Nous devons aussi mettre en évidence le fait qu'à l'est de nos régions, en Rhénanie, des invasions ont été constatées en 1965-1966, 1967-1968, 1970-1971 et 1974-1975 (MILDENBERGER, 1984) et que c'est au cours de ces mêmes hivers que les afflux les plus importants ont été notés en Wallonie. Mais en Rhénanie, les observations sont annuelles, à une exception près. Ailleurs dans le nord et le centre de l'Europe, peu de mouvements ont été signalés ces dernières années, si ce n'est en 1981-1982 (Iles Féroées, Danemark, Pays-Bas, Autriche, Bulgarie...) et en 1984-1985 (Norvège, Grande-Bretagne, Pays-Bas), sans qu'ils soient ressentis chez nous. Depuis vingt ans, le Jaseur est donc, dans le centre et le sud de la Belgique, un visiteur irrégulier en très petit nombre.

D. VAN DER ELST
rue des Echevins 60
B-1050 Bruxelles




Fig. 1 - Observations de Jaseurs boréaux en Wallonie et Brabant de 1966 à 1985. Nombre d'exemplaires (en abscisse) par observation (en ordonnée).




Fig. 2 - Nombres d'observations (en hachuré) et d'oiseaux observés (en blanc) chaque hiver en Wallonie et Brabant de 1966-67 à 1984-85.




Fig. 3 - Répartition géographique des observations en Wallonie et Brabant de 1966 à 1985.