

## BIBLIOGRAPHIE

- GANZEVLES, W., HUSTINGS, F., SCHEPERS, F., UMMELS, J. & VERGOOSSEN, W. (1985) : *Vogels in Limburg*, Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Maastricht.
- DE KNIJFF, P. (1982) : Bepaling van leeftijd en geslacht bij Pestvogel. *Dutch Birding*, 4 : 73-79.
- LIPPENS, L. & WILLE, H. (1972) : *Atlas des oiseaux nicheurs de Belgique et d'Europe occidentale*, Lannoo, Tielt.
- MILDENBERGER, H. (1984) : *Die Vögel des Rheinlandes*, Band 2. Kilda Verlag, Dusseldorf.
- TRICOT, J. (1965) : Le Jaseur boréal. Aperçu sur ses déplacements. Analyse des apparitions en Belgique. *Aves*, 2 : 97-125.

### UNE NIDIFICATION DU FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) AU SOL

Le 9 juin 1978, une nidification de Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) est découverte dans les pâtures de l'abbaye N-D de Scourmont à Forges, à 8 km au sud de Chimay. Curieusement, l'aire s'avère être placée au niveau du sol, plus exactement sous une mangeoire en auge, appartenant à un petit abri pour bétail. Cette mangeoire repose sur des planchettes tenues relevées, formant une série de loges sous toute la longueur de la mangeoire. Ces planchettes reposent à leur tour sur un sol bétonné, perpétuellement recouvert de boue et de fumier. Les loges ont une hauteur de 40 cm, et une profondeur de 50 cm; elles sont orientées vers le nord. Le bâtiment est situé en pleine pâture ouverte, à proximité de chemins utilisés par des tracteurs. L'une de ces loges est occupée par un couple de Crécerelles qui y élève deux jeunes, jusqu'au pillage probable de l'aire le 15 juin.

La reproduction du Faucon crécerelle au sol est considérée comme très rare en Europe. GEROUDET (1978) la renseigne comme exceptionnelle dans les dunes de la Mer du Nord.

P. GALL SCHUON  
Abbaye N-D de Scourmont  
B-6483 Forges

### UN CAS D'ABERRATION CHROMATIQUE CHEZ LE POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) : EXCES DE JAUNE

Parmi les aberrations de couleur chez les oiseaux, l'excès de jaune est rarement cité. C'est pourquoi nous relatons l'observation faite le 17 mai 1986 dans les bois d'Aye (province de Luxembourg), une chênaie-charmaie où nous comptons de nombreux cantons de Pouillots siffleurs (*Phylloscopus sibilatrix*). Un de ceux-ci, repéré et identifié au chant, a un plumage très particulier qui lui donne un aspect de parulidé : le jaune soufre pâle de la poitrine s'étend sur l'entièreté de la tête et sur le haut du manteau. La tête est de couleur uniforme, le reste du manteau est d'un vert plus clair que la normale, quelques scapulaires et couvertures sont isabelle, le bas de la poitrine est plus gris que d'habitude, le bec rosâtre. Le reste du plumage est normal. Le comportement de l'oiseau ne semblait nullement affecté.