

## CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE 1989/4 :

### septembre, octobre, novembre

par René DE LIEDEKERKE, Jean-Paul JACOB, Jean-Paul FOUARGE,  
Pierre COLLETTE et Emile CLOTUCHE<sup>1</sup>

Elaboration du fichier : Laurent Gée et Dominique Coune

Liste des collaborateurs ayant fourni des rapports d'observations effectuées pendant la période considérée :

A	Anonyme	CPe	C. Percsy	GON	Gr. Orn. du Nord
ADr	A. Dernier	DCl	D. Clermont	GRt	G. Rotsaert
ADu	A. Delaunois	DE	D. van der Elst	HDe	H. Delvoye
ADx	A. Doneux	DMt	D. Muyshont	HDu	H. Dufourny
AGo	A. George	DRA	D. Rabosée	HP	H. Pellegrin
AMo	A. Monmart	DTe	D. Testaert	HW	H. de Wavrin
AP	A. Pourtois	DV	D. Voituren	HWe	H. Wiesemes
AR	A. Rappe	DVe	D. Verroken	JBt	J. Bultot
BDe	B. Deccuninck	DVi	D. Vieuxtemps	JCDl	J.C. Delfosse
BFo	B. Forget	EC	E. Clotuche	JDa	J. Delarue
BH	B. Hanus	ED	E. Delmée	JDo	J. Doucet
BHF	B. Henry de Frahan	EVe	E. Verheggen	JF	J. Fouarge
BN	B. Nef	FDo	F. Doblestein	JGr	J. Grimont
BPh	B. Philippart	FDs	F. Desmette	JHp	J. Hupperetz
BT	B. Tricot	FG	F. Gijs	JLLe	J.L. Lebailly
CA	C. Ancelet	FH	F. le Hardy de Beaulieu	JLoC	J.Louis Coppée
CCa	C. Calberg	FHe	F. Hela	JLuC	J.Luc Coppée
CGe	C. Geyer	FHu	F. Hupet	JMCh	J.M. Charlier
CGo	C. Goblet	FMh	F. Mauhin	JMD	J.M. Deprovins
CLb	C. Libert	FRe	F. Renard	JMDu	J.M. Daulne
CLe	C. Lefèbvre	GBt	G. Bulteel	JMg	J. Matagne
CLy	C. Lemy	GGc	G. de Guchtenère	JMTe	J.M. Testaert
CN	C. Noiret	GLp	G. Lepoint	JPC	J.P. Chauffouraux

(1) Centrale ornithologique Aves

c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, Rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

JPCq	J.P. Coquette	MPa	M. Paquay	PWt	P. Wyckaert
JPF	J.P. Fouarge	MV	M. Vanderhoeven	RDt	R. Detaille
JPJ	J.P. Jacob	MWt	M. Watelet	RL	R. Lambert
JSe	J. Sedek	NG	N. Goetghebeur	RLb	R. Libois
JSe	J.S. Sieux	NPa	N. Paquay	RLi	R. de Liedekerke
JT	J. Tricot	NSe	N. Selosse	RML	R.M. Lafontaine
JYP	J.Y. Paquet	PAn	P. Anrys	RPo	R. Ponsen
LG	L. Géc	PC	P. Collette	RT	R. Thomas
LMs	L. Moreels	PCd	Ph. Collard	SB	S. Baugniet
LN	L. Noulard	PCi	P. Croisier	SD	S. Dupont
LSc	L. Schmitz	PDa	P. Dachy	SL	S. Lhoest
LSe	L. Servais	PDy	P. Degossely	SLD	D. Slabbinck
LV	L. Verroken	PGil	P. Gilson	SM	S. Moniotte
MBI	M. Blyth	PiC	Pi. Collard	SSo	S. Sorbi
MDc	M. Dubucq	PJe	P. Jenard	TDe	T. Dewitte
MDe	M. Deroanne	PLc	P. Lachapelle	TMc	T. Mersch
MGe	M. Gérard	PLI	P. Loly	TMq	T. Maniquet
MJ	M. Jacquemin	PLu	P. Lucas	UL	U. Lefèvre
MJa	M. Janssens	PPi	P. Pierre	VD	V. Degrelle
ML	M. Loison	PR	P. Remmerie	VLs	V. Leirens
MLm	M. Lambert	PS	P. Simon	VSc	V. Schollaert
MLs	M. Lesoir	PSa	P. Sacré	WGl	W. Glineur
MMn	M. Moncousin	PVe	P. Vandeveld	YF	Y. Fanon
MNB	M.N. de Bellefroid	PVT	P. Van Thorre	YR	Y. Robert

H. Bastin, D. Collette, L. Colmant, R. Cornet, A. Daschelet, N. Debaes, P. et Ph. Debeyter, O. Decoq, M. Degreef, M. Delcaut, P. Delchef, M. D'Hoore, F. Dubois, M. Gerits, Ch. Gruwier, P. Gysels, P. Hirsch, P. Hocks, J.C. Lepinois, V. Looten, E.G. Massart, Y. Michel, W. Muller, M. Nève, P. Patigny, C. Planckaert, A. Rega, G. Smets, J.C. Staquet, R. Tonnel, F. Vanhoue, M. & M.A. Verhaegen, V. Vervier, E. Wickens.

## CONDITIONS CLIMATIQUES

Faisant la transition avec une fin août fraîche et pluvieuse, le début de septembre se passa sous l'influence de courants maritimes frais mais modérément pluvieux. La situation s'améliora toutefois progressivement et, avec l'arrivée de courants continentaux secs et doux, les maxima passèrent la barre des 20°C du 6 au 12. La pluie, parfois abondante, revint le 12, annonçant un rafraîchissement sensible du 13 au 16, suivi d'un nouveau réchauffement avec l'arrivée de courants tropicaux humides du 17 au 19, continentaux doux du 20 au 22. Les températures restèrent donc généralement élevées du 16 au 22 (sauf le 19), plus particulièrement les 18, 21 et 22, où les 25° furent régulièrement dépassés, mais la pluie ne fut pas totalement absente. La fin du mois fut moins perturbée mais nettement plus fraîche : après une chute brutale de l'ordre de 10°C entre le 22 et le 23, les températures ne passèrent plus la barre des 20°C, voire même des 15°C en Haute Belgique. En moyenne, les précipitations furent partout un peu inférieures à la normale et les vents, orientés le plus fréquemment dans les secteurs NW-NNE et SE-SSW, furent anormalement calmes.

L'installation d'une vaste zone de haute pression sur l'Atlantique puis sur l'Allemagne maintint le même type de temps début octobre, sec et modérément doux mais couvert jusqu'au 3, ensoleillé le 4 et le 5, où les 20°C furent à nouveau dépassés, sauf en Ardenne. Le pays passa ensuite sous l'influence de zones de basse pression déterminant un temps généralement frais (maxima de 10 à 15°C, 8 à 12 en Ardenne) et pluvieux jusqu'au 15. Une remontée des températures diurnes s'amorça le 16, s'accroissant du 17 au 24 (maxima supérieurs à 15°C, et même à 20°C le 22) avec le développement d'un vaste anticyclone sur l'Europe de l'Est, amenant des courants tropicaux sur nos régions : le ciel resta généralement bien dégagé jusqu'au 27 mais pluvieux les 19 et 20, et le vent fut assez fort le 21. La pluie revint à partir du 28, et plus particulièrement le 29, accompagnée d'une baisse sensible de la température. En moyenne, les températures de ce mois d'octobre furent exceptionnellement élevées, surtout les minima; précipitations, vitesse du vent et ensoleillement furent normaux.

La pluie continua jusqu'au 10 novembre, mais en faible quantité sauf à l'est de la Meuse où elle fut assez forte le premier, la température restant assez douce les 1 et 2, nettement plus fraîche par la suite, tout cela sous l'influence de courants maritimes. Tout le reste du mois fut remarquable par son ensoleillement exceptionnel et sa sécheresse (25 à 52% de la normale pour le total des précipitations mensuelles, concentrées sur la première décade). Les températures maximales furent en général assez élevées, surtout du 11 au 14 (courants tropicaux) et du 19 au 21 (courants continentaux); à partir du 22, l'arrivée de courants d'origine polaire, puis continentale les 29 et 30, entraîna un net rafraîchissement avec des gelées nocturnes prononcées (jusqu'à -12°C). Le vent fut principalement orienté dans les secteurs N-NE, ENE-ESE et SSE-S et sa vitesse fut anormalement faible.

## FAITS SAILLANTS

L'automne permet d'encore jeter un oeil sur la reproduction passée. Pointons quelques espèces dans la zone d'inquiétude. Le Tétraz lyre s'est certes reproduit à Malchamps où un petit noyau semble se reformer; par contre, son effectif fagnard ne parvient pas vraiment à se redresser, sa présence aux Tailles reste confidentielle sinon irrégulière, et il semble bien qu'il soit maintenant éteint sur le plateau de la Croix-Scaille. Ceci fait que la population des Hautes-Fagnes apparaît comme la seule viable du Benelux, car en Campine et aux Pays-Bas son extinction paraît inévitable à brève échéance. Un autre devenir morose est celui de la Perdrix grise qui s'est éteinte des régions du sud-est du pays au cours de la décennie écoulée (malgré d'épisodiques lâchers à but cynégétique) et dont les densités en Condroz ou en Moyenne-Belgique deviennent assez irrégulières. Troisième espèce évoquée ici, elle aussi de milieux cultivés, le Bruant proyer : son déclin actuel tient également à une contraction d'aire (Haute-Belgique) et à une réduction des effectifs, au moins dans certaines régions. Fluctuation dont l'espèce est coutumière ou déclin plus réel? Il est sans doute prématuré de trancher, mais la question se pose, d'autant plus que ce bruant diminue gravement dans des régions voisines : aux Pays-bas, son effectif s'est par exemple réduit à moins de cent couples ! Un quatrième coup d'oeil enfin, une espèce qui augmente, mais faut-il s'en réjouir? Après les perruches, c'est en effet un nouvel exotique qui se répand en Brabant : l'Oie (Oulette) d'Egypte (du Nil - la nomenclature française n'est pas tout à fait fixée, dirait-on) colonise les étangs de type "parc" où son agressivité n'est pas unanimement appréciée. Un problème potentiel qui ne doit cependant pas oc-

cultiver les menaces plus graves et peut-être irréversibles affectant de nombreuses espèces indigènes.

Mais que furent les migrations de cet automne 89? Beaucoup de passages qualifiables de normaux, même si certains n'ont pas connu de pics de passage spectaculaires. Quelques nouveautés, 1989 ayant été une année faste de ce côté : Erismature à tête blanche, Bécasseau à queue pointue, Rousserolle isabelle. De bons nombres chez des anatidés comme les Canards chipeau et souchet ou la Sarcelle d'hiver, de grands passages devenant la règle chez le Grand Cormoran, d'assez nombreux Busards des roseaux, Torcols, traquets, Bergeronnettes grises, roitelets; on note encore la récupération des effectifs chez la Crécerelle et le Martin pêcheur, ou l'affluence de Pigeons ramiers dont la migration en Fagne-Famenne est particulièrement spectaculaire. Le plus n'allant pas sans le moins, on vit peu de Pinsons du Nord, de sizerins, de Gros-becs, de Beccroisés, assez peu de Rougegorges, de Grives musiciennes, d'Effarvattes. Pour l'Alouette lulu, le déclin est réputé se manifester aussi au niveau des migrateurs; de fait, des groupes de 50 et 100 comme on en a vu cet automne sont devenus l'exception. Passage modéré enfin pour les Grues, dont beaucoup ont dû passer à côté ou trop haut.

## DETAIL DES OBSERVATIONS

**Plongeon imbrin** (*Gavia immer*)\* : 1 ex. aux BEH\*\* à partir du 11.11 (JLoC, BHa, UL, MAm).

**Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : dernière nidification en cours signalée le 05.09 à Lasne (FHu). Le passage est déjà bien marqué début septembre; à Harchies, l'effectif diminue de 30 ex. le 03 à 15 le 12 et moins ensuite (HDu). Ailleurs, les nombres maxima sont notés début octobre. Latour reste le site qui accueille le plus de castagneux à l'automne : maximum 64 le 08.10 (PPi); seuls deux autres sites accueillent plus d'une douzaine d'exemplaires : Roly 20 le 29.09 (CN) et Tirlémont 23 le 16.09 (TMq). Globalement, le passage semble plus faible cette année que les précédentes. ● **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : des jeunes nourris sont fréquemment signalés en septembre, moins en octobre et deux derniers le 22.11 à Harchies (HDu). Les deux principales concentrations évoluent comme suit : Harchies, 87 ex. le 03.09, 59 le 26.09 et 30 à 40 durant les deux mois suivants (HDu); Virelles, augmentation de 50-60 à 80-90 courant septembre, 60-70 en octobre et départ début novembre à la suite de la vidange de l'étang (MLm, BPh). A Oost-Maerland et aux BEH, l'effectif paraît assez stable : entre 20 et 40 ex. durant toute la période. ● **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : à Virelles, 2 ex. le 23.09 et 1 ensuite jusqu'au 12.10 (BPh, MLm); aux BEH, 1 ex. du 23.09 au 07.10 (2 le 24.09) et du 18 au 30.11 (JLoC, JLuC, BHa); à Harchies, 1 le 11.10 (MJa). ● **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : passage en septembre totalisant au moins 9 exemplaires sur les sites suivants : Har-

\* Donnée soumise à homologation. Le rapport de la Commission d'Homologation pour l'année 1989 ayant déjà été publié (*Aves*, 27 : 83 - 94), seules les données homologuées sont citées dans cette chronique.

\*\* BEH = Barrages de l'Eau d'Heure

chies (au moins 4), Ath (1), les Marionville (1), Virelles (2), BEH (1) (nbx obs.); encore 1 le 30.11 à Nimy (PDy).

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : à nouveau un passage important : 2.313 ex. en 69 vols, dont huit groupes dépassant la centaine. Premier vol important assez tôt : 60 le 10.09 à Nismes/Dourbes (TDe); passage soutenu après le 25.09, sans pic marqué jusqu'à fin octobre; il s'intensifie ensuite pour culminer le 22.11 et cesser dès le 15. Fait nouveau cette année, les stationnements à Harchies atteignent des nombres record : de 45 le 03.09 on passe à 71 le 12, 88 le 18, 98 le 26; en octobre la centaine est plusieurs fois dépassée et le maximum est atteint le 09.11 : 180 ex. en deux dortoirs de 115 et 75 (HDu, LV,DVe).

**Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : 1-2 à Harchies durant toute la période (nbx obs.) et 1 le 03.09 à La Buissière (VD). ● **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*) : 1 les 01 et 02.09 à Harchies (ML, LV, DVe). ● **Héron bihoreau** (*Nycticorax nycticorax*) \* : 1 le 17.09 à Heer-Agimont (RLb). ● **Grande Aigrette** (*Egretta alba*) \* : 2 du 02 au 23.09 à Harchies (nbx obs.), 1 du 14 au 16.09 et le 26.11 aux BEH (JLoC, JLuc, BHa, CLy). ● **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : 290 données documentent une présence importante toute la période. A Virelles, pas plus de 20 ex. jusqu'au 20.10, puis 60-90 jusqu'à fin novembre, à la faveur de la mise en assec (BPh, MLm); à Chertal, 49 le 17.09 et 69 le 28.10 (FDo); à Ligneuville, moins de 10 en septembre mais 68 le 13.11 (JHp, NPa); 30-40 à Roly, aux BEH et à Harchies durant toute la période. La prédation de taupes est notée à Achêne-Taviet (FH) en septembre. ● **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : 1 à Rhode-Ste-Agathe le 30.09 (YR).

**Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) \* : 1 ex. vers le sud le 02.09 à Villers-la-Bonne-Eau (RDt), 4 à Witry et 1 à Godarville le 03 (MWt, PJe), 1 le 17 à Bailleux (TDe). Une dernière très tardive le 11.11 est suivie pendant une heure de Pailhe à Flostoy (13 km) (RLi, H. Bastin); il n'existe qu'une seule donnée plus tardive en Belgique. ● **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : seulement trois mentions en septembre : 3 le 07 à Cul-des-Sarts, 1 le 24 à Terwagne et 8 passent la nuit à Anderlecht ce même jour (CN, H.Bastin, A). Un juvénile recueilli blessé à la suite d'une chute dans une cheminée le 14.11 à Haine-Saint-Pierre (P.Patigny).

**Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) : concentrations de 25 le 23.09 à Rhode-Sainte-Agathe et de 35 ad. et 15 imm. le 19.11 à Ploegsteert (BN, LV, DVe). Comme toujours il est difficile de se faire une idée de l'origine de ces oiseaux. ● **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) : 4 dans la vallée de la Dyle à partir du 05.11 (BN, DRa, FHe, GRt, SLD). A Virelles, 4 le 06.11 (MLm). ● **Cygne sauvage** (*Cygnus cygnus*) : 7 du 15 au 30.11 à Virelles et Roly, un huitième le 27 à Roly (MLm, BPh, CN) et 1 vers l'est le 19 à Gages (VSc). ● Le passage des oies débute dès la dernière décade de septembre avec 5 vols, se poursuit irrégulièrement en octobre (11 vols) et est important du 29.10 au 22.11. L'**Oie cendrée** (*Anser anser*) est de loin la plus souvent identifiée. L'**Oie rieuse** (*Anser albifrons*) n'est signalée que deux fois : 1 à Virelles et Roly en septembre, mais dont l'origine sauvage n'est pas sûre, et 26 le 15.11 à Tervuren (TDe, MLm, BPh, JMQ, BFo); l'**Oie des moissons** (*Anser fabalis*) une seule fois : 4 à Rhode-Saint-Genèse le 22.10 (SLD). ● **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) : 1 le 18.10 à Gaurain-Ramecroix (JPCq). ● **Bernache cravant** (*Branta bernicla*) : 1 le 08.10 à Harchies (LV, DVe). ● **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) : 7 ex. vers le nord le 14.11 à Frasnes-lez-Buissenal (LV, DVe). ● **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : noté sur 18 sites (4 en septembre, 3 en octobre, 13 en novembre). Aux

régions habituelles du Hainaut et du Brabant s'ajoutent Oost-Maarland et le Namurois - Seilles, Gembloux, Tamines, Achêne-Taviet (nbx obs.).

**Canard siffleur** (*Anas penelope*) : régulièrement observé à partir de mi-septembre mais en nombres inférieurs aux automnes précédents. Le plus grand groupe compte seulement 28 ex. le 16.11 aux BEH. ● **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : plus nombreux cet automne, avec la concentration principale à Harchies : en septembre, 46, 67 et 73 ex. les 03, 12 et 26; en octobre environ 45 tout le mois; en novembre 130, 47 et 38 les 11, 19 et 25 (HDu, LV, DVe, JLLe). Ailleurs, 15 à 25 aux BEH à partir de fin septembre, un maximum de 14 du 07 au 10.11 à Virelles et moins de 5 sur douze sites dans toutes les régions (nbx obs.). A Harchies, retour du mâle hybride Chipeau-Colvert à partir du 21.10, pour la troisième année consécutive (HDu, LV, DVe). ● **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : présence globalement importante mais la distribution et les effectifs varient fortement au cours de la période. Au CRBH, on compte 335 sarcelles le 29.10 et 420 le 26.11, des chiffres qui n'ont plus été atteints depuis des années. Les sites suivants accueillent des groupes de 50 à 100, le plus souvent pendant une courte période : Thommen, Waremme, Genappe, Florival, Ath, Thieu, BEH, Roly, Virelles, Eghezée, Seneffe, Gastuche, Baudour-Douvain, les Marionville, Machelen, Oud-Heverlee, Gembloux, Tamines (nbx obs.). ● **Canard pilet** (*Anas acuta*) : apparition début septembre et présence faible durant l'automne sur une douzaine de sites; à l'exception de 40 ex. le 23.09 aux BEH (JLoC), les groupes ne dépassent pas six oiseaux. ● **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : 1-3 ex. notés sur dix sites, régulièrement jusqu'au 19.10, ensuite deux attardées en novembre, le 03 à Virelles et le 13 à Latour (MLm, BI). ● **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : Harchies accueille à nouveau la plus forte concentration : plus de 100 début septembre, 200 à la fin de ce mois, plus de 400 du 20 octobre au 15 novembre (max. 650 le 28.10) et encore 200 le 25.11 malgré le gel (HDu, LV, DVe). A Quaregnon-Marionville, on en note une centaine de fin octobre au 26.11 (DMt, PAn). Peu d'autres sites comptent plus de 20 exemplaires : Virelles (jusqu'à 20-25 fin octobre - début novembre), La Hulpe (jusqu'à 50 le 05.11), Gastuche (20 le 11.11) (MLm, BPh, DRa, BN).

**Nette rousse** (*Netta rufina*) : 1 femelle à Latour du 29.10 au 06.11 et 3 aux BEH le 16.11 (BI, PPI, RML, BHa). ● **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : en septembre, le passage se marque sur de nombreux sites dans toute la région, avec des effectifs assez fluctuants sur les deux sites les plus importants, Virelles et Harchies (max. 160 et 88), et très faibles ailleurs; en octobre les nombres augmentent progressivement avec l'arrivée des hivernants, qui se poursuit en novembre. C'est au début de ce mois que l'on enregistre les maxima sur la plupart des sites; dépassent la centaine : Virelles (420 le 27.10), Harchies (281 le 19.11), Quaregnon-les Marionville (env. 300 le 29.10), Nimy (360 le 30.11), Obourg (150 le 26.11), Chertal (300 le 12.11), Gastuche (109 le 12.11), Latour (130 du 01 au 15.11), Roly (100 le 12.11) (MLm, BPh, HDu, LV, DVe, JLLe, DMt, PAn,, PDy, DV, FDo, BN, BI). ● **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*) \* : 1 mâle à Harchies les 07 et 19.11 (HDu, LV, DVe). A Harchies également, deux oiseaux présentant des caractères d'hybride Nyroca-Milouinan (ML, LV, DVe). ● **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : très peu nombreux cet automne : les seuls groupes de plus de 25 ex. sont notés à La Hulpe le 09.09 (40 à 50), Hofstade les 01 et 22.10 (34 et 90), Harchies les 19 et 25.11 (53 et 35), Godinne les 15 et 26.11 (53 et 61). C'est très peu mais les informations sur la Basse-Meuse font défaut (JLoC, FHe, DRa, CGe, HDu, JPF). ● **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : toujours un mâle à Jambes, une femelle en Meuse hutoise en septembre-octobre et un mâle le 26.11 à Auderghem (AMo, PLI, JGr, DRa). ● **Harelde de Miquelon** (*Clangula hyemalis*) \* : une à Nalinnes dès le 27.11 (BHa). ● **Garrot à oeil d'or** (*Bucephala clangula*) : noté à

Harchies à partir du 21.10; l'effectif y atteint 8 ex. le 19.11 (HDu et nbx obs.). A Nimy, 6 ex. en fin novembre (JLLe); ailleurs 1-3 ex. sur sept sites dont Latour et Membach-La Gilleppe (PAn, JLoC, JBI, BPh, JPC, LSc, BI, BDe). ● **Harle piette** (*Mergus albellus*) : 2 à Harchies à partir du 18.11 et une femelle aux BEH les 29-30.11 (HDu, LV, DVe, BHa, PJe). ● **Harle huppé** (*Mergus serrator*) : une femelle les 08 et 15.10 aux BEH (JLoC, BHa). ● **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : apparition dès le 02.11 à Latour, ensuite 3 femelles le 16 aux BEH, une à Walem et 3 à Harchies le 17; déjà 11 ex. le 25 à Harchies et 13 le 30 aux BEH (RML, BI, CGe, ML, BHa). ● **Erismature rousse** (*Oxyura jamaicensis*) : 1 le 16.10 à Harchies (GON). ● **Erismature à tête blanche** (*Oxyura leucocephala*) \* : 1 juvénile à Latour du 29.10 au 12.11 (BI, PPI, RML, MJa et al.). Première mention de l'espèce en Wallonie.

**Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : moins de 50 ex. en septembre, les derniers le 26 à Blandain (VLs). ● **Milan noir** (*Milvus migrans*) : comme d'habitude, très peu observé à cette époque de l'année : 9 ex. entre le 01 et le 20.09. ● **Milan royal** (*Milvus milvus*) : une centaine d'oiseaux rapportés pour la période, dont un pic migratoire très tardif en novembre : le 20, 9 ex. à Verviers et 10 à Sainte-Marie (FRé, BI). ● **Pygargue à queue blanche** (*Haliaeetus albicilla*) \* : un immature à Vierves-sur-Viroin le 23.10 (BCI, TDe). ● **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : le passage est très soutenu en septembre (environ 200 ex. signalés) avec un pic du 20 au 25 : par ex., 23 le 20 à Mortier, dont un groupe exceptionnel de 9, puis encore 10 durant la matinée du 24 (PCd). Chute brutale du passage en octobre avec une douzaine de busards en tout. Encore trois isolés en novembre : Grand-Leez le 13, Ploegsteert le 19 et Quaregnon-Marionville le 26 (BDe, DCI, DMt). Comportement inhabituel : un ex. parasite systématiquement un Busard-Saint-Martin le 20.09 à Fleurus (JBI, PVe). ● **Busard Saint Martin** (*Circus cyaneus*) : augmentation progressive du passage au cours de la période : 23 ex. notés en septembre, 80 en octobre, 165 en novembre dont, pour ces derniers, une nette majorité en Haute-Belgique. Les quelques dortoirs signalés concernent peu d'oiseaux : en octobre, 3 ex. dans des betteraves à Fize-le-Marsal et 4 à Clermont-lez-Walcourt (LG, BHa) puis, en novembre, 2-3 à Ave-et-Auffe ainsi qu'à Bois-et-Borsu dans un champ de vesces (MV, CCa). ● **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : rareté devenue hélas classique : un mâle le 20.09 à Mortier (PCd) et c'est tout! ● **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : 20% des 140 ex. signalés pour la période ont été notés à l'ouest de l'axe Sambre-Meuse, donc en dehors de l'aire principale de l'espèce. L'oiseau le plus "occidental" est noté à Mouscron le 28.09 (G. Gruwier). ● **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : toujours bien suivi et omniprésent. Aucun pic migratoire perceptible, les observations étant réparties sur les trois mois. A Béciers, 1 ex. bagué en 1987 et déjà contrôlé en 1988 est repris le 11 octobre (PDa, PS). Le 19.11, 4 ex. chassent des étourneaux au dortoir à Seilles (SM). ● **Buse variable** (*Buteo buteo*) : migration soutenue durant toute la période avec des groupes atteignant 20 ex. au plus. Des stationnements locaux importants indiquent des populations de micromammifères abondantes : ainsi, une trentaine d'oiseaux autour de Forge-Philippe à la mi-septembre et encore 20 à la fin octobre (JMD) ; à Soy, 20 ex. sur 1 km<sup>2</sup> le 15.10 et 39 sur 2 km<sup>2</sup> le 26.11 (JMDu) ; au moins 40 ex. sur 10 km entre Aublain et Mariembourg le 28.11 (MLm). ● **Buse pattue** (*Buteo lagopus*) \* : 1 à Fleurus le 18.11 (JBI).

**Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : une trentaine d'oiseaux en septembre-octobre, les derniers à Stavelot le 27 et aux BEH le 29 (NPa, FG).

**Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : signe de la bonne santé retrouvée de l'espèce, une partie importante des données concerne plus d'un oiseau à la fois ; ainsi, début

septembre, jusqu'à 7 ex. sont notés à Lens s/Geer tandis que 15 ex. sont recensés sur 4,5km<sup>2</sup> à Aublain (LG, PLI, MLm). Début octobre, 7-8 ensemble à Nismes et, record du moment, 13 dans une plaine à Achêne le 06.10 (MLm, FH). ● **Faucon kobez** (*Falco vespertinus*) \* : un juvénile, probablement le même, à Soy et Beausaint les 10 et 13.09 (JMDu, DVI). ● **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : premiers très hâtifs, dès début septembre : Helchin le 04, Mariembourg le 07 et Mouscron le 08 (TDb, MLm). Ensuite, une douzaine de mentions en septembre, un maximum classique en octobre avec 25 ex. et diminution en novembre avec de nouveau une douzaine d'observations. ● **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : à Rhode-Saint-Genèse, un jeune local quitte les lieux le 17.09 tandis que 5 migrateurs sont notés le 20.09 (SLD). Une soixantaine d'ex. sont rapportés durant le mois, dont un tiers pour le Brabant central, où quelques couples ont niché. Six observations en octobre, avec les derniers à Houtain-Saint-Siméon le 18 et Fauroeux le 28 (Ph. Hocks, SD). ● **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : isolés à Rognée le 03.09, Elsenborn le 01.10 et Castillon le 15.10 (BH, PCd).

**Gelinotte des bois** (*Bonasa bonasia*) : une seule donnée : 2 ex. à Couvin le 12.11 (CN). ● **Tétras lyre** (*Tetrao tetrix*) : fait intéressant, une nichée a probablement réussi dans la Fagne de Malchamps : un coq et quatre poules sont notés en octobre-novembre (J-C. Lepinois, NPa). En Fagne Wallonne, 29 mâles sont notés en novembre ainsi que 15 à 20 femelles le 25.10 (VD, FRe). ● **Perdrix grise** (*Perdix perdix*) : une donnée d'une région devenue excentrique : une "compagnie" de 17 ex. le 27.09 à Soy, en Famenne (CGo). ● **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*) : à Angreau, un chanteur est entendu jusqu'au 10.09 et 5 ex. (une famille?) sont levés le 11 (HDu). De même, à Bois-et-Borsu, 5 ex. ensemble le 19.09 sur un site de nidification (CCa). Dernières le 21.09 à Angreau (HDu).

**Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : noté sur une bonne quinzaine de sites durant la période, les plus fréquentés étant comme d'habitude Virelles et Harchies avec des maxima de 7-8 ex. (nbx obs.). En octobre-novembre, l'espèce est notée sur plusieurs sites à l'est de la Meuse : Achêne, Stavelot, Walhorn (FH, NPa, LSc). ● **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : 1 ex. à Eghezée le 24.09, 1 juv. à Harelbeke les 21 et 26.09 puis le 07.10 (SSo, DTe, JMTe, JSS). ● **Poule d'eau** (*Gallinula chloropus*) : début septembre à Achêne, 2 juv. parasitent un couple de Grèbes castagneux nourrissant encore (FH). Sur quelques sites (Harchies, Bévercé), la migration amène une augmentation des effectifs durant la seconde quinzaine d'octobre mais ce sont probablement les gelées de fin novembre qui provoquent le départ de la majorité de la population, à Harchies et Vilvorde notamment (HDu, DRa). ● **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : en novembre, environ 500 ex. à Harchies et Oost-Maarland, "plusieurs centaines" aux BEH (HDu, JDa, BPh).

**Grue cendrée** (*Grus grus*) : passage très modéré avec 90 vols renseignés, répartis sur octobre-novembre. Premières le 04.10 avec 20 ex. à Bra s/ Lienne; le premier "pic" est noté le 28.10 (total d'environ 500 ex.). En novembre, les maxima se situent les 02 et 05 (chaque fois ± 500 ex.), et surtout le 13 (± 1.100 grues). Quelques vols excentriques sont notés, comme par exemple 85 ex. le 15.10 à Auderghem ou 22 le 11.11 à Lennik (AR, J-Ch. Staquet).

**Huitrier pie** (*Haematopus ostralegus*) : 1 à Harchies le 02.09 et un vol de 20 à Peissant le 30.11 (LV, DVe, SD). ● **Echasse blanche** (*Himantopus himantopus*) \* : aussi exceptionnel par l'époque que par l'endroit d'observation, 1 ex. à Rhode-Sainte-Agathe du 12 au 19.11 (FHe, nbx obs.).



**Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*) : une vingtaine de mentions de 1-8 ex. en septembre, hormis un groupe de 22 à Ath le 06 (FDs). Dernier à Ath le 04.10 (FDs). ● **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : une douzaine de données en septembre, toutes en Moyenne-Belgique; les plus remarquables sont 10 ex. à Ath le 06 et 7 à Harchies le 18 (FDs, HDu). Un dernier le 21.10 à Rhode-Sainte-Agathe (GRt). ● **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : le passage débute (ou se continue?) faiblement en septembre : moins de 20 données dont sept seulement dépassent la vingtaine d'oiseaux. L'espèce demeure discrète par la suite avec une soixantaine d'observations également réparties en octobre-novembre. Le passage est bien suivi à Houtain-le-Val, où le maximum est atteint entre le 08 et le 15.10 avec une centaine d'ex., mais on note encore 80 ex. le 28.10 (JMCh, PVT). ● **Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : 1 à Houtain-le-Val les 07 et 27.10 avec des Pluviers dorés (PVT, JMCh). ● **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : le passage se développe nettement à partir de la seconde quinzaine de septembre et les bandes dépassant le millier ne sont pas rares. Stationnements, passage et déplacements locaux se prolongent durant toute la période et en toutes régions, à l'exception de l'Ardenne. Par exemple, de 2.000 à 3.000 à Houtain-le-Val en octobre et de 3.000 à 5.000 à Mellet à la fin du mois (PVT, JBI). Le 02.11, environ 10.000 de passage en une heure à Bossière (FG) tandis que des groupes totalisant 5.000 ex. sont notés le 05.11 à Villers-le-Bouillet (PLI) et que 2.000 à 3.000 stationnent tout le mois à Bois-et-Borsu, 6.500 autour d'Ath (CCa, RLi, VSc).

**Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : une trentaine d'oiseaux en septembre, avec maximum en début de mois, dont 6 à Ath le 01 (CLb, LMs). Dernier à Ath le 20 (FDs). ● **Bécasseau à queue pointue** (*Calidris acuminata*) \* : première observation en Belgique, 1 ex. à Leuze-Longchamps du 03 au 06.09 (voir AMEELS *et al. in* Aves, 32 : 231-232). ● **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : contrastant avec l'afflux de l'automne 1988, aucune donnée cet automne! ● **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : entamé en août, le passage se poursuit en septembre avec une quarantaine d'ex., surtout durant la première quinzaine : 6 à Hensies le 01, 9 à Genappe le 07 (ML, CLb). Encore trois isolés durant la première moitié d'octobre et dernier à Virelles du 02 au 06.11 (MLm, BPh). ● **Chevalier combattant** (*Philomachus pugnax*) : moins de 70 ex. renseignés, tous en septembre à l'exception d'un attardé à Clermont-lez-Walcourt le 11.11 (BHa). ● **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : 17 ex. au total, la plupart isolés, entre le 04.10 et le 25.11. Aucune donnée à l'est de la Meuse. ● **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : il ressort des sites suivis régulièrement que la migration atteint un maximum en septembre à des dates variant suivant les endroits : Genappe, 68 ex. le 08 (LMs); Harchies, 100 les 07 et 12 contre 35 le 26 (HDu); Lens s/Geer, 40 le 09 contre 14 le 15 (PLI); Thommen, 3 le 09 mais 30 le 23 (NPa). L'espèce est présente en nombres généralement inférieurs en octobre-novembre, sauf par endroits comme à Harchies où une centaine d'oiseaux sont de nouveau notés les 12-13.11. ● **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : 21 ex. en septembre, 6 en octobre et 45 en novembre. Groupe le plus important : 9 à Harchies le 22.11 (ML). ● **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : une quarantaine notés en septembre, surtout pendant la première quinzaine, près de la moitié à Harchies (HDu). Quelques attardés en octobre, toujours à Harchies : 2 le 15, 1 les 28-29 (HDu, JLLe, LV, DVe). ● **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : une trentaine d'ex. en septembre, en général isolés sauf 15 ex. à Virelles le 27 (BPh). Sporadique par après : 2 à Ath le 13.10, 1 à Gozée le 31.10 et aux BEH le 02.11, 2 à Tamines le 21.11 (FDs, MLm, JPF). ● **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : passage maximal en septembre avec 80 données de 1-10 ex. provenant pour la plupart des sites classiques de Moyenne-Belgique. Une dizaine d'ex. en octobre, le dernier à Hensies le 27 (JLLe). ● **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : passage soutenu en septembre avec des groupes atteignant 13 ex. au plus (Genappe le 06 - LMs). Nette diminution en

octobre-novembre avec une cinquantaine d'ex. renseignés par mois. A noter que l'espèce est encore présente fin novembre malgré les gelées ayant sévi à l'époque : 8 ex. à Neerijse le 28 (SLD). ● **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : une cinquantaine d'ex. en septembre, principalement la première quinzaine. Derniers à Neerijse et Hensies les 04 et 08.10 (GGc, LV, DVe). Une seule donnée en Haute-Belgique : 1 ex. à Thommen le 13.09 (NPa). ● **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : le passage se poursuit en septembre, quoique nettement moins important qu'en août : les groupes ne dépassent pas les 10-12 ex., sauf 15-20 à Eghezée-Longchamps le 16 (JYP). Chute brutale en octobre avec 14 ex. en tout. Encore une dizaine en novembre, dont 2 à Hensies le 19, 1 à Obourg le 21 et à Dinant le 26 (HDu, JLLe, RL).

**Labbe parasite** (*Stercorarius parasiticus*) \* : 1 ad. de phase claire du 22 au 26.09 et le 01.10 au moins à Harchies (DTe, JMTe, DV, ADR, HDu). ● **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : 1 juv. le 20.09 à Harchies (DTe, JMTe), 1 ad. en octobre à Godinne (MV) et 1 juv. le 11.11 aux BEH (BHa). ● **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : Un peu de passage début septembre (e.a. max. de 2.300 le 02 à Harchies, plus de 1.000 le 09 à La Hulpe - HDu, JLoC), puis une situation assez calme jusqu'aux apports qui se marquent à partir de mi-octobre. Quelques scores aux dépotoirs à cette époque : Saint-Séverin (Lg) 3.000 le 20.10 (LG), Henri-Chapelle max. 900 en octobre et 1.250-1.950 en novembre (LSc), Beuzet 2.000 le 18.11 (FG), Harchies au plus 2.000 le 28.10 puis en novembre des vols vers le dor-toir comprenant 6.000 le 02, jusqu'à 9.500 le 15.11 (LV, DVe). L'assec de Virelles explique une concentration de 2-4.000 mouettes du 06 au 11.11 (MLm, BPh). ● **Goéland cendré** (*Larus canus*) : nombres croissant lentement de septembre (au plus 16 le 11 à Ampsin - PL) à novembre, avec un apport plus sensible à partir de mi-novembre : jusqu'à 70 le 19 à Henri-Chapelle, 25-29 les 18-26 à Harchies, 55 le 19 à Cérroux-Mousty, des dizaines le 25 aux BEH, ... (LSc, LV, DVe, CGe, JLoC). ● **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : quelques oiseaux en région liégeoise tout au long de l'automne, 3 ad. le 08.09 à Virelles (BPh) et des nombres plus substantiels quoique non exceptionnels en Brabant (max. renseigné : 40 le 02.09 à Wauthier-Braine - SLD) et en Hainaut occidental. Ici, l'effectif est très variable, e.a. à Harchies : entre 15 et 200 en septembre, 5 et 155 en octobre, 4 et 162 en novembre (HDu, LV, DVe, MJa, JLLe); à Gaurain-Ramecroix, 100 notés les 08.09 et 21.10, 135 le 05.11 (L. Colmant, LV, DVe). ● **Goéland leucophée** (*Larus cachinnans*) \* : 22 observations de 1 à 7 ex. réparties sur l'automne proviennent du Hainaut occidental, du Brabant (Mont-Saint-Guibert, Gastuche, Wauthier-Braine) et de la région liégeoise (Ampsin, Lixhe, Henri-Chapelle); davantage d'immatures en septembre, semble-t-il. ● **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : pas de grands nombres tout l'automne : pas plus de 80 à Henri-Chapelle et 800 à Harchies en novembre (LV, DVe); 4 imm. le 09.11 à Virelles (BPh, MLm). ● **Sterne pierre-garin** (*Sterna hirundo*) : en septembre, 1 juv. le 02 à Roly (MLm), 1 ex. le 07 et 4 le 15 aux BEH (JMD, JLuC, BHa). ● **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : fin du passage en septembre : 14 mentions de 1-8 ex. jusqu'au 09, 9 de 1-2 ex. jusqu'au 25, la dernière à Virelles (BPh).

**Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : à une exception près, de (trop) rares migrateurs sont notés en septembre-octobre, à côté de stationnements plutôt florissants; ceux-ci dépassent régulièrement les 50 oiseaux en Moyenne-Belgique, avec des bandes allant jusqu'à 100 et même 150 ex. (Pottes et Harchies - HDu, DTe, JMTe). ● **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : L'axe Fagne-Famenne voit à nouveau passer les plus grands nombres, au cours d'une migration peut-être plus longue ici qu'ailleurs. Les passages y sont en effet renseignés à partir du 04.10, contre le 09.10 ailleurs. Le mouvement s'y amplifie dès le 10.10. Le passage principal, dans toutes les régions, se déroule ensuite les 17-19 puis du

22 au 30.10. Des scores de quelques milliers par matinée ou même par heure proviennent alors essentiellement de la région liégeoise, de Famenne et de la Fagne, où le pompon revient aux 27.000 passant en deux heures le 28.10 à Mariembourg (MLm). Dès début novembre, ce ne sont plus guère que des stationnements qui sont indiqués; ils sont substantiels dans la Fagne jusqu'au 11 (max. environ 10.000 dans la région de Virelles - div. obs.). ● **Tourterelle turque** (*Streptopelia decaocto*) : le village de Gottignies accueille plusieurs dortoirs totalisant environ 1.500 oiseaux, provenant principalement de Mons, semble-t-il (CLE). ● **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : la migration se poursuit en petit nombre jusqu'au 18.09 (JPJ, FH, HDu, PDy, DTe, JMTe, LV, DVe, MLm, JLuC), ensuite 1 le 22.09 à Harchies (LV, DVe), le 23.09 à Angreau (HDu) et le 03.10 à Béciers (PDa).

**Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : quatre observations avant le 10.09 et un dernier le 23 à Nivelles (PLI, JMDu, HDu, JMCh).

**Hibou grand-duc** (*Bubo bubo*) : deux mentions en province de Namur (MLm, JYP). ● **Chouette hulotte** (*Strix aluco*) : 5 chanteurs régulièrement sur 8km<sup>2</sup> à Rendeux et 21 sur le trajet Vierves-Le Mesnil (DVi, JPCq). ● **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : en octobre, isolés à Brugelette le 08, à Maransart le 28 et à Mariembourg le 31 (VSc, FH, MLm).

**Engoulevent d'Europe** (*Caprimulgus europaeus*) : 1 le 29.09 à Estinnes-au-Mont (SD). ● **Martinet noir** (*Apus apus*) : dix observations de 1-2 ex. durant les deux premières décades de septembre. ● **Martin pêcheur** (*Alcedo atthis*) : signalé sur 94 sites dispersés dans toutes les régions; la répartition mensuelle donne 54 sites en septembre, 41 en octobre et 40 en novembre (nbx obs.). Jusqu'à 8 individus à Harchies (DTe, JMTe) et 7 bagués sur la Mehaigne de Latinne à Huccorgne (RLb).

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) : un cinquième exemplaire capturé et bagué cet automne à Achêne-Taviet en septembre et huit données d'isolés à Erbisoeul, Ecaussines, Genappe, Mont-Saint-Guibert, Bruxelles, Champlon, Angleur et Eghezée-Longchamps (VLs, LMs, BN, TMq, CGo, LSc). ● **Pic cendré** (*Picus canus*) : 1 chanteur le 01.10 à Elsenborn-Rocherath (PiC). ● **Pic noir** (*Dryocopus martius*) : une trentaine de mentions pour la période, dont une à Bruxelles (CGe).

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : passage du 20.09 au 13.11, maximum du 20 au 25.10 surtout le 22 où 29 ex. sont capturés et bagués à Membach (LSc). Les groupes en vol ne dépassent pas la dizaine; au sol, deux groupes d'une importance rare ces dernières années : 50 le 15.10 à Tohogne et 100 le 14 à Ampsin (YF, PLI). ● **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : premiers faibles mouvements à partir du 20.09; le passage s'intensifie en octobre et culmine du 19 de ce mois aux premiers jours de novembre; durant cette période, des flux migratoires de 1.000/h sont notés par plusieurs observateurs.

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : encore 250 et des jeunes nourris à Frasnes-lez-Couvin le 06.09 (CN, MLm), 100 à Harchies le 03 (HDu), ensuite une quinzaine de mentions de plus petits nombres jusqu'au 17; une dernière mention de 4 ex. le 04.10 à Ransart (JBI) puis, tout à fait étonnant, le 16 à Grez-Doiceau, 120 ex. s'arrêtent quelques minutes pour chasser, au lever du jour (GRt). ● **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : les passages les plus importants ont lieu vers la mi-septembre et cessent pratiquement dès début octobre dans l'est de la région. Dans l'ouest, ils se poursuivent avec par exemple

une moyenne de 150 par jour jusqu'au 15 et 50 du 16 au 23 à Seneffe (LMs). Après cette date, une attardée le 06.11 à Ampsin (PLI). ● **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : maximum du passage vers la mi-septembre comme pour l'Hirondelle de cheminée, avec des rassemblements plus importants : près d'un millier à Eghezée sur les décanteurs le 14. En octobre, elle est encore régulière jusqu'au 13, dont 300 à Roly le 12; quelques petites groupes jusqu'au 16, ensuite 1 le 24 à Rhode-Saint-Genèse, 4 à Couvin le 29 et 1 le 02.11 à Wavre (JPF, CN, SLD, GRt).

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : 11 mentions en septembre, essentiellement en Hainaut occidental; derniers : 1 le 27 et 2 le 29 à Mouscron (JSS, C. Gruwier). ● **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : migration décroissante au cours de septembre, se terminant début octobre; dernier le 17 à Spiennes (PDy). ● **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : début du passage vers la mi-septembre, ensuite passage régulier, sans grand relief, en octobre et se terminant à la mi-novembre. Un passage nocturne est entendu le 15.10 à Auderghem (AR). ● **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : première mention dès le 05.10 à Leefdaal (BFo), suivie de deux autres le 13 et le 14; plus régulièrement après le 20 : le dortoir de Walhorn compte 39 ex. le 28.10. En novembre, la population s'étoffe rapidement (46 mentions). Les maxima sont obtenus à partir du 15.11 : le 15 et le 18, environ 60 ex. à Virelles (JPC, MLm, BPh); le 19, 108 à Walhorn et 60 à Henri-Chapelle (LSc); le 21, 29 à Bierges (GRt). ● **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : encore un bon passage en septembre (plus de 50 données) avec des groupes de plusieurs dizaines d'ex. En octobre, seulement dix mentions, les dernières le 25 et le 27 à Dailly (1 ex.) et à Blégnay (2 ex.) (CN, JDa). ● **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergi*) : 1 mâle encore en plumage nuptial le 17 septembre à Aublain (Exc.Aves, JYP). ● **Bergeronnette printanière flavéole** (*Motacilla flava flavissima*) \* : 1 ex. en compagnie de 15 *flava* le 10.09 à Dourbes (TDe). ● **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : en plus des oiseaux locaux, passage net mais peu dense en septembre et octobre (CGo, HDu, JMTe, JYP). Comme d'habitude, elle s'installe dans certaines villes pour hiverner, par ex. à Liège-centre (HDu, PC). ● **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : très gros passages observés dès la mi-septembre, cette migration intense se poursuivant jusqu'aux environs du 20.10 : par exemple, 440 ex. en 43h d'observation à Seneffe du 02 au 16.10 (LMs); ensuite diminution pour se terminer vers la mi-novembre.

**Accenteur mouchet** (*Prunella modularis*) : comme d'habitude, passage nuptial dès le début de septembre, pic entre le 26 et le 30 à Spiennes (HDu), bien soutenu en octobre, se termine début novembre.

**Rougegorge** (*Erithacus rubecula*) : très peu de données, la migration ne semble pas avoir été très bien perçue. A Cerexhe-Heuseux, 1.165 ex. ont été bagués en septembre et 444 en octobre (PC, RPo, RT, HP). ● **Rosignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : à Cerexhe-Heuseux, 1 ex. le 02.09, 1 le 03.09 et un dernier bagué le 21.09 (PC, RPo, GLp). Pas d'autre donnée. ● **Gorgebleue** (*Luscinia svecica*) : quatre données en septembre, la dernière le 29.09 à Gaurain-Ramecroix (DTe, JMTe). ● **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : passage et départs bien notés en octobre (45 mentions). En novembre, 31 données mais seulement cinq après le 15; dernier le 25.11 à Angre (HDu). ● **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : migration régulière en septembre (24 mentions); se termine vers la mi-octobre : derniers le 15 à Cul-des-Sarts et le 17 à Roly (CN). ● **Traquet tarier** (*Saxicola rubetra*) : plus de 70 données en septembre indiquent un passage important qui se termine rapidement en octobre (sept mentions); derniers les 18 et 21.10 à Houtain-le-Val (JMCh). ● **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : 27 mentions en septem-

bre, principalement dans des endroits connus; départs discrets qui se poursuivent en octobre (17 mentions); dernier : 1 mâle le 28.10 à Chertal (FDo). ● **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : bon passage surtout au début de septembre, ensuite plus rare jusqu'à la mi-octobre; dernier le 14.10 à Eghezée (JPF). ● **Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : 1 ex. le 09.09 à Achène-Taviet (FH), seulement quatre mentions en octobre et cinq en novembre, dont trois le 04 : 1 mâle à Overijse (E.Wickens), 13 en Fagne Wallonne (FRE) et 7 dans un dortoir avec des grives à Robertville (LSc). Dernier le 07.11 à Harchies (LV, DVe). ● **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : premiers indices de migration dès la mi-septembre; le passage s'intensifie en octobre. Surtout important dans l'Est, il reste faible en d'autres endroits (Seneffe - LMs, Taviet - FH, Nismes - MLm,...). Un dortoir est noté à Harchies le 15.10 (HDu). Des passages et rassemblements importants sont observés principalement en Hautes-Fagnes : plus de 1.000 les 14 et 18.10 en Fagne Wallonne (CCa, PCd, Exc. Aves), 800 à 1.000 le 11.10 en Fagne de Ternell (Exc. Aves), plus de 1.000 le 12.10 à Sourbrodt (LSc). ● **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : premiers mouvements signalés dès le 10.09 à Mariembourg et le 13 à Harchies (MLm, HDu), mais le passage assez discret se termine à la mi-novembre. Par exemple : migration faible, surtout nocturne, à Renaix en octobre (LV, DVe); 250 ex. en deux heures, par groupes de 10 à 30, le 23.10 à Aublain (JMG). ● **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : premières le 25.09 à Leefdaal (BFo), suivies de quatre mentions en septembre; passage plus important que les années précédentes en octobre : par ex. 4.000 en 6 heures le 28.10 à Jupille s/Ourthe (DVi), passage très important le 25.10 en Hesbâye liégeoise (LG), grosse migration nocturne le 28.10 à Wavre et à Gosselies (GRt, JBI),... Les mouvements restent très importants en novembre, par exemple 4.500 ex. vers le SW en 3 heures le 02 à Sourbrodt (LSc). ● **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : passage important dès le 09.09 à Achène-Taviet (FH); migration irrégulière notée jusqu'à début novembre et ensuite il ne reste que de petites bandes (2 à 8 ex.), probablement candidates à l'hivernage.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : à Harchies, 1 ex. entendu à partir du 02.09 jusqu'au 02.11, ensuite 2 ex. jusqu'au 19.11 (LV, DVe, DTe, JMTe, ML, HDu, MJa). A Ploegsteert, 1 chanteur le 19.11 (LV, DVe). ● **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : quatre mentions en septembre et une dernière baguée le 02.10 à Béclers (PDa). ● **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : 1 à Harchies le 02.09, à Mont-Saint-Guibert le 05.09 et à Herve le 13.09 (LV, DVe, BN, EC). ● **Rousserolle isabelle** (*Acrocephalus agricola*) \* : 1 ad. bagué le 08.09 à Mont-Saint-Guibert (BN); troisième mention belge et première wallonne de cette espèce (voir *Aves*, 26 : 224-225). ● **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : cinq mentions en septembre, dont les deux dernières baguées le 12.09 à Cerexhe-Heuseux (RPo, HP). ● **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*) : peu de données sur le passage sauf sur des sites de baguage : Béclers, abondante en septembre (PDa), Cerexhe-Heuseux, 147 ex. bagués en septembre (PC, RPo, RT, HP). Encore quelques unes en octobre (neuf mentions) et, fait exceptionnel, 1 ex. le 01.11 à Gastuche (BN) et le 04.11 à Virelles (MLm). ● **Hypolaïs icterine** (*Hippolaïs icterina*) : en septembre, 1 ex. le 02 à Harchies (LV, DVe) et 1 les 06, 07, 10 et 18.09 (dernier) à Cerexhe-Heuseux (PC, RPo, RT, HP). ● **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : 23 mentions en septembre, 1 ex. le 01.10 à Bernissart (DV) et 1 ex. le 09.10 à Cerexhe-Heuseux (RT). ● **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : encore signalée en neuf endroits en septembre : notée 12 fois en 25 sorties à Angre-Angreau (HDu), 42 ex. bagués à Cerexhe-Heuseux en septembre (HP, RT, RPo). Plusieurs observateurs signalent une sensible augmentation. En octobre, trois données, la dernière le 14 à Angreau (HDu). ● **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : seulement 15 données en septembre; passage maximum début septembre à Achène-Taviet (FH) et migration soutenue jusqu'au 24.09 à Cerexhe-Heuseux (RT,

HP). En octobre, 1 le 02 à Béciers (PDa), 1 le 05 à Ombret (JF), aux Awirs (PLe) et à Cerexhe-Heuseux, où la dernière est baguée le 18 (PC, RPo). ● **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : le passage abondant de septembre (2.159 ex. bagués à Cerexhe-Heuseux - PC, RPo, HP) se poursuit jusqu'à la mi-octobre, ensuite diminution rapide pour se terminer début novembre (sept mentions); dernière le 12.11 à Cerexhe-Heuseux (RT). ● **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : premiers indices de migration vers la mi-septembre; le passage est déjà très important à partir du 20.09. Relativement peu de données en octobre (passage régulier sans relief) et présence importante pendant tout le mois de novembre (50 mentions). ● **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : en septembre, le passage semble faible, cependant 71 ex. sont encore bagués à Cerexhe-Heuseux, le dernier le 30 (PC, RT, RPo, HP). Un chanteur très tardif est entendu le 20.10 à Lasne (FHu). ● **Roitelet huppé** (*Regulus regulus*) : passage très remarqué en octobre et novembre; nombre observé nettement supérieur aux années précédentes. A Cerexhe-Heuseux, 58 ex. sont bagués en octobre pour dix seulement en 1988 (PC, RPo). ● **Roitelet triple bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : migration moins spectaculaire que celle du Roitelet huppé, cependant le passage exceptionnel des deux espèces de roitelets est souligné dans le Tournais par ED et PDa.

**Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : encore 16 mentions en septembre; derniers le 21 à Cerexhe-Heuseux (PC, RPo) et le 22 à Champlon (CGo). ● **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : environ 20 données en septembre, les derniers le 18.09 à Cerexhe-Heuseux (RT, HP) et le 20.09 à Ransart (JBI, PVe).

**Mésange à longue queue** (*Aegithalus caudatus*) : nidification particulièrement réussie, de nombreuses bandes sont signalées partout. Citons : 29 ex. au-dessus d'un champ le 22.10 à Spiennes (PDy), bande d'environ 50 le 23.10 à Waterloo (P.Gysels), 58 ex. le 24.11 à Cul-des-Sarts (CN). ● **Mésange noire** (*Parus ater*) : de septembre à novembre, passage noté en quelques endroits de l'ouest du pays (HDu, MLm, ML, LV, DVe) mais assez rare ailleurs, où le passage est cependant remarqué à Aineffe du 23 au 29.09 (LG). ● **Mésange rémiz** (*Remiz pendulinus*) \* : de septembre à novembre, 16 mentions (max. 5 ensemble) en six endroits : Harchies, les Marionville, Roly, Achêne-Taviet, Seilles et Oost-Maerland (LV, DVe, DTe, JMTe, JLLe, PAn, MLm, CN, FH, JYP, SM, SSo). A Harchies, deux premiers ex. le 22.09 et un dernier le 18.11 (LV, DVe). Observée en trois endroits différents les 07 et 08.10 : Les Marionville, Achêne-Taviet et Seilles.

**Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : dernières début septembre : 2 le 01 à Brûly-de-Couvin (TDe), 2 imm. le 10 à My et Soy (JMDu) et 1 femelle le 12 à Champlon (CGo). ● **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : 1 à Houtain-le-Val le 14.10 (PVT) et 1 à Harchies les 29.09, 04, 12 et 15.11 (DTe, JMTe, HDu, JLLe) sont les seules mentions de Moyenne-Belgique. A Taviet, une hivernante arrive le 05.10, soit à la même date qu'en 1987 et 88 (FH). Les 77 autres mentions proviennent de l'aire de nidification ou de sa périphérie immédiate.

**Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*) : le passage n'est guère mentionné qu'en septembre et surtout en Hainaut; assez peu d'individus sont concernés si l'on excepte 85 ex. en trente minutes le 27.09 à Cul-des-Sarts (CN). ● **Cassenoix moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : toutes les observations proviennent de l'aire normale, avec de nombreux cassenoix allant aux noisettes jusqu'à la mi-octobre. ● **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : peu de mentions de peu de migrateurs entre le 17.09 et le 03.11. Un Choucas oriental \* typé le 19.11 à Henri-Chapelle (LSc). ● **Corbeau freux** (*Corvus frugilegus*) : pas-

sage classiquement bien défini, noté du 21.10 au 12.11, principalement du 23 au 29.10; les scores matinaux sont surtout substantiels en Haute Belgique. ● **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : "hors zone", 2 le 26.10 à Brûly-de-Couvin (TDe), une des premières mentions à l'ouest de la Meuse depuis la réintroduction de l'espèce.

**Étourneau sansonnet** (*Sturnus vulgaris*) : très peu de données sur le passage migratoire, surtout en octobre; quelques dortoirs importants signalés : plus de 10.000 le 24.09 et environ 50.000 le 05.11 à Seilles (JYP, SM); de 150 à 200.000 le 02.10 à Libramont (DVi); 6.500 le 18.10 à Spiennes (PDy)...

**Moineau friquet** (*Passer montanus*) : 14 données en septembre indiquent des rassemblements de 12 à 50 ex., une fois 100 ex. le 12 à Nismes (MLm); migration en octobre relativement bien marquée en quelques endroits mais restant faible ailleurs. Encore quelques groupes de passage en novembre (12 mentions).

**Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) : la migration débute classiquement vers le 15.09, pour devenir très importante en octobre, avec un pic entre le 16 et le 18 : 2.332 ex. en 4h le 16 à Seneffe (LMs), 1.148 en 2h30 le 18 à Rhode-Saint-Genèse (SLD)... Les troupes de migrateurs restent importantes jusqu'au début de novembre. ● **Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : premier le 28 septembre à Villers-la-Loue (BI), ensuite quatre données le 30.09. En octobre, passage régulier mais en très petit nombre; une seule troupe de 40 ex. (max.) est signalée dans la région de Verviers (LSc); quelques bandes sont notées en novembre, surtout dans les Hautes-Fagnes. ● **Serin cini** (*Serinus serinus*) : à peine 23 mentions pour les trois mois. Généralement, 1 à 5 ex. sont signalés, sauf à Ethe en octobre (BI) et un groupe de 20 à 25 à Ampsin le 08.10 (PLI). ● **Verdier** (*Carduelis chloris*) : quelques groupes importants notés en septembre; la migration semble très faible en octobre-novembre. Seule grosse troupe signalée : environ 300 jusqu'au 20.11 à Sart-en-Fagne (P. Gysels). ● **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : comparativement aux années antérieures, les données (140 pour les trois mois) sont relativement abondantes; elles indiquent une bonne réussite des nichées et un passage bien fourni par petits groupes. Cependant, espèce restant faible en beaucoup d'endroits : Spiennes (PDy), région de Mariembourg (MLm). En novembre, de petites troupes encore signalées dont 21 ex. dans un dortoir à Rhode-Ste-Agathe le 14.11 (GRt). ● **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : peu noté en septembre (sept données); la migration en octobre et novembre (environ 90 mentions) est régulière mais faible en beaucoup d'endroits. ● **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : espèce en nette augmentation par rapport aux années précédentes : nidification très réussie et présence de nombreuses grosses troupes en septembre. La migration très fournie débute après la mi-septembre : déjà 140 ex. entre 7h et 9h30 le 18.09 à Angreau (HDu). En octobre, passage restant important et ne prenant fin que début novembre. Encore 60 le 12 à Soumoy (JSe), 30 le 19 à Ploegsteert (LV,DVe) et 15 le 25 à Harveng (PDy). ● **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : migration très clairsemée en octobre et novembre (environ 30 mentions). ● **Beccrois des sapins** (*Loxia curvirostra*) : seulement 30 données pour les trois mois; peu ou pas de fructification des épicéas, ce qui explique sa rareté. Cependant, quelques petits groupes erratiques sont signalées dans toute la Wallonie et la région bruxelloise. ● **Grosbec cassenoiaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : environ 25 données seulement pour septembre et octobre. En plusieurs endroits, l'espèce est rare ou absente et le passage d'octobre est quasi nul. En novembre, de rares petites bandes : 20 le 01 à Aublain (MLm), 30 le 03 à Grandhan (YF), 40 le 30 à Jupille s/ Ourthe (DVi).

**Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : des rassemblements apparaissent en septembre : Achêne-Taviet (FH), Mariembourg, Nismes (MLm),... La migration débute fin septembre et est surtout perceptible en octobre et novembre, tout en restant faible. Quelques rares groupes sont encore signalés en novembre : 85 ex. le 04 à Izier et 150 le 11 à Heyd (JMDu), 50-60 le 18 à Philippeville (JMg), 115 le 27 à Bois-Borsu (CCa), ... ● **Bruant zizi** (*Emberiza cirlus*) \* : 1 mâle le 02.09 à Chièvres (BFo). ● **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : en septembre, 1 à Eghezée et 2 à Robertville le 03 (JPF, LSc), 1 le 09 à Wéris (JMDu) et 3 le 10 à Mariembourg (MLm). ● **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : passage clairsemé à partir de fin septembre, plus perceptible en octobre mais restant faible en de nombreux endroits. Encore bien présent en novembre (surtout avant le 15) : environ 30 données. Un dortoir est suivi à Nouvelles : 100 le 30.10, 108 le 02.11 et 60 le 30.11 (PDy). ● **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : neuf mentions (max. 10 ex.) en six localités seulement en septembre et octobre : Bois-et-Borsu (CCa), Chapon-Seraing (LG), Waterloo (P. Gysels), Spiennes (PDy), Harchies (JLLe), Angreau (HDu).

**ERRATUM - Chronique 1989/2-3 - Aves, 27 : 95 - 118.**

A propos de la Bécassine sourde (p 107), la mention, étonnante, de 7 ex. le 21.04 à Mouscron est à modifier : il s'agissait d'un seul exemplaire.



*Bruant jaune* (*Emberiza citrinella*) mâle. Suède, 24.05.1990. Photo A. C. Zwaga.