



## Rapport de la Commission d'homologation Année 1992 \*

Dominique LAFONTAINE<sup>1</sup>, René-Marie LAFONTAINE<sup>1</sup>, Denis VAN DER ELST<sup>2</sup>  
et Hugues DUFOURNY<sup>3</sup>

Ce rapport reprend principalement les observations réalisées en 1992 ainsi que des données se rapportant à 1990 et 1991. La nouvelle liste des espèces à homologuer est publiée en annexe de ce rapport. Elle est identique à celle utilisée par la Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) et est entrée en application à partir du 01 janvier 1993. Les observateurs ont le choix entre ces deux commissions et cela quelle que soit la localité où l'observation aura été faite. Les deux commissions ont néanmoins une préférence pour les rapports rédigés dans leur langue respective.

Deux membres de la Commission se sont retirés après l'examen des demandes de l'année 1992. Il s'agit de Jacques van Esbroeck et de Suzanne Lhoest, laquelle continue cependant à assumer le secrétariat de la commission. L'ensemble des membres actuels et passés leur expriment toute leur gratitude pour le travail accompli durant ces quelques années.

Le rapport 1992 de la Commission d'Homologation apporte la première mention de l'Elanion blanc (*Elanus caeruleus*) pour la Belgique ainsi que des nouvelles données pour des espèces peu courantes comme le Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*), la Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*), le Bruant rustique (*Emberiza rustica*) et le Bruant fou (*Emberiza cia*).

\* La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société d'Etudes Ornithologiques Aves et de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. En sont membres : M. Ameels, P. Anrys, J.-M. Daulne, H. Dufourny, D. van der Elst, J. van Esbroeck, D. Lafontaine, R.-M. Lafontaine, S. Lhoest et R. de Liedekerke.

(1) Boulevard Brand Whitlock 95, B - 1200 Bruxelles.

(2) Rue A. Markelbach 68, B - 1030 Bruxelles.

(3) Rue du Raimbaix 20, B - 7387 Honnelles.

Notons également une observation très bien documentée d'une femelle de Sarcelle élégante (*Anas formosa*), qui est toutefois reprise dans la rubrique des espèces refusées par la Commission d'homologation. L'identification, le statut et l'apparition de cette espèce en Europe ont en effet été commentés par ELDRIDGE & HARROP (1992) et la conclusion de leur étude est que la probabilité d'observer une Sarcelle élégante d'origine sauvage en Europe est quasi nulle. Le Records Committee de la British Ornithologist's Union a également retiré cette espèce de la catégorie des espèces sauvages.

#### LISTE SYSTÉMATIQUE :

#### DONNÉES ACCEPTÉES PAR LA COMMISSION D'HOMOLOGATION

Sauf mention particulière, toutes les données se rapportent à l'année 1992.

#### **Plongeon imbrin**

(*Gavia immer*)

Hainaut :

- Froichapelle, barrage de la Plate-Taille, du 30 décembre 1992 au 09 janvier 1993 : 1 immature de première année (M. Ameels, J. Leclercq *et al.*).

#### **Grèbe esclavon**

(*Podiceps auritus*)

Hainaut :

- Obourg, carrière CBR, 23 avril : 2 ex. (J.-L. Lebaillly, V. Leirens).

#### **Cormoran huppé**

(*Phalacrocorax aristotelis*)

Liège :

- Lanaye-Eijsden, Oost-Maarland, 15 août : 1 immature (P. Deloyer, P. Lucas).

- Visé, Lixhe, du 01 au 27 septembre : vraisemblablement le même oiseau que celui observé à Lanaye-Eijsden (P. Deloyer, P. Lucas) (Photo 1).

#### **Grande Aigrette**

(*Egretta alba*)

Flandre occidentale :

- Knokke-Heist, Het Zwin, 13 septembre : 2 ex. (F. Héla, R. Mayné).

Hainaut :

- Bernissart, marais d'Harchies, du 01 octobre 1991 au 01 mars 1992 : 1 ex. hivernant et un deuxième ex. les 22 et 28 janvier (H. Dufourny, F. Héla *et al.*); du 18 novembre au 31 décembre : 1 ex. hivernant (P. Jenard *et al.*).

C'est le deuxième cas d'hivernage complet de la Grande Aigrette en Wallonie, chaque fois à Harchies. Les apparitions de plus en plus fréquentes de cette espèce et ces premiers cas d'hivernage sont à mettre en relation avec l'augmentation des effectifs nicheurs d'Europe centrale, particulièrement au Neusiedlersee (est de l'Autriche). Une situation identique est constatée dans les pays limitrophes de la Belgique.



Photo 1 - Cormoran huppé, Lixhe, septembre 1992 (P. Lucas)

**Aigrette garzette**  
(*Egretta garzetta*)

Hainaut :

- Thieu, 24 mai : 2 adultes (F. Gruwier, V. Leirens *et al.*).

- Ploegsteert, briquetterie, 30 mai : 1 ex. (J.-M. Testaert).

- Hensies et Bernissart, marais d'Harchies, du 12 au 15 août : 2 ex. et du 16 au 18 août : 1 ex. (H. Dufourmy, S. Carion *et al.*).

Luxembourg :

- Izel, du 12 au 20 mai : 2 adultes (M. Watelet, S. Gérard-Doffagne).

Cet afflux de données, totalisant sept oiseaux, est remarquable pour la Wallonie et est à mettre en relation avec l'expansion de cette espèce vers le nord. En Grande-Bretagne, des dizaines d'individus sont observés chaque année.

**Héron garde-boeuf**  
(*Bubulcus ibis*)

Brabant :

- Genappe, bassins de décantation, 05 octobre : 1 ex. (F. Hupet).

Flandre occidentale :

- Bissegem, 03 mai : 1 ex. (T. Debaere).

- Knokke-Heist, 27 juin : 1 ex. (J.-Y. Paquet, E. Delooz *et al.*).

Hainaut :

- Bernissart, marais d'Harchies, du 23 avril au 01 mai : 1 ex. (H. Dufourmy, M. Loison, J.-J. Strijckmans, P. Skinner *et al.*).

- Maisières, du 29 septembre au 07 octobre : 1 ex. (H. Dufourmy, V. Leirens *et al.*).

Un afflux sans précédent a eu lieu en avril-mai 1992. Il est à l'origine de trois données de printemps tandis que les données d'automne concernent sans doute des oiseaux descendant vers le sud. Pour cette année, il faut aussi si-

gnaler huit oiseaux supplémentaires en Flandre (en cours d'examen par le BAHC), quinze en France bien au nord de l'aire de nidification, une quinzaine aux Pays-Bas et dix-neuf en Grande-Bretagne ainsi qu'une première observation en Pologne.

**Héron bihoreau**  
(*Nycticorax nycticorax*)

Hainaut :

- Escanaffles, bassins de décantation, 30 mai : 1 adulte (J.-F. et A. Meersman).

- Ploegsteert, briquetterie, 07 juin : 1 adulte (J.-F. et A. Meersman).

- Mouscron, Fontaine bleue, du 11 août au 14 août : 1 immature (T. Debaere, B. Dusquennes *et al.*).

- Ronquières, réserve naturelle domaniale, 23 août : 1 immature (B. Etienne, F. Dauchot, L. Moreels *et al.*).

**Fuligule nyroca**  
(*Aythya nyroca*)

Hainaut :

- Bernissart, marais d'Harchies, 14 novembre : 1 mâle adulte (H. Dufourmy).

Liège :

- Ben-Ahin, du 11 novembre 1991 au 16 février 1992 : 1 mâle adulte, sans doute le même oiseau qui hiverne depuis sept ans (P. Loly).

**Circaète Jean-le-Blanc**  
(*Circaetus gallicus*)

Hainaut :

- Bernissart, Marais d'Harchies, les 23 et 24 mai : 1 ex. (O. Tollet, L. Verroken, D. Verroken).

Il s'agit du neuvième oiseau homologué en Belgique.

### **Elanion blanc**

(*Elanus caeruleus*)

Hainaut :

- Thuillies, 27 et 28 avril : 1 adulte (J.-D. Losseau).

Il s'agit de la première donnée de l'espèce pour la Belgique. La possibilité que cet oiseau soit un échappé de captivité n'est cependant pas totalement à exclure.

### **Buse pattue**

(*Buteo lagopus*)

Luxembourg :

- Bellefontaine, 05 et 06 décembre : 1 immature (R. Dujardin, L. Queré *et al.*).

### **Faucon kobez**

(*Falco vespertinus*)

Hainaut :

- Hensies, du 16 au 24 mai : au total 4 ex. (2 femelles adultes, 1 femelle et 1 mâle premier été) (V. Schollaert, H. Dufourny, O. Tollet *et al.*).

- Quévy-le-Grand, bassins de décantation, du 18 au 20 mai : 1 mâle premier été (P. Degossely, H. Dufourny).

Liège :

- Hermalle-sous-Argenteau, 04 juin : 1 femelle (P. Deloyer).

Luxembourg :

- Bastogne, 06 juin : 1 mâle immature (R. Detaille).

- Champlon, 14 juin : 1 mâle immature (C. Goblet).

Namur :

- Leuze-Longchamps, bassins de décantation, 19 mai : 1 femelle (J.P. Fouarge).

Un total de neuf oiseaux en une année est remarquable pour la Wallonie, et d'autres données sont encore à l'examen. Tous ces oi-

seaux furent observés entre le 16 mai et le 14 juin. L'année 1992 fut donc exceptionnelle pour ce petit faucon qui, à la "faveur" de vents d'est-sud-est, est apparu en grand nombre en Europe occidentale. Il y eut, notamment, des dizaines d'oiseaux en Flandres, plus de 100 en Grande-Bretagne (record du pays) et plus de 450 exemplaires aux Pays-bas.

### **Gravelot à collier interrompu**

(*Charadrius alexandrinus*)

Brabant :

- Genappe, 22 et 27 avril : respectivement 1 mâle et 1 femelle; 10 et 11 mai : 1 femelle (C. Libert, L. Moreels *et al.*).

Cette espèce est devenue plus fréquente en Wallonie ces dernières années. Trois oiseaux, tous observés au même endroit, est un record en une année. Depuis 1984, huit oiseaux ont été homologués en Wallonie

### **Pluvier guignard**

(*Eudromias morinellus*)

Hainaut :

- Havay, 14 août : 1 adulte (P. Degossely).

- Angre, 15 (1 adulte), 20 (2 juvéniles), 21 (1 adulte), 22 (1 adulte), 24 (1 juvénile), 26 (1 juvénile) et 31 août (2 adultes); 07 (1 juvénile), 11 (1 adulte et 2 juvéniles), 13 (2 juvéniles) et 15 septembre (1 juvénile) : au total 17 ex. (7 adultes et 10 juvéniles) dont cinq en passage actif (H. Dufourny, J.-L. Lebailly *et al.*).

Ce total de dix-sept oiseaux en un mois (du 14 août au 15 septembre) est sans précédent pour cette espèce qui n'était même pas annuelle en Wallonie. Ces données sont le résultat d'un suivi régulier de la migration postnuptiale dans les cultures. Il est fort probable que ce pluvier soit régulier en migration dans les grandes zones agricoles de Basse et Moyenne-Belgique et ne serait donc pas limité aux polders littoraux.

### **Chevalier stagnatile**

(*Tringa stagnatilis*)

Hainaut :

- Quévy-le-Grand, bassins de décantation, du 30 avril au 02 mai : 1 adulte (P. Degossely, J.-L. Bigorne).

Il s'agit du huitième oiseau homologué en Wallonie depuis 1984.

### **Bécasseau de Temminck**

(*Calidris temminckii*)

Brabant :

- Genappe, bassins de décantation, 11 mai : 3 ex.; 15 et 16 mai : 1 ex. (C. Libert).

Hainaut :

- Pommeroeul, canal de Mons-Condé, 09 mai : 1 ex. (J.-L. Lebailly, H. Dufourmy *et al.*).  
- Brugelette, bassins de décantation, 17 mai : 1 ex. (J.-L. Lebailly).  
- Brugelette, bassins de décantation, du 06 au 12 septembre : 1 ex. juvénile (J.-L. Lebailly).

Luxembourg :

- Latour, 08 mai : 1 ex. (M. Watelet).  
- Freux, 10 mai : 1 ex. (M. Watelet).

Namur :

- Leuze-Longchamps, bassins de décantation, 07 mai : 1 ex. (J.-P. Fouarge).

### **Bécasseau sanderling**

(*Calidris alba*)

Brabant :

- Genappe, bassins de décantation, 09 et 10 mai : 1 ex. (C. Libert, F. Hupet)

Hainaut :

- Pommeroeul, canal de Mons-Condé, 08 et 09 mai : à chaque fois 1 ex. différent (J.-L. Lebailly, H. Dufourmy *et al.*).

- Gaurain-Ramecroix, bassins de décantation, 18 septembre : 1 ex. juvénile (T. Debaere).

Namur :

- Leuze-Longchamps, bassins de décantation, du 02 au 04 mai : 1 ex. (J.-P. Fouarge, B. Nef, P. Lacroix).

### **Phalarope à bec étroit**

(*Phalaropus lobatus*)

Namur :

- Leuze-Longchamps, bassins de décantation, du 28 septembre au 08 octobre : 1 ex. juvénile (J.-P. Fouarge, J.-L. Lebailly *et al.*).

Il s'agit du douzième oiseau homologué en Wallonie depuis 1975. Pour la même période, c'est également la quatrième observation sur les décanteurs de Leuze-Longchamps.

### **Oedicnème criard**

(*Burhinus oedicnemus*)

Namur :

- Grand-Leez, 01 mars : 1 ex. (J.-P. Jacob).

### **ADDENDUM 1991**

Hainaut :

- Angre et Angreau, "Le Cavin Briffaux", du 15 août au 26 octobre 1991 : 1 ex. (H. Dufourny, J.-L. Lebailly).

Le séjour de plus de deux mois à Angre et Angreau est un cas sans précédent en Belgique.

### **Mouette mélanocéphale**

(*Larus melanocephalus*)

Hainaut :

- Angre, 01 août : 1 adulte (H. Dufourny).

Namur :

- Leuze-Longchamps, bassins de décantation, 08 mai : 1 immature (J.-P. Fouarge, B. Nef).

### **Guifette moustac**

(*Chlidonias hybridus*)

Hainaut :

- Bernissart, marais d'Harchies, 14 mai : 3 ex. (H. Dufourny, L. Verroken, D. Verroken *et al.*).
- Pommeroeul, canal de Mons-Condé, 15 mai : 2 ex. (H. Dufourny, V. Leirens *et al.*).
- Bernissart, marais d'Harchies, 10 juillet : 2 ex. (J.-L. Lebailly, H. Dufourny).

### **CORRIGENDUM 1991**

La donnée de Escanaffles du 01 juillet 1991 (1 ex.), publiée dans le rapport de la Commission d'Homologation 1991 (*Aves*, 29 : 100) est refusée. Sa mention parmi les données acceptées est due à une erreur de retranscription.

### **Guifette leucoptère**

(*Chlidonias leucopterus*)

Hainaut :

- Pommeroeul, canal de Mons-Condé, 18 mai : 1 ex. (H. Dufourny, V. Schollaert *et al.*).
- Bernissart, marais d'Harchies, 18 et 19 mai : 3 et 6 ex. (H. Dufourny, L. Verroken, D. Verroken *et al.*).

Comme le Faucon kobez, cette guifette a connu un afflux exceptionnel en mai 1992. Le total de sept oiseaux différents est un record pour la Wallonie et le groupe de six oiseaux à Harchies est le plus grand groupe jamais vu en Belgique (voir PEERO *et al.*, 1985). Cet afflux a également été constaté aux Pays-Bas et dans le nord de la France.

### **Sterne hansel**

(*Gelochelidon nilotica*)

Hainaut :

- Pommeroeul, canal de Mons-Condé, 23 mai : 2 ex. en passage actif (H. Dufourny).

Cette donnée est la deuxième de Wallonie pour ce siècle, la précédente datant du 11 août 1987 à Lens-sur-Geer. L'espèce est annuelle en Flandre, principalement au littoral. Par exemple, il y a eu 19 données de 1980 à 1988 dans cette région.

### **Sterne arctique**

(*Sterna paradisaea*)

Hainaut :

- Péronnes, Grand-large, 19 avril : 5 ex. (J.-L. Lebailly).
- Thieu, 19 avril : 3 ex. (P. Skinner).
- Quévy-le-Grand, bassins de décantation, 19 avril : 1 ex. (P. Skinner).
- Pommeroeul, canal de Mons-Condé, 20 avril au 15 mai : 8 observations totalisant 12 ex.; 1 les 20 avril, 01, 14 et 15 mai, 2 les 06 et 12 mai (H. Dufourny, J.-L. Lebailly).
- Bernissart, marais d'Harchies, 21 avril et 11 mai : 1 ex. (J.-L. Lebailly, H. Dufourny).
- Nimy, Grand-large, 11 mai : 2 ex. dont un en plumage d'hiver (H. Dufourny).
- Obourg, 11 mai : 2 ex. (H. Dufourny).

Liège :

- Ampsin, barrage d'Ampsin-Neuville, 19 avril : 3 ex. (P. Loly).

Namur :

- Leuze-Longchamps, bassins de décantation, 19 avril : 1 ex. (B. Nef).

Comme en 1981 et 1987, on enregistre cette année un nombre remarquable de données pour cette espèce en Wallonie. Ce total de trente et un oiseaux est sans précédent; de plus, certaines données n'ont pas encore été soumises à la CH, notamment 25 exemplaires à Harchies le 19 avril.

**Sterne naine**  
(*Sterna albifrons*)

Hainaut :

- Pommeroeul, canal de Mons-Condé, 10 et 11 mai : 1 ex. (H. Dufourny, J.-L. Lebailly et al.).
- Bernissart, marais d'Harchies, du 10 au 12 juillet : 1 ex. (J.-L. Lebailly, H. Dufourny).

**Traquet oreillard**  
(*Oenanthe hispanica*)

CORRIGENDUM 1991

Luxembourg :

- Bastogne, du 14 juillet au 10 août 1991 (DETAILLE & DAULNE, 1991) et non du 14 au 23 juillet 1991 comme publié dans le rapport de la CH.

**Pipit à gorge rousse**  
(*Anthus cervinus*)

Brabant :

- Genappe, bassins de décantation, 15 mai : 1 mâle chanteur (C. Libert, L. Moreels et al.).

Flandre occidentale :

- Harelbeke, De Gavere, 17 mai : 1 mâle chanteur (T. Debaere).

Hainaut :

- Angre, 17, 20 et 28 septembre : 2, 1 et 3 ex. en passage actif (H. Dufourny et F. Gruwier).

Namur :

- Leuze-Longchamps, bassins de décantation, 19 mai : 1 ex. (J.-P. Fouarge, S. Peten).

Tous ces oiseaux ont été observés lors de périodes dominées par des vents d'est-sud-est. Dans ces conditions, le Pipit à gorge rousse serait un migrateur rare mais régulier en Wallonie. En comparaison avec les années antérieures, le total de neuf oiseaux en 1992 est toutefois exceptionnel. Le passage de

cette espèce en Europe occidentale a été décrit par DIERSCHKE & DIERSCHKE (1991).

**Pipit de Richard**  
(*Anthus richardi*)

Hainaut :

- Gages, 28 septembre : 1 ex. en migration active (V. Schollaert).

ADDENDUM 1991

Hainaut :

- Gages, 12 octobre 1991 : 1 ex. en migration active (V. Schollaert).

**Pouillot à grands sourcils**  
(*Phylloscopus inornatus*)

Liège :

- Waimes, Sourbrodt, 27 octobre : 1 ex. capturé (J. Michel).

**Gobemouche nain**  
(*Ficedula parva*)

Liège :

- Jalhay, Baraque Michel, 13 septembre : 1 mâle adulte (W.N. Brooks).

**Pie-grièche à tête rousse**  
(*Lanius senator*)

Liège :

- Ampsin, 19 mai : 1 ex. (P. Loly, F. Sente).

Luxembourg :

- Messancy, 05 juin : 1 mâle (B. Iweins d'Eeckhoutte).

ADDENDUM 1991

Luxembourg :

- Nobressart, 09 juin 1991 : 1 adulte (P. Pierre, N. Lippens).

Il s'agit des premières données homologuées en Wallonie depuis 1984 pour cette espèce qui s'y est reproduite pour la dernière fois en 1982. La donnée de Messancy se situe dans une ancienne zone de nidification.

### **Bruant lapon**

(*Calcarius lapponicus*)

Hainaut :

- Angre, 24 et 28 septembre, 02, 09, 11, 12, 28 et 29 octobre, 14 novembre : au total 11 ex., à chaque fois 1 ex. sauf les 02 et 29 octobre où 2 ex. sont observés; la plupart de ces oiseaux étaient en passage actif et ont été identifiés d'après leurs cris (H. Dufourny, J.-L. Lebailly).

- Gages, 25 septembre et 20 octobre : 1 et 2 ex. en migration active (V. Schollaert).

- Angreau, 23 octobre : 1 ex. en migration active (H. Dufourny).

### **ADDENDUM 1991**

Hainaut :

- Frasnes-lez-Buissenal, 08 octobre 1991 : 1 femelle (E. Cuvelier).

Un suivi régulier de la migration post-nuptiale a permis d'augmenter considérablement le nombre de données pour ce bruant au cours des dernières années. Il est désormais annuel

et les quinze oiseaux de cette année prouvent qu'il n'est pas rare.

### **Bruant rustique**

(*Emberiza rustica*)

Liège :

- Wanne, Logbiermé, 21 mars : 1 mâle de première année (C.G. Bradshaw).

Cette espèce est exceptionnelle en Belgique; pour la Wallonie, il s'agit de la troisième donnée, les deux précédentes datant de 1928 et 1946 à Herve.

### **Bruant fou**

(*Emberiza cia*)

Luxembourg :

- Witry, 20 octobre : 1 ex. (M. Watelet) (Photo 2).

### **Choucas des tours "oriental"**

(*Corvus monedula "soemmeringii"*)

Hainaut :

- Spiennes, du 27 au 29 janvier : 1 ex. (P. Degossely).

- Bernissart, marais d'Harchies, 19 décembre : 1 ex. (J.-L. Lebailly).




Photo 2 - *Bruant fou*, *Witry*, 20 octobre 1992 (M. Watelet).

#### LISTE DES DONNEES N'AYANT PAS REÇU L'HOMOLOGATION

Ces observations, soumises à la Commission, n'ont pu être homologuées après examen parce qu'elles ne répondent pas aux conditions exigées pour recevoir une garantie d'authenticité. Y sont ajoutées les observations d'oiseaux dont l'identification est vraisemblablement correcte, mais qui sont probablement ou certainement échappés de captivité : celles-ci sont indiquées par (\*).

**Sarcelle élégante** (*Anas formosa*) - Eupen, barrage de la Vesdre, 31 mars et 01 avril : 1 femelle (\*).

**Aigle botté** (*Hieraaetus pennatus*) - Mouscron, 11 juin : 1 adulte.

**Buse variable des steppes** (*Buteo buteo vulpinus*) - Raeren, fagne de Steinley, 26 octobre 1991 : 10 ex. et Floreffe, 27 octobre 1991 : 1 ex.

**Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) - Gaurain-Ramecroix, 11 septembre : 1 adulte.

**Sterne hansel** (*Gelochelidon nilotica*) - Ouffet, 07 juillet 1991 : 1 ex.

**Sterne arctique** (*Sterna paradisaea*) - Marches-les-Dames, 24 juin 1990 : 1 ex.

**Bergeronnette printanière feldegg** (*Motacilla flava feldegg*) - Nimy, 29 avril : 1 mâle.

**Pouillot de Bonelli** (*Phylloscopus bonelli*) - Gérardville, 21 juillet : 1 ex.

**Bruant lapon** (*Calcarius lapponicus*) - Mouscron, 19 octobre 1991 : 1 adulte.

## BIBLIOGRAPHIE

- DETAILLE, R. & DAULNE, J.M. (1991) : Première observation d'un Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) en Belgique. *Aves*, 28 : 215 - 219.
- DIERSCHKE, V. & DIERSCHKE, J. (1991) : Der Durchzug des Rotkehlpiepers *Anthus cervinus* in Mitteleuropa. *Limicola*, 5 : 281 - 298.
- ELDRIDGE, M. & HARROP, A. (1992) : Identification and status of Baikal Teal. *Birding World*, 5 : 417 - 423.
- PEERO, M., MICHELIS, G. & JACOB, J.-P. (1985) : Statut des Guifettes moustac (*Chlidonias hybridus*) et leucoptère (*Chlidonias leucopterus*) en Belgique. Rappel des critères d'identification. *Aves*, 22 : 89 - 106.

### SUMMARY - Report of the Homologation Commission for the year 1992

The present report deals principally with data for 1992. It points out the first mention of a new species for Belgium, the Black-winged Kite (*Elanus caeruleus*), and reports new data for uncommon species like the Short-toed Eagle (*Circaetus gallicus*), the Gull-billed Tern (*Gelochelidon nilotica*), the Rustic Bunting (*Emberiza rustica*) and the Rock-Bunting (*Emberiza cia*). We remind readers that this report is essentially concerned with sightings in the French-speaking part of the country; for a complete information on sightings submitted for homologation in Belgium, you are advised to consult the B.A.H.C. Report (the Dutch-speaking Homologation Commission) published in "Oriolus".

### ANNEXE - Liste des espèces et sous-espèces soumises à homologation

Cette liste donne les espèces et sous-espèces appartenant à l'avifaune de Belgique dont la mention est soumise à l'examen de la Commission d'Homologation Aves ou de la Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC). Cette liste a pris cours le 1er janvier 1993. Elle a été publiée dans *Oriolus* 59, 2 (1993) mais, depuis, plusieurs modifications ont été apportées pour la région wallonne.

|   |                              |                                     |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
|   | Plongeon imbrin              | <i>Gavia immer</i>                  |
|   | Plongeon à bec blanc         | <i>Gavia adamsii</i>                |
| B | Grèbe esclavon               | <i>Podiceps auritus</i>             |
| B | Fulmar glacial               | <i>Fulmarus glacialis</i>           |
| C | Fulmar glacial septentrional | <i>Fulmarus glacialis glacialis</i> |
|   | Puffin cendré                | <i>Calonectris diomedea</i>         |
|   | Puffin majeur                | <i>Puffinus gravis</i>              |
| B | Puffin fuligineux            | <i>Puffinus griseus</i>             |
| B | Puffin des anglais           | <i>Puffinus puffinus</i>            |
|   | Puffin de Méditerranée       | <i>Puffinus yelkouan</i>            |
|   | Puffin mineur                | <i>Puffinus assimilis</i>           |
|   | Pétrel tempête               | <i>Hydrobates pelagicus</i>         |
| B | Pétrel culblanc              | <i>Oceanodroma leucorhoa</i>        |
| B | Fou de Bassan                | <i>Sula bassana</i>                 |
| B | Cormoran huppé               | <i>Phalacrocorax aristotelis</i>    |
|   | Héron crabier                | <i>Ardeola ralloides</i>            |
|   | Héron gardeboeuf             | <i>Bubulcus ibis</i>                |

|   |                                |                                     |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| E | Héron bihoreau                 | <i>Nycticorax nycticorax</i>        |
|   | Grande Aigrette                | <i>Egretta alba</i>                 |
| B | Aigrette garzette              | <i>Egretta garzetta</i>             |
|   | Ibis falcinelle                | <i>Plegadis falcinellus</i>         |
|   | Flamant rose européen          | <i>Phoenicopterus ruber roseus</i>  |
| B | Oie à bec court                | <i>Anser brachyrhynchus</i>         |
|   | Oie rieuse du Groenland        | <i>Anser albifrons flavirostris</i> |
|   | Oie naine                      | <i>Anser erythropus</i>             |
|   | Oie des neiges                 | <i>Anser caerulescens</i>           |
|   | Bernache cravant à ventre pâle | <i>Branta bernicla hrota</i>        |
|   | Bernache à cou roux            | <i>Branta ruficollis</i>            |
|   | Canard jansen                  | <i>Anas americana</i>               |
|   | Sarcelle élégante              | <i>Anas formosa</i>                 |
|   | Sarcelle d'hiver américaine    | <i>Anas crecca carolinensis</i>     |
|   | Sarcelle soucrourou            | <i>Anas discors</i>                 |
|   | Fuligule à bec cerclé          | <i>Aythya collaris</i>              |
| B | Fuligule nyroca                | <i>Aythya nyroca</i>                |
| E | Harelda de Miquelon            | <i>Clangula hyemalis</i>            |
|   | Eider à tête grise             | <i>Somateria spectabilis</i>        |
|   | Erismature à tête blanche      | <i>Oxyura leucocephala</i>          |
|   | Pygargue à queue blanche       | <i>Haliaeetus albicilla</i>         |
|   | Vautour fauve                  | <i>Gyps fulvus</i>                  |
|   | Circaète Jean-le-Blanc         | <i>Circaetus gallicus</i>           |
|   | Elanion blanc                  | <i>Elanus caeruleus</i>             |
|   | Busard pâle                    | <i>Circus macrourus</i>             |
|   | Buse variable des steppes      | <i>Buteo buteo vulpinus</i>         |
| B | Buse pattue                    | <i>Buteo lagopus</i>                |
|   | Aigle pomarin                  | <i>Aquila pomarina</i>              |
|   | Aigle criard                   | <i>Aquila clanga</i>                |
|   | Aigle royal                    | <i>Aquila chrysaetos</i>            |
|   | Aigle botté                    | <i>Hieraaetus pennatus</i>          |
|   | Aigle de Bonelli               | <i>Hieraaetus fasciatus</i>         |
| B | Faucon kobez                   | <i>Falco vespertinus</i>            |
|   | Faucon crécerellette           | <i>Falco naumanni</i>               |
| C | Faucon émerillon islandais     | <i>Falco columbarius subaesalon</i> |
|   | Faucon gerfaut                 | <i>Falco rusticolus</i>             |
| D | Gélinotte des bois             | <i>Bonasa bonasia</i>               |
|   | Grand Tétrás                   | <i>Tetrao urogallus</i>             |
|   | Marouette poussin              | <i>Porzana parva</i>                |
|   | Marouette de Baillon           | <i>Porzana pusilla</i>              |
|   | Poule sultane                  | <i>Porphyrio porphyrio</i>          |
|   | Outarde canepetière            | <i>Tetrax tetrax</i>                |
|   | Outarde houbara                | <i>Chlamydotis undulata</i>         |
|   | Outarde barbue                 | <i>Otis tarda</i>                   |
|   | Oedicnème criard               | <i>Burhinus oedicnemus</i>          |
|   | Courvite isabelle              | <i>Cursorius cursor</i>             |
|   | Glaréole à collier             | <i>Glareola pratincola</i>          |
|   | Glaréole à ailes noires        | <i>Glareola nordmanni</i>           |

|   |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
|   | Pluvier du désert               | <i>Charadrius leschenaultii</i> |
| B | Pluvier guignard                | <i>Eudromias morinellus</i>     |
| B | Gravelot à collier interrompu   | <i>Charadrius alexandrinus</i>  |
|   | Vanneau sociable                | <i>Chettusia gregaria</i>       |
|   | Bécasseau à cou roux            | <i>Calidris ruficollis</i>      |
| E | Bécasseau de Temminck           | <i>Calidris temminckii</i>      |
|   | Bécasseau de Bonaparte          | <i>Calidris fuscicollis</i>     |
|   | Bécasseau tacheté               | <i>Calidris melanotos</i>       |
|   | Bécasseau à queue pointue       | <i>Calidris acuminata</i>       |
| B | Bécasseau violet                | <i>Calidris maritima</i>        |
| E | Bécasseau sanderling            | <i>Calidris alba</i>            |
|   | Bécasseau falcinelle            | <i>Limicola falcinellus</i>     |
|   | Bécasseau rousset               | <i>Tryngites subruficollis</i>  |
|   | Bécassine double                | <i>Gallinago media</i>          |
| C | Barge à queue noire islandaise  | <i>Limosa limosa islandica</i>  |
|   | Courlis à bec grêle             | <i>Numenius tenuirostris</i>    |
|   | Chevalier stagnatilis           | <i>Tringa stagnatilis</i>       |
|   | Petit chevalier à pattes jaunes | <i>Tringa flavipes</i>          |
|   | Bargette de Terek               | <i>Xenus cinereus</i>           |
|   | Chevalier grivelé               | <i>Actitis macularia</i>        |
|   | Phalarope de Wilson             | <i>Phalaropus tricolor</i>      |
| B | Phalarope à bec large           | <i>Phalaropus fulicaria</i>     |
| B | Phalarope à bec étroit          | <i>Phalaropus lobatus</i>       |
| B | Labbe pomarin                   | <i>Stercorarius pomarinus</i>   |
| B | Labbe parasite                  | <i>Stercorarius parasiticus</i> |
| B | Labbe à longue queue            | <i>Stercorarius longicaudus</i> |
| B | Grand Labbe                     | <i>Stercorarius skua</i>        |
|   | Goéland ichthyaète              | <i>Larus ichthyaetus</i>        |
|   | Mouette de Franklin             | <i>Larus pipixcan</i>           |
| B | Mouette de Sabine               | <i>Larus sabini</i>             |
| B | Mouette mélanocéphale           | <i>Larus melanocephalus</i>     |
|   | Mouette de Bonaparte            | <i>Larus philadelphia</i>       |
|   | Goéland à bec cerclé            | <i>Larus delawarensis</i>       |
|   | Goéland à ailes blanches        | <i>Larus glaucoides</i>         |
| B | Goéland bourgmestre             | <i>Larus hyperboreus</i>        |
|   | Sterne hansel                   | <i>Gelochelidon nilotica</i>    |
|   | Sterne caspienne                | <i>Sterna caspia</i>            |
| B | Sterne caujek                   | <i>Sterna sandvicensis</i>      |
|   | Sterne de Dougall               | <i>Sterna dougallii</i>         |
| B | Sterne arctique                 | <i>Sterna paradisaea</i>        |
| E | Sterne naine                    | <i>Sterna albifrons</i>         |
|   | Sterne bridée                   | <i>Sterna anaethetus</i>        |
|   | Guifette moustac                | <i>Chlidonias hybridus</i>      |
|   | Guifette leucoptère             | <i>Chlidonias leucopterus</i>   |
| B | Guillemot de troïl              | <i>Uria aalge</i>               |
|   | Guillemot de Brünnich           | <i>Uria lomvia</i>              |
| B | Pingouin torda                  | <i>Alca torda</i>               |
| C | Pingouin torda nordique         | <i>Alca torda torda</i>         |

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
|   | Guillemot à miroir            | <i>Cepphus grylle</i>                  |
| B | Mergule nain                  | <i>Alle alle</i>                       |
|   | Macareux moine                | <i>Fratercula artica</i>               |
|   | Ganga unibande                | <i>Pterocles orientalis</i>            |
|   | Syrhapte paradoxal            | <i>Syrhaptus paradoxus</i>             |
|   | Coucou-geai                   | <i>Clamator glandarius</i>             |
|   | Coulicou à bec jaune          | <i>Coccyzus americanus</i>             |
|   | Hibou petit-duc               | <i>Otus scops</i>                      |
| D | Hibou grand-duc               | <i>Bubo bubo</i>                       |
|   | Chouette harfang              | <i>Nyctea scandiaca</i>                |
|   | Chouette épervière            | <i>Surnia ulula</i>                    |
|   | Chouette chevêchette          | <i>Glaucidium passerinum</i>           |
| D | Chouette de Tengmalm          | <i>Aegolius funereus</i>               |
|   | Martinet à ventre blanc       | <i>Apus melba</i>                      |
|   | Guêpier d'Europe              | <i>Merops apiaster</i>                 |
|   | Rollier d'Europe              | <i>Coracias garrulus</i>               |
| D | Pic cendré                    | <i>Picus canus</i>                     |
| C | Pic épeiche nordique          | <i>Dendrocopos major major</i>         |
| D | Pic mar                       | <i>Dendrocopos medius</i>              |
|   | Pic à dos blanc               | <i>Dendrocopos leucotos</i>            |
|   | Alouette calandrelle          | <i>Calandrella brachydactyla</i>       |
| B | Alouette hausse-col           | <i>Eremophila alpestris</i>            |
|   | Hirondelle de rochers         | <i>Ptyonoprogne rupestris</i>          |
|   | Hirondelle rousseline         | <i>Hirundo daurica</i>                 |
| B | Pipit maritime                | <i>Anthus petrosus</i>                 |
|   | Pipit de Richard              | <i>Anthus richardi</i>                 |
|   | Pipit de Blyth                | <i>Anthus godlewskii</i>               |
|   | Pipit à gorge rousse          | <i>Anthus cervinus</i>                 |
| E | Bergeronnette de Yarrell      | <i>Motacilla alba yarrellii</i>        |
| E | Bergeronnette flavéole        | <i>Motacilla flava flavissima</i>      |
| D | Cincla plongeur               | <i>Cinclus cinclus</i>                 |
|   | Cincla plongeur à ventre noir | <i>Cinclus cinclus cinclus</i>         |
|   | Accenteur alpin               | <i>Prunella collaris</i>               |
|   | Rosignol progné               | <i>Luscinia luscinia</i>               |
|   | Gorgebleue à miroir roux      | <i>Luscinia svecica svecica</i>        |
|   | Traquet du désert             | <i>Oenanthe deserti</i>                |
|   | Traquet oreillard             | <i>Oenanthe hispanica</i>              |
|   | Merle de roche                | <i>Monticola saxatilis</i>             |
|   | Grive dorée                   | <i>Zoothera dauma</i>                  |
|   | Merle sibérien                | <i>Zoothera sibirica</i>               |
|   | Grive obscure                 | <i>Turdus obscurus</i>                 |
|   | Grive de Naumann              | <i>Turdus (naumanni) naumanni</i>      |
|   | Grive à ailes rousses         | <i>Turdus (naumanni) eunomus</i>       |
|   | Grive à gorge noire           | <i>Turdus (ruficollis) atrogularis</i> |
| C | Grive mauvis islandaise       | <i>Turdus iliacus coburni</i>          |
|   | Merle migrateur               | <i>Turdus migratorius</i>              |
|   | Cisticole des joncs           | <i>Cisticola juncidis</i>              |
|   | Locustelle de Pallas          | <i>Locustella certhiola</i>            |

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
|   | Locustelle lancéolée         | <i>Locustella lanceolata</i>                 |
|   | Locustelle fluviatile        | <i>Locustella fluviatilis</i>                |
| B | Phragmite aquatique          | <i>Acrocephalus paludicola</i>               |
|   | Rousserolle isabelle         | <i>Acrocephalus agricola</i>                 |
|   | Hypolaïs pâle                | <i>Hippolais pallida</i>                     |
|   | Hypolaïs botté               | <i>Hippolais caligata</i>                    |
| D | Hypolaïs polyglotte          | <i>Hippolais polyglotta</i>                  |
|   | Fauvette pitchou             | <i>Sylvia undata</i>                         |
|   | Fauvette passerinette        | <i>Sylvia cantillans</i>                     |
|   | Fauvette mélanocéphale       | <i>Sylvia melanocephala</i>                  |
|   | Fauvette orphée              | <i>Sylvia hortensis</i>                      |
|   | Fauvette épervière           | <i>Sylvia nisoria</i>                        |
|   | Pouillot verdâtre            | <i>Phylloscopus trochiloides</i>             |
|   | Pouillot de Pallas           | <i>Phylloscopus proregulus</i>               |
| B | Pouillot à grands sourcils   | <i>Phylloscopus inornatus</i>                |
|   | Pouillot de Hume             | <i>Phylloscopus (inornatus) humei</i>        |
|   | Pouillot de Schwarz          | <i>Phylloscopus schwarzi</i>                 |
|   | Pouillot brun                | <i>Phylloscopus fuscatus</i>                 |
|   | Pouillot de Bonelli          | <i>Phylloscopus bonelli</i>                  |
| C | Pouillot véloce sibérien     | <i>Phylloscopus collybita tristis</i>        |
|   | Gobemouche nain              | <i>Ficedula parva</i>                        |
|   | Gobemouche à collier         | <i>Ficedula albicollis</i>                   |
|   | Tichodrome échelette         | <i>Tichodroma muraria</i>                    |
| D | Grimpereau des bois          | <i>Certhia familiaris</i>                    |
| C | Grimpereau des bois nordique | <i>Certhia familiaris familiaris</i>         |
|   | Pie-grièche isabelle         | <i>Lanius isabellinus</i>                    |
|   | Pie-grièche à poitrine rose  | <i>Lanius minor</i>                          |
|   | Pie-grièche à tête rousse    | <i>Lanius senator</i>                        |
| D | Cassenoix moucheté           | <i>Nucifraga caryocatactes</i>               |
| C | Cassenoix moucheté sibérien  | <i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i> |
| D | Grand Corbeau                | <i>Corvus corax</i>                          |
|   | Martin rosélin               | <i>Sturnus roseus</i>                        |
|   | Moineau soulcie              | <i>Petronia petronia</i>                     |
|   | Venturon montagnard          | <i>Serinus citrinella</i>                    |
| C | Sizerin flammé du Groenland  | <i>Carduelis flammea rostrata</i>            |
|   | Sizerin blanchâtre           | <i>Carduelis hornemanni</i>                  |
|   | Beccroisé bifascié           | <i>Loxia leucoptera</i>                      |
|   | Beccroisé perroquet          | <i>Loxia pytyopsittacus</i>                  |
|   | Roselin cramoisi             | <i>Carpodacus erythrinus</i>                 |
|   | Durbec des sapins            | <i>Pinicola enucleator</i>                   |
|   | Bruant à calotte blanche     | <i>Emberiza leucocephalos</i>                |
|   | Bruant zizi                  | <i>Emberiza cirrus</i>                       |
|   | Bruant fou                   | <i>Emberiza cia</i>                          |
|   | Bruant rustique              | <i>Emberiza rustica</i>                      |
|   | Bruant nain                  | <i>Emberiza pusilla</i>                      |
|   | Bruant auréole               | <i>Emberiza aureola</i>                      |
|   | Bruant lapon                 | <i>Calcarius lapponicus</i>                  |

B A homologuer en dehors de la région flamande.

C Seules les observations documentées par une capture ou un animal collecté seront examinées.

D A homologuer en dehors des zones de nidification connues - des cartes de distribution pour les espèces concernées seront publiées ultérieurement.

E A homologuer uniquement à l'est de la vallée de la Meuse

### Remarques

a) L'observation d'espèces ou de sous-espèces nouvelles pour l'avifaune de Belgique est bien sûr aussi soumise à l'homologation.

b) Les observations d'oiseaux échappés de captivité ne sont pas soumises au contrôle de la Commission d'Homologation. Pour les espèces dont les observations donnent néanmoins lieu à des données pouvant se rapporter soit à des oiseaux d'origine sauvage, soit à des individus échappés de captivité, comme l'Oie des neiges, la Bernache à cou roux, le Venturon montagnard, etc... la Commission tiendra compte dans sa décision de la vraisemblance d'une origine sauvage. Nous demandons d'en soumettre les données quand une origine naturelle de l'oiseau est vraisemblable. Par exemple, il serait heureux qu'un groupe de quelques Oies des neiges accompagnant en hiver une troupe d'autres oies fasse l'objet d'une description détaillée. Nous comptons beaucoup sur le bon sens des observateurs en cette matière. En cas de doute, il suffit de se renseigner auprès d'un membre de la Centrale ornithologique Aves ou de la Commission d'Homologation.

c) Par rapport à la dernière liste publiée en 1984 et les modifications ultérieures, il faut noter la disparition complète de trois sous-espèces : Oie des moissons de taïga, Choucas des tours oriental et Bouvreuil pivoiné écarlate. Le statut géographique de certaines espèces change également. Ainsi, les espèces suivantes ne sont plus à homologuer que dans les régions wallonne et bruxelloise : Grèbe esclavon, Fulmar glacial, Puffin fuligineux, Puffin des anglais, Pétrel cul-blanc, Fou de Bassan, Cormoran huppé, Aigrette garzette, Oie à bec court, Fuligule nyroca, Buse pattue, Faucon kobez, Pluvier guignard, Gravelot à collier interrompu, Bécasseau violet, Phalarope à bec large, Phalarope à bec étroit, Grand labbe, Labbe pomarin, Labbe parasite, Labbe à longue queue, Goéland bourgmestre, Mouette mélanocéphale, Mouette de Sabine, Sterne caujek, Sterne arctique, Mergule nain, Pingouin torda, Guillemot de Troil, Alouette hausse-col, Pipit maritime et Pouillot à grands sourcils. Huit espèces ne sont plus à homologuer qu'à l'est de la vallée de la Meuse : Héron bihoreau, Harelde de Miquelon, Bécasseau de Temminck, Bécasseau sanderling, Sterne naine, Bergeronnette de Yarrell, Bergeronnette flavéole et Bruant lapon.

Apparaissent en revanche quelques espèces appartenant à l'avifaune de Belgique mais qui n'avaient pas été incluses précédemment dans la liste de la Commission d'Homologation et qui sont à homologuer sur l'ensemble du territoire belge ou en dehors des zones de nidification connues (D) : Flamant rose européen, Faucon gerfaut, Gélinoite des bois (D), Grand Tétrás, Barge à queue noire islandaise, Pingouin torda nordique, Hibou grand-duc (D), Pic épeiche nordique,

Cincle plongeur(D), Grive mauvis islandaise, Pouillot véloce sibérien, Grimpereau des bois nordique, Cassenoix moucheté sibérien, Grand Corbeau(D), Durbec des sapins.

Apparaissent aussi des espèces nouvelles pour l'avifaune de Belgique par rapport à la dernière liste publiée (cas homologués par la Commission d'Homologation Aves (CH) ou par le Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) avec l'année du rapport où la première mention est acceptée) : Puffin majeur (BAHC 1984), Puffin mineur (BAHC 1990), Fulmar glacial septentrional (BAHC 1985), Canard jansen (BAHC 1986), Sarcelle élégante (BAHC 1978), Eider à tête grise (BAHC 1984), Erismature à tête blanche (BAHC 1986), Elanion blanc (CH 1992), Faucon émerillon islandais (BAHC 1980), Glaréole à ailes noires (BAHC 1986), Bécasseau à cou roux (BAHC 1989), Bécasseau de Bonaparte (CH 1991), Bécasseau rousset (BAHC 1984), Bécasseau à queue pointue (CH 1989), Mouette de Franklin (BAHC 1987), Goéland à bec cerclé (BAHC 1989), Sterne bridée (BAHC 1989), Hirondelle de rochers (CH 1989), Pipit de Blyth (BAHC 1988), Traquet du désert (BAHC 1991), Traquet oreillard (CH 1991), Locustelle de Pallas (BAHC 1989), Locustelle lancéolée (BAHC 1988), Rousserolle isabelle (BAHC & CH 1989), Hypolaïs pâle (BAHC 1990), Hypolaïs botté (BAHC 1988), Fauvette pitchou (BAHC & CH 1988), Fauvette passerinette (BAHC 1984), Fauvette mélanocéphale (BAHC 1986), Pouillot verdâtre (BAHC 1987), Pouillot de Hume (BAHC 1987), Pouillot de Schwarz (BAHC 1986) et Pie-grièche isabelle (BAHC 1989). D'autres, comme la Rousserolle des buissons, s'y ajouteront bientôt.