

UNE FAUVETTE A TETE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) IMITATRICE

par Jules FOUARGE¹

A l'une ou l'autre reprise (FOUARGE, 1972 - Aves, 9 : 197; 1974 - Aves, 11 : 127), nous avons signalé de rares cas de Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) imitant d'autres oiseaux de la faune indigène, notamment le Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*).

Le 14 avril 1994, nous notions à nouveau dans notre jardin (Engis, entre Huy et Liège), un mâle de Fauvette à tête noire qui, en plus du chant typique à l'espèce, imitait parfaitement les espèces suivantes :

- * Grive musicienne (*Turdus philomelos*) : longues séquences de 10 à 30 secondes environ;
- * Grive draine (*Turdus viscivorus*) : chant imité à s'y méprendre, c'est lui qui nous a indiqué la "piste", le chant de la Draine n'étant pas courant à cette époque chez nous, et encore moins dans les fourrés d'une vieille haie;
- * Merle noir (*Turdus merula*) : chant et "rire" ou "cri de fuite";
- * Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) : ramage classique du chant;
- * Hypolaïs icterine (*Hippolaïs icterina*) : pot-pourri typique de l'espèce;
- * Mésanges sp. (*Parus spp.*) : cris divers;
- * Moineau domestique (*Passer domesticus*) : alarmes;
- * Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) : longues séquences du chant et cris;
- * Pouillot fitis : chant amputé de la finale et répété ou enchaîné sur d'autres imitations.

Début mai, il ressort que les imitations les plus régulières sont, dans l'ordre décroissant, celles de la Linotte mélodieuse, du Pouillot fitis et de la Grive draine. Relevons encore que le 7 mai, il émet de nombreux chants de Fitis, tous amputés de la finale et enchaînés sur le chant typique de la Fauvette à tête noire. Comme on pouvait s'y attendre, les imitations ont diminué avec la fréquence et la densité des chants. Elles ont été notées de plus en plus sporadiquement jusqu'à début juin. Celles qui ont persisté le plus longtemps sont celles de la Linotte mélodieuse (cris) et de la Grive draine (chants).

C'est, en trente ans,⁸ notre troisième ou quatrième observation d'une Fauvette à tête noire imitatrice avec, cette fois, un répertoire plus étendu. Dans tous les cas, on retrouvait le Pouillot fitis parmi les espèces imitées. Cela nous amène incidemment à nous souvenir de ce Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) imitateur lui aussi d'une série d'oiseaux, dont à nouveau le Pouillot fitis.

SUMMARY - An imitating Blackcap (*Sylvia atricapilla*).
In spring 1994, a male Blackcap was heard imitating nine bird-species.

Reçu le 16.05.1994. Accepté le 19.09.1994.

(1) rue d'Ombret 267c, B - 4480 Clermont-sous-Huy.