

Centrale Ornithologique Aves*

Observations récentes : novembre 1995 - février 1996.

Une nouvelle rubrique

Aves publie des chroniques saisonnières depuis plus de trente ans. Largement lues et utilisées, ces Chroniques sont un des principaux éléments de connaissance de l'avifaune du centre et du sud du pays. Elles ont néanmoins souvent souffert d'un notable retard de publication, dû en partie à la longueur de la transcription sur fiches puis de la saisie informatique des dizaines de milliers de données communiquées par les observateurs. Ce fut le cas ces dernières années. Aussi, afin de mieux répondre à l'attente des ornithologues, un important changement est proposé à partir de 1996 avec le lancement de deux types de chroniques dans le Bulletin Aves :

- une rubrique "Observations récentes" paraîtra dans chaque Bulletin. En quelques pages, elle donnera un premier compte rendu de l'actualité ornithologique des derniers mois, d'après les données qui auront été transmises à la COA;

- une synthèse "Rapport annuel" traitera, de manière plus analytique, l'ensemble des données d'une année. Cette synthèse constituera chaque année une contribution importante à la connaissance et au suivi de notre avifaune; les résultats de systèmes de surveillance pourraient y être intégrés. La périodicité annuelle, en réduisant les découpages saisonniers, permettra de traiter des cycles entiers. Un numéro du Bulletin y sera en grande partie consacré, environ un an après la fin des observations : la première année ainsi analysée sera 1995, avec une parution prévue pour début 1997. Séparément, nous poursuivons la préparation des chroniques en retard de fin 1993 et de 1994.

A propos de "Observations récentes"

- Les données traitées sont celles qui sont communiquées en temps utile à la COA via des rapports d'observations (voir les adresses des délégués régionaux en p. 2 de couverture du Bulletin), des communications téléphoniques ou par le "forum" créé sur le serveur Internet qu'utilise Aves (adresse du site :

<http://www.biol.ucl.ac.be/ecol/html/Organis/FBDB/AVES/AVES.Intro.html>).

(1) Centrale Ornithologique AVES

c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

Nous invitons donc tous les observateurs à rentrer sans tarder leurs données. La sélection présentée ici est forcément fragmentaire et ne fait pas l'objet d'un commentaire développé.

- La périodicité sera trimestrielle; la rubrique résumera les événements ornithologiques de la saison écoulée.

- La région couverte est la Wallonie ainsi que la Région bruxelloise et sa grande périphérie, y compris la vallée de la Dyle.

- Les mentions normalement soumises à homologation sont reprises, même si une demande d'homologation n'est pas encore rentrée, faute de temps. Elles sont indiquées par un astérisque après le nom de l'espèce, ou après la donnée si l'espèce n'est pas à homologuer partout. Toutefois, de telles données ne seront plus citées par la suite si elles ne sont pas étayées par une description, de manière à en garantir, le mieux possible, l'authenticité.

- Des photos d'actualité illustreront les chroniques; des clichés peuvent être directement envoyés au bureau COA, à la Maison Liégeoise de l'Environnement, 36 rue de la Régence, 4000 - Liège.

- Les observateurs qui ont communiqué des données et ceux qui ont préparé ce compte rendu sont cités en fin de rubrique. Afin de ne pas alourdir la présentation, il a été préféré de ne pas énumérer les noms des observateurs après chaque donnée.

- Quelques abréviations sont utilisées : BEH = barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre-Sambre-et-Meuse, MSG = décharge de Mont-Saint-Guibert, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf autre précision utile.


Jean-Paul Jacob

La douceur de l'automne a sans doute incité quelques migrateurs à s'attarder et même à tenter l'hivernage (Pouillots véloques, Bergeronnettes grises, Rougequeues noirs...). Ensuite, bien que l'hiver n'ait pas été des plus rudes chez nous, il fut très sec avec de longues périodes froides. C'est cependant surtout l'extrême rigueur de cet hiver au nord de nos contrées qui est à l'origine de nombreux afflux, dignes des hivers de grands froids comme celui de 1984-1985. Des hivernages sans précédent ont été enregistrés pour le Grand Cormoran et les canards plongeurs, surtout les Milouins et les Harles bièvres. Présence remarquable aussi de Butors étoilés, de Grandes Aigrettes, du Pygargue à queue blanche, d'oies, de Goélands cendrés, de Grives litornes et des extraordinaires Jaseurs boréaux. Les observateurs fréquentant les barrages de l'Eau d'Heure ont eu la joie d'observer simultanément les cinq espèces de grèbes début décembre alors que ceux la Basse-Meuse pouvaient observer à loisir les quatre espèces de fuligules accompagnées d'une petite série d'hybrides. Retenons aussi les hivernages remarquables des Cygnes sauvages à Roly, des Pipits spioncelles ou encore des Bécassines sourdes dans la province du Luxembourg. Certaines espèces ont néanmoins brillé par leur quasi absence, entre autres des granivores comme les Beccroisés et les Pinsons du nord, malgré d'abondantes fructifications des hêtres et épicéas.

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*) : une seule observation, 1 du 04 au 11.01 aux BEH.

• **Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : bien représenté dans le Hainaut où l'on peut estimer à 130 le nombre d'hivernants répartis sur

8 sites suivis, dont 50 à 60 ex. aux BEH (hivernage record pour le site). Egalement nombreux en Haute Meuse et sur les principales rivières, par exemple 37 ex. à Hamoir et 100-120 sur la Semois gaumaise le 14.01. • **Grèbe huppé** (*Po-*



Grèbe esclavon, Liège, février 1996.
(O. Schoebrechts)

diceps cristatus) : sur neuf sites suivis dans le Hainaut, 140 en novembre et 400 en décembre; en Meuse 160 en novembre et 210 en décembre. Record de 280 le 13.01 aux BEH. L'hivernage est important pendant les périodes froides sur la Meuse et les plans d'eau restés libres. • **Grèbe jongris** (*Podiceps grisegena*) : au moins 10 ex. durant la période considérée, dont 1 adulte du 26.11 au 03.12 à Antoing, 1 ex. les 18 et 19.11 à Virelles et 1-2 de novembre à début décembre puis fin janvier aux BEH. Le maximum est observé à Harchies avec 4 ex. le 22.12. • **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*)* : 1-2 du 30.11 au 24.12 aux BEH et les 05-09.02 en Meuse (voir photo). • **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : données de l'ESM seulement; elles peuvent concerner les mêmes oiseaux se déplaçant d'un site à l'autre : 2 ex. les 18-19.11 puis 1 le 05.12 à Virelles, un séjour du 25.11 au 05.12 à Roly, premier hivernage partiel de l'espèce aux BEH du 07.12 au 13.01 (1 à 2 ex.).


Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : suite logique de l'évolution de l'espèce dans notre pays, l'expansion continue sauf en Meuse liégeoise où un tassement des effectifs est noté (légère baisse à Chertal). L'augmentation



Grande Aigrette, Libois, 23.12.1995.
(E. Walravens)

est continue en Meuse namuroise où le doroir de Jambes dépasse par moments les 700 ex. L'aire hivernale s'élargit aussi, avec création de nouveaux doroirs sur la Sambre, sur l'Ourthe (Rosières environ 50 et Grand-Han 13 ex.) et la Semois gaumaise; le Viroin est visité, parfois par plusieurs centaines d'oiseaux. L'effectif wallon atteint au moins 1.600 ex. en novembre et 2.300 en décembre.

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) : afflux assez exceptionnel, dû au froid sévissant plus au nord. Jusqu'à 20 ex. différents en décembre-janvier, dont 2-3 du 9 au 16.12 à Virelles, 1 du 16 au 27.12 à Evelette, 1 à partir du 26.01 à Wibrin et jusqu'à 5 à Roly du 08.12 au 31.01. Le record est enregistré à Harchies avec un maximum hivernal de 11 en décembre! • **Grande Aigrette** (*Egretta alba*)* : en dehors de Harchies, où deux individus hivernent (première le 16.11), 9 autres sites ont été visités par l'espèce! Les Marionville tout d'abord, 1 ex. régulièrement en janvier (probablement un visiteur venant d'Harchies); ailleurs, des isolés fin novembre à Grand-Leez, du 01 au 05.11 et le 25.11 à Virelles, le 05.12 à Roly, le 13.12 à Taviet, le 16.12 aux BEH, le 23.12 à Libois (voir photo), les 21-22.01 à Au-



Héron cendré, décembre 1995. (Ph. Moës)

derghem et dans la vallée du Geer en janvier. Plusieurs de ces données pourraient concerner un même oiseau. • **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*)* : exceptionnelle en hiver, 1 le 15.12 à Grand-Leez (voir photo). • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : l'hivernage est normal, avec des maxima de 80-90 ex. le 18.11 à Virelles et de 70 le 13.01 aux BEH. Peu de découvertes d'oiseaux mis à mal par le gel (voir photo). • **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : 1 ex. le 12.11 à Ragnies et 1 du 30.12 au 18.01 à La Salle (Neupré).

• **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*)* : présent à Harchies pendant toute la période avec 14 au maximum à la mi-novembre. • **Cygne sauvage** (*Cygnus cygnus*) : deux hivernages dont celui de Roly, spectaculaire : il y est présent dès le 12.11 et un maximum de 20 est atteint en janvier; l'autre hivernage concerne un immature à Oost-Maarland à partir du 29.12. Ailleurs, 1



Aigrette garzette, Grand-Leez, décembre 1995. (Ph. Van Horen)

ex. le 27.01 aux BEH et aux étangs de Rabais, à Ethe. • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : passage marqué en novembre : 1.957 ex. en 13 heures de suivi à Frasnès-lez-Buissenal. En décembre, 6 ex. sont observés aux Marionville. En janvier, 1 à Harchies, 1 les 14-15 Tintigny et 6-7 à Grand-Leez. • **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) : neuf observations en janvier (Meux, Herstal, Oost-Maarland, Harchies, Roly, Mariembourg et Cul-des-Sarts); le plus grand vol (vers le sud-ouest) comprenait 300 oies le 14.01 à Oost-Maarland. • **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) : seule mention, 2 ex. de la sous-espèce *rossicus* à Roly à partir du 03.01.

• **Tadorne de Blon** (*Tadorna tadorna*) : observée durant toute la période, l'espèce voit ses effectifs augmenter en janvier : maxima de 23 à Ploegsteert, de 30 à Warcoing et de 22 le 28.01 à l'île Monsin (Herstal). Ailleurs, le tadome est entre autres noté en Gaume : 7 ex. à Latour tout le mois de janvier. • **Canard siffleur** (*Anas penelope*) : présent en petit nombre à partir de mi-novembre sur tout le territoire et petit apport en janvier. Epinglons quelques maxima : 70 le 04.01 aux BEH et 55 en décembre puis 112 mi-janvier à Warneton. • **Canard chipeau**

(*Anas strepera*) : hivernage moyen, les maxima sont observés mi-décembre aux BEH (65 ex.) et en Basse-Meuse (27 ex.). • **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : hivernage plutôt faible d'après les premières données. Les plus grandes concentrations sont notées à Harchies (275 ex. en décembre) et aux Marionville (200 en novembre, 109 en décembre). • **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : hivernage assez faible, les maxima ne dépassent nulle part le millier : ainsi, 840 le 16.12 en Moyenne-Meuse et 763 en décembre dans le Tournaisis. Aux BEH, l'hivernage faible s'inscrit bien dans la diminution des effectifs remarquée depuis plusieurs hivers. • **Canard pilet** (*Anas acuta*) : en dehors du Hainaut, où 10 à 20 ex. sont notés durant l'hiver (maximum 8 en novembre à Harchies), 2 ex. les 06.11, 17.01 et 20.01 respectivement à Libramont, Noiseux et Petit Han; 1 mâle le 19.01 à Coö. • **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : un exemplaire très tardif est observé le 13.11 au Grand Vivier de Longchamps. • **Canard-souchet** (*Anas clypeata*) : quasi toutes les observations proviennent du Hainaut occidental, où trois sites totalisent 519 ex. en novembre dont 271 à Harchies. Les effectifs diminuent d'environ 45% en décembre. Hormis cette région, 2 à 7 ex. hivernent en Basse-Meuse et 5 ex. sont observés le 16.12 à Roly.

Nette rousse (*Netta rufina*) : petit afflux avec e. a. 4 à 6 ex. du 14 au 24.12 aux BEH et 4 mentions d'un individu : 1 femelle le 21.11 à Lattour, 1 mâle du 07 au 29.12 à Gives, 1 mâle du 15 au 30.12 en Basse-Meuse et le 14.01 à Jambes. • **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : hivernage record pour l'espèce; les effectifs continuent encore à augmenter en janvier où, lors du recensement BIROE, la Wallonie compte plus de 9.000 oiseaux, pour la plupart en Basse-Meuse (plus du double des hivernages précédents). La barre des 10.000 est franchie en février. • **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)* : 2 mâles adultes hivernent en Basse-Meuse à partir du 19.11. • **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : tout comme pour le Milouin, l'hivernage est remarquable. A la mi-janvier, la Wallonie compte plus de 1.400 oiseaux dont la majorité en Meuse. • **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) :

présent toute la période en Basse-Meuse, où le maximum est obtenu le 29.12 avec 34 ex., pour la plupart des immatures; l'hivernage ne concerne ensuite qu'une quinzaine d'ex. à Oost-Maerland et un mâle immature à Hermalle-sous-Argenteau. En dehors de la Basse-Meuse, quelques oiseaux séjournent aussi en Moyenne-Meuse, aux BEH et en Hainaut occidental. L'afflux majeur noté au littoral pendant les périodes froides de début d'année ne touche pas la Wallonie. • **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : 1 ex. rivé à Jambes, 2-3 individus en Basse-Meuse, 2 ex. le 12.01 à Péronnes et 1 ex. le 29.01 à Coö. • **Harelde de Miqnelon** (*Clangula hyemalis*)* : 1 mâle imm. du 13 au 15.12 à Eghezée-Longchamps. • **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : 1 femelle le 05.11 à Harchies. • **Macreuse brune** (*Melanitta fusca*) : une femelle le 24.12 à Hermalle-sous-Argenteau. • **Garrot à oeil d'or** (*Bucephala clangula*) : comme pour les harles, le froid persistant explique l'arrivée continue d'oiseaux poussés vers le sud. En janvier, les maxima notés sont 21 ex. le 28 en Basse-Meuse et 18 le 13 aux BEH. • **Harle piette** (*Mergus albellus*) : observé en petit nombre dès novembre, avec des fluctuations des effectifs suivant de très près les vagues de froid. Augmentation en janvier : 17 ex. le 14.01 en Basse-Meuse et 15 à Harchies. • **Harle huppé** (*Mergus serrator*) : 3 femelles le 05.11 à Virelles, 1 à 2 femelles du 16 au 25.12 puis 1 mâle le 27.01 aux BEH, 1 femelle le 17.02 à Obourg et 1 mâle le 27 à Harchies. • **Harle bièvre** (*Mergus*



Harle piette, Tilff, 06.02.1996.
(R. Dumoulin)



Harle bièvre, Liège, décembre 1996.
(O. Schoebrechts)

merganser) : les effectifs augmentent constamment de novembre à février. Près de 900 ex. sont totalisés fin janvier et près de 2.000 au maximum de février, dont plus de la moitié en Meuse. C'est un record absolu : même des hivers bien plus rudes chez nous n'avaient jamais vu apparaître autant de harles.

Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)* : trois mentions mais pas de séjour prolongé : 1 juv. le 04.12 à Virelles, 1 ex. (le même?) le 09.12 à Bourlers et 1 sub-adulte les 21-22.12 à Oost-Maarland. • **Milan royal** (*Milvus milvus*) : quelques isolés en décembre et janvier, principalement dans le sud Luxembourg et dans l'ESM. Le retour a lieu dès mi-février : notamment une vingtaine d'oiseaux le 13 sur un site de nourrissage près de Neufchâteau et 3 ex. le 17 à Ferrières. • **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : rare en Hesbaye, notamment dans la région de Namur-Gembloux, et présence modérée ailleurs, plus forte dans l'ESM en début d'hiver; notamment un dortoir d'au moins 10 ex. les 11.11 et 02.12 à Clermont-lez-Walcourt. • **Épervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : 1 ex. capture un Colvert le 20.12 à Taviet; 1 couple parade le 22.01 à Aywaille. • **Buse pattue** (*Buteo lagopus*)* : 1 le 08.12 à Renaix, le 04.01 à Floreffe et le 06.01 à Messancy. • **Faucon éme-rillon** (*Falco columbarius*) : quasi absent après le passage, qui a lieu surtout en octobre; séjour

d'une femelle jusqu'au 21.11, puis une le 16.01, sur le plateau du Gerny à Jemelle, où elle chasse les alouettes; 1 mâle le 15.12 à Meux, 1 femelle le 01.01 à Court-sur-Heure. • **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : régulièrement noté dans la plaine de Clermont-lez-Walcourt - Court-sur-Heure : 1 à 2 en novembre, 1 adulte en décembre et 1 immature fin janvier; 1 hivernant à Harchies; 1 le 12.11 à Frasnes-lez-Buissenal, le 13.01 à Tourinnes-Saint-Lambert et le 31.01 à Hockai.

Gelinotte (*Bonasa bonasia*) : 1 le 04.12 à Rendoux. • **Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : quelques données ponctuelles, reflet d'un hivernage sans doute largement sous-estimé, à Bambois, Taviet, Longchamps (Lux.); 2 tout l'hiver à Sterpenich et 1 à Herve à partir de fin octobre, pour le quatrième hiver consécutif. • **Foule macroule** (*Fulica atra*) : abondante aux BEH jusqu'à mi-décembre, puis diminution suite à la baisse du niveau d'eau de la Plate-Taille, qui assèche les herbiers : plus de 1.200 le 16.12, 1.013 le 04.01, 800 le 13.01. En Basse-Meuse, son abondance est normale avec 1.176 le 17.12 et 2.037 le 14.01. Retour de quelques ex. sur l'Ourthe moyenne après 15 ans d'absence.

Grue cendrée (*Grus grus*) : le passage, assez faible, se prolonge quelque peu en décembre : 30 à Havelange et 65 à Modave le 03.12, 11 à Aywaille le 16.12; un vol vers le SW (non quantifié) est même signalé le 14.01. Les premiers retours sont très précoces, malgré les conditions climatiques peu favorables : 25 ex. le 23.01 à Andrimont et 30 ex. le 19.02 à Polleur.

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*) : fin de passage vers la mi-novembre puis hivernage au moins partiel dans la région de Clermont-lez-Walcourt et Castillon : 93 ex. le 02.12, 25 le 25.12, 36 le 18.01. Le 13.01, 300 + 45 à Pottes-Marquais. • **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : se raréfie assez nettement dans toutes les régions dès début-mi décembre; plus de 1.000 ex. le 02.12 à Castillon, 400 le 16.12 à Aublain et 300 en fin de mois à Pailhe, sont les plus grosses bandes du mois; ensuite, quasi disparition, sauf en Tournaisis. • **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : à part quelques données épar-

ses en début de période, c'est la province du Luxembourg qui fournit le gros des données, grâce à une recherche spécifique : plus de 30 ex. dont 6 à Harnoncourt, 4 à Wanlin, 4 à Odeigne et 4 à Bourcy; 4 aussi le 14.01, 1 les 21-28.01 à Wavre. L'ampleur de cet hivernage a été franchement sous-estimée jusqu'à ces dernières années.

• **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : quelques groupes relativement importants, plus particulièrement en Luxembourg : 50 ex. le 09.12 à Sterpenich, 36 le 27.12 à Boeur, 15-20 fin janvier et en février à Libramont; ailleurs, 27 à Bambois et 25 à Aublain le 16.12. • **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : données ponctuelles, dont deux observations dans des jardins le 01.12 à Uccle et le 29.01 à Nandrin. • **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : petit afflux à l'ouest de la Meuse à partir de décembre. • **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : 1 le 07.12 à Harchies. • **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : étonnamment peu; 3 le 14.01 à Latour, 1 le 05.02 à Clavier et 1 de début janvier à mars à Herve. • **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : 1 le 04.11 à Wibrin, le 12.11 à Comines, le 16.12 aux BEH, le 21.12 à Oost-Maarland et le 05.01 à Lixhe.

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) * : 1 imm. 2e hiver les 03, 06 et 12-13.12 à Nimy. • **Goéland cendré** (*Larus canus*) : les coups de froid nous amènent toujours, très vite, de nombreux Goélands cendrés. Ils furent abondants en janvier-février avec e.a. 100-500 à Engis, plus de 100 aux BEH le 13.01, 300 au dortoir de Nimy le 11.01, 70 le 05.02 aux étangs d'Ixelles, 850 min le 27.02 à Obourg et un maximum de 2.400 le 07.02 à MSG. Apparition rare au Luxembourg : 1 ad. + 2 imm. le 05.12 à Vielsalm. • **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : 70 le 21.11 à Engis (un record pour cette partie de Meuse), le plus abondant des grands goélands aux BEH en novembre (250 le 18.11), quelques-uns à MSG en hiver, des dizaines en Hainaut occidental (46 le 22.02 à Gaurain-Ramecroix). • **Goéland leucophée** (*Larus cachimans*) : en Meuse, 1 ad. le 04.11 et 2 ad. le 19.11 à Lixhe, 2 ad. le 11.02 à Hermalle-sous-Argenteau. Dans l'ESM, 20 le 18.11 aux BEH et plusieurs en décembre-janvier, 3 le 5.12 à Virelles et un autre le

même jour à Roly. En Hainaut, e. a. 1 imm. les 17 et 27.02 à Obourg. • **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : espèce devenue moins commune ces dernières années. Petits nombres en Brabant et dans le bassin mosan, par ex. 70 seulement le 07.02 à MSG et 70 à Lanaye; 500 au dortoir de Nimy le 13.01. • **Goéland marin** (*Larus marinus*) : e. a. 1 imm. 1er hiver les 12-13.01 à Nimy et le 17.02 à Gaurain-Ramecroix.

Chouette effraie (*Tyto alba*) : une nichée très tardive : 2 juvéniles volants le 20.12 à Aubange. • **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 1 ex. le 12.11 à Warneton; dortoir de 3-6 ex. de fin novembre à début février dans la plaine de Castillon/Clermont. • **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : premier chant le 1er février (le 21.03 en 1995!); nombreux contacts dès février avec 22 chanteurs repérés au 10 mars. L'importance des populations de micromammifères présume une importante reproduction. L'abondance de nourriture explique en partie la précocité et l'intensité des chants; les mâles capturés en début d'année ont en outre un poids moyen nettement supérieur aux pesées de 1994-95.

Pic mar (*Dendrocopos medius*) : observé en un nouvel endroit à Roly. • **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : en Famenne, disparitions d'hivernants avec le froid après le 20.01. • **Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : après le passage très important d'octobre, encore 3 le 10.11 à Bourdon, 8 le 04.11 à Heyd et 11 migratrices le 21.11 à Pessoux. En janvier, insolite, un chanteur à Seilles. • **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : en fin de passage, 1 le 19.11 à Virelles. • **Pipit de Richard** (*Anthus richardi*) * : séjour exceptionnel d'un individu du 08.12 à début février à Oost-Maarland (partie NL). • **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : petit hivernage en Famenne jusqu'à mi-janvier. • **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : groupes fréquents au Luxembourg, surtout dans les vallées de l'Ourthe et de la Semois, avec plusieurs sites dépassant 20 ex. et un maximum de 40 à Bourcy; l'hivernage luxembourgeois est estimé à plus de 250 oiseaux. Petits nombres dans l'ESM dont 12 le 13.12 à Roly; en Meuse, max. 40 le 17.12 à Hermalle-sous-Huy. • **Bergeronnette grise**



Jaseur boréal, Kraainem, 03.03.1996.
(A. Georges)

(*Motacilla alba*) : assez fréquente cet hiver (par ex. 10-15 aux BEH), en particulier au Luxembourg où sa fréquence est inhabituelle en décembre-janvier (10 mentions de 1-8 ex.).

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : dernières observation de nicheurs le 04.11 à Vezin, ensuite 1 ex. le 09.11 à Philippeville, 1 mâle le 05.12 à Chertal et le 09.12 à Hermalle-sous-Argenteau, 1 ex. le 17.12 à Esneux. • **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : 1 ex. le 28.12 à Oost-Maarland, le 31.01 à Marche et à Hensies en janvier. • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : nombres moyens jusqu'à début janvier, puis apports progressifs et, à partir du 20-25.01, une nette augmentation avec des passages de fuite devant le froid; elles furent alors nombreuses en Moyenne Belgique alors que se vidaient les régions à l'est de la Meuse. Assez peu restaient, souvent affaiblies, pendant le froid neigeux de février. • **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : isolées à Basse-Wavre en décembre-janvier, à Uccle en janvier-février, à Houyet, Ciergnon et Holton en janvier (souvent absente en Famenne en hiver), etc. • **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : présences locales, au plus 250 le 17.11 à Roly (fin de migration), 75 le 15.12 à

Harzé et 80 le 27.12 à Strée. Rare en janvier-février. • **Grive drainc** (*Turdus viscivorus*) : retours à partir du 06.01 à Meux.

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : 1-2 chanteurs en hiver à Harchies, invariablement ...

• **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : 1 ex. le 02.11 à Yvoz-Ramet, 1 mâle et 1 femelle picorant des pommes non tombées le 25.11 à Mariembourg, 2 mâles le 17.12 à Jette, 1 ex. le 05.01 à Moulins-sous-Fléron. • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : belle série de mentions, y compris en Haute Belgique : 07.11 à Mariembourg, 15.11 à Frasnes-lez-Couvin, 21.11 à Jette, 01.12 à Jupille-sur-Ourthe, 02.12 à Machelen, 09.12 à Hermalle-sous-Argenteau, 10 et 17.12 à Jette, 16 et 30.12 à Jambes, 16.12 et 17.01 à Oost-Maarland, 17.12 à Esneux, 21.12 à Hermalle-sous-Huy, 01 et 03.01 à Vilvorde, 10.01 à Ransart, 11.01 à Lixhe, en décembre-janvier à Harchies. Peu par la suite. • **Roitelet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : toujours rarement vu (et cherché) en hiver : 1 les 17.12 et 14.01 à Nisramont, plusieurs en janvier en Hainaut, 1 le 14.02 à Mons. • **Mésanges** : hivernage considéré comme très moyen d'après les observations aux mangeoires. • **Mésange rémiz** (*Remiz pendulinus*) : 1 ex. le 24.11 à Harchies. • **Mésange à moustaches** (*Panurus biarmicus*) : présence à Harchies les 15 et 27.02.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : une dizaine d'hivernants dans la moitié sud de l'ESM, maximum 6 hivernantes au camp de Marche, 4 sur 4 km² le 26.12 à Bastogne. Hors zone de nidification, 1 en décembre à Taviet et des migratrices en Hesbaye le 14.01 à Stockay et le 26.01 à Dhuy. • **Jaseur boréal** (*Bombicilla garrulus*) : un des faits marquants de la fin d'hiver. L'afflux en Wallonie s'est amorcé à partir de mi-janvier : Strainchamps, 1 ex. le 14.01. A Kraainem, 6-7 ex. à partir du début de février (04.02); 6 le 19.02 à Louvain, une vingtaine le 22.02 à Bonnelles, 15 le 24.02 à Seraing, etc.. Une synthèse plus complète dans un prochain Bulletin.

Pie bavarde (*Pica pica*) : dortoir de 120 le 22.11 aux Isnes (Gembloux), de 150 au moins



Moineau friquet (F. Renard)

en janvier à Mariembourg et de 165 à Nimy.

• **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : hivernage de 2-4 Choucas orientaux (*C. m. soemmeringii*) à Meux/Upigny. • **Cornicille mantelée** (*Corvus corone cornix*) : 1 ex. à Upigny du 27.01 au 22.02. • **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : hors zone habituelle, 1 ex. le 03.11 à Wibrin et le 21.11 à Bande.

Moineau friquet (*Passer montanus*) : maxima en novembre : 50 le 12.11 à Heure-le-Romain, le 18.11 à Harzé et le 10.01 à Géromont, et 90 le 27.11 à Vežin. • **Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) et **Verdier** (*Carduelis chloris*) : nombres souvent très moyens aux mangeoires. • **Pinson du nord** (*Fringilla montifringilla*) : des masses de faînes mais fort peu de pinsons! Au mieux, quelques bandes de 100-300 en décembre-janvier (max. 300 le 07.12 à Freux). • **Serin cini** (*Serinus serinus*) : attardés : 1 ex. le 07.11 à Huy, 1 le 10 et 3 le 11.11 à Ombret, 1 le 13.11 à Sainte-Marie-sur-Semois. • **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : groupes les plus grands : 100 le 19.11 et 50+80 le

17.12 à Virelles. • **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : petits nombres en beaucoup d'endroits (maxima régionaux de 30-80 ensemble), localement plus abondant : 300 le 07.01 à Wyompont, nombreux dans la vallée de la Lienne et dans le bassin du Ton. • **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : maximum 30 à Bierges et 40 à Grez-Doiceau le 14.01; en Ardenne, 12 hivernent à Harsin et 20 le 30.01 à Tournay. • **Linotte à bec jaune** (*Carduelis flavirostris*) : passage de plusieurs groupes en janvier à l'est de Liège.

• **Sizercin flammé** (*Carduelis flammea*) : mentions de 1-7 ex. à Heyd, Latour, Marloie, Marche, Saint-Hubert, Ombret et Mariembourg en novembre, au plus 22 le 26.11 à Ombret; quelques-uns en décembre à Ohain, Mariembourg, Roly et Vance, puis en janvier à Romedenne, Géromont (20 le 10), Bra et Wardin. Peu d'arrivées de nordiques *C. f. flammea* semble-t-il : 11 le 12.11 à Grand-Leez. • **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : très rare en fin d'automne-hiver, quelquefois 1-10 ex., max. 20 le 23.11 à Ampsin; quelques bandes dans les Hautes Fagnes. • **Grosbec cassenois** (*Coccothraustes*

coccothraustes) : maxima locaux en Ardenne : 30 le 12.01 à Jupille-sur-Ourthe et 60 le 02.12 à Wibrin.

Bruant fou (*Emberiza cia*)* : une capture à la mi-décembre aux Awirs. • **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : 62 rejoignent un

dortoir à Harchies le 18.11; 6-8 hivernants à Marche et des isolés ailleurs au Luxembourg (par ex. Baranzy 14.01, Ethe 27.01, Ochamps 22.01). • **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : 13 le 12.01 à Seraing-le-Château, 15 environ le 20.02 à Angreau.

Liste des collaborateurs

Ont contribué à cette première chronique d'actualité :

Ameels M., Bathy F., Baye J.-M., Bihain B., Blyth M., Bocca S., Brochier B., Buckinx G., Bultot J., Buts Y., Chable M., Chiwy B., Clermont D., Clesse B., Clotuche E., Collette P., Coppée J.-Lo., Coppée J.-Lu., d'Oultremont O., Daulne J.M., de Liedekerke R., De Moor-Danse, de Wauters B., Debue A., Degossely Ph., Degreef M.; Delarue J., Delbecque F., Deloyer P., Derroanne M., Detaille R., Dewolf P., Doblestein P., Dortu C., Doucet J., Dufourny H., Dujardin R., Dumoulin R., Duyck B., Fanon Y., Farinelle C., Flon Y., Fouarge J., Gallez J., Gast G., Gilles S., Goffart Ph., Gridlet T., Groupe Emberiza, Hanus B., Héla F., Herrent Ph., Hupperetz J., Iweins B., Jacob J.-P., Jacquemin M., Janssen M., Jardon B., Jenard Ph., Kuciapa W., Lafontaine R.M., Lagarde J., Lambert M., Lambinet J.-C., Le Hardy F., Loly P., Malengreau A., Mardulyn H., Matgen O., Michaux J., Molitor B., Monmart A., Muyshont D., Nicolas M., Noiret C., Paquay M., Paquay N., Paquet J.-Y., Pékus F., Philippart B., Pierre P., Ponsen R., Rega A., Renoy A., Robiolle J., Rotsaert G., Rousseau C., Scheffers J., Schoebrechts O., Schollaert V., Sente F., Sorbi S., Teerlynck H., Testaert D., Thonnard P., Verroken D., Verroken L., Vieuxtemps D., Wargé L., Watelet M., de Wavrin H., Willem G.

Les données ont été rassemblées par les délégués régionaux de la COA : J-Lo Coppée, P. Loly, D. Muyshont, N. Paquay, D. Vieuxtemps, L. Wargé et H. de Wavrin.

Rédaction : Jean-Paul Jacob, Dominique Testaert et Emile Clotuche.

First Meeting of the European Ornithological Union (change of date)

The first meeting of this new organisation was planned for August 1996 in Bologna.

Unfortunately however, the Conference Centre will be closed at that time for maintenance. Attempts to find another suitable date in 1996 have not been successful and so the meeting has been postponed until 28-30 August 1997.

Programme details etc will be available from Dr Fernando Spina, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Via Ca' Fornacetta 9, 40061 Ozzano Emilia (BO), Italy (Tel. : 00 39 51 65 12 111, Fax. : 00 39 51 79 66 28).