

NOTES

OBSERVATION D'UN OISEAU PRÉSENTANT DES CARACTÈRES INTERMÉDIAIRES ENTRE LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) ET LA MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*)

par Jules FOUARGE¹

Le 01.12.1994, une mésange présentant des caractères intermédiaires et parfois communs aux espèces *Parus major* et *Parus ater* a été capturée pour le baguage à Ombret (Clermont/Engis); elle a ainsi pu être observée de près et décrite de façon détaillée (photos déposées à la Rédaction d'Aves).

Description :

Tête et gorge noires avec légers reflets bleuâtres; joues blanches; dessous blanc sale sans jaune, excepté aux flancs, où apparaît un "souffle jaune pâle"; raie ventrale noire coupée court; dos gris bleuté avec très légère tache olivâtre à l'extrémité des plumes; tache blanche réduite à la nuque; rémiges secondaires également gris foncé avec des liserés jaune-olivâtre bien marqués; rectrices gris foncé, excepté la paire externe, complètement blanche. Bec noir, pattes bleu-grisâtre, iris brunâtre.

A partir de cette description et de diverses mensurations, nous avons établi le tableau ci-dessous, reprenant 17 critères comparatifs entre les deux espèces. Les mensurations de références reprises pour les Mésanges charbonnière et noire sont extraites de GEROUDET, 1954 (*Les Passereaux*, vol II. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel et Paris).

Huit de ces 17 critères ne correspondent pas à *Parus major* et sept excluent *Parus ater*. Deux d'entre eux (n° 13 et 16) excluent simultanément les deux espèces : il s'agit de mensurations intermédiaires. Si la longueur de la queue peut éventuellement prêter à discussion en raison des phénomènes de croissance et d'usure et d'une certaine imprécision, il en va autrement de celle du tarse, facile à mesurer avec une marge d'erreur négligeable. Or le tarse est ici trois millimètres trop grand pour appartenir à *Parus ater* et trois millimètres trop court pour appartenir à *Parus major*. Ceci nous avait d'ailleurs frappé au premier examen.

Trois critères, enfin, sont compatibles avec les caractères des deux espèces : les liserés aux rémiges secondaires (n° 6), la longueur du bec (n° 15) et le poids (n° 17).

En tout, seize critères d'exclusion contre trois de chevauchement nous amènent à considérer que nous avons eu affaire à un hybride entre une Mésange charbonnière et une Mésange noire, *Parus major x ater*.

Reçu le 15.02.1996. Accepté le 25.04.1996.

(1) Rue d'Ombret 267C, B - 4480 Engis.

CRITERES	<i>Parus major</i>	Sujet observé	<i>Parus ater</i>
1. Tache blanche à la nuque	NON	NON	OUI
2. Barre(s) alaire(s)	1	1	2
3. Raie ventrale noire	OUI	OUI	NON
4. Dos vert-olive	OUI	NON	NON
5. Liserés blancs ou clairs aux rémiges primaires	NON	OUI	OUI
6. Liserés jaunâtre-olive aux rémiges secondaires	OUI	OUI	OUI
7. Couvertures alaires vert-olive	OUI	NON	NON
8. Flancs jaunâtre pâle	NON	OUI	OUI
9. Dessous blanc	NON	OUI	OUI
10. Rectrices avec paire externe blanche	OUI	OUI	NON
11. 2èmes rectrices externes avec extrémités blanches	OUI	NON	NON
12. Aile pliée (mm)	70-82	69	58-65
13. Queue (mm)	61-71	55	44-49
14. Longueur totale (mm)	120-140	130	110
15. Bec (mm)	10-11	10	9-10
16. Tarse (mm)	23	20	16-17
17. Poids (gr)	15-22	16	8-16

N.D.L.R. :

Les cas d'hybridation de la Mésange charbonnière avec d'autres mésanges semblent extrêmement rares. Le seul cité dans GLUTZ VON BLOTZHEIM (1975) est un cas (probablement *Parus major x ater*) signalé également par FOUARGE, en 1975 (*Aves*, 12 : 285), mais sur la base d'une simple observation visuelle. Le même est cité dans CRAMP & PERRINS (1993), qui signalent en outre deux cas d'hybridation avec la Mésange bleue (*Parus caeruleus*), un rapporté par ARRIGONI DEGLI ODDI en 1931 (*Riv. Ital. Orn.*, 1 : 1-4) et un autre par GODIN en 1974 (*Aves*, 11 : 128), lui aussi sur la base d'une observation visuelle. Ce dernier mentionne en outre dans sa note un cas similaire constaté en Italie en 1892 (in LEGENDRE, 1932 : *Monographie des mésanges d'Europe*), cet oiseau étant fort semblable à celui qu'il avait observé. DUQUET (1995), enfin, décrit un hybride probable *Parus major x P. palustris* capturé en juin 1993 dans la Loire (*Ornithos*, 1 : 93).

Les hybrides entre les autres espèces de mésanges semblent eux-aussi très rares, sauf peut-être entre la Mésange noire et la Mésange lapone (*Parus cinctus*) et, surtout, entre la Mésange bleue et la Mésange azurée (*Parus cyanus*), à la suite d'invasions de cette dernière vers l'ouest.

SUMMARY - Sighting of a bird showing intermediate plumage between Great Tit (*Parus major*) and Coal Tit (*Parus ater*).

A probable hybrid Great Tit / Coal Tit was captured on 1st december 1994 in Clermont / Engis (Belgium). The identification is based on coloring aspects as well as on some measurements, intermediate between those of the two species.