

Rapport de la Commission d'Homologation

Année 1993*

par Hugues DUFOURNY ¹

Ce rapport reprend principalement les observations réalisées en 1993 ainsi que certaines données antérieures parvenues tardivement à la Commission. La liste des espèces à homologuer a été publiée en annexe du rapport de l'année 1992 (*Aves*, 31 (1) : 10-16). Certaines données ayant fait l'objet de demandes d'homologation ne sont pas reprises ici car elles se rapportent à des espèces (surtout des bécasseaux) retirées de la liste des espèces à homologuer depuis le 1er janvier 1993. Cette liste étant parue bien après cette date, les observateurs ignoraient le retrait de ces espèces. La C.H. leur présente donc ici ses excuses et espère qu'ils comprendront le choix de ne pas publier ces données. Les données antérieures à 1993 pour ces espèces sont toutes publiées et continueront à être traitées par la C.H.

Le présent rapport diffère de tous les rapports antérieurs car il reprend non seulement les données homologuées par la C.H. mais aussi des données acceptées par le B.A.H.C. (Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité), équivalent néerlandophone de la C.H. Il s'agit toutefois uniquement des espèces soumises à homologation sur l'ensemble du territoire belge. L'inclusion de ces données permettra dorénavant d'avoir une vision de la situation des oiseaux rares au niveau national, comme c'est le cas dans tous les autres pays d'Europe possédant un organe d'homologation. Cependant, afin de ne pas "alourdir" ce rapport avec des données qui concernent prioritairement la Flandre, il a été choisi de ne reprendre, parmi celles acceptées par le B.A.H.C., que les données d'espèces pour lesquelles au maximum 30 individus ont été "homologués" en Belgique à ce jour (la Fauvette passerinette et non la Fauvette épervière par exemple). Pour le reste des données concernant la Flandre, on se référera au rapport du B.A.H.C. de l'année 1993 (DE SMET *et al.*, 1995). Celui-ci contient l'ensemble des observations traitées par la C.H.

* La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société d'Etudes Ornithologiques Aves et de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. En sont actuellement membres : M. Ameels, J.-M. Daulne, H. Dufourny, A. Joris, R.-M. Lafontaine, C. Libert, L. Raty et M. Watelet.

(1) Rue du Raimbaix 20, B - 7387 Honnelles.

L'année 1993 apporte les premières mentions belges pour deux espèces et deux sous-espèces : le Percnoptère d'Égypte (*Neophron percnopterus*), la Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*), le Rougequeue noir oriental (*Phoenicurus ochruros phoenicuroides*) et le Traquet pâtre sibérien (*Saxicola torquata maura*). Une observation de Pluvier fauve (*Pluvialis fulva*) de 1992 et une observation de Traquet du désert (*Oenanthe deserti*) de 1990, acceptée après révision, constituent aussi des "premières" pour notre pays. Ce rapport reprend aussi la deuxième mention pour la Locustelle fluviatile (*Locustella fluviatilis*), les deuxième et troisième pour l'Hypolais bottée (*Hippolais caligata*), la troisième pour le Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*), la quatrième pour le Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*), la cinquième pour le Gravelot de Leschenault (*Charadrius leschenaultii*) et le Vanneau sociable (*Chettusia gregaria*), de la cinquième à la huitième pour la Rousserolle isabelle (*Acrocephalus agricola*), de la sixième à la huitième pour la Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) et la huitième pour une Glaréole indéterminée (*Glareola sp.*).

Autre différence par rapport aux publications précédentes, nous avons ajouté, entre parenthèses à la suite du nom des espèces, un certain nombre de chiffres résumant le statut de ces espèces dans notre pays. Ceci n'a toutefois été fait que pour les **espèces soumises à homologation dans toute la Belgique**. Prenons un exemple pour expliquer l'interprétation de ces nombres : Grande Aigrette (-, 66/71, 7/9). Chaque nombre se rapporte à une période déterminée : - (= pas de donnée) se rapporte à la période 1800-1949, 66/71 à la période 1950-1992 et 7/9 à l'année considérée dans le rapport, c'est-à-dire 1993 dans le cas présent. Le premier nombre est le **nombre de données**, le second est le **total d'individus** homologués ou jugés suffisamment documentés avant la création des Commissions d'Homologation. Dans ce cas, il faut donc interpréter l'exemple comme suit : (aucune Grande Aigrette n'a été "homologuée" en Belgique de 1800 à 1950, 66 données concernant 71 Grandes Aigrettes ont été "homologuées" en Belgique de 1950 à 1992, 7 données concernant 9 Grandes Aigrettes ont été homologuées en Belgique en 1993). Si un seul nombre est donné (ex. Circaète Jean-le-Blanc (4, 7, 1)), cela signifie que le nombre de données est identique au nombre d'individus. Dans certains cas, un nombre est donné pour une période différente, précisée en italique, et enfin, un "n" remplace parfois un nombre imprécis d'individus parce que l'espèce a été retirée d'une des listes d'espèces à homologuer durant cette période. L'addition des trois nombres donne évidemment le total d'individus "homologués" en Belgique de 1800 jusqu'à l'année du rapport.

Le dossier 1993 de la Commission d'Homologation a été traité par Marc Ameels, Jean-Marie Daulne, René de Liedekerke, Hugues Dufourmy, Dominique Lafontaine, René-Marie Lafontaine et Denis van der Elst. Les tâches de secrétariat furent encore assurées par Suzanne Lhoest pour ce dossier. R. de Liedekerke a souhaité quitter la C.H. après l'examen du dossier 1993. Les membres passés et présents de la C.H. les remercient vivement pour le travail accompli durant ces années.

Une série d'observations et de captures en vue du baguage n'ont pas été soumises à homologation, ce qui les écarte malheureusement du cadre de travaux d'avifaune. La

C.H. serait donc heureuse que ces données puissent être documentées, même si elles datent de plusieurs années.

LISTE SYSTEMATIQUE :

1. DONNÉES ACCEPTÉES

Sauf mention particulière, toutes les données se rapportent à 1993.

Grèbe esclavon :

(*Podiceps auritus*)

- Libramont (Lux.), étang de l'usine "L'Oréal", du 26 août au 01 septembre (M. Watelet).

Donnée remarquable par sa localisation et sa date très hâtive.

Puffin cendré (-, 12/19, 1) :

(*Calonectris diomedea*)

- Zeebruges (Fl. occ.), en mer, 17 octobre : 1 ex. imm. en migration vers le sud-ouest (G. Spanoghe, B. de Meulemeester, K. De Rouck *et al.*, B.A.H.C.).

Le récent engouement pour le "seawatching" a montré que ce grand puffin est régulier en très petit nombre au large des côtes belges. En 1993, environ 1.400 oiseaux ont été observés depuis les côtes de Grande-Bretagne et l'on peut donc s'étonner qu'un seul oiseau ait atteint la Belgique. Les observateurs ont signalé le bec noir de cet oiseau, qui indiquerait la sous-espèce *edwardsii* des Iles du Cap-Vert. L'identification de cette sous-espèce sans données biométriques est cependant jugée peu fiable et elle n'a jamais été identifiée en Europe occidentale. La sous-espèce rencontrée en Mer du Nord est *borealis*, qui niche notamment au Portugal et dans l'archipel des Iles Canaries.

Fou de Bassan :

(*Morus bassanus*)

- Gaurain-Ramecroix (Ht), bassins de décantation, 24 janvier : 1 adulte mazouté posé puis en vol vers le sud (B. Duyck).

Il s'agit du cinquième oiseau homologué en Wallonie depuis 1988. Les forts vents d'ouest de cette période ont bien sûr déporté cet individu vers l'intérieur des terres.

Cormoran huppé :

(*Phalacrocorax aristotelis*)

- Basse-Wavre (Bt w.), 31 octobre et 01 novembre : 1 immature (D. van der Elst).

Ce cormoran n'est pas annuel en Wallonie. Cette observation concerne un oiseau signalé d'abord sur le répondeur de la Dutch Birding Vogellijn. Il est probable qu'il s'agit d'un séjour plus long, non documenté par des demandes d'homologation.

Héron crabier (3/4, 17, -) :

(*Ardeola ralloides*)

ADDENDUM 1992 :

- Lokeren (Fl. or.), Molsbroek, 12 et 13 août : 1 adulte (I. Mauro, B. Meys, B.A.H.C.).

Grande Aigrette (-, 66/71, 7/9) :

(*Egretta alba*)

- Bernissart (Ht), Pommeroeul et Hensies, réserve des Marais d'Harchies, 08 janvier : 1 ex. (P. Jenard); du 09 janvier au 14 mars : 2 ex. hivernants (J.-L. Lebailly, P. Jenard *et al.*); du 01 au 25 octobre et le 10 décembre : 1 ex.; du 11 au 31 décembre : de nouveau 2 ex. hivernant jusqu'en 1994 (H. Dufourmy, F. Héla *et al.*).

- Arbre (Ht), 28 novembre : 1 ex. en migration vers l'est (J.-L. Lebailly).

- Thommen (Lg), étang, 03 septembre : 2 ex.; du 05 au 15 septembre : 1 juvénile (L. Schmitz, D. Batteux *et al.*). L'âge est établi d'après l'absence de mue des rémiges.

ADDENDUM 1991 :

- Maisières (Ht), Bois-des-Dames, 11 décembre 1991 : 1 ex. en vol vers le sud-sud-ouest (V. Leirens). Il s'agit peut-être de l'oiseau qui a rejoint l'hivernant des marais d'Harchies le 13 décembre de cette année-là.

ADDENDUM 1992 :

- Virelles (Ht), étang, du 29 octobre au 13 novembre au moins : 1 ex. (M. Lambert, B. Philippart *et al.*). Une précision de dates est apportée par rapport à la donnée publiée dans *Oriolus*.

L'augmentation ininterrompue de cette aigrette est remarquable et constatée partout en Europe occidentale. L'espèce fait désormais partie des hivernants réguliers en Wallonie. Les cas d'hivernage antérieurs pour la Wallonie proviennent aussi de ce site au début de 1990 et au cours des hivers 1990-91 et 1991-92 mais ils ne concernaient qu'un seul individu.

Aigrette garzette :

(*Egretta garzetta*)

- Leuze-Longchamps (Na.), bassins de décantation, 16 mai : 2 adultes en migration vers le nord (A. Joris *et al.*).

ADDENDUM 1992 :

- Obourg (Ht), carrières des cimenteries, 24 mai : 2 adultes (V. Leirens). Ces oiseaux ont fait l'objet d'une autre observation homologuée à Thieu (*Aves*, 31 (1) : 3).

Malgré l'augmentation généralisée de l'espèce sur les rivages de France, de Flandre, d'Angleterre et des Pays-Bas, cette aigrette reste juste annuelle en Wallonie. Avec 7 oiseaux, 1992 fut l'année-record pour la Wallonie.

Fuligule à bec cerclé (-, 6, 1) :

(*Aythya collaris*)

- Zeebrugge (Fl. occ.), avant-port ouest, 02 janvier : 1 femelle (G. Sallaets, P. Beirens, L. Janssen, B.A.H.C.).

- Gent/Doornzele (Fl. or.), Rodenhuizedok et Geuzenhoek, du 21 octobre 1993 au 22 avril 1994 : 1 femelle (H. Remaut, M. Demeulemeester, G. Spanoghe *et al.*, B.A.H.C.).

- Anvers/Flandre orientale du 17 novembre 1990 au 13 février 1994 : 1 mâle présent avec des interruptions en différents endroits dont les plus réguliers sont Anvers (Blokkeerdijk) et Oorderen (De Kuifeend). Pour le détail complet du séjour de cet oiseau, voir *Oriolus*, 61 (2) : 30.

Ce fuligule est fréquemment détenu en captivité mais les dates d'arrivée de ces trois oiseaux plaident en faveur d'une origine sauvage. Il faut cependant signaler que le désormais célèbre mâle du

“Blokkersdijk” fut rejoint par un autre, porteur d’une bague en plastique jaune, à partir du 22 décembre 1993.

Fuligule nyroca :

(*Aythya nyroca*)

ADDENDUM 1992 :

- Virelles (Ht), étang, 03 septembre : 1 mâle adulte (M. Lambert).

La date est particulièrement hâtive pour cette espèce.

Modification de la dernière liste des espèces à homologuer : le Fuligule nyroca est de nouveau à homologuer partout en Belgique à partir du 1er janvier 1995.

Percnoptère d’Egypte (-, -, 1) :

(*Neophron percnopterus*)

- Membach (Lg), Seveneiken, 31 mai : 1 adulte en vol (L. Schmitz).

Première mention en Belgique. Comme pour beaucoup de rapaces très rares, l’origine peut évidemment être discutée mais l’absence de toute trace de captivité et la période plaident en faveur d’une origine sauvage pour cet individu.

Circaète Jean-le-Blanc (4, 7, 1) :

(*Circaetus gallicus*)

- Bernissart (Ht), réserve des marais d’Harchies, 16 août : 1 ex. (R. Tonnel).

Cet oiseau est le douzième observé en Belgique et le troisième à Harchies.

Buse pattue :

(*Buteo lagopus*)

- Jalhay (Lg), Les Grands Champs, 20 novembre : 1 juvénile (L. Schmitz).

Une seule donnée est un fait normal en Wallonie au cours d’une année sans invasion. Pour des détails sur le statut de cette espèce, voir WATELET (1991).

Faucon kobez :

(*Falco vespertinus*)

- Pommeroeul (Ht), canal Mons-Condé, 14 mai, 1 mâle immature premier été (H. Dufourmy).

- Bernissart et Hensies (Ht), réserve des marais d’Harchies, du 28 avril au 09 mai : 1 femelle immature premier été; 02 mai : un second individu du même âge, du 21 au 24 mai : 2 autres femelles immatures premier été (V. Schollaert, H. Dufourmy *et al.*).

- Grand-Leez (Na.), 26 mai : 1 mâle adulte en migration vers le nord (J.-P. Jacob).

- Sombreffe (Na), La Chaussée, 14 et 15 juin : 1 femelle immature premier été (L. Wargé, L. et D. Verroken).

ADDENDUM 1992 :


- Frasnes-lez-Buissenal (Ht), bois de Leuze, 15 mai : 1 femelle en migration vers le nord (E. Cuvelier).

- Virelles (Ht), étang, 17 mai : 1 femelle probablement adulte; du 27 au 30 mai : 1 mâle immature premier été; du 27 mai à “début-juin” : 1 femelle immature (M. Lambert *et al.*).

- Bütgenbach (Lg), Rurhof, 28 mai : 1 mâle immature premier été (L. Schmitz).

- Boussu-en-Fagne (Na.), Ferme de la Forge, 06 juin : 1 femelle immature (J.-L. Coppée).

Ces données complètent la série-record de 1992 qui est maintenant de 15 oiseaux homologués en Wallonie. Avec 7 individus,



Faucon kobez, femelle immature, Sombreffe, 15 juin 1993 (L. Verroken).

1993 se place aussi au-dessus de la fréquence normale d'observation de ce faucon chez nous. Comme en 1992, les raisons de cette "abondance" s'expliquent par l'influence de vents d'est-sud-est en pleine période de migration.

Marouette poussin (-, 27, 1) :
(*Porzana parva*)

- Menen (Fl. occ.), réserve "De Poel", 20 et 21 avril : 1 mâle (E. et B. Vantomme, B.A.H.C.).

Il s'agit de la deuxième observation dans cette réserve, après celle d'une femelle (filmée) le 02 mai 1990.

Glaréole indéterminée (3, 5/6, -) :
(*Glaucopis sp.*)

ADDENDUM 1989 :

- Genk (Limb.), réserve "De Maten", 06



Faucon kobez, femelle, Hensies, 6 mai 1993 (L. Verroken).

août, 1 ex. en vol vers l'est (C. Vanderijdt, B.A.H.C.).

L'espèce n'a malheureusement pas pu être déterminée. Trois espèces de glaréoles s'observent en Europe occidentale; ce sont, par ordre décroissant de rareté, la Glaréole à ailes noires (*Glaucopis nordmanni*), la Glaréole à collier (*Glaucopis pratincola*) et la Glaréole orientale (*Glaucopis maldivarum*), qui n'a jamais été vue en Belgique.

Gravelot à collier interrompu :
(*Charadrius alexandrinus*)

- Genappe (Bt w.), bassins de décantation, 07 et 08 mai : 1 mâle adulte (C. Libert *et al.*).

Il s'agit du neuvième oiseau homologué en Wallonie depuis 1984 et du quatrième aux décanseurs de Genappe. Ce gravelot reste très rare à l'intérieur des terres.

Gravelot de Leschenault (-, 4, 1) :
(*Charadrius leschenaultii*)

- Zeebruges (Fl. occ.), avant-port ouest, 14 et 15 juillet : 1 mâle adulte (P. Adriaens,

W. van Nunen *et al.*, B.A.H.C.) (ADRIAENS et DE SMET, 1994).

Les quatre observations antérieures en Belgique proviennent aussi du littoral. Juillet est un mois typique pour l'apparition de ce limicole en dehors de son aire de répartition normale.

Pluvier guignard :
(*Charadrius morinellus*)

- Havay (Ht), 29 août : 1 juvénile en migration vers le sud (P. Degossely).

Une donnée d'un type désormais normal en Wallonie pour cette espèce, dont le statut a été décrit en détail par ROUSSEAU (1996).

Pluvier fauve (-, 1, -) :
(*Pluvialis fulva*)

ADDENDUM 1992 :
- Zeebruges (Fl. occ.), avant-port ouest, 16 septembre : 1 adulte (N. Selosse, B.A.H.C.).

Première donnée belge pour ce pluvier dont l'observation est devenue annuelle aux Pays-Bas.



Pluvier fauve, Zeebruges, 16 septembre 1992 (N. Selosse).

Vanneau sociable (-, 4, 1) :
(*Chettusia gregaria*)

- Meise/Wolvertem (Bt fl.), 18 avril : 1 adulte (M. Segers, P. Herroelen *et al.*, B.A.H.C.).

Cet oiseau fut découvert en pleine campagne du Brabant flamand lors d'un recensement d'oiseaux nicheurs (HERROELEN et SEGERS, 1993). La précédente donnée homologuée en Belgique datait du 25 mai 1970 à Turnhout (Limbourg).



Gravelot de Leschenault, Zeebruges, 15 juillet 1993 (F. Bogaert, arch. B.A.H.C.).

En Europe occidentale, ce vanneau est le plus souvent découvert en automne dans les grandes troupes de Vanneaux huppés (*Vanellus vanellus*). L'espèce semble en nette diminution sur ses lieux de nidification d'Asie centrale menacés de destruction par une agriculture agressive.



Vanneau sociable, Meise/Wolvertem, 18 avril 1993 (E. Toorman, arch. B.A.H.C.).

Bécasseau sanderling :
(*Calidris alba*)

ADDENDUM 1992 :

- Gaurain-Ramecroix (Ht), bassins de décantation, 11 mai : 1 ex. (E. Cuvelier).

Il s'agit du sixième oiseau homologué en Wallonie pour 1992. Ce bécasseau est devenu annuel en Wallonie à partir de 1987.

Rappelons que, à partir du 1er janvier 1993, cette espèce n'est à soumettre à homologation qu'à l'est de la vallée de la Meuse.

Bécasseau tacheté (-, 21/22, 1) :
(*Calidris melanotos*)

- Zelzate (Fl. or.), Callemansputte, du 11 au 22 août : 1 mâle adulte (L. Bekaert, M. Demeulemeester *et al.*, B.A.H.C.).

ADDENDUM 1991 :

- Gent (Fl. or.), Geuzenhoek, 28 septembre : 1 juvénile (G. Spanoghe, P. Carchon, W. de Floor, B.A.H.C.).

La donnée supplémentaire de 1991 porte à 4 le total de cette année, qui devient ainsi l'année-record en Belgique pour ce limicole néarctique et est-paléarctique très régulièrement observé en Europe occidentale. Des 23 oiseaux homologués en Belgique, seulement 4 ont été observés en Wallonie. La répartition mensuelle des 22 données belges (dates d'arrivée) est la suivante : mai (2), juin (2), juillet (1), août

(5), septembre (8), octobre (4).

Bécasseau falcinelle (4, 9/10, 1) :
(*Limicola falcinellus*)

- Leuze-Longchamps (Na), bassins de décantation, du 16 au 19 mai : 1 adulte (A. Joris *et al.*).

En Wallonie, il s'agit du deuxième oiseau depuis 1980 et du troisième de ce siècle. Le précédent présente des similitudes frappantes avec celui-ci puisqu'il s'agissait d'un adulte les 18 et 19 mai 1980 au même endroit. L'espèce est presque annuelle en Flandre, où elle n'a toutefois pas été observée en 1993.

Bécasseau roussel (-, 3, 1) :
(*Tryngites subruficollis*)

- Zeebruges (Fl. occ.), avant-port ouest, du 09 au 11 septembre : 1 juvénile (W. van Nunen, P. Beirens *et al.*, B.A.H.C.).

Cet oiseau fut trouvé dans une zone de végétation rase comme les apprécie particulièrement ce limicole. Avec quatre données, cette espèce reste étonnamment rare chez nous alors qu'il est un des

limicoles néarctiques les plus fréquemment observés en Grande-Bretagne, où 24 individus ont ainsi été observés du 18 août au 13 octobre 1993.

Chevalier stagnatile (1901-1992 : 120, 6/7) : (*Tringa stagnatilis*)

- Leuze-Longchamps (Na), bassins de décantation : 20 avril et 30 juin : chaque fois 1 adulte (A. Joris *et al.*).

Il s'agit des neuvième et dixième oiseaux homologués en Wallonie depuis 1984, où une observation du 20 avril est la mention la plus hâtive. Les données antérieures sont d'avril (3), mai (2), juin (2) et août (1).

Chevalier à pattes jaunes (-, 2, 1) : (*Tringa flavipes*)

- Knokke (Fl. occ.), Oude Vrede, 25 juillet :

1 adulte (F. Willemyns, M. Demeulemeester, F. De Ruwe *et al.*, B.A.H.C.) (WILLEMYS *et al.* (1995).

Il s'agit seulement de la troisième observation en Belgique de ce limicole fréquemment observé en Grande-Bretagne. La date hâtive indique sans doute un oiseau qui a passé l'hiver de ce côté de l'océan atlantique et migre en compagnie de limicoles européens.

Bargette de Térék (-, 6, 1) : (*Xenus cinereus*)

- Gaurain-Ramecroix (Ht), bassins de décantation, 25 avril : 1 adulte (L. et D. Verroken, J.-L. Lebailly *et al.*).

- Escanaffles (Ht), bassins de décantation, du 26 au 29 avril : 1 adulte (L. et D. Verroken J.-L.? Lebailly *et al.*)



Bécasseau rousset, juvénile, Zeebruges, 9 septembre 1993 (P. Beirens, arch. B.A.H.C.).

Il s'agit du même oiseau, retrouvé par les mêmes observateurs sur le second site après son départ du premier! Ces observations, les premières de l'espèce en Wallonie, sont détaillées par VERROKEN & VERROKEN (1993).

Phalarope à bec étroit :

(Phalaropus lobatus)

- Libramont (Lux.), étang de l'usine "L'Oréal", 28 et 29 mai : 1 mâle (M. Watelet, Y. Kempeneers).

- Leuze-Longchamps (Na.), bassins de décantation, du 20 au 23 septembre : 1 juvénile (A. Joris, E. Branquart *et al.*).

Il s'agit des treizième et quatorzième oiseaux homologués en Wallonie depuis 1975. L'observation de mai en province de Luxembourg est remarquable compte tenu de la rareté de l'espèce au passage pré-nuptial, et de la localisation du site d'observation, loin à l'intérieur du pays.

Phalarope à bec large :

(Phalaropus fulicarius)



Phalarope à bec large, marais d'Harchies, 11

- Bernissart (Ht), marais d'Harchies, du 10 au 12 décembre : 1 immature premier hiver (H. Dufourmy *et al.*).

Ce phalarope reste exceptionnel à l'intérieur des terres. Il n'y a que quatre données homologuées en Wallonie de 1975 à 1992. Celle-ci est la plus tardive et concerne un oiseau qui fut manifestement dévoyé par de forts vents d'ouest.

Mouette mélanocéphale :

(Larus melanocephalus)

- Leuze-Longchamps (Na.), bassins de décantation, du 01 au 05 mai : 1 immature premier été (A. Joris, B. Nef).

ADDENDUM 1989 :

- Hensies (Ht), réserve des marais d'Harchies, 07 avril : 7 adultes (L. et D. Verroken).

Le groupe de 7 adultes en 1989 est le plus important jamais observé en Wallonie. Cette donnée porte, avec l'oiseau de 1993, le total à 23 oiseaux homologués en Wallonie depuis 1975. L'espèce est principalement observée en avril.



Phalarope à bec étroit, Libramont, 28 mai 1993

Sterne hansel (n, 42/61, 4/5) :

(*Gelochelidon nilotica*)

- Achêne (Na.), Taviêt, étang des Hayettes, 25 juillet : 1 adulte (F. le Hardÿ de Beaulieu).

Il s'agit seulement de la troisième donnée du siècle en Wallonie (pour 4 oiseaux) alors que l'espèce est annuelle en Flandre.

Sterne caugèk :

(*Thalasseus sandvicensis*)

- Chertal (Lg), 17 juillet : 1 adulte (F. Doblestein).

Malgré son abondance au littoral, cette sterne reste très rare à l'intérieur des terres : il s'agit seulement de la cinquième en Wallonie depuis 1975.

Sterne de Dougall (-, 5+, 1) :

(*Sterna dougallii*)

- Zeebruges (Fl. occ.), avant-port ouest, 14 et 15 juillet : 1 adulte (F. de Ruwe, G. Spanoghe *et al.*, B.A.H.C.).

ADDENDUM 1992 :

- Ostende (Fl. occ.), estacade est, 13 août : 1 juvénile en migration vers le sud-ouest (J. Vanwijnsberghe, G. Spanoghe *et al.*, B.A.H.C.).

Cette sterne est observée annuellement dans les colonies d'autres sternes à Zeebruges depuis 1990. Après des années noires, les effectifs remontent enfin en Irlande, où la colonie de Rockabill atteignait ainsi un record de 427 couples en 1993.

Sterne arctique :

(*Sterna paradisaea*)

- Hensies (Ht), marais d'Harchies, 02 mai :

1 adulte (H. Dufourny *et al.*).

- Pommeroeul (Ht), canal Mons-Condé, Grand Large, 02 mai : 3 adultes (H. Dufourny *et al.*).

- Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large, 02 mai : 1 adulte (H. Dufourny *et al.*).

- Nimy (Ht), Grand Large, 16 mai : 1 adulte (H. Dufourny *et al.*).

ADDENDUM 1989 :

- Bernissart (Ht), réserve des marais d'Harchies, 14 avril : 1 adulte (L. et D. Verroken).

ADDENDUM 1990 :

- Bernissart (Ht), réserve des marais d'Harchies, 15 avril : 1 adulte (L. et D. Verroken, J.-J. Strijckmans).

ADDENDUM 1992 :

- Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large, 08 mai et 11 mai : respectivement 2 et 1 adultes (E. Cuvelier).

Le total de 1992 est maintenant de 34 oiseaux homologués du 19 avril au 15 mai et certaines données sont encore en examen! Cet afflux est sans précédent pour la Wallonie, où l'espèce est susceptible d'être rencontrée chaque printemps si les conditions météorologiques sont favorables, c'est-à-dire surtout un temps couvert et du vent d'ouest-nord-ouest. Avec 6 oiseaux, le passage de 1993 est peut-être normal.

Sterne naine :

(*Sterna albifrons*)

ADDENDUM 1992 :

- Froidchapelle (Ht), lac du barrage de la Plate-Taille, 05 septembre : 1 ex. (J.-L. Coppée).

Il s'agit du cinquantième oiseau homologué

en Wallonie depuis 1975. Cette petite sterne est annuelle depuis 1981, principalement en mai et juin.

A partir du 1er janvier 1993, cette espèce n'est à soumettre à homologation qu'à l'est de la vallée de la Meuse.

Guifette moustac (2/4, n, 6/11) :

(*Chlidonias hybridus*)

- Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large, 03 mai : 1 adulte (H. Dufourny *et al.*).

- Pommeroeul (Ht), réserve des marais d'Harchies, 18 mai : 4 adultes (H. Dufourny, J-L. Lebailly *et al.*).

- Grand-Leez (Na), étangs du Long-Pont, 23 avril : 3 adultes (J.-P. Jacob).

Le total de 8 individus en 1993 porte à 74 le nombre d'oiseaux homologués en Wallonie depuis 1975. La date du 23 avril est la deuxième plus précoce de Wallonie.

L'espèce n'a plus été soumise à homologation en Flandre pendant plusieurs années, ce qui explique l'imprécision pour la période 1950-1992. Elle est de nouveau à homologuer partout en Belgique. Pour un rappel détaillé du statut de cette espèce, voir PEERO *et al.* (1985).

Guifette leucoptère (5/6, n, 4/5) :

(*Chlidonias leucopterus*)

- Leuze-Longchamps (Na.), bassins de décantation, 29 août : 1 adulte (A. Joris, B. Nef).

ADDENDUM 1992 :

- Péronnes-lez-Antoing (Ht), Grand Large, 20 mai : 2 adultes (E. Cuvelier).

Pas d'afflux printanier en 1993 malgré les vents d'est-sud-est. La donnée



Guifette moustac, marais de Pommeroeul, 18 mai 1993 (L. Verroken).

supplémentaire du printemps 1992 porte le total de cette année à 9 individus homologués en Wallonie du 18 au 20 mai.

L'espèce a été retirée de la liste des espèces à homologuer en Flandre pendant plusieurs années mais elle est de nouveau à homologuer partout en Belgique.

Guillemot de Troïl :

(*Uria aalge*)

- Bütgenbach (Lg), lac, 30 et 31 janvier : 1 ex. (N. Paquay, R. Heck).

Un afflux exceptionnel de guillemots a été observé dans le bas-Escaut et le nord du pays (prov. d'Anvers et de Limbourg essentiellement) au début de 1993 (à partir du 19 janvier) (SEYS, 1993). L'observation de Bütgenbach est celle réalisée le plus loin dans l'intérieur.

Macareux moine (n, 1989-1992 : 11, 1) :

(*Fraterecula arctica*)

- Ostende (Fl. occ.), depuis le ferry, 11

novembre : 1 ex. (P. van Daele, C. van de Woestijne, B.A.H.C.).

Cet alcidé est sans doute plus fréquent que ce qui est connu au large des côtes belges.

Coucou-geai (1, 3, 1) :

(*Clamator glandarius*)

- Sinsin (Na.), 21 mars : 1 immature de premier été trouvé mort (déposé dans les collections de l'I.R.S.N.B., information via J.-P. Jacob).

Cette espèce est vue annuellement en Grande-Bretagne mais reste rarissime chez nous.

Martinet alpin (1/2, 12, 3/4) :

(*Apus melba*)

- Zandvoorde (Fl. occ.), Zoutekreek, 22 mai : 1 ex. en migration vers le nord-nord-est (P. Bultinck, J. Dellaert *et al.*, B.A.H.C.).

- Ostende (Fl. occ.), 24 mai : 2 ex. en migration vers le nord-nord-est (R. François, B.A.H.C.).

- Blankenberge (Fl. occ.), 07 octobre : 1 ex. en migration vers le sud-ouest (R. Drijvers, B.A.H.C.).

Quatre oiseaux en un an est le record pour la Belgique. Ce martinet est assez souvent observé en dehors de son aire de répartition normale : ainsi, 19 oiseaux ont été homologués en Grande-Bretagne et 5 en Suède en 1993.

Guêpier d'Europe (± 11/31, 38/102, 3/4) :

(*Merops apiaster*)

- Bredene (Fl. occ.), 22 mai : 1 adulte en migration vers le sud-ouest (J. Dellaert, L. Janssen, E. Vanloo, B.A.H.C.).

- Grüfflingen (Lg), 01 juin : 1 adulte (N. de Sadeleer, A. Erdal).

- Fronville (Lux.), Monteuville, du 04 juillet au 08 août : 2 adultes avec tentative de reproduction (J.-M. Daulne, J.-M. Demonty *et al.*).

ADDENDUM 1991 :

- Pommeroeul (Ht), réserve des marais d'Harchies, 02 juin : 4 ex. en vol vers le nord-nord-est (L. et D. Verroken).

La tentative de nidification relatée ici est la troisième en Belgique, les précédentes remontant à 1933 à Warcoing (Ht) et 1956 à Stamburges (Ht). L'augmentation du nombre de données en Belgique est à mettre en corrélation avec l'avancée vers le nord de l'aire de reproduction de l'espèce. Le Guêpier d'Europe est maintenant un nicheur régulier (en très petites colonies) dans le nord de la France et son installation chez nous est à prévoir.

Pic cendré :

(*Picus canus*)

- Latour (Lux.), 14 mars : 1 mâle adulte (O. Matgen, R.-M. Lafontaine *et al.*).

- Arlon (Lux.), domaine militaire de Lagland, 24 avril : 1 oiseau entendu (O. Matgen).

Ce pic est très rare dans la province de Luxembourg, où sa nidification n'est cependant pas à exclure.

Alouette calandrelle (11, 9, 1) :

(*Calandrella brachydactyla*)

- Zeebruges (Fl. occ.), avant-port ouest, 15 juillet et du 02 au 05 août : 1 ex. probablement de la sous-espèce *brachydactyla* (M. Demeulemeester, G. Spanoghe, P. Adriaens *et al.*, B.A.H.C.).

Cette alouette est très régulièrement observée en “overshooting” au printemps en Grande-Bretagne (par ex. 15 mentions en mai 1993) mais reste très rare chez nous. L’oiseau de Zeebruges est sans doute arrivé ainsi et pourrait avoir séjourné incognito, jusqu’à sa découverte en juillet.



Alouette calandrella, Zeebruges, 3 août 1993
(P. Beirens, arch. B.A.H.C.).

Pipit de Richard (1800-1899 : 18, 1900-1966 : 25, 1967-1992 : 75, 2) :
(*Anthus richardi*)

- Gaurain-Ramecroix (Ht), bassins de décantation, 27 avril : 1 adulte (L. et D. Verroken).

Cette observation est la première au printemps en Belgique (VERROKEN et VERROKEN, 1994).

Après plusieurs années de retrait de la liste des espèces à homologuer en Flandre, ce pipit est de nouveau soumis à homologation partout en Belgique.

Pipit à gorge rousse (5, n, 8) :
(*Anthus cervinus*)

- Genappe (Bt w.), bassins de décantation, 07 et 08 mai : 1 mâle adulte (C. Libert *et al.*).

- Angre (Ht), Chapelle Saint-Roch, 20 septembre : 1 ex. brièvement posé; 30 septembre : 1 ex. entendu en migration; 02 octobre : 1 ex. posé; 06 octobre : 1 ex. en migration vers le sud-ouest (H. Dufourny, G. Willem).

ADDENDUM 1992 :

- Gaurain-Ramecroix (Ht), bassins de décantation, 11 mai : 1 adulte (E. Cuvelier).

L’oiseau supplémentaire de 1992 grossit le record de cette année, qui passe donc à 9 oiseaux homologués en Wallonie. Avec 5

oiseaux, 1993 est encore au-dessus de la normale mais il est probable que ce rythme devienne annuel si les suivis de la migration en poste fixe sont maintenus.

Bergeronnette citrine (-, -, 1) :
(*Motacilla citreola*)

- Lierre (Anv.), Anderstad, 09 mai : 1 femelle (D. Colin, J. Tafforeau, G. Driessens *et al.*, B.A.H.C.) (COLIN, 1995).

Il s’agit de la première observation de cette espèce en Belgique. Les vents d’est du printemps 1993 ont provoqué un afflux important en Europe avec, notamment, un record de 43 oiseaux en Pologne, 14 en Suède, 9 en Grande-Bretagne et 9 en Allemagne.

Bergeronnette de Yarrell :
(*Motacilla alba yarrellii*)

ADDENDUM 1991 :

- Membach (Lg), 28 mai : 1 mâle (L. Schmitz).

Cette sous-espèce reste étonnamment rare à l’est de la vallée de la Meuse.

Rossignol progré (-, 12, 2) :*(Luscinia luscinia)*

- Semmerzake (Fl. or.), Bolveerput, 06 septembre : 1 mâle immature premier hiver capturé et bagué (J. De Beule, L. Stevens, D. Verbelen *et al.*, B.A.H.C.).

- Lede, 07 septembre : 1 immature premier hiver capturé et bagué (D. De Mesel, B.A.H.C.).

Les 14 données belges (dont seulement 1 en Wallonie) concernent toutes des oiseaux de premier hiver capturés à partir de 1980. Toutes ces données sont concentrées du 11 août au 18 septembre.

Rougequeue noir oriental (-, -, 1) :*(Phoenicurus ochruros "phoenicuroides")*

- Zeebruges (Fl. occ.), base navale, 28 octobre : 1 immature premier hiver (G. De Smet, I. Mauro, G. Spanoghe, E. Verduyze, B.A.H.C.).

Une note de DE SMET et VERCRUYSE (1994) détaille cette première mention de cette sous-espèce en Belgique. Très récemment, un article allemand a mis en évidence la grande ressemblance entre les Rougequeue noirs "orientaux" et les hybrides Rougequeue noir X Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*). L'auteur conclut que l'on peut émettre des "doutes bien fondés" quant à la validité des données de *P. o. "phoenicuroides"* en Europe occidentale (KING, 1996).

Traquet pâtre "sibérien" (-, -, 1) :*(Saxicola torquata maura)*

- Meetkerke (Fl. occ.), 11 octobre : 1 immature premier hiver (F. De Ruwe, P. Beirens, R. De Jaegher, J. Vanpraet, B.A.H.C.).

Première mention de cette sous-espèce en Belgique. Elle est par contre très régulière en Grande-Bretagne avec une vingtaine de données chaque année de la période 1989-1993. En 1993, 17 oiseaux ont été homologués dans ce pays (ROGERS, 1994). Pour l'identification, on se référera utilement à BARTHEL (1992).

Locustelle fluviatile (-, 1, 1) :*(Locustella fluviatilis)*

- Schilde (Anv.), Schijnvallei, 30 et 31 mai : 1 mâle chanteur (B. Luyckx).

Cette donnée, la deuxième pour la Belgique, a fait l'objet d'une note par LUYCKX (1993). Cette espèce, déjà annuelle aux Pays-Bas, est en lente expansion vers l'ouest. D'autres observations en Belgique sont assez probables dans les années à venir.

Rousserolle isabelle (-, 5, 3) :*(Acrocephalus agricola)*

- Messelbroek (Bt fl.), 29 août : 1 immature premier hiver capturé et bagué (M. Clerckx, R. De Fraine, H. Berghmans *et al.*, B.A.H.C.).

- Nieuport (Fl. occ.), 04 novembre : 1 adulte capturé et bagué (R. Debruyne, J. Jacques, N. Roothaert, B.A.H.C.).

- Grembergen (Fl. or.), 20 septembre : 1 immature premier hiver capturé et bagué (J. Mannaert, B.A.H.C.).

ADDENDUM 1992 :

- Wetteren (Fl. or.), 27 septembre : 1 immature premier hiver capturé et bagué (L. et K. Caekebeke, V. Geers, B.A.H.C.).

Comme le Rossignol progré, cette rousserolle n'a jamais été observée sur le



Rousserolle isabelle, Nieuwport, 4 novembre 1993 (R. Debruyne, arch. B.A.H.C.).

terrain en Belgique. La capture de novembre est particulièrement tardive et celle d'août, hâtive; celle-ci a fait l'objet d'une note par DE FRAINE (1993).

Hypolaïs bottée (-, 1, 2) :
(*Hippolais caligata*)

- Wetteren (Fl. or.), 03 et 05 octobre : chaque fois 1 immature premier hiver de la sous-espèce *caligata* capturé et bagué (L. Caekebeke, K. van Laeken, B.A.H.C.).

Baguer deux Hypolaïs bottées dans son jardin à un jour d'intervalle, voilà qui n'est pas banal. Tout aussi étonnant fut de découvrir que le deuxième oiseau avait déjà été bagué peu de temps auparavant, le 16 septembre 1993 à Spurn Head (Humberside), dans le nord de l'Angleterre, où l'espèce est annuelle. En 1993, 12 individus dont 8 en septembre ont été homologués dans ce pays.

Fauvette passerinette (-, 7, 1) :
(*Sylvia cantillans*)

- Le Coq (Fl. occ.), 28 avril : 1 mâle capturé et bagué (E. et P. Schepens, M.-P. Schepens-Van Thiel, B.A.H.C.).



Fauvette passerinette, Retie, 1er juin 1988 (R. Debruyne, arch. B.A.H.C.).

ADDENDUM 1988 :

- Retie (Anv.), 01 juin : 1 mâle adulte de la sous-espèce *cantillans* capturé et bagué (J. Spaepen, B.A.H.C.).

ADDENDUM 1992 :

- Wetteren (Fl. or.), 25 avril : 1 male capturé et bagué (L. Caekebeke, V. Geers, B.A.H.C.).

Le nombre d'oiseaux homologués en Belgique (depuis 1984) est bien faible si l'on sait que cette fauvette est un des passereaux rares les plus nombreux en "overshooting" en Grande-Bretagne. Rappelons qu'il n'y a qu'une seule mention en Wallonie : 1 mâle le 20 avril 1985 à Libramont (Luxembourg).

Pouillot de Pallas (-, 28, 2) :
(*Phylloscopus proregulus*)

- Zeebruges (Fl. occ.), base navale, du 25 au 28 octobre : 1 immature premier hiver

(G. De Smet, G. Spanoghe, D. Verbelen *et al.*, B.A.H.C.).

- Zeebruges, "bois de la croix", du 01 au 04 novembre : 1 immature premier hiver (G. Spanoghe, E. Vercruyse, M. Demeulemeester *et al.*, B.A.H.C.).

Ce superbe pouillot est décelé chaque automne au littoral grâce à la prospection assidue de certaines zones arbustives. La première observation (capture) remonte à 1971 et il y a maintenant 30 oiseaux homologués. Leur répartition par mois est la suivante : octobre (14), novembre (14), décembre (2). L'unique mention de Wallonie est toujours celle d'un oiseau capturé en vue du baguage et mort au lâcher le 22 octobre 1982 à Erbisoeul (Hainaut).

Roselin cramoi (3, 17, 1) :
(*Carpodacus erythrinus*)

- Zevegem (Fl. or.), 06 juin, 1 mâle immature premier été chanteur (A. Reynaerts, G. Spanoghe, D. Verbelen *et al.*, B.A.H.C.).

ADDENDUM 1991 :

- Heusy (Lg), du 27 avril au 08 mai : 1 mâle adulte chanteur (L. Schmitz).

Outre une donnée de février en Brabant, le mâle chanteur de Heusy est l'oiseau le plus précoce jamais homologué en Belgique et l'on peut, pour cette raison, s'interroger sur son origine. Il s'agit du septième individu et du deuxième chanteur homologué en Wallonie. L'oiseau de Zevegem est plus typique, la date du 06 juin devant de seulement deux jours les autres arrivées printanières.

En forte expansion vers l'ouest depuis une dizaine d'années, le Roselin cramoi s'est reproduit pour la première fois en Belgique

en 1993 : deux cas certains et un probable à Knokke et un cas possible à Zeebruges et Wenduine/Le Coq. Ces données n'ont cependant pas encore fait l'objet de demandes d'homologation.

Bruant lapon :
(*Calcarius lapponicus*)

- Eupen (Lg), Kutenhart, 01 novembre : 1 ex. en vol (L. Schmitz).

- Lanaye (Lg), 02 novembre : 2 ex. en vol (D. Testaert).

ADDENDUM 1992 :

- Montroeuil-au-Bois (Ht), 12 septembre : 1 ex. en migration vers le sud-ouest (E. Cuvelier).

- Havay (Ht), 29 septembre : 1 ex. en migration vers l'ouest-sud-ouest (P. Degossely).

- Bognies (Ht), 16 octobre : 1 ex. en migration vers le sud-ouest (P. Degossely).

La régularité de l'espèce en migration d'automne a été mise en évidence grâce aux suivis en poste fixe. Les données supplémentaires de 1992 portent le total de cette année à 18 oiseaux, soit le record pour la Wallonie. L'automne 1992 a aussi été très productif en observations de cette espèce dans d'autres régions d'Europe occidentale.

A partir du 1er janvier, cette espèce n'est à soumettre à homologation qu'à l'est de la vallée de la Meuse. Cette précision avait été omise dans la dernière liste des espèces à homologuer (*Aves*, 31 (1) : 14).

Bruant rustique (3, 4/5, 2) :
(*Emberiza rustica*)

- Tessengerlo (Lim.), 12 mars : 1 femelle

capturée et baguée (R. De Fraine, H. Berghmans, M. Clerckx *et al.*, B.A.H.C.).

- Tenneville (Lux.), 29 mars : 1 mâle chanteur (M. Watelet).

Ces deux données de début de printemps correspondent à ce qui est observé dans d'autres pays d'Europe occidentale. Elles pourraient indiquer une tendance à l'hivernage de quelques individus, fait déjà connu pour d'autres oiseaux sibériens (p. ex. Pipit de Richard, Pouillot à grands sourcils).

La donnée en province de Luxembourg est cependant peu banale car elle se rapporte à un mâle chanteur qui ne fut hélas pas retrouvé le lendemain. Il s'agit de la quatrième donnée en Wallonie.

2. DONNÉES ACCEPTÉES APRÈS RÉVISION

Traquet du désert (-, 2, -) :
(*Oenanthe deserti*)

CORRIGENDUM 1990 :

- Brecht (Anv.), 05 octobre : 1 femelle immature premier hiver (J. De Ridder, B.A.H.C.).

Cette donnée a pu être révisée et acceptée grâce à l'apport d'informations supplémentaires. Elle devient ainsi chronologiquement la première donnée belge de ce traquet, précédant celle du mâle vu du 13 au 15 octobre 1991 à Zeebrugge.

Bruant nain (6, 22, -) :
(*Emberiza pusilla*)

ADDENDUM 1991 :

- Flémalle (Lg), Les Awirs, 19 octobre : 1 immature premier hiver capturé et bagué (R. Fraipont, J. Neuville).

Date typique pour cet "égaré" annuel en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas mais encore très rare chez nous. Il s'agit seulement de la deuxième donnée en Wallonie!

Tichodrome échelette (3/4, 6, -) :
(*Tichodroma muraria*)

CORRIGENDUM 1943 :

- Berchem (Anv.), 04 décembre : 1 immature premier hiver (H. Roels, B.A.H.C.).

Les récentes observations d'un tichodrome en vol au-dessus de la plage d'Heist (novembre 1989) et d'un hivernant au centre d'Amsterdam (hivers 1989/90 et 1990/91) ont convaincu le B.A.H.C. de la possibilité de rencontrer cet oiseau en des endroits plus qu'inattendus et à revoir cette observation bien décrite.

3. DONNÉES REFUSÉES APRÈS RÉVISION

Gobemouche à collier (-, 4, -) :

(*Ficedula albicollis*)

CORRIGENDUM 1987 :

- Beerse (Anv.), du 22 au 26 mai : 1 femelle capturée et baguee (dix-neuvième rapport du B.A.H.C., *Oriolus*, 55 : 138).

Cette donnée n'avait pas été examinée par le B.A.H.C. et avait été publiée par erreur.

Les documents photographiques établissent que l'oiseau en question était un mâle premier été de Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) de la forme brune appelée "*muscipeta*".

La capture d'un mâle premier été de Gobemouche à collier reste, elle, acceptée.

4. DONNÉES N'AYANT PAS REÇU L'HOMOLOGATION

Seules les données traitées par la C.H. sont citées. Sauf mention contraire, elles se rapportent à 1993.

Héron bihoreau (*Nycticorax nycticorax*) : Damme (Fl. occ.), réserve, 19 mai 1991 : 1 ex.

Circaète Jean-le-blanc (*Circaetus gallicus*) : Chaudfontaine (Lg), 05 août 1992 : 1 ex.

Buse variable "des steppes" (*Buteo buteo vulpinus*) : Frasnies-lez-Buissenal (Ht), 15 mai 1992 : 1 ex. en migration vers le nord-est.

Buse pattue (*Buteo lagopus*) : Waremme (Lg), bassins de décantation, 16 et 17 octobre 1993 : 1 ex.

Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) : Bernissart (Ht), marais d'Harchies, mai 1984, 1 immature de troisième ou quatrième année.

Aigle botté (*Hierraeetus pennatus*) : Bernissart (Ht), réserve des marais d'Harchies, 18 septembre 1993 : 1 ex. de la forme claire.

Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*) : Angre (Ht), 29 septembre 1993 : 1 ex. en migration vers le sud-ouest.

Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*) : Oud-Heverlee (Bt fl.), 19 septembre 1993 : 1 adulte.

Gobemouche nain (*Ficedula parva*) : Bernissart (Ht), réserve des Marais d'Harchies, 26 septembre 1993 : 1 mâle immature premier hiver.

Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*) : Sibret (Lux.), Ile-le-Pré, 02 juin 1993 : 1 mâle.

Bruant fou (*Emberiza cia*) : Grandcourt (Lux.), 08 avril 1993 : 1 mâle.

Bibliographie

- ADRIAENS, P. & DE SMET, G. (1994) : Woestijnplevier (*Charadrius leschenaultii*) te Zeebrugge in juli 1993. *Mergus*, 8 : 88 - 96.
- BARTHEL, P. (1992) : Die bestimmung östlicher Unterarten des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*). *Limicola*, 6 : 217 - 241.
- COLIN, D., (1995) : Citroenkwikstaart (*Motacilla citreola*) te Lier op 9 mei 1993. *Oriolus*, 61 : 40 - 41.
- DE FRAINE, R. (1993) : Eerste augustusvangst van een Velddrietzanger (*Acrocephalus agricola*) in België. *Oriolus*, 59 : 74.
- DEMEULEMEESTER, M. & DE SMET, G. (1995) : Kortteenleeuwerik (*Calandrella brachydactyla*) te Zeebrugge in juli-augustus 1993. *Mergus*, 9 : 108 - 114.
- DE SMET, G. : *Lijst van Belgische Vogels*.
- DE SMET, G. & VERCRUYSE, E. (1994) : Oostelijke Zwarte Roodstaart (*Phoenicurus ochruros* "phoenicuroides" te Zeebrugge (W). *Oriolus*, 60 : 66 - 68.
- DE SMET, G., POLLET, J. en de leden van het BAHC (1995) : Zeldzame vogels in België in 1993. *Oriolus*. 61 : 25 - 39.
- HERROELEN, P. & SEGERS, M. (1993) : Eerste waarneming van Steppekievit (*Chettusia gregaria*) in Brabant. *Oriolus*, 59 : 72.
- KING, J. (1996) : Ornithonews - Black news on eastern redstarts. *Birding World*, 9 : 244.
- LAFONTAINE, D., LAFONTAINE, R.-M., VAN DER ELST, D. & DUFOURNY, H. (1994) : Rapport de la Commission d'Homologation - Année 1992. *Aves*, 31 : 1 - 16.
- LUYCKX, B. (1993) : Een auditieve waarneming van een Krekkelzanger (*Locustella fluviatilis*) in de Schijnvallei (A). *Oriolus*, 59 : 73.
- PEERO, M., MICHIELS, G. et JACOB J.-P. (1985) : Statut des Guifettes moustac (*Chlidonias hybridus*) et leucoptère (*Chlidonias leucopterus*) en Belgique. Rappel des critères d'identification . *Aves*, 22 : 89 - 106.
- ROGERS, M.J. (1994) : Report on rare birds in Great Britain 1993. *British Birds*, 87 : 503 - 571.
- ROUSSEAU, J.-S. (1996) : Observations récentes du Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*) en Wallonie. Statut de l'espèce en Belgique et notes sur ses habitudes et son identification. *Aves*, 32 : 177 - 206.
- SEYS, J. (1993) : Ongewone influx van Zeekoeters *Uria aalge* in het binnenland (België) tijdens de winter 1992-1993 : situatieschets en achtergronden. *Oriolus*, 59 : 67 - 70.
- VERROKEN, L. & D. (1993) : Première observation d'une Bargette de Térék (*Xenus cinereus*) en Wallonie. *Aves*, 30 : 72 - 74.
- VERROKEN, L. & D. (1994) : Une observation printanière du Pipit de Richard (*Anthus richardi*) en Belgique. Son apparition printanière en Europe occidentale et les problèmes d'identification. *Aves*, 30 : 221 - 225.
- WATELET, M. (1991) : Statut de la Buse pattue (*Buteo lagopus*) en Wallonie et en Belgique. Description de l'invasion durant l'hiver 1986-87. *Aves*, 27 : 173 - 185.
- WILLEMYNS, F. & DEMEULEMEESTER, M. (1995) : Kleine Geelpootruiter (*Tringa flavipes*) te Knokke in juli 1993. *Mergus*, 9 : 20 - 25.