

# CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE :

## juillet à novembre 1993

par Jean-Paul JACOB, Emile CLOTUCHE, Didier RABOSEE,  
Pierre LOLY et François PAULUS<sup>1</sup>

Les chroniques intitulées "Observations récentes" ont pris depuis le début de 1996 le relais des anciennes chroniques Aves. Malgré un retard considérable, nous avons tenu à préparer cette chronique de fin 1993 de manière à ce que la continuité des synthèses ornithologiques soit assurée. Il en sera ensuite de même pour les années 1994-1995, avant qu'un rapport annuel de synthèse ne vienne compléter "Observations récentes" à partir de l'année 1996.

Vu le retard de parution, nous avons tenté de donner à la présente chronique une présentation assez résumée. Elle n'inclut pas les données soumises à homologation qui ont, pour la plupart, été traitées dans le rapport 1993 de la CH (Bulletin *Aves* vol. 33, 1996 : 169 - 188).

### CONDITIONS CLIMATIQUES

Juillet 1993 a connu un temps chaud et sec jusqu'au 10 (vaste anticyclone sur l'Europe), ensuite des conditions nettement plus fraîches et humides. Le temps du mois d'août fut assez normal, quoique peu pluvieux, avec un ciel modérément dégagé et des températures déficitaires surtout en fin de mois (influences polaires du 21 au 28). Ce temps assez médiocre s'est poursuivi sur une grande partie de septembre : la prédominance de courants maritimes est à l'origine d'un ciel généralement couvert, d'une météo assez fraîche et pluvieuse (23 jours avec de la pluie contre 15 en moyenne à Uccle). La première quinzaine d'octobre fut à son tour marquée par des courants perturbés (dépression centrée sur les îles Britanniques). Par la suite, des influences continentales et polaires expliquent un temps frais (première neige le 15 sur les Hauts Plateaux) et peu ensoleillé, avec des vents du secteur N à ENE anormalement fréquents. En novembre, après une profonde dépression les 10-13 (pluies et grands vents), on retient surtout le temps assez froid, ensoleillé et sec de la seconde quinzaine, agrémenté d'un enneigement général dû aux faibles précipitations des 20-22 novembre.

---

(1) Centrale Ornithologique Aves  
c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

## FAITS SAILLANTS

La fin de la période de nidification confirme entre autres l'absence du Busard des roseaux et du Blongios en tant que nicheurs, la rareté du Râle des genêts, le maintien de la Turdoïde. On notera également l'estivage du Garrot à Harchies et des observations estivales de Canards siffleurs et pilets.

De nombreux passages postnuptiaux sont considérés comme moyens à faible (divers insectivores, Tourterelle des bois, Ramier, Grue, Pluvier doré, certains bécasseaux et chevaliers, Busard Saint-Martin, Sarcelle d'hiver, oies...). Ce n'est cependant pas le cas d'oiseaux dont l'augmentation est indéniable, comme le Grand Cormoran et le Faucon pèlerin, ni celui d'oiseaux dont des afflux particuliers sont notés : Bécasseau minute, Mésange noire, Mésange à moustaches, Beccroisé des sapins. Il s'y ajoute de petits mouvements de Geais et de Cassenoix, une bonne migration du Colombin, une certaine abondance de la Crécerelle, du Martin pêcheur et de plusieurs pics. Quelques espèces fournissent de nombreuses données grâce à la meilleure attention dont elles font l'objet lors de suivis migratoires (Bruant lapon, Pipits jousselfine et à gorge rousse, Bruant ortolan...). A remarquer des séries de mentions tardives, spécialement en octobre-novembre : e.a. Cigogne blanche, plusieurs rapaces (Bondrée, Milan noir, Faucon hobereau, Busard des roseaux), Bergeronnette printanière, etc. Peu après la mi-novembre, l'arrivée du froid explique les passages ou arrivées de Foulques, Cygnes sauvages, Chipeaux, harles, Sarcelles d'hiver... l'arrivée de Butors étoilés et certaines observations particulières (Mouette tridactyle...).

Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre-Sambre-et-Meuse, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf précision utile.

## DETAIL DES OBSERVATIONS

**Plongeon arctique** (*Gavia arctica*) : 1 ex. le 04.11 aux BEH, 1 le 24.11 à Lanaye et 1 le 30.11 à Petit-Lanaye (BH, PSc, DTe). • **Plongeon catmarin** (*Gavia stellata*) : 1 ex. les 30-31.10 à Nimy, 1 les 01, 02 et 07.11 à Harchies, 1 le 21.11 à Vivegnis et 1 le 30.11 à Lanaye (JLLe, V. Caucheteur, LV, DVe, TDb, PDo, DTe).

**Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : signalé comme nicheur sur 22 sites en juillet-août et début septembre. Passage sensible en septembre avec par ex. 29 ex. le 06, 25 les 17 et 23 à Harchies (div. obs.), 17 à La Hulpe le 09 (DRa), 15 le 29 à Virelles (BPh). A partir de la mi-octobre, la plupart des observations ne dépassent pas 5 ex.; seules exceptions notables : 15 ex. le 29.10 à Obourg, 13 le 31.10 à Vielsalm, 11 le 06.11 à Oud-Heverlee et 10 le 30.11 à Lanaye (PDy, BCl, FHe, DTe). • **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : en dehors de la vallée de la Meuse, signalé comme nicheur sur 10 sites notamment en région bruxelloise, dans l'ESM et à Harchies. Maximum de 12 nichées signalées le 01.07 à Virelles, où l'on passe de 20 ex. le 17.08 à 94 le 31.08, 99 le 17.09 et 34 le 18.10 (BPh, MLm). En outre, une cinquantaine à Harchies du 20.07 au 25.10 et 27 à 40 ex. du 15.08 au 02.10 à Oost-Maerland. Notons 70 ex. le 11.10 aux BEH, qui accueillent un record absolu pour le site avec 200 ex. le 20.11 (JLoC). • **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : 5 observations : 1 ex. sur la Semois à Chiny le 01.08, 1 les 30.08 et 11.10 aux BEH, 1 à Hofstade le 16.10 et 1 le 28.11 à Obourg (MJa, MLm, JLoC, GWi, AMI). • **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : séjour prolongé à Virelles avec 3 ex. le 25.07, 2 le 13.08 puis 2 à 6 ex. en septembre (BPh, MLm), à Eghezée avec 1 ex. du 29.07 au 11.08 puis du 29.08 au 02.09 (AJr, LWa, PLI, CFa) et à Harchies avec 2 imm. les 04 et 10.07, 3 les 20-21.07 et 2 imm. les 22-23.07 (PJe, HDu, JLLe). A Warcoing, 1 couple le 26.08, 1 ex. le 07.09 et un autre le 11.09 (JBL, X. Vandevyvre) et à nouveau 1 ex. du 03 au 10.10 à Eghezée.

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : aux petits groupes d'estivants régulièrement mentionnés en juillet-août en Brabant, Hainaut et Basse Meuse s'ajoutent quelques vagabonds notés dans "toutes les régions" : maxima de 22 ex. à Ganshoren le 21.07 (JLa), 15 à Harchies le 20.07 (PJe), 11 à Chertal le 05.08 (FDo). Dès fin août, on observe des troupes plus nombreuses : 95 ex. aux BEH le 30.08 (MLm) et 50 ex. à Hermalle-sous-Argenteau le 31.08 (PLu). Le passage s'accroît durant les mois de septembre et surtout d'octobre avec des groupes de plusieurs centaines d'individus : 300 ex. à Virelles le 10.10 (JPF), 319 ex. à Mazée le 15.10 (LWa), 175 ex. à Harchies le 17.10 (F. Vrijens), 137 ex. à Ben-Ahin le 27.10 (FRu), 200 ex. le 02.11 à Harchies (TDb). Fin octobre et courant novembre, les hivernants présents sur les sites habituels d'hivernage comptent jusqu'à 400 ex. au dortoir de Chertal le 31.10, 232 ex. à celui de Gives le 7.11 et 489 ex. le 28.11 (PLI). Le 24.11, 850 ex. survolent Liège (DTe).

**Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : l'espèce est présente à Virelles à partir de la 2ème quinzaine du mois d'août (BPh, MLm) et à Harchies pendant toute la période (max. 4 le 20.11 à Pommeroeul - PJe). Ailleurs, 1 ex. à Roly le 20.11 et à Rosières le 20.11 (MLm, HDU, BC). • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : signalé partout, généralement pas plus de 5 à 10 ex. ensemble, durant l'été et le début de l'automne; le 17.07 la colonie de Vivegnis compte encore 78 individus (adultes et jeunes confondus). Une tentative de nidification à Nismes (MLm). En septembre, max. 61 ex. le 06 à Harchies (PJe). Fin octobre et courant novembre, certains sites sont occupés par plus de 50 individus : 65 ex. à Gaurain-Ramecroix le 25.10 (ECu), 54-65 ex. à Virelles fin octobre puis 83 ex. le 01.11 et 86 ex. le 04.11 avant de tomber à moins de 30 dans les semaines suivantes (BPh, MLm). Pour le reste des régions, les observations sont nombreuses mais les groupes ne dépassent guère 20 individus. • **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : 1 ex. à Romedenne le 27.08 (JMg) et à Fleurus le 12.09 (JBI). • **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : environ 50 mentions témoignent de la présence régulière de l'espèce en Ardenne luxembourgeoise. En dehors de ces zones habituelles, plusieurs observations dans des régions limitrophes comme le Condroz ou l'ESM : 1 ex. à Natoye le 03.07 (RLI), 1 ex. à Tohogne le 22.07 (YF), 1 ex. à Havelange le 06.08 (A. Thewis), 1 ex. à Freyr le 18.08 (M. Dufréne), 2 ex. à Roly le 26.08 (MLm), 1 ex. à Virelles le 13.09 (BPh) et 1 ex. à Nismes le 24.09 (MLm). Au nord de la Meuse : 3 ex. à Harchies le 20.07 (PJe), 1 ex. à Woluwe-Saint-Pierre le 14.08 et 4 ex. à Uccle le 19.08 (SC et Gierst). Dernières observations le 17.10 : 1 ex. à Mellet et 1 ex. à Tirlemont (JBI, A.). • **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : 24 mentions à partir de la fin juillet, la plupart à l'est du sillon Sambre-et-Meuse; la majorité concernent des individus isolés ou des petits groupes comprenant jusqu'à 6 ex. (6 obs. de plus d'un individu). Font exception : 20 ex. passent la nuit du 13 au 14.08 à Pommeroeul (in OHO) et 30 ex. à Presgaux le 18.08 (AMo). De façon anormale, du moins pour les populations sauvages, la moitié des mentions se concentrent sur la seconde moitié d'octobre et le mois de novembre avec une dernière observation d'1 ex. à Neufchâteau le 29.11 (JMo).

**Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) : 4 ex. les 27-28.10 puis régulièrement 2-3 jusqu'au 20.11 à Harchies (C. Auverlot, DV *et al.*). • **Cygne sauvage** (*Cygnus cygnus*) : premier hivernant à Roly-Virelles le 18.11 puis 4 ex. le 25 (BPh, MLm, JLoC), 2 le 07.11 à Harchies (TDb). • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : une première mention très précoce de 3 ex. en vol le 14.08 à Stavelot (R. Rahir) puis 1 ex. posé le 06.09 aux décanteurs de Genappe (CLb); 15 Oies sp., sans doute des cendrées, en vol le 27.09 à Saint-Gilles (J. Gersmeyer). La migration démarre, plus classiquement, le 08.10 avec 200 ex. à Mouscron (TDb); bien marqué jusqu'au 24, le passage reste globalement assez peu fourni et même assez réduit en novembre, où il n'est pratiquement plus noté qu'en Hainaut occidental. Rarement plus de 100 ex., maximum de 330 le 19.10 à Mouscron (TDb). • **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) : 61 en vol le 13.10 à Louvain-la-Neuve (GN), 25 en vol le 04.11 à Hologne-sur-Geer (T. Petitjean), 6 ex. à Roly du 05 au 28.11 (MLm) et 1 ex. le 21.11 à Hermalle-sous-Argenteau (DTe). • **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) : 5 ex. en halte le 28.11 à Hermalle-sous-Argenteau (DTe). • **Ouette**

**d'Égypte** (*Aloochen aegyptiacus*) : les observations commencent à se multiplier en Brabant; couples installés ou nidifications signalés en juillet-août à Maransart, Auderghem (Rouge-Cloître), Genappe et Chaumont-Gistoux (CPE, FHe, FHu, JDe). Hors Brabant, 1 ex. le 09.08 à Harchies, 2 ex. à Seneffe le 17.10 et 3 le 01.11, 2 ex. à Virelles le 21.10, 1 ex. le 11.11 à Waremme et 1 ex. le 21.11 à Vaulx-lez-Tournai (ST, BPh, T. Petitjean *et al.*). • **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : plus de 100 données mais qui ne concernent le plus souvent que 1-6 ex. et sont concentrées sur peu de sites différents, notamment plusieurs bassins de décantation. A sortir du lot, 1 couple avec 2 jeunes le 01.07 à Oost-Maarland (PDo), 19 ex. en migration le 22.08 à Havay (PDy) et 7 ex. en migration à Liège le 22.11 (DTe).

**Canard mandarin** (*Aix galericulata*) : observé en région bruxelloise et en Brabant sur 4 sites avec pour maximum 13 ex. le 20.10 à Auderghem (Rouge-Cloître); ailleurs, 1 ex. le 24.11 à Herstal (FHe, DTe). • **Canard siffleur** (*Anas penelope*) : en été, 1-3 ex. les 20-25.07 et le 01.09 à Harchies (PJe *e.a.*). Ensuite, apparition en très petit nombre à partir de début octobre. Harchies compte 10 ex. le 20.10 tandis que Virelles accueille 10-15 ex. du 28.10 au 09.11 (HDu, BPh, MLm). Apparition de 10 ex. aux BEH le 20.11 puis 40 ex. le 25.11 (JLoC). • **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : 3 données en juillet, 8 en août dont 13 ex. à Zemst (GWi, SHt) et 5 en septembre. En automne, on compte maximum 20 ex. le 16.10 à Virelles, 21 le 31.10 à Roly, 15 le 14.11 à Oost-Maarland et 12 le 20.11 aux BEH (MLm, DTe, PLI, JLoC). Petits nombres en Hainaut occidental, sauf lors du passage dû au froid de novembre : max. 119 ex. le 19, 94 le 21 et 35 le 23 à Hensies, 43 ex. le 28 et 25 le 21 à Harchies où l'espèce a disparu dès le 29.11 (PJe, HDu *et al.*). • **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : signalée sur 6 sites en juillet et plus de 40 pour le reste de la période. Classiquement, passage moyen de mi-août à fin septembre avec comme maxima 103 ex. le 06.09 à Harchies (div. obs.) et 106 ex. le 09.09 à Waremme (PLu). Le passage s'intensifie à partir de début octobre avec notamment 102 ex. le 02.10 aux Marionville et 250 le 06.10 à Harchies (DMt, RTö). En novembre, Waremme accueille le plus grand nombre d'oiseaux : 100 ex. du 01 au 17, 243 le 21 et 127 le 27 (T. Petitjean, PLI). Faible présence dans l'ouest du Hainaut (max. au moment du coup de froid : 84 ex. le 20.11 à Harchies, 74 le 21 aux Marionville et 62 ce même 21.11 à Brugelette (C. Auverlot, DMt, JLLe). Notons également 110 ex. le 04.11 à Virelles (BPh). • **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : encore 1 femelle au nid le 07.08 à Thommen. Quelques sites accueillent plusieurs centaines d'ex. dès juillet-août mais il s'agit dans certains cas de lâchers massifs en vue de la chasse. A Virelles, l'effectif passe de 200 ex. le 17.08 à 550 le 30.08, retombe à moins de 200 mi-septembre et remonte à 650 fin octobre-novembre (MLm, BPh). En automne, trois sites (Waremme, Les Marionville et Latour - T. Petitjean, DMt, BMo) dépassent 300 ex. et quatre 500 ex. avec pour maxima : 530 le 16.10 à Tournai, 512 le 24.10 à Brugelette et 1.100 le 20.11 aux BEH (JLLe, JLoC). • **Canard pilet** (*Anas acuta*) : observé sur 14 sites dont un premier ex. dès le 16.07 à Virelles (BPh), 4 le 06.09 et 1 le 23 à Harchies (OHO) et 2 le 12.09 à Seneffe (JMCh). Noté régulièrement aux Marionville dans la dernière quinzaine d'octobre (DMt). Maximum de 17 ex. le 19.10 à Roly (MLm). En novembre, 16 données dont au plus 5 ex. le 14.11 à Hermalle-sous-Argenteau (PLI). • **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : aucune preuve de nidification. Signalée sur 4 sites en juillet, notamment à Harchies, qui est le seul montrant le début du passage post-nuptial en passant de 6 ex. le 16.07 à 26 le 20 et 22 le 23 (C. Auverlot, PJe). En août, observée seulement sur 9 sites avec des nombres variant de 1 à 9 ex. maximum. Trois données en septembre et une dernière le 15.10 à Roly (MLm). • **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : très faible passage en juillet et légère augmentation des données en août avec pour maxima 45 ex. le 27.07 à Harchies et 45 le 21.08 à Virelles. (C. Auverlot, BPh). Les mois de septembre, octobre et novembre montrent un passage régulier dans toutes les régions situées au nord et à l'ouest de la Meuse mais sans tendance locale ou temporelle particulière. Maxima locaux : 60 ex. le 13.09 à Virelles, 135 le 15.10 à Harchies, 124 le 17.10 aux Marionville, 81 le 24.10 aux décanteurs de Brugelette (BPh, DMt, JLLe, GWi, SHt).

**Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : en juillet, des familles sur 6 sites dont 32 ad. et 24 jeunes à Neerijse, 3 nichées à Grand-Leez, 1 femelle et 11 juvéniles à Virelles. En août, 2 femelles et 6 poussins à La Hulpe (FHe, LWa, BPh). Observé sur 11 autres sites en juillet-août avec pour maximum 220 ex. le 31.08 à Virelles. En septembre, Virelles accueille la plus forte concentration : 250 ex. le 11 et 521 le 29 (BPh). Apparition à partir de mi-septembre sur les sites d'hivernage de Basse-Meuse, où l'effectif atteint 380 ex. le 17.10 et passe à 2.043 le 21.11 (nbx obs.). Ailleurs, notons en octobre des maxima de 123 le 20 à Harchies, 147 le 24 à Neerijse, 842 le 28 à Virelles et en novembre de 350 le 01 et 190 le 03 à Roly, 350 le 20 aux BEH et 133 le 28 au Bassin Vergote à Bruxelles (HDu, FHe, BPh, MLm, JLoC, DRa). • **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : signalé en juillet-août comme nicheur sur 9 sites dont 38 ad. et 27 poussins le 02.07 à Neerijse (FHe). En septembre, les seules concentrations sont notées sur les sites de nidification dont 72 ex. le 05 à Neerijse et max. 89 ex. le 29 à Virelles (FHe, BPh). Il faut attendre début octobre pour voir arriver les premiers hivernants, notamment en Basse-Meuse où sont recensés 86 ex. le 17.10 et 320 le 21.11. En octobre-novembre, en dehors de Virelles où sont présents 98 ex. le 08.10, 117 le 19 et 155 le 28, rares sont les groupes dépassant la cinquantaine d'ex. : 60 ex. les 29.10 et 19.11 à Zemst, 60 le 30.10 à Roly, 55 le 11.11 à Gives et 120 le 20.11 aux BEH (GWi, SHt, MLm, PLI, JLoC). • **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) : 1 femelle très précoce du 10 au 29.09 à Harchies (PJe, C. Auverlot). En dehors d'un ex. les 20 et 25.11 aux BEH (JLoC), toutes les observations sont faites en Meuse : premier ex. le 17.10 à Hermalle-sous-Argenteau, 1 le 02.11 à Wanze, 1 les 11 et 20 à Bas-Oha, 1 le 17 à Oost-Maarland, 3 le 27 à Ahin; 13 le 14, 7 le 17 et 2 les 21 et 30 à Lanaye (PDo, PLI, DTe, CFa, RDm). • **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : 2 femelles le 19.10 à Harchies et 3 femelles le 18.11 à Obourg (HDu, C. Altruy). • **Garrot à œil d'or** (*Bucephala clangula*) : 1 femelle estivale à Harchies (premier cas régional) où 1 mâle imm. arrive le 26.08 et reste jusqu'en octobre; à nouveau 1 femelle les 06.09 et 03.10 puis progressivement jusqu'à 7 ex. en fin de mois et en novembre (nbx obs.). Séjour de 1-2 ex. du 26.10 au 05.11 à Roly (MLm). Ailleurs, 14 données pour 11 sites de mi-octobre à fin novembre avec au plus 7 ex. le 20.11 aux BEH, 3 le 24 à l'Ile Monsin et 3 le 28 à Amay (JLoC, DTe, PLI). • **Harle piette** (*Mergus albellus*) : 4 données, toutes en novembre : 1 ex. les 23 et 28 à Hermalle-sous-Argenteau, 3 le 25 aux BEH et 4 le 30 à Petit-Lanaye (DTe, BH, JLoC). • **Harle huppé** (*Mergus serrator*) : 4 ex. le 20.11 aux BEH (JLoC). • **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : en octobre, des isolés les 27 et 30 à Harchies et le 31 à Virelles (C. Auverlot, HDu, BPh). En novembre, apport et passage dus au froid : les BEH accueillent 28 ex. le 20 et 40 le 25 (JLoC); ailleurs, apparition à partir du 11 : 1 ex. les 11, 12 et 17 à Roly, les 14 et 21 à Hermalle-sous-Argenteau, le 20 à Zemst, le 27 à Oost-Maarland et Waulsort, 4 ex. le 16 à Virelles, 2 le 20 à Gaurain-Ramecroix, 2 le 30 à Lanaye et de 1 à 16 tout le mois à Harchies (MLm, PDo, DTe, BPh, OHe, A-M Fouarge). • **Erismature rousse** (*Oxyura jamaicensis*) : 1 ex. les 07 et 15.11 aux Marionville (AMI, DMt).

**Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : plusieurs observations estivales en Dyle ainsi qu'à Frasnes-lez-Buissenal le 21.07 (ECu), à Eghezée le 23.07, à Grand-Leez le 01.08 (LWa) et à Boistfort les 01-08.08 (MNi). La migration est assez discrète en août-septembre avec une dernière observation normale le 02.10 à Jalhay (LSc) et une mention très tardive : 1 ex. le 27.10 à Harchies (C. Auverlot). Les observations ne comptent guère plus de 4-6 ex. à la fois avec une majorité d'individus isolés; cependant, le 14.08, 14 ex. sont notés à Aye (APd). • **Milan noir** (*Milvus migrans*) : en juillet, l'espèce est observée dans le sud Luxembourg, à Virelles et dans l'est de la province de Liège. Une tentative de nidification échoue à Virelles (MLm). A partir de septembre seulement 4 mentions dont 9 ex. en migration le 03.10 à Mageret (JCL) et une dernière observation, tardive, le 02.11 à Neerijse (D. Crickillon). • **Milan royal** (*Milvus milvus*) : quelques données de juillet - août au Luxembourg et dans l'est de la province de liège concernent des nombres élevés : 10 ex. à Ambève le 02.07 (NPa), 6 ex. à Limerlé le 21.07 (YBt) et 6 ex. à Wardin le 15.08 (RDt). La migration d'automne, peu spectaculaire, voit passer essentiellement des individus isolés ou des petits groupes de 2 à 4 ex. Quelques

exceptions : 10 ex. à Remagne le 05.09 et 15 ex. à Freux le 08.09 (MWt). En dehors de la zone la plus habituelle d'observation de l'espèce, une dizaine de données, toutes d'isolés, provenant essentiellement du Hainaut et concentrées entre le 10 et le 27.10, sauf le 02.09 à Harchies (RTo) et le 24.11 à Saive (HT). • **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : aucune donnée de nidification obtenue cette année; à part 3 fois 1-2 immatures estivants signalés en Hesbaye liégeoise par LG, seulement 4 observations en juillet. Ensuite, 50 mentions en août, 86 données en septembre et 35 en octobre. Toutes ont été faites au nord et à l'ouest de la Meuse (Hesbaye, Brabant, Hainaut et ESM) hormis 13 mentions en province du Luxembourg, presque toutes en Famenne. En général des isolés ou pas plus de 3 ex. ensemble; quelques exceptions : 8 ex. le 08.08 et 7 ex. le 18.09 à Fleurus (JBI), 4 ex. à Virelles le 08.10 (BPh) et 5 ex. à Martilly le 10.10 (MWt). Les derniers migrateurs sont observés le 17.10 à Mazée (LWa) et le 17.11 à Harchies (C. Auverlot). • **Busard Saint Martin** (*Circus cyaneus*) : aucune donnée pour juillet puis 7 observations en août : Saint-Léger (Ht) et Angreau le 1er, Havay, Harchies, Mazée et Spa-Malchamps à partir du 23 (HDu, PDy, RTo, TDe, JCL). 17 données en septembre puis augmentation en octobre avec 60 observations, principalement à partir de la fin de la première décennie; légère diminution en novembre avec 43 mentions. Dans l'ensemble, l'hivernage s'annonce assez modeste. • **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : seulement 3 mentions : 1 ex. en vol le 14.07 à Torgny (GRa), 1 ex. à Watermael-Boisfort le 21.08 (MNI) et 1 juv. le 10.10 à Seneffe (PJe). • **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : de nombreuses mentions au sud du sillon Sambre et Meuse et une quinzaine en Brabant (Berthem, Auderghem - Rouge-Cloître, Watermael-Boisfort, Sterrebeek), Hainaut (Mouscron, Angre, Frasnes-lez-Buissenal, Donstiennes, ...) (FHe, MNI, OHe, TDb, ECu, BH *et al.*) ainsi qu'à Spy (05.08 - LWa). • **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : migration visible à partir de début septembre, surtout en octobre avec notamment 80 migrateurs notés au cours du mois à Mariembourg (MLm). • **Busc variable** (*Buteo buteo*) : en migration, jusqu'à 71 ex. à Mazée le 17.10 (LWa). Des données de densité d'hivernants mentionnent jusqu'à 63 ex. sur un trajet de 25 km dans la région de Villers-en-Fagne les 03 et 05.11 (J&N).

**Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : 1 estivant à Harchies à partir du 10.07 (JLLe, C. Auverlot, PJe). La migration s'amorce début août avec un premier ex. le 06 à Virelles; elle semble culminer entre le 26.08 et le 20.09 mais l'accumulation de données sur certains sites, plus particulièrement Harchies et Virelles-Roly, complique les décomptes. Relevons notamment 3 ex. à Virelles les 04 et 11.09 (BPh, MLm) et à Freux du 03 au 09.09 (MWt). La migration se termine en octobre avec 13 données dont la dernière le 29 à Lierneux (MDe).

**Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : LG renseigne une bonne reproduction de l'espèce en Hesbaye liégeoise. Concernant la migration, MWt signale le passage de 29 ex. en une matinée à Martilly le 10.10. Présence importante en fin d'automne en Fagne-Famenne, Condroz et Hesbaye (15 ex. sur environ 30 km<sup>2</sup> en novembre à Bossière - LWa). • **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : 62 données en septembre et octobre, les premiers le 06.09 à Chapon-Seraing, le 11.09 à Havay et le 12.09 à Matagne-la-Petite (PLI, PDy, MLm). Le pic de passage se situe entre la fin septembre et la troisième décennie d'octobre, moment où les observations sont quasi journalières. A partir du 20.10, seulement 15 observations. • **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : R. Jacquet signale un couple cantonné au Rouge-Cloître (Auderghem) le 07.08, mais aucun jeune vu. Deux données de nidification sûres en Ardenne, à Remagne et Bom (MWt, NPa). Quelques migrateurs sont notés en juillet et août avec max. 5 ex. ensemble le 21.08 à Mouscron (TDb). La migration s'intensifie fin août et courant septembre avec max. 5 ex. le 22.09 et 4 ex. le 10.10 à Virelles (BPh, JPF). Les derniers sont observés le 23.10 à Ganshore (JLa) et le 01.11 à Havay (PDy), ce qui est tard. • **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : 45 mentions d'isolés pour la période, dont 2 en juillet (Roly le 16 et Donstiennes le 23 - A. Van Hoovels, J. De Meirsmen, BH). La majorité de ces observations se situent au nord et à l'ouest de la Meuse; font exception : Erezée le 29.08 (J&N), Butgenbach le 29.09 (NPa) et Eupen le

16.10 (LSc). On notera les mentions à Bruxelles les 11.09 et 25.11 (J. Gersemeter, OHe), ainsi que la capture d'une corneille par un adulte le 18.09 à Blaton (PS).

**Gelinotte des bois** (*Bonasa bonasia*) : 1 ex. le 10.07 à Bertrix (TDb). • **Tétras lyre** (*Tetrao tetrix*) : 9 observations de 1 à 4 ex. à Malchamps entre le 28.07 et le 11.11 (JCL). • **Perdrix grise** (*Perdix perdix*) : quelques observateurs font état de bons résultats de la nidification; seulement deux données au sud du sillon Sambre et Meuse, peut-être dues à des lâchers : 2 ex. le 06.09 à Silenrieux et 9 ex. le 04.11 à Jamagne (MLm, JMg). • **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*) : une dernière observation le 14.09 à Waterloo (D. Etienne).

**Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : données estivales (juillet) à Genval (réserve LRBP), Virelles, Harchies et Pommeroeul (MLm, FHe, Cl Auverlot, PJe). Des migrateurs et hivernants sur l'ensemble des sites habituels à partir d'août avec un maximum de 8 ex. à Harchies le 25.10 (HDu). • **Râle de genêts** (*Crex crex*) : année à faible effectif avec seulement 7 territoires localisés en Fagne (voir la synthèse de Ph. Ryelandt in Aves 32 : 1-33). • **Poule d'eau** (*Gallinula chloropus*) : parmi les données éparses concernant la nidification, 8 nichées à Virelles et 8 à Chertal (BPh, FDo) et deux à Grandhan, sur l'Ourthe, où l'espèce est devenue très rare (YF). • **Foule macroule** (*Fulica atra*) : des poussins sont encore observés le 20.8 à Vilvorde (RF). Des concentrations post-nuptiales sont notées dès juillet : 200 ex. le 10.07 à Roly (MLm), 478 ex le 20.07 à Harchies (PJe). En automne, un pic de passage lié aux premiers froids est révélé par 1.378 ex. le 19.11 à Harchies (HDu) et 500 ex. le 20.11 aux BEH (JLoC).

**Grue cendrée** (*Grus grus*) : une donnée en dehors de la période normale : 8 ex. le 25.08 à Mariembourg (TDe). La migration s'amorce dès le 30.09 (6 ex. à Aineffe - LG) et le 01.10 (250 ex. à Dampicourt - O. Lepage). Plus de 120 données à partir de cette date; du 14.10 au 02.11, des données quasi journalières dont 23 pour la seule journée du 19.10. Les vols les plus importants comptent 250 ex. à la Reid le 19.10 (RDm), 220 ex. à Jupille-sur-Ourthe le 19.10 (DVi) et 230 ex. à Virelles le 02.11 (AJr). Toutes les observations se situent au sud du sillon Sambre-et-Meuse à l'exception de 4 ex. à Neerijse le 24.10 (FHe), 60 ex. le 02.11 à Mons (DV), 62 ex. le 02.11 à Nouvelles (PDy) et 4 ex. le 21.11 à Péronnes-lez-Antoing (BDu, JMB).

**Huitrier pic** (*Haematopus ostralegus*) : 1 ex. le 09.08 à Roly (MLm). • **Avocette** (*Recurvirostra avosetta*) : 1 ex. le 25.11 aux BEH (BH, JLoC).

**Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*) : nicheur à Genappe (une douzaine d'ad. présents fin juin), Eghezée-Longchamps (idem), Waremmes, Hollogne-sur-Geer, Gastuche (au moins 3 couples), Chertal, Taviet et Chabrehez (plateau des Tailles) (Gr. Gen., AJr, LWa, PLI, GRt, FDo, FH, MJV). • **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : passage post-nuptial discret du 18.07 au 24.09 avec des maxima de 3-4 à Eghezée-Longchamps, de 13 le 05.09 à Genappe et de 4 le 28.09 à Hollogne-sur-Geer (AJr *et al.*, Gr. Gen., CFa). Encore 1 ex. le 05.10 à Warcoing (JBL) et le 19.10 à Harchies (HDu); en Ardenne, 1 le 10.09 à Freux (MWt). • **Gravelot à collier interrompu** (*Charadrius alexandrinus*) : 1 ex. à Gaurain-Ramecroix le 17.10 (C. Altruy). • **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : passage automnal insignifiant après un premier ex. dès le 29.08 à Havay (PDy); le plus souvent pas plus de 2-5 ex. sauf 35 le 05.10 à Gembloux (CRo) et 3 groupes de 10-20 les 11, 12 et 22.11 à Angre, Seneffe et Chapon-Seraing (HDu, PJe, PLI). • **Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : migrateurs isolés en vol les 27.08 et 01.10 à Havay, le 18.09 à Angre et 1 posé le 27.09 à Chapon-Seraing (PDy, HDu, PLI). • **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : les mouvements et stationnements post-nuptiaux, notés surtout en Haute Belgique en juillet, augmentent en importance à partir de la fin août et ce sont alors les plaines céréalières de Hainaut et Hesbaye qui accueillent ou voient passer les plus grands

groupes : 700 ex. le 04.09 à Eghezée-Longchamps, 600 le 12 à Givry, 2.500 le 15 à Lens-sur-Geer, 1.450 le 22 à Angre, 1.500 le 30 à Seneffe, 1.200 le 28 aux Isnes où un dortoir de  $\pm 1.500$  ( $\pm 500$  en journée) est occupé jusqu'à début novembre... (AJr, PDy, PLu, HDu, PJe, LWa). La migration proprement dite est signalée surtout à partir de la fin septembre, avec des pics de passage les 29 et 30.09 à Angre et Seneffe (HDu, PJe), le 15.10 à Havay (PDy), le 22.10 à Chapon-Seraing (PLI), le 30.10 à Seneffe (PDy); la diminution est assez brutale en novembre mais quelques groupes s'attardent ou passent jusqu'en fin de mois.

**Bécasseau maubèche** (*Calidris canutus*) : 1 ex. le 04.09 à Zemst (GWi, SHt) et 1 juv. du 06 au 11.09 à Genappe (CLb, FHu). • **Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : 2 ex. à Eghezée-Longchamps le 22.09 (PLI). • **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : passage important. Un premier ex. dès le 21.07 à Eghezée-Longchamps; parfois accompagné d'un deuxième (en supposant qu'il s'agit du ou des mêmes oiseaux), il est noté régulièrement jusqu'au 1.08, plus irrégulièrement ensuite (AJr, SBc, LWa...); 2 ex. aussi le 01.08 à Genappe. Sinon le passage se développe à partir de la fin août et culmine entre le 05 et le 21.09. A Genappe, 9 ex. du 01 au 03.09, 15 le 07, 18 le 08, 11 le 13, 13 le 15; à Eghezée, 39 le 10, 36 le 11, 62 le 12, 35 le 15, 37 le 16 et diminution jusqu'à 5 le 29 (Gr. Gen., AJr, LWa, SBc...). Troisième site bien fréquenté, Hollogne-sur-Geer avec 5 ex. le 30.08, 7 les 09 et 10.09 et 8 le 11 (PLI, CFa). Une dizaine d'autres sites sont mentionnés; en Hainaut, seul Gaurain-Ramecroix sort légèrement du lot avec un maximum de 6 ex. le 08.09 (JLLe). • **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : 1 ex. du 29.07 au 01.08 à Eghezée-Longchamps (LWa, AJr, PLI) et 1 ex. à Hollogne-sur-Geer les 02-03.09 (PLI). • **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : très régulièrement 1-3 ex. à Eghezée-Longchamps du 22.07 au 21.09 et 4 ex. le 25.07 (AJr, LWa, SBc, CFa...); beaucoup plus discret à Genappe avec 1-2 ex. du 05.02.09 (Gr. Gen.); bien que moins régulier à Hollogne-sur-Geer, à partir du 16.08, il y culmine avec 12 ex. le 30.08, 9 le 02.09, 7 les 09-11 et termine avec 1 ex. le 28.09 (PLI, CFa). Un seul autre site : 2 ex. le 31.08 à Gaurain-Ramecroix (GPh). • **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : passage discret à partir de début août, un peu plus fourni en septembre et se prolongeant jusqu'à la mi-octobre; maxima de 5 ex. les 06-08.09 à Genappe et 10-11 ex. les 21-22.09 à Eghezée-Longchamps; très peu en Hainaut, par contre 1 ex. du 02 au 10.10 à Freux (MWt). • **Combattant** (*Philomachus pugnax*) : passage assez important à partir du 01.07 : en Hainaut, notamment 15 ex. le 08.07 aux Marionville et 32 ex. le 16 à Escanaffles (DMt, ECu). A Eghezée-Longchamps, présence quasi permanente de quelques ex. avec un premier pic à 38 ex. le 19.07 et un second à 28 ex. le 19, 32 le 21 et 24 le 22.09 puis brusquement plus rien (AJr, PLI, LWa, CFa...). A Genappe, régulièrement 1 à 10 ex. en juillet, jusqu'à 18 vers le 10.09, encore 2 le 03 et 1 le 04.10 (Gr. Gen.). Dernières mentions le 09.10 à Angre et le 16.10 à Brugelette (HDu, JLLe). • **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : première le 02.10 à Butgenbach puis 6 mentions à partir de fin octobre à Mouscron, Harchies, Nismes, Mariembourg et Petit-Lanaye. • **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : très nombreuses mentions mais rarement des groupes importants et aucun pic de passage ne se dégage nettement : 20 ex. dès le 18.08 à Genappe, pas plus de 10 ensuite, 15 le 02.10 à Mouscron, 30 le 16.10 à Tamines, 25 le 27.10 à Virelles, 15 le 27.10 à Nismes, 16 le 16.11 à Harchies (Gr. Gen., TDb, LWa, BPh, PJe). • **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : une trentaine d'observations indiquent un passage surtout après la mi-octobre. • **Barge à quercu noir** (*Limosa limosa*) : très faible passage : 1 ex. le 07.07 à Genappe, 3 ex. du 13 au 31.07 puis 2 le 01.08 à Eghezée-Longchamps, 5 ex. le 16 et 6 le 24 à Escanaffles, 2 le 16.07 à Harchies et 1 le 31.08 à Zemst (LWa, AJr, ECu, JLLe, GWi, SHt). • **Barge rousse** (*Limosa lapponica*) : 1 ex. en vol le 29.08 à Havay (PDy). • **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : 23 ex. le 31.07 à Angre (HDu). • **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : une quinzaine d'observations de 1 à 4 ex., la moitié en vol, principalement de fin juillet à début octobre mais 1 ex. le 01.07 à Hollogne-sur-Geer et 2 le 03.11 à Corroy-le-Grand (PLI, CRo). • **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : passage discret de mi-août à mi-septembre puis un attardé le 25.11 aux BEH (BHh). • **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : passage insignifiant : sans doute



pas plus de 20 ex. renseignés, sur 7 sites différents, principalement début septembre; maximum 5 ex. le 19.09 à Mouscron (TDb). • **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*): extrêmement bien répandu (plus de 150 mentions) mais le plus souvent en isolés ou assez petits groupes, de début juillet à mi-septembre, ensuite encore quelques isolés jusqu'au 03.10 à Genappe (CLb) et le 12.11 à Virelles (MLm). Un vol de 50 ex. le 29.07 à Achène-Taviet (FH), maxima de 14 à 32 ex. à Eghezée-Longchamps entre le 06 et le 17.08 (AJr, LWa, PL...) et de 10 ex. le 01.09 à Genappe (Gr. Gen.). • **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*): encore plus répandu que le précédent (plus de 200 mentions) et souvent en groupes un peu plus importants. Sa présence encore bien marquée localement en juin, notamment à Genappe (régulièrement plus de 5 et jusqu'à 19 le 24) masque le début du passage post-nuptial, qui se prolonge au moins jusqu'à la mi-octobre et quelques attardés sont renseignés jusqu'à fin novembre. Les maxima locaux sont généralement enregistrés entre mi-juillet et début septembre: 18 le 16.07 à Escanffles, 15 le 19 et 13 le 26.07 à Waremme, 10 le 19 à Eghezée-Longchamps, 30 les 01 et 12.08, 12 le 01.09 à Genappe (ECu, PLI, Gr. Gen.). • **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*): passage relativement bien fourni pour cette espèce souvent moins fréquente que d'autres chevaliers; augmentation lente dès début juillet, maximum entre mi-juillet et mi-août, puis quelques attardés jusqu'à fin septembre: maxima de 6 ex. le 16.07 à Escanffles, régulièrement plus de 5 du 16.07 au 13.08 et jusqu'à 17 le 29.07 à Eghezée-Longchamps (ECu, LWa, PLI, CFa...). • **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*): classiquement le chevalier le plus répandu et le plus abondant à cette saison (environ 300 mentions) de la fin juin à la mi-septembre, ensuite quelques attardés jusqu'à mi-octobre. Le pic de passage a lieu de mi-juillet à mi-août et les groupes de plusieurs dizaines d'ex. ne sont pas rares sur les sites les plus favorables: 31 le 16.07 à Escanffles (ECu), régulièrement plus de 50 entre le 16.07 et le 16.08, notamment 78 le 30.07 et 83 le 01.08 à Eghezée-Longchamps (LWa, AJr, PLI, CFa...), 35 le 19.07 à Hollogne-sur-Geer (PLI), 25 le 02.08 à Virelles (MLm), 34 le 13.08 et 55 le 14 à Genappe (Gr. Gen.)... • **Tournepiere à collier** (*Arenaria interpres*): 1 ex. à Harchies le 30.09 et du 15 au 18.09 à Eghezée-Longchamps (AJr, CFa).

**Mouette pygmée** (*Larus minutus*): 1 juv. le 08.08 à Eghezée-Longchamps (LWa) et le 14.09 aux BEH (JBI). • **Mouette ricuse** (*Larus ridibundus*): pas de grands dortoirs signalés, au plus 1.000 - 1.500 à Ampsin, 1.000 - 2.500 à Gaurain-Ramecroix et, en novembre, un millier au prédortoir de Virelles. • **Goéland cendré** (*Larus canus*): hors Meuse et Haine, noté à Eghezée-Longchamps et Genappe en été. Quelques migrateurs à partir du 10.10. En novembre, arrivées en partie dues au froid; au plus 35 le 20 à La Hulpe et 80 le 28 à Visé (BC, DTe). • **Goéland marin** (*Larus marinus*): 1 ex. le 02.11 à Mouscron (TDb) et le 30.11 à Harchies (PJe *et al.*). • **Goéland brun** (*Larus fuscus*): 1 ex. le 31.07 à Elsenborn (NPa). En Hesbaye occidentale, observations régulières à Eghezée-Longchamps. Plus petits nombres en Meuse et aux abords de la vallée, notamment 49 le 14.08 à Oost-Maarland et 64 le 05.09 à Chapon-Seraing (PDo, PLI). Dans l'ESM, le dépotoir d'Erpion en attire au plus 650 le 29.08 et encore 185 le 11.10 (JLoC); en novembre, 120 sont présents le 12 aux BEH. Aucune concentration n'atteint la centaine en Hainaut occidental. • **Goéland leucophée** (*Larus cachimans*): 1 ex. le 18.07 à Virelles (BPh), 30 ex. le 15.08 et 11 ex. le 03.10 à Hermalle-sous-Argenteau (PLu, PDo), 4 ad. le 02.11 à Lanaye (DTe); quelques données de l'ouest du Hainaut dont le 29.09 à Gaurain-Ramecroix, 1 ad. qui avait été bagué comme jeune de première année le 15.07.1984 à Nieupport. • **Goéland argenté** (*Larus argentatus*): aucun rassemblement important: au plus 100 le 20.11 à Hermalle-sous-Huy (CFa), 150 le 07.09 à Wauthier-Braine et 400 le 28.11 au canal de Charleroi à Grimbergen (DRa). • **Mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*): 2 imm. le 30.10 à Virelles (BPh, A. Bacq), 1 ad. le 15.11 à Harchies (LV, DVe) et 1 imm. le 20.11 à Huy (CFa). • **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*): 1 ex. le 03.07 à Taviet (FH), 5 ex. le 19.09 à Virelles (BPh) et 1 ex. le 17.10 à Quaregnon (ADu). • **Guifette noire** (*Chlidonias niger*): une quinzaine de mentions, au plus 16 ex. le 29.08 à Eghezée-Longchamps (AJr); dernière le 01.10 à Virelles (BPh).

**Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : derniers nicheurs : des pulli de dix jours en nichoir le 29.09 à Gosselies (JBl). Migrateurs notés du 05.10 au 16.11 dont un record local de 209 le 08.10, suivi par 64 ex. le 10.10 à Angre (HDu). A l'inverse du Ramier, le passage dans l'ouest du Hainaut fut important cet automne (544 ex. comptés). • **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : migration signalée du 05.10 au 15.11, mais sans très grands nombres : au plus, 6.300 en un jour (17.10 à Nismes - MLm). • **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : très petits nombres en août mais passage plus étoffé en septembre, avec trois groupes relativement importants en Hainaut : 52 ex. le 1er à Seneffe, 20 le 2 à Gages, 25 le 10 et 35 le 12 à Givry (PJe, VSc, PDy).

**Perruche à collier** (*Psittacula krameri*) : hors Bruxelles, notée à La Hulpe, Neerijse et Remouchamps. • **Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : derniers le 05.09 à Thommen et Warcoing (NPa, OHO).

**Chouette effraie** (*Tyto alba*) : encore des jeunes au nid fin octobre à Merlemont et Villers-en-Fagne (J&N). • **Chouette chevêche** (*Athene noctua*) : encore une nichée (3 jeunes) dans un nichoir à Crécerelle le 18.08 à Seneffe (ST). • **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 1 migrateur les 10 et 16.10 à Havay (PDy).

**Martinet noir** (*Apus apus*) : départs classiques de fin juillet-début août avec une présence qui s'atténue progressivement ensuite; derniers le 18.09 à Moircy, le 29.09 à Virelles, les 29.09 et 01.10 à Mariembourg, le 03.10 à Havay et Mouscron (MWt, MLm, PDy, TDb). La destruction en pleine reproduction de l'usine désaffectée de Hampteau a entraîné celle de la plus forte colonie de Martinet de la région (50-60 couples - DVi). • **Martin pêcheur** (*Alcedo atthis*) : l'abondance de données, provenant de toutes les régions, indique un haut niveau de population postnuptiale.

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) : 3 ex. le 15.08 à Floriffoux, 1 ex. le 27.08 et le 03.09 à Mariembourg, 1 ex. les 28.08 et 02.09 à Mouscron, 3 ex. le 31.08 à Boitsfort, 1 ex. le 09.09 à Gimnée, 1 ex. le 17.09 à Harchies, puis tardivement le 30.09 à Jalhay et le 13.10 à Lavaux-Sainte-Anne (LWa, MLm, TDb, JSS, R. Woute, PJe, FRe, ST). • **Pic noir** (*Dryocopus martius*) : nombreuses données, entre autres des nicheurs du bois de Lauzelle à Louvain-la-Neuve; noté entre le 02 et le 25.10 à Harchies (DV, RTo, HDu). • **Pic épeiche** (*Dendrocopos major*) : signalé en migration le 03.10 à Gages, le 10.10 à Seneffe, le 15.10 à Mazée et le 17.10 à Angre (VSc, PJe, LWa, JYB, HDu). • **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) : hors sites habituels, 1 ex. le 11.11 à Aublain (MLm) et le 12.11 à Spa (LSc). • **Pic épeichette** (*Dendrocopos minor*) : en erratisme le 08.08 à Butgenbach (LSc).

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : en dehors des sites habituels, 1 ex. à Chevron le 04.07 (YBu). La migration se déroule du 28.09 au 11.11, dont 103 ex. en une matinée le 10.10 à Martilly (MWt). • **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : bonne reproduction notée fin juillet à Angre (HDu). Passage marqué du 28.09 à la première décade de novembre avec un pic les 29-30.09 et autour du 10-11.10 (nbx obs.).

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : encore 8 couloirs occupés le 04.08 à Gemmenich (LSc) et 1 nourrissage le 01.09 à Frasnes-lez-Couvin (MLm). Au rayon des migrateurs attardés : 3 ex. le 05.10 à Genappe (CLb), 1 ex. en vol vers le SO le 17.10 à Mouscron (TDb) et 2 ex. le 31.10 aux Marionville (AMl). • **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : concentration régulièrement suivie à l'étang de Virelles : plusieurs centaines en août, 1.000 en septembre, encore 20 ex. le 08.10 et 8 le 28.10 (BPh). Dernières observations le 30.10 à Hensies et Nimy, le 31.10 à Chaumont-Gistoux, Latour et Merlemont, du 01 au 03.11 à Harchies et le 05.11 à Roly (JLLe, PDy, JHo, RTo, J&N, MLm). Enfin, un sujet albinos le 29.08 à Banneux (S. Rouxhet). • **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon*

*urbica*) : peu de recensements précis de nicheurs : 68 nids occupés à Laforge/Mormont en juillet (JMDu), 69 nids occupés à Rouvroy le 22.07 (O. Lepage), tandis que les effectifs s'effondrent à Taviet : 16 nids le 06.08 contre 50 précédemment (FH). Nicheurs tardifs : encore 2-3 nids avec jeunes le 19.09 à Barvaux-en-Condroz (RLi). Les rassemblements post-nuptiaux du mois d'août disparaissent dans le courant de septembre, ainsi sur les 150-200 hirondelles présentes à Longchamps le 29.08, plus une seule n'est vue le 21.09 (AJr, CFa). Dernières observations : 1 ex. le 30.10 à Harchies (C. Auverlot), le 31.10 à Ohey (BS) et le 07.11 à Virelles (BPh).

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : signalé en 12 localités du 29.08 au 02.10. Aux décan-teurs de Genappe, au moins 4 ex. différents sont observés du 09 au 12.09 (Gr. Gen.). • **Pipit des ar-bres** (*Anthus trivialis*) : nicheur rare cette année à Taviet (FH). Le passage de cette espèce discrète semble très tenu du 07.08 au 10.10. • **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : les premiers arrivent le 03.10 à Mouscron (TDb); ensuite, arrivages du 06 au 09.10 à Seneffe, Angre, Havay et au barrage de la Gileppe (PJe, HDu, PDy, LSc). Les effectifs s'étoffent peu à peu sur les sites d'hivernage : au plus 40 ex. à Walhorn le 28.11 (LSc). • **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : passage important de la mi-août à début octobre. Dernières le 18.10 à Colonster, 3 ex. posés à Seneffe les 29 et 30.10 puis 2 migrateurs tardifs le 12.11 à Seneffe (LSc, PJe). Deux identifications de Bergeronnettes nor-diques (*M. f. thunbergi*) : 3 ex. le 31.08 à Matagne-la-Grande et 2 ex à Genappe le 11.09 (MLm, T. Dethier). • **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : envol tardif d'une nichée de trois jeun-es le 24.08 à Taviet (FH). • **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : à Taviet, un couple nourrit sa troisième nichée le 28.07 (FH). Passage de la mi-août à fin octobre; pic du 1er au 10 octobre.

**Jaseur boréal** (*Bombycilla garrulus*) : 1 ex. à Plainevaux du 06 au 08.08 (CFa, J. Marec), c'est-à-dire en dehors de la période normale de présence de l'espèce. S'agit-il d'un échappé de cap-tivité ?

**Troglodyte mignon** (*Troglodytes troglodytes*) : à Cerexhe-Heuseux, un passage régulier est noté à partir du 18.09, atteignant un pic entre le 08 et le 18.10 (Gr. Heuseux). Une abondance inha-bituelle début novembre à Harchies, par exemple 25 ex. le 02 (DVe), est sans doute le reflet de mou-vements tardifs. • **Accenteur mouchet** (*Prunella modularis*) : 3 jeunes encore nourris à Rixensart le 22.08 (FHe). La migration débute timidement le 20.08 à Sart-lez-Spa et le 25.08 à Sourbrodt; pic de passage le 16.10 à Cerexhe-Heuseux (LSc, EDg, Gr. Heuseux).

**Rougegorge** (*Erithacus rubecula*) : passage noté à partir du 25 - 27.08, régulier en septembre; il semble culminer vers le 10.10 pour diminuer à partir du 20 de ce mois (Gr. Heuseux, EDg, DMt). • **Rossignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : passage noté à Cerexhe-Heuseux dans le courant du mois d'août; dernière mention le 15.09 (Gr. Heuseux). • **Gorgebleue** (*Luscinia svecica*) : 1 couple nicheur à Chertal le 17.07 (FDo); derniers migrateurs à Virton le 23.08 (MJ) et à Bèclers début sep-tembre (*in* OHO). • **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : cinq observations d'oc-tobre dont la dernière le 16.10 à Cerexhe-Heuseux (Gr. Heuseux). • **Traquet tarier** (*Saxicola rubetra*) : en province de Luxembourg, signalé nicheur en juillet à Almeroth, Lichert et Longvilly; noté "en net déclin" à Sampont (PPi, RDT, JGa). Le passage commence le 07.08 à Thommen et le 08.08 à Pailhe (A, RLi). Neuf observations d'octobre, dont 6 pour la seule station de suivi de la mi-gration à Angre, la dernière le 15 (HDu). • **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : dernier à Harchies le 01.11 (HDu). • **Traquet motté** (*Oenanthe oenanthe*) : aucune observation de juillet. Mis à part 2 ex. précoces le 01.08 à Matagne-la-Petite (FVn), la migration débute à la mi-août, s'étoffe vers la fin du mois et dans le courant de septembre pour décliner jusqu'au 17.10; ensuite 1 ex. le 28.10 à Seneffe (PJe). • **Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : 2 ex. à Angre le 15.10, 1 ex. à Eupen le 16.10, 1 ex. à Saint-Pierre le même jour et 1 ex. à Bèclers le 30.10 (HDu, LSc, MWt, D. Deschamps).

• **Merle noir** (*Turdus merula*) : le 13.10, à Sart-lez-Spa, total de 20 migrateurs en vol vers le SW en une matinée (LSc). • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : en juillet, nidifications, maintenant traditionnelles, en Dyle (Neerijse et Oud-Heverlee - FHe) et dans l'ouest du Hainaut (Harchies, Harmignies - in OHO). Premières bandes notées dès le 11.08 (JT). En octobre-novembre, plusieurs groupes de quelques centaines d'individus observés à l'est de la Meuse, groupes plus petits à l'ouest. • **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : généralement qualifiée d'abondante au passage du 07 au 31.10. Un chanteur tardif à Uccle le 08.10 (FVn). • **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : première le 19.09 à Heyd, puis le 22 à Havay, le 23 à Mouscron, le 24 à Cerexhe-Heuseux, le 25 à Mont-Saint-Aubert et le 26 à Mariembourg. Gagne ensuite toutes les régions début octobre (TDb, JMDu, Gr. Heuseux, MLm, FHe, LSc). Pic migratoire vers le 20 - 30.10. En novembre, encore 5 observations après le 20, dont le 29 à Uccle et le 30 à Molenbeek (FVn, FHe). • **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : bonne réussite de la reproduction dans les Hautes-Fagnes avec quelques bandes de plusieurs dizaines en août (LSc).

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : à Harchies, maximum 3 ex. le 10.10 (HDu, PJe, C. Auverlot, RF, F. Vrijens). • **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : 14 observations, généralement auditives, en juillet. En août, le passage se déroule "en nombre important" à Sourbrodt, 1 ex. le 12 à Goffontaine, 1 ex. bagué le 14 à Floriffoux et 7 ex. bagués le 28 à Watermael-Boitsfort (LSc, PiC, LWa, MNi). Encore quelques captures du 02 au 04.09 à Béclers. De nombreuses données de baguage ne sont malheureusement jamais communiquées. • **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : 1 ex. le 03.07 aux Marionville (DMt). En août, 6 données de baguage à Thuillies : 2 le 02, 1 le 11 et le 13, 2 le 14 (PGil). Enfin, 1 ex. le 05.09 à Béclers, le 11.09 à Hologne-sur-Geer, le 18.09 à Eghezée-Longchamps et le 19.09 aux Marionville (D. Deschamps, CFA, LWa, HDu). • **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : peu de données de migration; passage qualifié de peu important en août à Cerexhe-Heuseux (Gr. Heuseux). • **Rousserolle effarvatte** (*Acrocephalus scirpaceus*) : migration très bien suivie à Thuillies avec 636 ex. bagués entre le 22.07 et le 03.10; pic migratoire le 14.08 avec 120 oiseaux bagués sur la journée (PGil). Dernières observations le 20.10 à Harchies et le 31.10 à Cerexhe-Heuseux (HDu, Gr. Heuseux). • **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*) : à Harchies, un couple nicheur et un second mâle le 26.07; 2 ex. à Virelles le 08.07 et 1 ex. bagué à Floriffoux le 18.08 (BPh, AMo). • **Hypolaïs icterine** (*Hippolaïs icterina*) : bonne reproduction à Chertal (FDo); 15 couples sur 15 km<sup>2</sup> dans la région de Saint-Sauveur/Renaix, ce qui représente une diminution de moitié depuis 1988 (LV, DVe). Passage très peu remarqué; dernière observation à Cerexhe-Heuseux le 09.09 (Gr. Heuseux). • **Hypolaïs polyglotte** (*Hippolaïs polyglotta*) : un chanteur à Maffle jusqu'au 23.07 (JLLe). • **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : dernières les 17 et 18.09 à Cerexhe-Heuseux (Gr. Heuseux), le 23.09 à Harchies (PJe). • **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : passage classique en août (nbx obs.), inhabituellement fourni à Sourbrodt le 18.08 (LSc). Dernières observations d'un ex. le 20.09 à Cerexhe-Heuseux et à Mariembourg, le 23.09 à Harchies et le 24.09 à Angre (Gr. Heuseux, MLm, PJe, HDu). • **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : dernières les 09.09 à Cerexhe-Heuseux et 19.09 à Jamagne (Gr. Heuseux, JMg). • **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : passage régulier fin-août (nbx obs.). Le baguage à Thuillies du 01.09 au 18.10 met en évidence un pic de passage entre le 02 et le 07.09 (PGil). Seule donnée de novembre : 1 ex. à Uccle le 21.11 (FVn). • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : à Cerexhe-Heuseux, passage très faible en août - début septembre, plus soutenu du 17.09 au 17.10 et ensuite très nette diminution, ces observations étant partiellement confirmées aux Marionville, à Mouscron et à Viesville (Gr. Heuseux, DMt, TDb, JSe). Encore 18 observations de novembre, dont 4 dans la dernière décade. • **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : première vague de migrateurs le 01.08 avec 50 contacts en Fagne wallonne (LSc); passage régulier fin août-début septembre, encore 1 ex. le 15.09 à Fagnolle et 1 attardé le 09.10 aux Marionville (MLm, DMt). • **Roitelet huppé** (*Regulus regulus*) : à Angre, très peu cet

automne; premier migrateur entendu le 05.10 (HDu). • **Roitelet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : trop peu signalé; encore 4 observations dans la dernière décade de novembre, notamment au parc de Wolvendael à Uccle, où il est présent tout le mois (JMDu, JSe, FVn).

**Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : nidifications tardives: jeunes volants encore nourris le 21.08 à Virton et le 04.09 à Virelles (MJ, MLm). Passage extrêmement faible à Cerexhe-Heuseux en août-septembre, derniers le 02.10 à Gottignies et Maransart (Gr. Heuseux, ED, D. Deschamps, PHi, DRa). • **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : 11 individus observés sur 7 sites du 18.08 au 16.09, dont 4 ex. bagués le 28.08 à Watermael-Boitsfort (MNI).

**Mésange à moustaches** (*Panurus biarmicus*) : alors qu'aucune observation automnale n'avait été effectuée de 1989 à 1991 et que seuls 2 sites avaient été visités en automne 1992, cette année 5 sites ont accueilli un maximum de 21 ex. entre le 16.10 et le 05.11 : à Harchies, de 2 à 12 ex. du 16 au 30.10 puis 1-9 ex. en novembre (HDu, AMI, RTo); à Virelles, de 2 à 3 ex. du 16 au 21.10 (BPh, MLm); aux décanseurs de Genappe, 1 ex. le 16.10, première donnée pour ce site (FHu, CLb); à Gozée, 3 ex. le 17.10 (BH); à Roly, 1 ex. le 04.11 et 2 le 05 (J&N, MLm); à Hérinnes, 1 ex. le 27.11 (JBL). Plus tôt en saison, ces données ont été précédées de 2 ex. le 28.08 à Harchies et 1 migrateur le 19.09 à Hérinnes (RTo, JBL). • **Mésange à longue queue** (*Aegithalus caudatus*) : la plus grosse troupe atteint les 43 ex. le 24.07 à Bossière (LWa). Semblerait plus abondante que d'habitude en septembre-octobre dans le Condroz (RLi). • **Mésange noire** (*Parus ater*) : le passage important signalé dès fin août dans différentes régions (nbx obs.), se poursuit en septembre pour prendre l'allure d'une "véritable invasion" à Uccle (FVn); en octobre, il connaît un pic important le 02.10 à Mariembourg (MLm). • **Mésange rémiz** (*Remiz pendulinus*) : 2 ex. à Eghezée-Longchamps le 18.09 et une bande en vol le lendemain (AJr, LWa), 1 ex. aux Marionville le 19.09 (HDu), 1 ex. à Hingeon le 20.09 (LWa), 1 ex. le 27.09 et 2 ex. le 02.10 à Harchies (DVe, HDu), 1 ex. aux décanseurs d'Escanaffles le 03.10 (D. Deschamps), 1 ex. à Taviet le 19.10 (FH).

**Loriot d'Europe** (*Oriolus oriolus*) : observation tout à fait remarquable de 11 ex. ensemble, prenant leur envol vers le sud, le 27.07 à Hensies (C. Auverlot); dernière mention le 09.09 à Harchies.

**Pic-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : nidification certaine ou probable signalée dans au moins 42 localités de la zone habituelle. Parmi les effectifs notés, épingleons 18 couples recensés dans la vallée de l'Attert (PPI) et 46 territoires occupés à Durbuy (JMDu). Encore 4 observations de septembre dont la dernière de 2 ex. le 19 à Heyd (JMDu). • **Pic-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : observée sur 25 sites en juillet dont 1 ex. à Harchies les 05 et 23.07 puis fin novembre (C. Auverlot, PJe, HDu, TDb); peu de données de densités : 7 ex. sur un parcours de 2 km à Bièvre le 06.07 (TDb).

**Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*) : l'espèce est particulièrement abondante en août en Ardenne où des mouvements (régionaux?) sont perçus à partir du 10.09. Ailleurs, seul un petit nombre de migrateurs sont renseignés du 18.09 au 10.10, maximum 15 ex. le 03.10 à Mariembourg (MLm). • **Cassenoix moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : nombreuses données dans l'aire ardennaise; en marge de celle-ci, 1 ex. le 25.08 à Légglise (APd), 8 ex. le 27.08 à Mariembourg (MLm), 1 ex. le 28.08 à Merlemont (MLm), 2 ex. le 08.10 à Mouscron (NSe) et 1 ex. le 17.10 à Buzenol (Y. Laurent). • **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : passage du 29.09 au 13.11, maximum 146 ex. le 10.10 à Angre (HDu) et 591 le 17.10 à Mouscron (TDb). • **Corbeau freux** (*Corvus frugilegus*) : migration du 06.10 au 15.11, toujours en petit nombre, sauf une concentration de 1.200 le 19.10 à Marcouray (DVi). • **Corneille mantelée** (*Corvus corone cornix*) : 1 ex. le 21.11 à Chapon-Seraing (PLI). • **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : observations de 1-4 ex. à Muno, Les Amerois, Les Epioux, Pin, Suxy, Orval, en forêt d'Anlier, à Bertrix et Recogne.

**Moineau friquet** (*Passer montanus*) : passage signalé du 19.09 au 15.11, en général en petits nombres, hormis lors du pic de migration de la première décade d'octobre avec 168 ex. le 03.10 et 349 ex. le 08.10 à Gages (VSc), une centaine le 03 à Wiers (JMB) et 154 le 08 à Angre (HDu).

**Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) : une concentration postnuptiale atteint 200 ex. le 31.08 à Marcouray (DVi); ensuite, passage classique mentionné à partir du 28.09. Le pic des 06-08.10 voit par exemple passer 1.451 ex. le 06 à Seneffe et 3.444 le 08 à Gages (PJe, VSc); les passages sont nettement moins étoffés par la suite. • **Pinson du nord** (*Fringilla montifringilla*) : premiers le 19.09 à Fleurus et le 23.09 à Mariembourg (JBI, MLm); passages en petits nombres (aucune donnée n'atteint la centaine) jusqu'au 07.11 au moins. La migration de cet automne est considérée par plusieurs observateurs comme insignifiante. • **Serin cini** (*Serinus serinus*) : quelques migrateurs sont signalés à partir du 12.09; en fin d'automne, contacts le 25.10 à Pommeroeul, le 30.10 à Seneffe, le 05.11 à Angre, le 16.11 à Harchies et les 17-23.11 à Celles en Hainaut (HDu, PJe, HDu, D. Deschamps). • **Verdier** (*Carduelis chloris*) : également une migration d'ampleur assez modeste, aucune donnée de passage n'atteignant la centaine, même lors du pic de passage entre le 09 et le 13.10. • **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : localement abondant en été en Ardenne (par exemple 50 en juillet à Wardin - RDt); des apports sont mentionnés dans l'ESM dès le 20.08. Passage en petit nombre par la suite et stationnements sans ampleur en octobre-novembre; petits maxima locaux fin novembre : 20 ensemble le 21.11 à Harchies et le 23.11 à Latour, ainsi que 50 le 21.11 aux Marionville - BMO, HDu, DMt). • **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : 3 ex. le 02.07 à Noville-sur-Mehaigne (AJr) et 1 le lendemain à Frasnes-lez-Couvin (MLm). Il faut ensuite attendre le 15.08 pour voir des arrivées reprendre, avec dès ce moment une succession de petits groupes (max. 46 le 07.09 à Musson - O. Lepage). Les tarins deviennent plus nombreux à partir de la fin septembre, dont 100 le 01.10 à Mariembourg (MLm) et le 14.10 à Mons (PDy); en migration, max. 109 le 19.10 à Angre (HDu). L'abondance est moindre en novembre (max. 70 à Virelles le 15 - BPh). • **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : les bandes estivales atteignent 120 ex. au plus le 31.08 à Lanaye (DTe); migration citée du 28.09 à début novembre, mais surtout du 6 au 13.10 (max. journalier: 454 le 08 à Angre - HDu); rare en novembre avec notamment plusieurs oiseaux à Pailhe (RLi) et 100 à Bomal (YF) le 22.11. • **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : une nidification en dehors des noyaux habituels : 1 couple avec 3 jeunes en juillet à Bertrix (TDb). Faible passage à partir du 07.09, un peu plus étoffé fin octobre et en novembre, du moins sur le site de Ombret où JF en dénombre max. 20-23 les 07 et 11.11. • **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : l'afflux commencé en juin se poursuit dans les mois qui suivent, touchant toutes les régions. Les nombres sont cependant modestes en juillet-août, à quelques exceptions près, comme 17 le 15.07 à Casteau, 55 en juillet à Heyd, 30 le 16.08 à Aineffe, 25 le 20.08 à Mont-Saint-Aubert et 50 le 21.08 à Braine-le-Comte (PAN, JMDu, LG, JB Pierret). De tels passages se poursuivent jusqu'en octobre, avec raréfaction progressive en Moyenne Belgique où l'espèce n'est plus notée après le 04.11 (Auderghem - FHe). En novembre, présence répandue par petits groupes essentiellement en Ardenne. • **Bouvreuil pivoine** (*Pyrrhula pyrrhula*) : passages du 26 au 30.09 à Eupen (FRe), ailleurs quelques migrateurs notés jusqu'au 27.10. • **Grosbec casse-noyaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : migration globalement peu importante; groupes principaux en automne : 38 le 15.10 et 69 migrateurs le 17.10 à Mazée (JYB, LWa), 80 ex. le 27.11 à Remagne et 120 ex. le 28.11 à Tournay (MWt).

**Bruant lapon** (*Calcarius lapponicus*) : 18 données de 1-4 ex. en Hainaut occidental du 18.09 au 05.11 et trois observations liégeoises : 5 ex. le 29.10 à Herve, 1 ex. le 01.11 à Eupen et 2 ex. le 02.11 à Lanaye (D. Jacquemotte, LSc, DTe). • **Bruant des neiges** (*Plectrophenax nivalis*) : un mâle le 21.11 à Chapon-Seraing (PLI). • **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : très peu de migrateurs signalés; seuls rassemblements dépassant la cinquantaine : 200 les 21-28.11 à Soy et le 21.11 à Esneux (JMDu, YBu). • **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : en Ardenne : 1 ex. le 08.08 à Butgenbach,

le 27.08 à Lierneux, le 28.08 à Elsenborn, le 29.09 à Heyd et 3 ex. le 18.09 à Moircy (LSc, MDe, JMDu, MWt). Dans l'ouest du Hainaut, 3 ex. le 06.09 et 1 le 07 à Gages, 4 ex. le 07 à Havay (VSc, PDy). • **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : nidification tardive : des jeunes encore nourris le 17.08 à Eghezée-Longchamps (SBc, LWa). • **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : en août, à noter le séjour d'un groupe de 50-75 à Havay, atteignant 100 ex. du 23 au 31 (PDy). Quelques migrateurs de fin septembre à début novembre; au posé, maximum 18 ensemble le 15.10 à Angreau (HDu).

Cette chronique semestrielle a pu être réalisée grâce à la collaboration des ornithologues dont les noms sont repris dans la liste ci-après. Nous tenons à les remercier, de même que les délégués au Bureau de la Centrale Ornithologique, qui ont assuré le travail de rassemblement des données, et les avésiens qui ont ensuite assuré l'encodage informatique des données : W. Kuciapa, J. Magnette, L. Wargé, P. Gonze et D. Muysfont.

A	Anonyme	FHu	F. Hupet	LWa	L. Wargé
ABP	A. Bas-Perez	FMh	F. Mauhin	MBb	M. Barbusiaux
ADu	A. Delaunois	FRe	F. Renard	MDe	M. Deroanne
AHb	A. Habsch	FRu	F. Rouchet	MGu	M. Guillaume
AJo	A. Jortay	FSe	F. Sente	MJ	M. Jacquemin
AJr	A. Joris	FVn	F. Vanhove	MJa	M. Janssens
AMl	A. Malengreau	GPh	G. Philippe	MJV	M.-J. Voz
AMo	A. Monmart	GRt	G. Rotsaert	MLm	M. Lambert
APd	A. Picard	GWi	G. Willem	MNI	M. Ninanne
ARg	A. Rega	HB	H. Bédoret	MPa	M. Paquay
AW	A. Willame	HDu	H. Dufourny	MSa	M. Saulmont
BC	B. Chivy	HT	H. Teerlynck	MWa	M. Walravens
BCl	B. Clesse	HW	H. de Wavrin	MWt	M. Watelet
BDu	B. Duyck	JaLi	J. Liénart	NPA	N. Paquay
BH	B. Hanus	JBl	J. Bullot	NSe	N. Selosse
BI	B. Iweins	JBL	J.B. Lison	OHe	O. Hendrick
BMo	B. Molitor	JCL	J.-C. Lepinois	OM	O. Matgen
BN	B. Nef	JDa	J. Delarue	PAn	P. Anrys
BPh	B. Philippart	JDe	J. Delvaux	PCI	P. Claerhout
BS	B. Sabatier	JF	J. Fouarge	PDo	P. Deloyer
BT	B. Tricot	JGa	J. Gallez	PDt	P. Destexhe
CFa	C. Farinelle	JHo	J. Houbart	PDy	P. Degossely
CGe	C. Geyer	JLa	J. Lauwers	PFa	P. Fayt
CHu	C. Houalet	JLA	J.L. Arpigny	PGil	P. Gilson
CLb	C. Libert	JLLe	J.L. Lebaillly	PGy	P. Gailly
CPe	C. Percsy	JLoC	J-Louis Coppée	PHi	P. Hirsch
CRo	C. Rousseau	JMB	J.M. Baye	PiC	P. Collard
DE	D. van der Elst	JMCh	J.M. Charlier	PJe	P. Jenard
DL	D. Landrieu	JMDu	J.M. Daulne	PLI	P. Loly
DRa	D. Rabosée	JMg	J. Matagne	PLu	P. Lucas
DTe	D. Testaert	JPCq	J.P. Coquette	PPi	P. Pierre
DV	D. Voituren	JPF	J.P. Fouarge	PS	P. Simon
DVe	D. Verroken	JPJ	J.P. Jacob	PSa	P. Sacré
DVi	D. Vieuxtemps	JSe	J. Sedek	PSc	P. Schaecken
EC	E. Clotuche	JSS	J.S. Sieux	PVo	P. Voet
ECu	E. Cuvelier	JT	J. Tricot	RDm	R. Dumoulin
EDg	E. Degros	JYB	J.Y. Baugnée	RDt	R. Detaille
EWa	E. Walravens	LG	L. Gée	RDu	R. Dujardin
FDo	F. Doblestein	LL	L. Ledoux	RF	R. Flamant
FH	F. le Hardy	LSc	L. Schmitz	RLb	R. Libois
FHe	F. Héla	LV	L. Verroken	RLi	R. de Liedekerke

RR	R. Robin	ST	S. Tombeur	TP	T. Petitjean
RSn	R. de Shaetzen	TDb	T. Debaere	VBu	V. Bulteau
RTo	R. Tonnel	TDe	T. Dewitte	VSc	V. Schollaert
SBc	S. Bocca	TDt	T. Dethier	YBu	Y. Buts
SHt	S. Hotton	TMe	T. Mersch	YF	Y. Fanon
SSo	S. Sorbi	TMq	T. Maniquet		

C. Auverlot, Y. André, Ch. Altruy, M. Blyth, Ph. Callewaert, V. Caucheteur, B. Collinet, D. Deschamps, L. Delcourt, J.-M. Defleau, G. Delforge, J. De Meirman, P. Deramaix, P. Dodémont, S. Duriaux, R. de Faily, J. de Favreau, J.M. Geechele, J. Gersemeter, P. Gérrouville, P. Gysels, A. Guissart, Gr. Heuseux (= R. Thomas, R. Ponsen *et al.*), P. Hirsch, R. Jacquet, D. Jacquemotte, Y. Kempeneers, B. Laurent, F. Lemaigre, O. Lepage, H.F. Leroux, P. Lucas, J. Maréchal, A. Martens, M. Massagé M. de Mévius, G. et M. Peeters, M. Pontegnie, M. Provost, D. Rappe, F. Rouveau, Y. Roquet, C. Rossignon, . Struys, J. Tits, CNB- La Trientale (= B. Clesse *et al.*) A. Trivier, D. Vaiser, X. Vandevyvre, A. Van Hoovels, E. Verhegghen, F. Vrijens, R. Wouters, R. van Zuylen.