

Centrale ornithologique Aves<sup>1</sup>

## Observations récentes : novembre-décembre 1996

### FAITS SAILLANTS

Les dernières vagues de migrateurs passent en novembre avec encore de nombreux Pigeons ramiers, mais aussi des grives, des freux, des choucas, des pinsons, des Alouettes lulu et des champs. C'est tout à fait classique, comme les inévitables attardés : Merle à plastron (01-10.11 - un oiseau toujours peu fréquent en automne), Hirondelle de cheminée (05-12.11), Cigogne noire (06.11), Busard des roseaux (08.11). Un Pipit à gorge rousse très tardif s'arrête le 10 novembre et un Pygargue passe le lendemain. La mi-novembre voit le retour de quelques Mésanges à moustaches, l'augmentation du Pipit spioncelle et le développement d'un petit afflux de Sizerins flammés, cabarets et boréaux mêlés. Le premier refroidissement a lieu à ce moment. Il amène des hivernants d'origine nordique (premier Harle bièvre le 13 et Cygne sauvage le 15), chasse de nombreux oiseaux des étangs qui gèlent (grèbes par exemple) et pousse vers le sud une série d'oiseaux qui s'attardaient (Milans royaux, Pipits farlouses, etc.). Les semaines qui suivent voient se raréfier les Busards Saint-Martin et les Goélands bruns, ainsi que le passage de quelques migrateurs inattendus aussi tard (Faucon kobez le 30 novembre, Bruant lapon le 4 décembre, Bergeronnette printanière le 9 décembre). Cette période permet également de remarquer la fréquence élevée de la Bergeronnette grise au Luxembourg, quelques Rougequeues noirs et une présence insignifiante du Pinson du Nord, du Beccroisé et du Grosbec.

Après une période assez douce, qui provoque les premiers chants (Grive draine le 18), une vague de froid majeure débute le 20 décembre. Un puissant anticyclone nous enverra des courants continentaux glacés avec gel permanent jusque loin en janvier. Les conséquences en sont classiques. Le froid implique l'abandon des étangs figés par la glace et le repli sur les cours d'eau encore libres en début de vague de froid. Les départs assez discrets de Vanneaux, Pluviers dorés, Alouettes des champs et grives s'étalent toutefois sur une semaine. L'effectif du Troglodyte chute à Harchies, le Martin pêcheur se fait vite rare, les dortoirs de Pipits spioncelles se vident, de rares bécassines se réfugient sur des suintements et de rares points d'eau libre. Quelques Grues attardées passent à Noël tandis qu'à Mouscron, c'est un surprenant duo Autour + Grand Corbeau qui vole vers l'ouest le 23 décembre.

Comme d'habitude, il faut peu de temps aux Goélands cendrés pour se rabattre en grand nombre vers nos régions. Quelques Buses pattues, des plongeurs, des Grands Butors, des cygnes, des Courlis cendrés nous arrivent fin décembre. Plus surprenante est la venue à ce moment de groupes

(1) Centrale Ornithologique Aves

c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

d'Alouettes lulus. Si bois et campagnes se vident, la Meuse et quelques-uns de ses affluents voient rapidement affluer de grands nombres d'oiseaux d'eau. Le spectacle de l'hiver 1995-96 se réédite et, dès fin décembre, les nombres de Milouins battent le record établi l'hiver précédent. Aux mangeoires, quelques Pics mars sont les premiers d'une série inhabituelle.

Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre-Sambre-et-Meuse, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf précision utile.

## DETAIL DES OBSERVATIONS

**Plongeon arctique** (*Gavia arctica*) : un immature le 05.12 aux BEH puis 1 ex. le 29.12 au barrage d'Ampsin-Neuville. • **Plongeon catmarin** (*Gavia stellata*) : 1 ex. le 30.12 à Tihange.

**Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : en Hainaut occidental, on estime la population hivernante en novembre-décembre à 50 oiseaux avec des maxima de 26 ex. le 22.11 et 17-20 à partir du 14.12 à Obourg et d'une quinzaine d'ex. à Warneton fin novembre. Ailleurs, on note quelques rassemblements : 22 ex. le 15.11 en Haute-Sambre (amont de Lobbes), 26 ex. le 26.11 et 20 le 14.12 aux BEH, 16 ex. le 15.12 à Chertal et 15 ex. le 21.12 à Vielsalm. L'espèce est quasi absente en Moyenne-Meuse. • **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : un couple nourrit encore 4 jeunes le 09.11 à La Calamine, de même qu'à Roly (un seul jeune). Les principaux effectifs hivernants sont notés en Basse-Meuse, aux BEH et à Obourg où l'on recense respectivement en novembre et en décembre : 189 et 132 ex. en Meuse, 150 et 185 aux BEH, 72 et 76 à Obourg (pratiquement le seul site de cette région qui ne soit pas pris par les glaces fin novembre). En province de Luxembourg, où l'espèce n'hiverné pas, une dernière observation le 06.12 à Libramont. • **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : 1 ex. du 13 au 16.11 à Harchies puis 1 ex. le 15.12 aux BEH. • **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : 1 ex. le 24.11 à Tournai, 1 ex. le 04.12 à Virelles.

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : fin du passage noté sur les sites d'observation de la migration en Hainaut occidental

début-mi-novembre : 23 ex. le 08 et 62 ex. le 12 à Havay. Apparemment pas de dortoir mais de nombreux mouvements en novembre et décembre dans l'ESM, avec parfois des groupes de 100-150 ex. (BEH, Viroin, Roly). Les comptages aux dortoirs en décembre fournissent respectivement pour les provinces de Liège, Hainaut, Namur et Luxembourg : 898 ex. (Chertal), 470 ex. (Harchies et Senefte), 300 ex. (Gives) et 212 ex. (Grandhan, Melreux, Houyet et Villers-sur-Lesse).

**Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : 1 ex. les 02 et 17.11 à Harchies, 1 le 26.11 à Virelles; ensuite, arrivages sensibles fin décembre : 1 ex. le 23.12 à Warneton, 1 le 25.12 à Harchies, 1 à 3 ex. à partir du 24 à Roly et 1 ex. le 29.12 à Lanaye. • **Grande Aigrette** (*Egretta alba*)\* : huitième hivernage consécutif d'un ex. à Harchies; un deuxième oiseau est observé à plusieurs reprises à partir du 05.12. • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : les rassemblements de décembre atteignent notamment 21 ex. le 10 à Latour, environ 60 ex. pour l'ensemble de la Basse et Moyenne-Meuse, 30 ex. les 14-16 à Virelles et un maximum de 22 ex. à Roly. Dans le Hainaut occidental, l'hivernage est peu fourni. • **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : 2 ex. tardifs le 06.11 à Harnoncourt.

**Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) : avec l'arrivée du froid, augmentation fin décembre en Hainaut occidental, où Warneton accueille 46 ex. le 29.12, sinon assez peu renseigné dans l'ensemble : une vingtaine d'oiseaux en différents sites (BEH, Roly, Virelles, Basse-Meuse...). • **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) : observé



*Nette rousse*, Angleur 26 décembre 1996. (R. Du-moulin)

durant les deux mois à Harchies avec un maximum de 23 ex. le 02.11 puis 10-11 jusqu'au 13. Ensuite quelques oiseaux, avant 9 et 14 ex. les 22 et 28.12. En dehors de ce site, une seule mention : 1 ex. du 14 au 16.11 à Virelles. • **Cygne sauvage** (*Cygnus cygnus*) : à Roly, le premier oiseau est noté le 15.11, puis 7 ex. à partir du 21.12 et augmentation régulière pour arriver à 11 oiseaux le 28.12. • **Cygne noir** (*Cygnus atratus*) : (échappés) 2 ex. à la mi-novembre à Saint-Denis, 1 ex. mourant le 28.12 à Warneton. • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : passage classique début novembre en Hainaut, notamment 1.200 oies en 4 heures d'observation à Flobecq le 13.11. Quelques vols tardifs totalisant encore 200 oiseaux en décembre. Sur le reste du territoire, des vols sont notés également début novembre : 70 le 08.11 à Roly, 47+46 le 13.11 à Mariembourg. • **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) : 18 ex. le 14.12 à Virelles, 70 le 13.11 à Flobecq. • **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) : 2 ex. le 29.12 à Neuvillers. • **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) : 15 ex. le 15.12 à Oost-Maarland, 8 ex. le 26.11 à Tilff. Reflet de la forte population flamande : 53 ex. le 13.12 à Zemst. • **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) : 3 ex. vers le sud le 01.12 à Péronnes. Origine? • **Ouette d'Égypte** (*Alopochen aegyptiacus*) : minimum 10 ex. en Hainaut durant le mois de décembre, 2-3 oiseaux en Basse-Meuse et 2 ex. à Steenkerques. • **Ta-**

**dorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : faible hivernage en Hainaut, maxima respectifs de 32 et 17 ex. à Warneton et aux Marionville à la mi-décembre. Ailleurs, on note quelques oiseaux comme 4 ex. le 05.12 aux BEH, 2 ex. du 08 au 16.11 et le 23.12 à Virelles.

• **Canard carolin** (*Aix sponsa*) : 3 ex. le 15.12 à Visé et 1 ex. les 01 et 16.11 à Gastuche. • **Canard mandarin** (*Aix galericulata*) : 2 ex. les 03 et 16.11 à Jambes, 1 le 10.11 à Houx (Yvoir), 1 mâle le 14.12 aux BEH et 4 le 15.12 à Visé. • **Canard siffleur** (*Anas penelope*) : le Hainaut occidental, bastion de la population hivernante, totalise environ 150 ex. sur 5 sites (maximum 58 ex. le 23.12 à Warneton). Ailleurs, 33 ex. les 16.11 et 26.12 aux BEH et quelques isolés sur le reste du territoire. • **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : maxima de 42 ex. le 13.12 à Zemst, 40 le 16.11 aux BEH et 36 le 25.12 à Ploegsteert. Observé régulièrement mais en nombres plus faibles ailleurs, notamment à Harchies, Warneton, Oost-Maarland... Quelques isolés aussi en province de Luxembourg. • **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : début d'hivernage fourni en Hainaut avec 650 ex. en décembre pour 4 sites dont 300 à Harchies et 64 à Obourg. Autres maxima : 327 ex. le 14.12 à Waremme, 170 le 16.11 à Virelles, 109 le 27.12 à Labuissière et 80 le 26.12 aux BEH. Au total,

les rassemblements connus totalisent en décembre plus de 1.500 oiseaux, sans compter les observations de quelques individus épars.

• **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : les rassemblements connus totalisent en décembre environ 7.000 oiseaux dont 996 en Basse-Meuse, 620 en Moyenne-Meuse, 730 à Waremme et 2.835 pour la population hennuyère en fin de mois (avec un maximum de 927 ex. à Harchies). • **Canard pilet** (*Anas acuta*) : maxima de 7 ex. le 23.12 à Warneton, 5 en novembre à Virelles, 12 le 13.11 à Harchies, 3 le 15.12 à Neerijse et le 21.12 à Roly. L'espèce est également observée à Oud Heverlee, aux BEH, à Flobecq et Oost-Maarland. • **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : le plus grand rassemblement se situe habituellement à Harchies où l'on recense le maximum de 860 ex. le 03.11 puis 220 à 260 ex. la première quinzaine de décembre. En dehors de ce site, 50 ex. le 11.11 à Virelles, 33 le 14.12 à La Hulpe et 15 le 15.12 à Oost-Maarland.

**Nette rousse** (*Netta rufina*) : la femelle présente depuis octobre séjourne jusqu'au 23.12 à Warneton, 1 ex. le 05.11 à Oud Heverlee, 1 mâle le 20.12 à Hermalle-sous-Argenteau, 1 femelle (sans doute échappée) fin décembre à Angleur et 1 femelle à partir du 24.12 à Obourg.

• **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : arrivée en grands nombres sur les sites d'hivernage, où les records de l'hiver 1995-96 sont déjà battus fin décembre. En Meuse (Basse et Moyenne), on passe de 964 ex. début novembre à 8194 fin décembre. La population hennuyère totalise fin décembre 400 oiseaux. A Virelles par contre, des 685 ex. présents le 12.11, on passe à 274 le 16.11 puis à environ 200 début décembre. Le dernier oiseau y est vu le 14.12 (coup de gel). En revanche, l'espèce apparaît fin décembre aux BEH suite au coup de froid (300 ex. le 25.12).

• **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)<sup>\*</sup> : 1 femelle du 06 au 23.12 à Warneton. • **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : même évolution que chez le Milouin : on passe de 484 ex. début novembre en Basse et Moyenne-Meuse à 959 fin décembre. A Virelles aussi, même scénario que pour le Milouin : 90 ex. le 11.11 et disparition de l'espèce le 14.12. La population hennuyère est faible et ne

dépasse pas les 200 ex. fin décembre. Site moins connu, le bassin Vergote (port de Bruxelles) accueille 136 ex. le 31.12. • **Fuligule milouin** (*Aythya marila*) : mis à part le mâle observé le 14.12 à Warneton, les autres observations proviennent de la vallée de la Meuse : 4 puis 1 immature les 03 et 20.12 à Hermalle-sous-Argenteau, 1 femelle du 08 au 14.12 à Ampsin-Neuville et 1 femelle à Chertal le 20.12. • **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : 1 mâle le 10.11 à Oost-Maarland et le 15.11 à Hermalle-sous-Argenteau, peut-être le même oiseau. • **Macreusse noire** (*Melanitta nigra*) : 3 puis 2 femelles les 15 et 17.11 à Oost-Maarland et 1 ex. le 25.12 à Pommeroeul. • **Macreusse brune** (*Melanitta fusca*) : 1 ex. le 17.11 à Noville (Fazône), 1 ex. le 21.12 à Harchies, 2 femelles le 22.12 puis 3 femelles à partir du 25.12 aux BEH. • **Garrot à oeil d'or** (*Bucephala clangula*) : après l'avant-garde de fin octobre, apparition sur divers sites à partir de mi-novembre. La vague de froid de fin décembre entraîne une augmentation des effectifs, principalement en Basse-Meuse où l'on compte 20 ex. à Lanaye et 14 à Oost-Maarland le 28. Ailleurs, retenons les 12 à 15 ex. en Hainaut dont 8 le 26.12 sur le canal d'Hensies-Pommeroeul. L'espèce se rencontre également à Vielsalm (3 femelles du 15 au 21.12) et à Latour (1 ex. le 16.11). • **Harle piette** (*Mergus albellus*) : l'espèce arrive avec le froid : premier oiseau le 01.12 à Virelles puis augmentation à partir de mi-décembre. Fin décembre, on estime à 50 ex. la population hennuyère, 30 ex. en Basse et Moyenne-Meuse, 20 ex. aux BEH et 21 ex. à Roly. • **Harle huppé** (*Mergus serrator*) : 1 femelle le 13.11 à Obourg, 1 couple le 23.11 et 1 femelle 18.12 à Harchies, 1 mâle du 24 au 29.12 à Hermalle-sous-Huy et 1 femelle ou immature à partir du 25.12 aux BEH. • **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : observé dès la mi-novembre (15 ex. le 13 à Harchies, 8 le 16 aux BEH). Ensuite les effectifs augmentent pour atteindre fin décembre un total estimé à 800 ex. pour l'ensemble de la Wallonie (271 ex. en Moyenne-Meuse, 253 en Basse-Meuse et 140 en Hainaut).

**Milan royal** (*Milvus milvus*) : derniers migrateurs pendant la seconde quinzaine de no-

vembre : le 17 à Saint-Vith, le 19 à Mariembourg et Tillet, le 22 à Harchies. • **Pygargue à queue blanche** (*Haliaeetus albicilla*)\* : 1 imm. le 11.11 aux Marionville. • **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : encore un migrateur le 08.11 à Roly puis deux données de fin décembre : une femelle le 26 à Harchies et, plus étonnant, un mâle à Chassepierre (Gaume) le 25.12. • **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : malgré des observations provenant d'une cinquantaine de localités, la fin de l'année ne connaît pas de grande abondance et une diminution progressive au fil des semaines. Observations en général d'oiseaux bruns isolés; les seuls petits dortoirs renseignés se situent à Hérisnes (4 ex. le 08.12), Roly et Aublain (2-3 mâles le 24.12). • **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : quatre mentions en dehors des zones habitées par l'espèce : 1 mâle le 03.11 à Waremme, 1 ex. du 01 au 15.11 à Grand-Manil, 1 femelle imm. le 22.11 à Marchipont (Ht occ.) et 1 ex. en vol vers l'ouest, en compagnie d'un Grand Corbeau (!) le 23.12 à Mouscron. • **Buse variable** (*Buteo buteo*) : encore 6 migratrices le 30.11 à Aywaille. Début d'hivernage normal en Fagne, plutôt faible en Hainaut occidental. Le 31.12, une buse capture une Grive draine à Mormont. • **Buse pattue** (*Buteo lagopus*)\* : arrivées avec le froid, 1 ex. du 27 au 29.12 à Moiry et 1 ex. le 28.12 à Eglisezée-Longchamps.


**Faucon kobcz** (*Falco vespertinus*)\* : une donnée exceptionnellement tardive, sous réserve d'homologation : 1 mâle le 30.11 à Grivegnée. • **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : après 2 ex. le 01.11 à Angre, seulement 11 mentions d'isolés : Angreau 02.11, Aywaille 05.11, Longvilly 09.11, Havay 12.11, Cour-sur-Heure 22.11, Waremme 23.11, Quévy 25.11 (houspillé par un Pèlerin), Angreau 14 et 19.12, Warneton 14 et 28.12. • **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : toutes les observations proviennent de Moyenne Belgique : Les Awirs, Chaumont-Gistoux, Houtain-le-Val, Genappe, Hensies, Obourg, Cour-sur-Heure, Quévy et Spiennes.

**Rôle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : signalé sur 14 sites : au Luxembourg à Autelbas, Au-

bange, La Cussignière (Signeulx), et Dampicourt (sur la Chevratte), en ESM à Gozée (jusqu'à 4 ex.) et à Roly (jusqu'à 3), en Brabant à Neerijse, Oud-Héverlée, Gastuche, Grez-Doiceau et Woluwe-Saint-Lambert (1 hivernant), en province de Liège à Herve (première observation de l'hivernant "habituel" à la mi-novembre). • **Poule d'eau** (*Gallinula chloropus*) : 275 ex. le 15.11 et 214 le 15.12 en Haute Sambre (de Lobbes à la frontière). • **Foule macroule** (*Fulica atra*) : le plus grand rassemblement est noté à Harchies où l'effectif monte à 1.457 ex. le 28.11 pour retomber à 800 fin décembre; l'évolution est inverse aux BEH avec 600 ex. le 16.11, 740 le 14.12 et 1.083 le 26.12. En Basse et Moyenne Meuse, les totaux de mi-mois sont de 875 et 990 ex. seulement.

**Grue cendrée** (*Grus grus*) : au Luxembourg, le passage est quotidien du 11 au 22.11 mais peu d'oiseaux (1.100); une deuxième vague passe les 06-07.12 (300 ex.) et une troisième du 19 au 24 (250 ex.), au début de la vague de froid. Ailleurs, des grues passent les 06 et 09.11 à Vierves, 20 ex. le 08.11 à Gosselies, en novembre-début décembre dans la région de Saint-Vith, le 09.12 à Flobecq ainsi que le 20.12 à La Roche et Membach (80 ex. cherchant à se poser). A Roly, 11 ex. séjournent les 14-15.11, 8 le 16 et 1 juv. jusqu'au 24.11.

**Huitrier pic** (*Haematopus ostralegus*) : 1 ex. le 01.12 à Warneton. • **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : peu en novembre (dont 8 ex. le 16 sur le Gerny à Marche), quelques groupes début décembre (dont 160 à Warneton et 40 à Focant) puis un petit passage en début de vague de froid, surtout les 21-23.12 : 50 ex. à Neufvilles, 21 à Givry et 21 à Houtain-le-Val le 21, 45 à Escanaffles/Celles le 23. • **Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : 7 ex. le 03.11 à Waremme. • **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : passages et haltes migratoires un peu partout en novembre-décembre. Les groupes les plus étoffés sont notés en Ardenne, Famenne et Hainaut occidental : 1.000 le 01.11 à Moinet et le 06.12 à Tintigny, 5.000 le 05.12 à Focant, 1.200 le 07.12 à Gaurain-Ramecroix, 1.300 le 16.12 à Escanaffles. A partir du 21.12, de rares



Goéland argenté, Tilff, 26 décembre 1996. (R. Dumoulin)

passages de fuite sont perçus tandis que les stationnements s'amenuisent au fil des jours : encore plusieurs centaines le 24 à Aublain, 160 le 22 à Gonrioux et 300 le 22 aussi à Houtain-le-Val; à Obourg, on passe de 311 le 22 à 46 le 26, à Celles (Ht) de 90 le 22 à 50 le 23. En Ardenne, un isolé est encore noté le 29.12.

**Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : 1 ex. le 18.11 à Gaurain-Ramecroix. • **Combatant** (*Philomachus pugnax*) : 7 ex. le 06.11 à Eghezée et 1 ex. le 07.12 à Gaurain-Ramecroix. • **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : 16 sites d'observation (8 en Ardenne) et plus de 25 ex. pour la période; parmi les données, 7 ex. à Ochamps le 06.12, une hivernante à Woluwe-Saint-Lambert et encore 1 ex. le 30.12 à Champlon malgré les fortes gelées (refuge permis par des sources). • **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : fin de migration et début d'hivernage assez faibles, avec les groupes les plus importants en Haute Belgique : 31 ex. le 01.11 à Tavigny (Boeur), 20 ex. le 16.11 à Viville et Sterpenich, 27 ex. le même jour à Dampicourt, encore 20 le 14.12 à Melreux. En Brabant et Hainaut, les groupes restent réduits (1-9 ex.), à l'exception de Flobecq où 29 ex. étaient présents le 23.11 puis 25 les 22-23.12. Le 01.12, le chevrottement caractéristique du vol nuptial est entendu à Marche-en-Famenne. Très rare dès les premiers jours froids (Amel, Seneffé, Woluwe-

Saint-Lambert). • **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : à Bruxelles, présence en décembre à Woluwe-Saint-Lambert et au Moeraske, à Eveure. • **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : migrateurs isolés le 06.11 à Eghezée et le 09.11 à Harchies. Fin décembre, l'arrivée du froid provoque un passage perçu un peu partout, avec notamment 8 ex. à Dailly le 24 et un total de 55 ex. dans la partie occidentale du Hainaut (dont 37 à Ramegnies-Chin le 23). • **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : un migrateur le 08.11 à Angre. • **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : rare en novembre et six données en décembre dont 4 ex. le 21 à Latour et 1 ex. le 26 à Obourg alors que le gel est généralisé à cette dernière date. • **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : 1 ex. le 10.11 à Oost-Maerland et le 13.12 à Zemst.

**Mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*) \* : un visiteur de plus en plus régulier semble-t-il : 1 imm. 1er hiver le 11.11 et 1 ad. les 18-20.12 au dortoir de Nimy. • **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : 1 ad. le 19.11 à Harchies. • **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : les dortoirs de Nimy-Obourg totalisent environ 7.000 ex. en novembre-décembre, celui d'Engis 1.850 le 04.12 et 1.700 le 19.12. Au Luxembourg, max. 23 ex. le 16.11 à Latour. Trop peu d'informations ailleurs. • **Goéland cendré** (*Larus ca-*

*mus*) : présence en assez petit nombre avant l'arrivée du froid de fin décembre (quelques dizaines en novembre aux dortoirs hennuyers et max. local de 63 le 07.12 à Ploegsteert). Comme de règle, le froid amène presque immédiatement des immigrants; fin décembre, les Goélands centrés sont répandus partout en Moyenne Belgique (par exemple, 90 le 29 dans la campagne de Meux), leur présence aux dortoirs s'accroît (300 le 26 à Obourg) et des oiseaux sont même vus en Ardenne : 1 le 23 à Libramont et 3 le 30 à Neuvillers. • **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : présence encore importante début novembre, allant en s'amenuisant : Obourg, 350 le 08.11 puis 170 le 13, 140 le 18 et de petits nombres ensuite; Harchies, nombres variables avec max. 156 le 16.11; BEH max. 120 le 16.11; en Meuse, max. début novembre avec 47 le 02 à Visé et 64 le 09 à Engis. Peu fin décembre. • **Goéland leucophéc** (*Larus cachinnans*) : présence continue en Hainaut occidental et aux BEH mais seulement 1-3 ex. à la fois; les nombres sont plus importants en Meuse liégeoise avec un max. de 12 le 09.12 à Engis. • **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : sa fréquence actuelle n'a plus rien à voir avec celle d'il y a quelques années : max. mosan de 270 le 19.12 à Engis, max. hennuyer de 70 en novembre et 124 en décembre. • **Goéland marin** (*Larus marinus*) : 1 ad. le 21.11 à Gaurain-Ramecroix et 1 ex. le 06.12 à Warneton.

**Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : fin de migration en novembre avec encore 3 ex. en 2 h le 12 à Havay. • **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : le passage très important de l'automne se termine en novembre avec deux vagues, celle du 30.10-02.11 (max. 1.540 en 1 h le 02 à Wiers) et celle du 08-12.11 : gros passage le 09 en Brabant, 7.475 aux postes d'observations du Hainaut occidental. L'espèce reste ensuite présente en nombres normaux, même en début de vague de froid.

**Perruche à collier** (*Psittacula krameri*) : plusieurs observations en Dyle à Neerijse, Rhode-Sainte-Agathe et Sint-Joris-Weert; à Bruxelles, le prédortoir du bois de la Cambre compte 72 ex. le 15.11.

**Hibou grand-duc** (*Bubo bubo*) : insolite, cet oiseau perché sur l'église de Grandmenil (Manhay) plusieurs jours de suite début novembre. • **Martin pêcheur** (*Alcedo atthis*) : la présence semble déjà faible début décembre, puis l'espèce devient une vision rare en fin de mois.

**Pic noir** (*Dryocopus martius*) : au moins 2 ex. séjournent à Harchies. • **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) : en décembre, début d'une série sans précédent d'observations aux mangeoires : Chiny et Mormont.

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : la migration se poursuit au cours de la première quinzaine de novembre : 1 ex. le 03 à Lommersweiler, 1 le 05 à Wiers, 2 le 09 à Hermée, 9 le 13 à Mariembourg et 1 vers le SO le 14 à Angreau. Le 16.12, 1 ex. à Sberchamps, en pleine Ardenne, est étonnant. Plus exceptionnelles sont les deux données de séjour à partir de fin décembre : un groupe de 12 se nourrissant de graines d'armoise à partir du 29 à Villers-sur-Lesse et 40-50 dans un champ de Péronnes-lez-Antoing à partir du 26, en compagnie de divers granivores. • **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : fin de migration en novembre, avec un petit pic autour du 09 mais encore des passages le 16 et même le 22 (Harzé une centaine). Les bandes qui atteignaient 200-300 en novembre en Moyenne Belgique se réduisent en décembre, surtout en dernière décade. Les départs dus au froid sont cependant progressifs et l'on note encore 350 ex. sur le plateau du Gerny (Marche) le 27; à cette époque, de petits groupes apparaissent dans la vallée de la Meuse.

**Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : des attardées le 05.11 (3 ex.) à Bellefontaine, le 09.11 à Renaix et le 12.11 à Nimy.

**Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : en petit nombre avant le froid de fin décembre en Meuse et Moyenne Belgique (par ex. 25 le 14.12 à Houtain-Saint-Siméon); plus au sud, encore 3 le 22.11 au Gerny et 1 le 06.12 à Melreux. • **Pipit à gorge rousse** (*Anthus cervinus*)\* : 1 ex. le 10.11 à Angre constitue une mention très tardive pour ce pipit. • **Pipit spioncelle** (*Anthus spino-*



*Grive litorne et Grive mauvis*, Xhoris, 22 novembre 1996. (R. Dumoulin)

*letta*) : la présence de l'espèce se renforce en novembre mais les nombres restent faibles en Moyenne Belgique, où le dortoir de Warchin atteint 16 ex. avant de passer à 11 ex. début décembre et se maintenir avec 3-6 ex. en fin de mois. Les autres localités du Hainaut et le Brabant (6 sites) ne donnent lieu qu'à des mentions de 1-9 ex. En Haute Belgique, la présence est plus nette. Le dortoir de Walhorn passe de 1 ex. le 01.11 à 11 le 03, 31 le 16, 31 le 07.12 et 28 le 28.12. Dans l'ESM, la cariçaie de Roly accueille un dortoir de 30-40 les 08-11.11 et l'on note plus tard 21 ex. le 25.12 à Merlemeont et 10 ex. le lendemain à Aublain. Au Luxembourg, plusieurs dortoirs : 20 ex. en novembre à Dampicourt, 15 le 12.11 à Petit-Han, 18 le 07.12 à Longvilly, 10 le 03.12 à Bertogne, mais aussi 30 du 16 au 25.12 en prairie à Jupille-sur-Ourthe. Fin décembre, le froid vide tous les dortoirs. • **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : très tard, 1 ex. le 09.12 à Hampteau. • **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : répandue en novembre-décembre, y compris en ville de Bruxelles (plusieurs hivernantes). • **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : l'hivernage de l'espèce au Luxembourg est à relever : présence en décembre au Gerny, à Marloie, Ciergnon, Mormont, Latour et Villers-sur-Lesse. Présente en très petit nombre en Meuse et en Moyenne Belgique après la fin de la migration, autour de la mi-novembre. A ce moment, encore des grou-

pes notables comme 40 le 09 à Fontenoy et 60 en dortoir urbain le 19 à Mons; max. de décembre : 13 le 21 à Neufvilles.

• **Troglodyte mignon** (*Troglodytes troglodytes*) : à Harchies, des comptages régionaux mettent en évidence une nette diminution fin décembre, lors de l'arrivée du froid. A noter, un chant complet le 20.12 à Petit-Han. • **Accenteur mouchet** (*Prunella modularis*) : à l'inverse du Troglodyte, l'arrivée du froid se traduit par une augmentation à Harchies : 15 ex. le 25.12 au lieu des 5-7 habituels.

• **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : une dizaine de mentions en novembre puis quelques candidats à l'hivernage en décembre, paradoxalement la majorité en Haute-Belgique : 1 ex. le 04 à Ampsin, le 06 à Hotton, le 11 à Marcouray, le 15 à Angre, le 30 à Journal et "en décembre" à Harnoncourt. • **Traquet pâle** (*Saxicola torquata*) : 1 femelle ou juvénile le 09.11 à Roly et, plus étonnant, un couple le 21.12 à Jemappes. • **Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : 3 ex. les 31.10 et 01.11 à Bérismenil, 1 ex. le 10.11 à Wibrin. • **Merle noir** (*Turdus merula*) : 31 ex. le 16.11 pour le tour complet d'Harchies, 57 le 25.12; 24 sur 3,8 km à Wiers le 24.11, 42 le 01.12. A Bersillies-l'Abbaye, 40-50 ex. se nourrissent de pommes le 29.12. • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : le mouvement



entamé à la fin octobre s'accroît début novembre : de gros passages et/ou arrivées importants sont signalés plus particulièrement le 05 à Harzé (2.000 ex. en halte) et les 08-09 dans la région du Viroin (plusieurs milliers), de même qu'en Hainaut occidental et en Brabant. Paradoxalement, rien de particulier en Luxembourg. En décembre, l'hivernage est considéré comme assez moyen; maxima de 600 ex. le 08 et 270 le 12 à Waimes. • **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : seule donnée importante en novembre : 30 ex. sur 5 km à Boirs. En décembre, quelques rares isolés, par exemple 2 ex. à Uccle le 25 et 1 ex. le 31 à Ciergnon. • **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : le passage proprement dit se déroule classiquement de façon similaire à celui de la Litorne : arrivées et passages importants sont mentionnés aux mêmes dates et dans les mêmes régions (Harzé, Viroin, Brabant, Hainaut occidental et Ardenne liégeoise) mais en général en nombre un peu moins important, les gros effectifs étant passé en octobre. La diminution est d'ailleurs plus rapide : les seuls groupes importants signalés après la mi-novembre sont 150 ex. du 16 au 30.11 à Philippeville et 100 le 17.12 à Rosières. • **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : fin du passage en novembre : nombreuses bandes (5-20 ex.) les 08 et 09 dans la région du Viroin, bien répandue à Aywaille jusqu'au 20. Quelques hivernantes sont signalées en décembre : 2 ex. le 01 à Bossut-Godechain, 1 à Wavre le 01, plusieurs à Ombret... A noter, un premier chant le 18 à Pommeroeul.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : encore 4 postes de chant différents en décembre à Harchies. • **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : 3 données pour la période : 1 mâle consomme des graines de fusain le 05.11 à Mariembourg, 1 femelle le 17.11 à Engis et 1 mâle le 18.12 à Rendeux (Chéoux), candidat probable à l'hivernage. • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : plusieurs données, sans doute de migrants attardés, dans toutes les régions jusqu'à la mi-novembre. Candidats plus sérieux au titre d'hivernants : 1 ex. le 23.11 à Molenbeek-St-Jean, le 06.12 à Ochamps, le 11.12 à Frasnes-lez-Couvin, le 15 à Waremme, le 16 à Sterpenich et Rixensart, le 22 à Mariembourg et le 28 à Oost-



*Corbeaux freux*, Harzé, 22 novembre 1996. (R. Dumoulin)

Maarland. • **Roitelet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : renseigné uniquement à Harchies : 1 ex. les 16 et 19.11, 3 le 24.11, 2 le 01.12 et 1 les 16 et 25.12.

**Mésange à moustaches** (*Panurus biarmicus*) : à Harchies, l'espèce est contactée à partir de la mi-novembre : 3 ex. le 16.11, 1 couple le 19, 1 mâle le 04.12, au moins 3 mâles le 14.12, 1 mâle et 2 femelles le 15, entendue le 25. Mention plus étonnante : 1 couple en halte le 09.11 au marais de Warchin. • Pour les **mésanges** (*Parus spp*), les seules observations un peu particulières concernent quelques hivernants en décembre dans des sites inhabituels du Hainaut occidental : 2-3 **Nonnettes** à Harchies, 2 à Angre; 2 **Huppées** dans un jardin à Mons à partir du 14; 1-2 **Noires** à Froyennes, à Mons et à Renaix. • **Sittelle torchepot** (*Sitta europaea*) : suite, sans doute, des mouvements signalés en septembre-octobre, quelques mentions d'une affluente "anormale" dans les jardins ou aux mangeoires



*Moineau friquet.* (F. Renard)

en Luxembourg et en quelques sites inhabituels du Hainaut occidental. • **Grimpereau des bois** (*Certhia familiaris*) : 1 ex. le 14.11 à Woluwe-Saint-Etienne\*.

**Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : nombreuses en Luxembourg en début d'hivernage et série "classique" de mentions dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (une dizaine) et l'est de la province de Liège (6); hors zone habituelle, 1 ex. le 15.11 à Plainevaux (Condroz liégeois).

Très peu d'informations concernant la fin du passage des **Corbeaux freux** (*Corvus frugilegus*) et **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : pour ce dernier, plus de 1000 ex. chaque jour du 02 au 05.11 puis plus réduit du 17 au 21 à Presgaux. Pour le Freux, encore un peu de passage du 08 au 12.11 en Hainaut occidental après une interruption du 01 au 07; un dortoir de 8-900 ex. est noté le 08.11 à Mons. • **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : hors zone habituelle, 1 couple régulièrement noté les deux mois à Wibrin, confirmation de données antérieures; beaucoup plus loin, 1 ex. vers l'ouest le 23.12 à Mouscron\*.

**Moineau friquet** (*Passer montanus*) : quelques bandes de plusieurs dizaines d'ex. signalées en Haute-Belgique, notamment plus de 150 ex. le 12 à Frasnes-lez-Couvin, 80 ex. le 30.11 à Lontzen, 60 le 15.12 à Villers-le-Gambon, 70 le 18.12 à Harzé, 80 le 22.12 à Martués, 100 le 27.12 à Heyd, 100 le 29.12 à Hachy et Fagnolle.

**Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) : 800 ex. en halte le 01.11 à Sart-lez-Spa et passage encore important le 08.11 à Harzé (216 ex. en 1 h) et à Mariembourg (plusieurs centaines en 1/2 h). • **Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : déjà relativement peu fourni en octobre, le passage est quasi insignifiant en novembre. Très peu d'hivernants sont signalés en décembre : au plus 15 ex. le 14.12 à Walhorn et 30+25 le même jour à Fagnolle. • **Serin cini** (*Serinus serinus*) : dernier le 04.11 à Marche-en-Famenne; 2 et 1 ex. les 28 et 30.11 à Woluwe-Saint-Lambert. • **Verdier** (*Carduelis chloris*) : passage peu fourni également mais quelques groupes d'hivernants d'une certaine importance sont signalés : 180 ex. le 23.11 à Tenneville

(Wembay), 120+30 ex. le 14.12 à Fagnolle, dortoir de plus de 150 ex. en décembre dans des houx, avenue Louise à Bruxelles, groupes de 110 ex. le 04.12, 65 le 06, 150 le 14 mais plus que 35 le 19 à Angreau. • **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : plusieurs groupes de 10-20 ex. sont signalés (principalement en novembre) en Hainaut surtout mais aussi en Haute-Belgique : notamment 13-19 ex. en décembre et jusqu'à 50 le 08 à Harchies, 30 le 22.12 à Seneffe, 30 le 21.11 à Hargimont, 30 le 25.12 à Latour. • **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : présence assez forte en novembre, plutôt faible en décembre mais des groupes d'une certaine importance mentionnés par-ci par-là. Dans l'ESM et plus particulièrement dans la vallée du Viroin, nombreuses bandes (10-50 ex., jusqu'à 100) en novembre, nettement plus rare par la suite; dans la vallée de la Meuse, présent en permanence à Ombret, maxima de 150 ex. le 17.12 et 250 le 14.12 à Hermalle-sous-Huy; nettement plus rare dans le reste de la province de Liège. En Luxembourg, maxima de 100 ex. le 11.12 à Rendeux et le 12.12 à Bastogne. Hormis 150 le 23.11 à Houtain-le-Val, plutôt rare ailleurs en Brabant; même chose en Hainaut occidental mais une présence importante à Harchies à partir de fin novembre : en général 40 à 140 ex. et un maximum de 250 le 15.12. • **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : elle se fait rare dès début novembre : outre quelques isolées, 25 ex. le 11 à Oneau, 32 le 24.11 et 30 le 01.12 à Nethen, 6 le 22.12 à Basse-Wavre, 10 le 01.12 à Alleur, 10 le 20.12 à Grivegnée, 18 le 06 et 8 le 14.12 à Angreau. • **Sizerin flammé** (*Carduelis flammaea*) : signalé régulièrement mais en très petit nombre pendant la première quinzaine de novembre dans l'est de la province de Liège, à Ombret et à Mariembourg. Un afflux plus important est constaté dans toutes les régions à partir de la mi-novembre mais les effectifs restent néanmoins le plus souvent peu importants : une dizaine d'observations totalisant un peu plus de 100 oiseaux en Luxembourg, 5 mentions en Brabant dont 32 ex. le 24.11 et 30 le 01.12 à Nethen et 40 ex. le 15.11 à Huppaye, 60 ex. le 24.11 et 25 le 25 à Harchies, 22+20 ex. le 10.12 à Hensies, 45-50 le 27.12 à Seneffe/Ronquières. A Ombret, la sous-espèce nordique (*C. fl. flammea*) est notée réguliè-



*Grosbec cassenois*. (Franck Renard)

ment à partir du 18.11 (100+70 ex. ce jour), souvent en mélange avec le Sizerin flammé cabaret. Ailleurs, la sous-espèce n'est en général pas précisée, sauf dans l'est de la province de Liège, où le Sizerin flammé nordique est mentionné régulièrement mais concernant presque toujours des isolés. • **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : particulièrement rare cet automne et signalé seulement en novembre; notamment 10 ex. le 17 à Elsenborn et Sart-lez-Spa, 15 le 11 à Latour, 20 le 09 à Rendeux et 40 le 20 en Moyenne-Semois. • La rareté des mentions de **Grosbec cassenois** (*Coccothraustes coccothraustes*) correspond certainement bien à une réelle rareté.

**Bruant lapon** (*Calcarius lapponicus*) : 1 ex. dans un vol d'alouettes le 04.12 à Angreau. • **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : en général assez rare : outre quelques rares mentions de migrateurs début novembre, notons 50 ex. du 25 au 30.11 à Nismes, plus de 100 les 17 et 23.11 et plusieurs dizaines le 29.12 à Dourbes, 100 le

08.12 à Moinet et 90 le 15.12 à Nisramont.  
• **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : quelques petits groupes sont signalés jusqu'à la mi-novembre, ensuite plus sporadiquement; notamment 25 ex. le 13.11 (dortoir) puis 1 à 7 en décembre à Harchies, 10 ex. le 10.11 à Warchin, 10 le 16.11 à Genappe, 10 (dortoir) le 12.11 à Petit-Han, 5 les 08 et 22.12 à Basse-Wavre, 5 à 10 hivernants dans le camp de Marche-en-Famenne

et quelques groupes (jusqu'à 8 ex.) en Hainaut occidental en décembre. • **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : 5 à 58 ex. durant toute la période à Angreau (41 le 25.11, 50 le 04.12, 58 le 14.12), seul groupe d'hivernants signalé, hors une observation de 60 ex. le 24.11 à Gaurain-Ramecroix. Hors zone habituelle de l'espèce, 1 ex. le 15.11 à Roly.

## Ont contribué à cette chronique d'actualité :

Arpigny J.-L., Baijot B., Banant M., Baye J.-M., Bigorne J.L., Blondlet A., Blyth M., Bocca S., Buckinx G., Burnel A., Chable M., Charlier J.M., Chiwy B., Claerhout P., Clermont D., Clesse B., Clotuche E., Collard Ph., Coppée J.-Lo., Coppée J.-Ph., Coquette J.P., Crickillon D., Daulne J.M., Deflorenne Ph., Degossely Ph., Deloyer P., Delvaux J., Deroanne M., Derouaux A. et J.-P., Desablens P., Deschamps D., Detaille R., Dethier T., Dewitte Th., Doblestain F., Dortu Ch., Dufourmy H., Dujardin R., Dumoulin R., Durant M., Fanon Y., Farinelle C., Fouarge J., Gallez J., Geroges A., Gillard M., Grandjean G., Gratia C., Grégoire D., Hanus B., le Hardy F., Héla F., Hubert M., Hupet F., Iweins B., Jacob J.-P., Jacquemin B., Jacquemin M., Janssens M., Jardon B., Jenard Ph., Joris A., Jortay A., Lambert M., Laudelout A., Lepinois J.-C., Libois R., Libert C., de Liedekerke R. et C., Loison M., Loly P., Lucas Ph., Malengreau A., Mardulyn H., Matagne J., Matgen O., Mengal J., Molitor B., Moncousin M., Monmart A., Muyshont D., Nicolas M., Paquay N., Paquay M., Paquet J.-Y., Percsy C. et N., Philippart B., Piette J., Pierre, P., Piraux B., Portier B., Ravet P., Rega A., Renoy A., Roland S., Roskam Y., Rotsaert G., Rousseau Ch., Ruyschaert F., Sacré P., Scharls B., Schmitz L., Schoebrechts O., Sédek J., Sente F., Swinnen U., Testaert D., Thonnard P., Tricot B., Tricot J., Vanbelligen V., Van Halst V., Van Volsem J., Vandevyre X., Verroken D. et L., Vieuxtemps D., Voituren D., Watelet M., de Wavrin H., Wilputte S., Zeicher M., les observateurs de Latour et du Groupe de la Trientale (C.N.B.)... et quelques autres, sans doute, que nous avons oubliés. Qu'ils soient bien persuadés que cela est tout à fait involontaire.

Les données ont été rassemblées par les délégués régionaux de la COA : J-Lo Coppée, P. Loly, D. Muyshont, P. Degossely, D. Vieuxtemps, A. Monmart et H. de Wavrin.

Rédaction : Jean-Paul Jacob, René de Liedekerke, Dominique Testaert et Emile Clotuche.