

NOTES

Un Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) à Recogne-Libramont les 27 et 28 juin 1997 *

par Didier VIEUXTEMPS¹

Le 27 juin 1997, arrivant à hauteur de l'étang de l'usine "l'Oréal" à Recogne (Province du Luxembourg), mon attention est attirée par un oiseau à l'allure de petit héron blanc. Son identification aux jumelles est immédiate : un Crabier chevelu ou Héron crabier. L'oiseau (voir photo) présente un splendide plumage nuptial : livrée ocre éclatante au niveau du manteau et des scapulaires, long panache de plumes descendant sur le dos, bec bleu à bout noir, rémiges et rectrices blanches, pattes rose-rouge. L'œil est coloré par un iris jaune et une pupille noire. Posé dans la végétation de la rive, le Crabier, silencieux, chasse à l'affût et consomme une grande quantité de Grenouilles vertes, qu'il avale d'une seule pièce. Les batraciens constituent, comme l'on sait, une des principales sources de nourriture de cette espèce de héron.

Le site d'observation est un petit étang artificiel (environ 2 ha) creusé en bord de route dans l'enceinte de l'usine "l'Oréal" (domaine privé, fermé au public). La végétation des rives est composée de graminées, de plages de joncs et de quelques bouquets de saules dans lesquels le héron se perchait volontiers.

La venue du Crabier en Belgique

En Europe, l'aire de distribution du Crabier chevelu se limite aux bassins de la Méditerranée, de la mer Noire et de la Caspienne, ainsi qu'à une partie de l'Europe centrale. Les oiseaux qui parviennent au printemps dans le nord-ouest du continent ont dépassé leur zone de nidification; plus tard, les observations concernent plutôt des hérons en dispersion postnuptiale.

En Belgique, le Crabier a toujours été considéré comme un visiteur accidentel. Jusqu'en 1997, 29 mentions seulement sont connues dont 11 avant 1950 et 17 depuis. La relative rareté des données "récentes" trouve un parallèle dans les îles Britanniques où l'on enregistre 90 données avant 1958 et 23 de 1958 à 1985 (DYMOND *et al.*, 1989). Il est probable que ce héron fut plus fréquent dans le passé et qu'il nichait plus au nord que

Reçu le 06.10.1997.

* Observation soumise à la Commission d'homologation.

(1) Rue Chantevent 20, B - 6900 Marloie (Marche-en-Famenne).



Crabier chevelu
(*Ardeola ralloides*),
Libramont, 28.06.1997.
Photo Luc Verroken.

de nos jours (peut-être même aux Pays-Bas - SOVON, 1987). Le commerce des plumes ornementales de son plumage nuptial, diverses pertes d'habitats et les conséquences de sécheresses sahéliennes (cfr la quasi absence de données dans nos régions après les hivers de forte sécheresse) sont les principales causes avancées pour expliquer son relatif déclin.

L'observation de Recogne est la deuxième effectuée en Belgique à l'est de la Meuse. Les données précédentes se répartissent entre 20 mentions de Flandre (liste en annexe) et 8 de Wallonie. Ces dernières sont :

- Tournai (Ht), deux captures avant 1840 sur les bords de l'Escaut (E. DE SÉLYS LONGCHAMPS *in* VAN HAVRE, 1928);
- Huy (Lg), bord de Meuse, une capture en 1841 (*idem*);
- Namur (Na), Ruisseau du Grand-Pré, une capture en 1863 (FALLON, 1865 *in* VAN HAVRE, 1928);
- Obigies (Ht), marais, une capture vers 1877 (M. DE CONTRERAS *in* VAN HAVRE, 1928);
- Rance (Ht), une capture fin mars ou début avril 1953 (LIPPENS, 1954; AVIFAUNE DE BELGIQUE, 1967);
- Harchies (Ht), 1 ad. le 9 juin 1981 (*Aves* 20, 1983 : 34);
- Sainte-Marie-sur-Semois (Lux.), 1 ex. le 15 juillet 1986 (*Aves* 24, 1987 : 138).

A l'échelle des trente dernières années, l'espèce est restée un visiteur très irrégulier en Belgique : entre 1968 et 1997, neuf années seulement ont donné lieu à son observation. Parfois, de petits afflux sont décelés, comme celui de 1979 qui fut sensible dans plusieurs pays d'Europe nord-occidentale (4 données de Flandre).




Fig. 1 - Répartition par décades des observations datées effectuées en Belgique.

Les Crabiers n'arrivent qu'exceptionnellement en Belgique à l'époque de leur migration de retour vers les colonies de reproduction, entre mars et mai (Fig. 1). Davantage nous parviennent plus tard, en juin (12 données sur 22 datées avec assez de précision). Comme la reproduction bat son plein à cette époque de l'année, il peut soit s'agir d'oiseaux ayant poursuivi leur route vers le nord après avoir dépassé leur zone de nidification, soit de non nicheurs ou d'oiseaux ayant échoué en dispersion estivale. On notera la rareté des mentions plus tard en été (une seule en août). Dans tous les cas sauf un, il s'agit d'oiseaux isolés. Les séjours sont rares : 21 mentions de un jour, 5 de deux, 2 de trois et 1 de onze jours.

Sous plusieurs aspects, la donnée de Recogne s'inscrit donc dans la "moyenne" des données belges.

SUMMARY - A Squacco Heron (*Ardeola ralloides*) in Recogne-Librumont (Ardenne) on 27-28 June 1997.

An adult in nuptial plumage stayed two days near a pond, eating numerous Green Frogs. This record is the second in Belgium east of Meuse on a total of 29. The Squacco Heron is an accidental visitor in Belgium, where majority of observations were made in June.

Bibliographie

COMMISSION POUR L'AVIFAUNE DE BELGIQUE (1967) : Avifaune de Belgique. *Le Gerfaut*, 57 : 365 - 465.

DYMOND, N., FRASER, P.A. & GANTLETT, S.J.M. (1989) : *Rare Birds in Britain and Ireland*. T. & A.D. Poyser, Calton.

VAN HAVRE, G.C.M. (1928) : *Les oiseaux de la faune belge*. Ed. M. Lamertin, Bruxelles.

LIPPENS, L. (1954) : *Les oiseaux d'eau de Belgique*. E. Vercruyssen - Van Hove, Saint-André-lez-Bruges.

SOVON (1987) : *Atlas van de Nederlandse Vogels*. Arnhem.

Annexe : Mentions du Crabier chevelu en Région flamande.

Les données sont extraites de la compilation des synthèses de van Havre (1928), VERHEYEN (1948), LIPPENS (1954), LIPPENS & WILLE (1972), de l'Avifaune de Belgique (1967), de la synthèse "*Vogels in Vlaanderen*" (VLAVICO, 1989) et des rapports des Commissions d'Homologation.

Ellen, près de Hasselt, une capture vers 1870; Léau (Zoutleeuw), une capture le 2 juin 1905; Itegem, une capture en mai ou juin 1910; Grobbendonk, 1 ex. tiré et un second observé fin juillet 1929; Courtrai, 1 ad. capturé le 19 mai 1934; Merksem, 1 ex. le 24 mai 1953; Anvers, Borgerweert, 1 ad. les 25-26 juin 1966; Beek, Bree, 1 ex. le 17.06.1969; Lierre, 1 ex. du 17 au 28.06.1979; Hoeilaart, 1 ad. les 20-21.06.1979; Sint-Jan-in-Eremo, 1 ex. du 30.06 au 02.07.1979; Knokke, Zwin, 1 ex. le 1er mai 1981; Kalmthout, 1 ad. le 5 juin 1981; Zonhoven, 1 ex. le 15 juillet 1981; Snaaskerke, 1 ex. du 16 au 18 mai 1982; Neerpelt, 1 ex. le 12 juillet 1982; Kallo/Doel, 1 ex. les 23 et 24 juin 1991; Lierre, 1 ex. le 6 juin 1992; Lokeren, 1 ex. les 12 et 13 août 1992; Harelbeke, De Gavers, 1 ex. le 13 juin 1993 .