

Centrale ornithologique Aves<sup>1</sup>

## Observations récentes : mars - mai 1997

### FAITS SAILLANTS

Début mars, le temps doux s'accroît et la végétation démarre : les saules marsault, les peupliers, les jonquilles fleurissent. Cette météo clémente, chaude dans le sud de l'Europe, permet le retour rapide de quelques migrateurs précoces (dont les premiers retours ont parfois été signalés dès février) comme le Traquet pâle, le Rougequeue noir, le Bruant des roseaux, le Pouillot véloce.... Certaines migrations semblent vite terminées ou sont passées inaperçues (Ramier, Milan royal...).

Mars se caractérise en effet par des températures anormalement élevées et un temps sec, grâce à la prédominance de conditions anticycloniques quasi tout le mois; seule la période du 19 au 23, sous influence polaire, fut plus conforme à la normale. Parmi les valeurs indicatrices à Uccle, retenons une pression moyenne de 1024,3 hPa (normale 1014,9), une température moyenne de 8,6 °C (normale 5,5), un jour de gel (normale 8,4) et 24,3 mm de pluie (normale 53,6).

Du 1er au 7 avril puis du 11 au 22 et du 30 avril au 2 mai, ce fut au tour de courants d'origine polaire de marquer la météo, tandis que la période du 23 au 29 a connu un régime de précipitations. La persistance des courants polaires est à l'origine d'un fort ensoleillement, de températures nocturnes fraîches et d'un temps toujours assez sec (seulement 24,4 mm d'eau à Uccle; normale 53,1). Les vingt jours suivants ont connu une alternance de douceur et de fraîcheur (le plus froid les 7-8), dans une ambiance plutôt humide. Seule la dernière semaine de ce mois de mai, sous l'influence d'un anticyclone centré sur les îles Britanniques, a connu une météo chaude et ensoleillée, propice au début de la fenaison.

La raréfaction généralisée du Martin-pêcheur est un des effets prévisibles de l'hiver, comme la diminution de la Chevêche en Ardenne. C'est peut-être le cas aussi du Corbeau freux. Par contre, on n'a pas constaté de diminution sensible chez d'autres sédentaires comme le Pic vert, la Bouscarle et d'autres passereaux. Mais les rapaces nocturnes ont pratiquement fait l'impasse sur la reproduction, sans doute en raison de la faible abondance des proies (celle-ci est bien plus liée aux mauvaises fructifications enregistrées en été mais on peut tout de même supposer que les rapaces n'étaient pas dans des conditions physiologiques florissantes à la fin du gros coup de froid). L'automne 1996 avait justement été marqué par des mouvements inhabituels d'espèces forestières, liés au manque de nourriture. Beaucoup plus discrets, quelques mouvements de retours ont toutefois été décelés chez le Geai et la Sittelle.

Toujours liées à la météo favorable de mars, des arrivées précoces sont enregistrées chez diverses espèces au cours de ce mois ou même en avril (Petit Gravelot, Bergeronnette printanière, Gor-

---

(1) Centrale Ornithologique AVES

c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

gebleue, Traquet tarius, Pouillot fitis, Couou, Phragmite des joncs, Rousserolle effarvate, Fauvettes grisette et des jardins...), mais elles sont le plus souvent suivies de retours normaux, forts échelonnés, car les conditions atmosphériques sont peu favorables en avril. D'une manière générale, la migration semble d'ailleurs se dérouler dans une certaine discrétion, notamment pour les limicoles et laridés sur les bassins de décantation. S'il faut sortir l'une ou l'autre espèce du lot, on peut citer le Combattant varié, le Merle à plastron en Luxembourg, le Bruant des roseaux. A l'inverse, la Tourterle des bois, le Pipit des arbres (à nouveau), le Pouillot siffleur et la Fauvette babillarde attirent l'attention par leur arrivée tardive et/ou leur rareté, liées à des causes différentes.

Ce printemps apporte en outre son lot habituel de migrateurs rares, notamment une possible première belge (Bécasseau échasse), un Fuligule à bec cerclé, quelques Buses pattues, une Buse de Russie, un Aigle botté, un Goéland à ailes blanches, quelques Sternes hansel, Huppés, Guépriers, une Hironnelle rousseline, quatre Pipits à gorge rousse, encore un Bruant fou... (tout cela sous réserve d'acceptation par la C.H.). Par contre, on n'a pas ou guère eu d'afflux d'espèces orientales, comme le Faucon kobez et la Guifette leucoptère, notés dans des régions proches sous l'influence des vents d'est dominants en avril. C'est pourtant eux, sans doute, qui nous ont amené la Buse de Russie.

Dans un tout autre registre, on notera deux données exceptionnelles de Pic cendré hors de son aire normale et plusieurs de Pic mar en marge des sites connus de reproduction dont, remarquable, un oiseau en mars à Marche-les-Dames. Le Pic noir poursuit son installation dans la vallée de la Haine et le Torcol donne quant à lui quelques signes encourageants en Famenne. Et continuons avec de bonnes nouvelles : le Traquet pâtre et la Pie-grièche écorcheur poursuivent une augmentation inimaginable il y a quelques années, le Faucon pèlerin niche avec succès en Meuse liégeoise et le Bruant proyer effectue un brusque retour inattendu en Famenne et en Gaume.

## DETAIL DES OBSERVATIONS

**Plongeon arctique** (*Gavia arctica*) : deux courts séjours printaniers, dont un relativement tardif : 1 ex. du 13 au 15.03 à Nimy et 1 ex. du 09 au 20.04 à Wépion. • **Plongeon catmarin** (*Gavia stellata*) : un adulte le 14.03 à Obourg.

**Grèbe castagnoux** (*Tachybaptus ruficollis*) : mis à part les 7 chanteurs pour l'ensemble du site d'Harchies fin mars, on signale des couples nicheurs (jamais plus de deux) à Chertal, Lens-sur-Gcer, Peissant, Sart-Dames-Avelines et Genappe, etc. • **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : au comptage de la mi-mars, il reste encore 119 ex. en Basse-Meuse et 80-85 ex. aux BEH plus quelques groupes de moins de 30 oiseaux. Les nicheurs de Auderghem et de Freux reviennent respectivement à la mi-février et à la mi-mars. Quelques données de nidification : 10-11 couples fin mars aux marais d'Harchies et Hensies, 4 couples sur la Meuse à Jambes, 1 couple à Gives et 48 couples nicheurs pour l'ensemble des sites de la Basse-Meuse. • **Grèbe**

**jougris** (*Podiceps grisegena*) : un adulte les 27.04 et 12.05 à Obourg. • **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*)\* : deux remarquables mentions de printemps : un groupe de 5 adultes le 30.04 à Péronnes et 1 adulte du 02 au 04.05 à Obourg. • **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : principalement signalé en Hainaut avec 21 migrants en mars (maximum 11 ex. le 30 à Harchies), 4-5 ex. en avril et 6-9 ex. en mai dont 2 couples à Harchies du 16 au 19.05 et un couple à partir du 27.05 à Quévy. Ailleurs, seulement 2 ex. le 29.3 à Zemst et 1 ex. le 28.03 à Fazone (Noville).

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : à la mi-mars, les dortoirs de Chertal et de Gives totalisent respectivement 920 et 220 oiseaux. Le passage est noté principalement durant la seconde quinzaine de mars. Côté nidification, on compte 103-105 nids à Obourg et 68, soit une augmentation d'une vingtaine par rapport à 1996, à Hensies. Ailleurs, bien qu'il

reste des adultes estivants, il n'y a aucune tentative de nidification.

**Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : encore 1 ex. le 02.03 à Roly puis un chanteur en mars et mai à Virelles (2 le 29.05) et un jusqu'à la mi-avril à Harchies. Un oiseau est encore entendu début mai mais la localisation n'est pas précise : Hensies ou Condé. Plus étonnant : 1 ex. du 13 au 21.04 à Fazone (Noville). • **Grande Aigrette** (*Egretta alba*) \* : 1 ex. le 12.03 à Virelles et 1 ex. du 26.05 au 02.06 au barrage d'Ampsin-Neuville, site bétonné bien différent des milieux généralement fréquentés. • **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) \* : 1 ex. en halte le 14.05 à Genappe. • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : 16 sites totalisent plus de 408 nids, dont environ 94 à Vivegnis, 76-79 à Hensies et 40-45 à Lessive. Un comptage effectué par la suite dans cette dernière colonie a donné un total de 120 poussins. Plumages remarquables : un oiseau mélanique presque total le 16.03 à Gozée alors qu'un autre, mélanique partiel, séjourne en Basse-Meuse. • **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : après une première donnée hâtive de 1 ex. le 02.03 à Chiny, deux observations à la mi-mars (Grupont et Libramont) puis une trentaine principalement en province de Luxembourg et 1 ex. vers le NNO le 09.04 à Angre. Malgré des retours relativement précoces, plutôt prometteurs, la saison de nidification se révélera très mauvaise, avec plusieurs abandons et des accidents comme la chute d'un nid avec ses jeunes du côté de la Croix Scaille. L'espèce continue néanmoins sa progression : la nidification est jugée possible dans les régions de Neuville-en-Condroy, Pailhe-Havelange et Yvoir et est établie pour la première fois dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et en Hautes Fagnes. • **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : les mauvaises conditions rencontrées en avril sur la route des migratrices orientales (voir AVES Contact n° 4/97), expliquent-elles le nombre élevé de données ce printemps, qui concerneraient en partie des oiseaux égarés ? 25 observations sont en effet signalées dont 14 en mai ; la plupart concernent des isolés mais nous épingleons les 7 Cigognes du 25.03 à Bra-sur-Lienne, un séjour de 2 ex. pendant une semaine en mai à Grand-Leez et de 2 puis 3 ex.

(dont un couple cantonné) tout le mois de mai dans la plaine de Beauraing-Focant. • **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) : 1 ex. du 19 au 20.04 et 1 en vol le 27 aux marais d'Harchies, 3 ex. en halte le 20.05 à Genappe. Un des oiseaux de Genappe, porteur d'une bague, était originaire de Vlieland ou de Terschelling.

**Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) : cantonnements dès mi-mars : 3 couples aux marais d'Harchies et Hensies, 4-5 couples en Basse-Meuse. • **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) : 4 ex. vers le NE le 05.03 à Meux. • **Cygne sauvage** (*Cygnus cygnus*) : encore 6 ex. le 20.03 et 7 le 22.03 à Virelles tandis que le groupe d'hivernants de Roly passe de 12 ex. début mars à 7 à la mi-mars puis à 5 fin mars. Ailleurs, 1 ex. le 10.03 à Achène-Taviet. La dernière observation est effectuée le 01.04 à Virelles. • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : faible passage printanier dans le Hainaut : 5 vols totalisent 81 ex. • **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) : 1 ex. du 07 au 13.03 à Péronnes-lez-Binche et un vol de 45 ex. vers le nord le 18.03 à Aywaille. • **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) : plus de quinze données de 1 ou 2 ex., 15 ex. le 15.03 à Oost-Maarland et 140 ex. à l'étang de Vervoz (Ocquier), sans doute le site d'implantation le plus important de Wallonie. L'espèce niche en Meuse namuroise, 9 jeunes sont notés le 17.05 à Jambes. • **Bernache cravant** (*Branta bernicla*) : 4 ex. le 14.03 à Nimy et 1 ex. le 27.04 à Frasnes-lez-Couvin. • **Ouette d'Egypte** (*Alopochen aegyptiacus*) : une vingtaine de mentions, au plus 5 ex. le 03.03 à Oost-Maarland et 4 ex. le 15.03 à Hollogne-sur-Geer. En haute Belgique, 1 ex. le 28.03 à Herve. • **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : hormis le maximum de 43 ex. le 25.04 à Zemst (2 couples nicheurs en mai), les plus grands groupes sont notés en Hainaut occidental, également sur les sites de nidification : 17 ex. à Escanaffles (1 nichée), 13 ex. à Warneton (2 nichées), 22 ex. à Warcoing le 15.03. Nicheur aussi à Melsbroeck (1 couple) et peut-être à Hollogne-sur-Geer (1 couple).

**Aix mandarin** (*Aix galericulata*) : noté principalement en Brabant : 2 couples le 03.03 à Auderghem, 1 couple le 25.03 à La Hulpe, 1 cou-

ple le 11.04 à Genval, 3 ex. le 25.03 à Boitsfort; ailleurs, 7 ex. le 02.03 à Visé et 1 couple le 02.03 à Roly. • **Canard siffleur** (*Anas penelope*): encore quelques groupes en mars avec des maxima de 30 ex. les 24 et 25.03 à Obourg et 24 ex. le 01.03 aux BEH puis, en avril, outre quelques isolés, encore 17 ex. à Obourg, 5 ex. à Roly et 2 ex. à Rhode-Sainte-Agathe le 06.04. Dernier le 17.05 à Escanaffles. • **Canard chipeau** (*Anas strepera*): aux marais d'Harchies, l'effectif passe de 45 ex. en mars à 11 ex. en avril puis 3 couples en mai, peut-être nicheurs. Ailleurs, on note maximum 24 ex. le 16.05 à Zemst et plusieurs mentions de quelques exemplaires dont 4 le 25.03 à Waremmes, 4 ex. le 29.03 à Longchamps (Lux.) et 1 mâle le 23.05 à Vielsalm. • **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*): les dernières grandes concentrations sont notées le 22.03 à Waremmes (200 ex.) et Lens-sur-Geer (120 ex.). Sinon toujours moins de 50 ex. et le passage a lieu principalement de la mi-mars à la fin de la deuxième décennie d'avril. Seulement deux données en mai: 5 ex. le 02.05 aux marais d'Harchies et un mâle le 17.05 à Waremmes. • **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*): encore quelques concentrations début mars: 180 ex. à Waremmes et 120 ex. à Virelles. Une première ponte est notée le 10.03 à Achêne-Taviet et les premières nichées le 07.04. Deux données de succès des nichées: 3 couples accompagnées de 23 pulli à Escanaffles et 11 nichées totalisent 51 jeunes le 27.05 à Genappe. • **Canard pilet** (*Anas acuta*): le passage est médiocre en Hainaut occidental; on y note cependant un groupe de 71 ex. le 20.03 aux marais d'Harchies et un vol de 17 ex. le 17.03 à Fontenoy. Ailleurs, mis à part le record de 140 ex. le 03.03 à Zemst, on ne dépasse jamais les 10 ex. sauf le 20.03 à Roly (17 ex.). Surprenant par sa localisation, un vol de 46 ex. vers le nord le 21.03 à Erezée. • **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*): après les trois premières du 10.03 à Péronnes-lez-Antoing, l'espèce est notée du 12.03 à la mi-avril. Les maxima sont notés à Donstiennes avec 17 ex. le 12.04 et à Roly avec 14 ex. le 06.04; un dernier ex. est noté le 17.05 à Escanaffles. • **Canard souchet** (*Anas clypeata*): passage bien marqué en mars avec des maxima de 289 ex. le 24.03 aux marais d'Harchies, 93 ex. le 21.03 à Obourg et de 33 ex.

le 31.03 à Eghezée-Longchamps. En avril, le passage continue et, excepté Obourg et Harchies où l'on compte respectivement 118 ex. et 97 ex. début avril, le maximum est atteint en province de Luxembourg avec 44 ex. le 05.04 à Latour. Aucune nidification signalée.

**Nette rousse** (*Netta rufina*): une femelle le 02.03 à Hensies et le 11.03 à Harchies, un mâle le 19.03 à Obourg et une femelle échappée du 19.04 au 08.05 à Visé. • **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*): à la mi-mars, la Basse-Meuse ne compte plus que 165 ex. alors qu'il en reste encore 200 à Virelles et 112 à Grand Leez. Quelques groupes de passage sont encore notés jusqu'en mai alors qu'une première nichée de 4 jeunes est déjà signalée à Ploegsteert le 14.05. Quatre données de nidification: 4-5 couples en Basse-Meuse, 2 couples à Gembloux et 1 couple à Genappe. • **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)\*: la femelle présente depuis le 26.02 à Ploegsteert y reste jusqu'au 03.03, une femelle à partir du 05.03 à Warneton (la même?) et un mâle le 16.03 à Chertal. • **Fuligule à bec cerclé** (*Aythya collaris*)\*: un mâle est présent le 06.04 aux marais d'Harchies. Si elle est acceptée par la CH, cette donnée sera la deuxième pour la Wallonie, après celle de mai 1996 à Latour. • **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*): à la mi-mars, la Basse-Meuse totalise encore 64 ex. alors qu'il en reste encore 140 ex. à Virelles et environ 90 ex. aux marais d'Harchies. Les derniers hivernants partent un peu plus tard que les Milouins, début avril. Des cantonnements sont notés à Gembloux, Eghezée-Longchamps, Zemst, Genappes et, nouveau site, Stavelot (au moins tentative de nidification); 9 ex. stationnent encore le 29.05 à Freux. • **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*): une femelle le 02.03 à Hermalle-sous-Argenteau et 1 ex. le 03.03 à Zemst. • **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*): hormis le résident de Jambes, une femelle le 10.05 à Obourg. • **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*): deux femelles le 02.03 à Oost-Maerland, 2 mâles et 1 femelle le 05.04 à Obourg. • **Garrot à oeil d'or** (*Bucephala clangula*): la majeure partie des hivernants quittent la région dans le courant du mois de mars mais il reste encore 15 ex. fin du mois aux marais d'Harchies.

Les dernières observations sont effectuées le 18.04 à Virelles (5 ex.) et le 29.04 à Harchies (1 ex.). • **Harle piette** (*Mergus albellus*) : encore quelques données en mars aux marais d'Harchies, à Obourg et à Roly. Le dernier oiseau quitte Roly le 08.04. • **Harle huppé** (*Mergus serrator*) : 1 ex. le 03.03 à Auderghem et 1 femelle le 06.04 à Obourg. • **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : les hivernants disparaissent fin mars en laissant derrière eux quelques retardataires : 1 ex. le 06.04 à Cox, 1 femelle le 01.05 à Ampsin, 1 mâle le même jour à Oost-Maerland et 1 femelle le 06.05 à Profondeville.


• **Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : à part 1 ex. à une date anormalement précoce le 21.03 à Aubange, les premières sont observées les 05 et 12.05, le passage étant du reste peu noté durant le reste du mois. • **Milan noir** (*Milvus migrans*) : c'est de Lorraine que proviennent les données les plus importantes : 4 ex. le 17.03 et 11 ex. le 30.04. La plupart des 30 autres mentions concernent des isolés et sont réparties majoritairement en avril-mai. Nouveau cas de nidification à Thommen, où la couvaison débute le 22.04. Un ex. capture un jeune vanneau le 02.05 à Nismes. • **Milan royal** (*Milvus milvus*) : le passage se poursuit sporadiquement jusqu'à la mi-mai; deux données seulement concernent plus d'un oiseau : 6 ex. à Hour le 18.03 et à Ciney le 27.03; derniers le 12.05 à Saint-Ghislain et le 19 à Wiers. Seulement une trentaine d'ex. sont signalés en avril-mai. La rareté de l'espèce est soulignée par plusieurs observateurs en Luxembourg tandis que l'on manque d'informations dans l'est. • **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : premiers le 16.03 à Virelles et le 21.03 à Harchies. Le passage se poursuit durant toute la période et des oiseaux séjournent sur les sites classiques comme Harchies mais aucun indice de nidification n'est relevé. • **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : 3 mâles en Fagne Wallonne le 23.03, la plupart des autres données ne concernant qu'un ex. à la fois. Pas moins de 8 données d'attardés en mai, les derniers à Angre le 14 et à Noirefontaine le 19. La nidification de 1996 ne s'est pas reproduite (voir *Aves*, 34 : 39-45). • **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : avec 13 ex., le pas-

sage est moins insignifiant que d'habitude. Premier le 20.04 à Genappe, ce site totalisant d'ailleurs la moitié des données à lui seul, en ce compris le dernier le 24.05. Les femelles sont nettement majoritaires : 10 pour seulement 3 mâles. • **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : son installation se confirme dans le Hainaut occidental : des parades sont notées à Frasnes-lez-Buissenal et à Angre, un transport de proie à Wiers le 17.04 ainsi qu'un ex. à Péronnes-lez-Antoing le 21.04. • **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : 5 migrateurs volant plein nord le 09.03 à Bertrix. • **Buse variable** (*Buteo buteo*) : la migration se poursuit en mars : un groupe de 9 ex. le 07 à Borlon, 8 ex. en 1/2 h le 10 à Bertrix, 9 ex. en 1 h le 15 à Marche, 12 ex. à Limbourg le 16... • **Buse de Russie** (*Buteo buteo vulpinus*)\* : 1 ex. à Angre le 08.04. • **Buse pattue** (*Buteo lagopus*)\* : 1 ex. à Wibrin du 07 au 09.03. • **Aigle botté** (*Hieraetus pennatus*)\* : 1 ex. de phase claire à Angre le 14.05.

• **Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : premier migrateur le 22.03 à Freux, suivi d'une petite quarantaine d'ex., principalement durant les deux dernières décades d'avril. Le passage est noté surtout dans les provinces de Liège et du Luxembourg : 13 mentions chacune. Dernier du printemps le 27.05 à Virelles.

• **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : nidification précoce aux BEH : 2 jeunes volants le 17.05. Comportement rarement noté, un couple capture des insectes en vol le 07.03 à Mariembourg. • **Faucon kobez** (*Falco vespertinus*)\* : 1 femelle le 22.04 à Wellin, 1 mâle les 01 et 17.05 à Harchies et 1 femelle le 17.05 à Genappe. • **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : 18 mentions d'isolés dont les deux tiers en avril, le dernier à Bastogne le 26. • **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : après 1 ex. anormalement précoce le 09.03 à Wibrin, premiers le 10.04 aux marais d'Harchies qui rassemblent une fois de plus les effectifs les plus importants : 19 ex. le 23.04, 17 le 01.05 et encore 11 ex. le 25.05. La majorité des observations ont lieu en mai et des oiseaux cantonnés sont notés à Yvoir, Haccourt (parade le 03) et Amblève (Born). Des observations en fin de mois ont lieu





*Echasses blanches (couple) : Eghezée-Longchamps, 04.05.1997. A. Joris.*

sur les sites de nidification présumés de Oud Heverlee, Boitsfort, Roly et Mariembourg. • **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : 7 mentions d'isolés dans le Hainaut en mars et 1 ex. tout le mois à Castillon. Encore 5 données en avril mais la principale nouvelle est évidemment la réussite d'une couvée en nichoir à la centrale électrique de Seraing (envol de 3 juv. le 22.05). Par contre, le couple installé à Tihange échoue.

**Gelinotte des bois** (*Bonasa bonasia*) : toutes les données concernant cette espèce rare et discrète sont utiles pour documenter son aire de répartition; 1 ex. à Laneuville-au-Bois le 10.03, à Pays-les-Veneurs le 11.03, à Muno le 16.03 et à Doische le 28.05. • **Tétras lyre** (*Tetrao tetrix*) : en mars, 2 femelles dans la Fagne de Malchamps le 12 tandis que 3 mâles paraded le 22 en Fagne Wallonne. • **Perdrix grise** (*Perdix perdix*) : trois couples sur 1 km<sup>2</sup> à Jamagne le 13.03. Sans qu'on puisse exclure des oiseaux réintroduits, un couple à Jallet (Condroz hutois) le 19.05, région d'où l'espèce avait disparu depuis près de 20 ans. • **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*) : premières le 01.05 à Woluwe-St-lambert, le 03 à Autelbas, le 04 à Vonêche, le 07 à Merlemont et Focant. Déjà 3 chanteurs à Angreau le 17.05.

**Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : données fragmentaires : une douzaine de cantons en mars aux marais d'Harchies, 1-2 ex. à Roly en avril-mai, 5-6 ex. à Virelles à la mi-mai et 1 ex. à Sart-Dame-Avelines à la même époque. • **Poule**

**d'eau** (*Gallinula chloropus*) : surprenant, l'espèce est totalement absente de Virelles en avril-mai et signalée en diminution à Mariembourg. • **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : encore 327 ex. sur les lieux d'hivernage en Basse Meuse le 16.03 et 254 ex. à Harchies le 20.03, où le premier nid est noté le 26.

**Grue cendrée** (*Grus grus*) : ayant débuté en février, le passage se poursuit principalement durant la première quinzaine de mars avec deux pics : le 07 avec environ 6.000 ex. dans le Luxembourg et le 09 avec 4.500 ex. dans le Luxembourg et 550 ex. dans la province de Liège. Quelques vols sont notés en dehors du couloir de migration habituel : 11 ex. à Angreau le 04.03, 6 ex. à Namur le 09.03 et 70 ex. le 31.03. Une isolée attardée est posée à Fagnolle le 15.04 et une autre séjourne à Recogne du 21 au 27.04.

**Huitrier pic** (*Haematopus ostralegus*) : Abondance inhabituelle de données. A côté de migrateurs isolés, dont 1 ex. vers le N le 07.03 à Cugnong (Mortehan), quelques données attirent l'attention : un groupe de 15 ex. le 05.04 à Obourg, 8 ex. le 01.05 à Oost-Marland, 5 ex. le 26.05 à Genappe et un couple en avril-mai à Vilvorde. • **Echasse blanche** (*Himantopus himantopus*)\* : cette espèce rare mais presque annuelle au printemps fournit deux données : 2 ex. du 03 au 05.05 à Eghezée-Longchamps et un couple paradant avec tentatives d'accouplement le 19.05 à Fontenoy. • **Avocette** (*Recurvirostra*

*avosetta*) : passage concentré en mars-avril; deux groupes importants sont à signaler : 33 ex. le 23.03 aux BEH et 23 ex. le 28.03 à Genappe; les autres données sont plus classiques, 1-2 ex. à Waremmes, à Zemst, à Obourg... et, plus rare, une donnée ardennaise : 1 ex. le 14.03 à Fazone (Noville). Tentative de nidification à Eghezée-Longchamps, où la ponte est détruite par des corneilles en mai, et 2 couples à Escanaffles en avril-mai, sans preuve de nidification.

**Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*) : premiers retours dès début mars : le 02 à Eghezée-Longchamps, le 08 à Harchies... puis passage culminant vers la mi-avril : 23 ex. le 14.04 à Latour, 18 ex. le 24 à Eghezée-Longchamps. Trop peu de renseignements concernant les nidifications. • **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : passage dérisoire en Wallonie (18 ex. au total !) à partir de début mars (2 ex. le 02 à Vitelles et 1 ex. le 10 à Angreau) alors qu'en province de Luxembourg, on mentionne 3 données en mai, ce qui est inhabituel : à Longchamps et Latour les 04 et 05, au Gerny le 21. • **Gravelot à collier interrompu** (*Charadrius alexandrinus*)<sup>\*</sup> : 1 ex. de cette espèce rare à l'intérieur des terres, du 18 au 20.04 à Eghezée-Longchamps. • **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : le passage, dans l'ensemble assez faible, est noté en trois courtes périodes : tout début mars et fin mars en Moyenne Belgique (entre le 02 et le 06 à Castillon, Angreau et Houtain-le-Val, total 264 ex.; 50 ex. le 29 à Petit-Enghien, 67 ex. le 22 et 230 le 29 à Warneton) puis le 02.04 en Luxembourg (3 groupes totalisant 127 ex.). Trois mentions très tardives en mai : 1 ex. le 05 à Leugnies, 1 ex. le 07 à Lessines et 1 ex. le 19 à Meux. • **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : alors que l'espèce semble réapparaître à Bruxelles (2-3 nicheurs à Neder-over-Hembeek), une diminution est constatée en Condroz et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. En mars, un seul groupe important est mentionné : 2.000 ex. le 07.03 à Renuâmont (Sainte-Ode).

**Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : accepté un exemplaire précoce le 31.03 à Eghezée-Longchamps, le passage totalise 10 ex. entre le 01 et le 25 mai. • **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : 1 ex. le 04.05 à Eghezée-Longchamps et un groupe de 3 ex. le 11.05 à Genappe. • **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : ce bécasseau toujours rare au passage prénuptial fournit une seule donnée : 1 ex. début mai à Eghezée-Longchamps. • **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : le passage totalise un peu plus de 50 ex. et s'étale de début mars (2 ex. le 03 à Ploegsteert) à la mi-mai, sans pic marqué. Groupes principaux : 11 ex. le 24.03 à Eghezée-Longchamps et 6 ex. le 20.04 à Quévy. A l'est de la Meuse, 1 ex. le 01.04 à Dion (Beauraing). • **Bécasseau échasse** (*Micropalama himantopus*)<sup>\*</sup> : un limicole observé pendant deux minutes à Quévy le 25.04 fut identifié comme appartenant à cette espèce. En cas d'acceptation par la Commission d'Homologation, il s'agirait d'une première pour la Belgique. • **Combattant** (*Philomachus pugnax*) : passage à partir du 16.03 (17 ex. avec des vanneaux à Torgny) puis se développant de façon spectaculaire fin-avril début-mai : max. 90 ex. le 20.04 à Eghezée-Longchamps, 41 ex. le 04.05 à Genappe et 21 ex. le 30.04 à Lens-sur-Geer. Il est toutefois très peu décelé en Hainaut occidental, où la seule donnée importante est 26 ex. le 28.03 à Fontenoy. • **Bécassine sourde** (*Lymnocyrtus minimus*) : les migrants et les derniers hivernants sont renseignés ci et là (1-2 ex.); le dernier oiseau est observé le 14.04 à Genappe. • **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : dans l'ensemble peu nombreuse et peu renseignée sauf 50 ex. le 15.03 à Dampicourt; les derniers migrants sont observés le 17.05 à Hour et le 18.05 à Genappe. • **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : le passage est dans l'ensemble assez modéré mais un pic très marqué apparaît dans la deuxième quinzaine de mars : un groupe de 190 oiseaux (!) est en effet observé le 17.03, puis un de 48 ex. le 21, à Fontenoy. • **Barge rousse** (*Limosa lapponica*) : seule donnée, 1 ex. en vol le 20.04 à Frasnes-lez-Buissenal. • **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : le passage de ce printemps totalise 33 migrants dont 29 ex. à Genappe entre le 09 et le 26.04. • **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : le passage se concentre principalement dans la deuxième quinzaine du mois de mars; le plus gros groupe totalise 26 migrants en vol le 28.03 à Fontenoy. • **Cheva-**

**lier arlequin** (*Tringa erythropus*) : après 5 premiers exemplaires le 16.03 à Warcoing, on observe un passage très faible pour ce chevalier classiquement peu abondant; la majorité des oiseaux sont observés durant la deuxième quinzaine d'avril. • **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : le passage est particulièrement marqué en Hainaut dans la deuxième quinzaine de mars (100 ex.) et début avril avec entre autres 34 ex. le 17.03 à Fontenoy et 46 ex. à Gaurain-Ramecroix le 06.04; derniers migrateurs le 25.05 à Genappe. • **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : apparition précoce dans l'Entre-Sambre et Meuse (1 ex. le 03.04 à Aublain et le 09.04 à Merbes-le-Château) puis retour progressif ailleurs à partir du 15.04; le passage peut être qualifié de normal et culmine fin-avril début-mai. • **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : passage noté surtout en avril, culminant vers le 20 : 14 ex. le 29.03 et 19 ex. le 15.04 à Latour, régulièrement 15-20 ex. en avril à Eghezée-Longchamps, mais peu en Hainaut et en Hesbaye liégeoise. Dernier migrateur observé le 16.05 à Fontenoy. • **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : passage "anectodique" en mai (moins de 35 oiseaux au total); maximum 8 ex. le 03.05 à Eghezée-Longchamps. • **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : premier le 17.04 à Virelles puis passage plutôt faible par la suite; seulement 27 ex. au canal Hensies-Pommeroeul le 30.04. • **Tournepierre à collier** (*Arenaria interpres*)\* : la seule donnée concerne 1 ex. le 04.05 à Genappe.

**Mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*)\* : de plus en plus régulière : 1 ex. le 25.03 à Péronnes-lez-Antoing. • **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : passage peu développé, observé presque exclusivement en Hainaut (total de 30-40 ex.); premières (3 ex.) le 10.04 aux BEH, maxima de 8 ex. le 20 et 6 ex. le 29 à Péronnes-lez-Antoing, dernières le 02.05. • **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : la dernière concentration renseigne 1.000 ex. à Virelles le 05.03; la nidification est renseignée à Zemst, Genappe (6 couples), Hollogne-sur-Geer, Waremme, Eghezée-Longchamps et Fontenoy (250 nids le 11.05 mais plus que 164 le 22.05). • **Goéland cendré** (*Larus canus*) : la ni-



*Sterne hansel; Eghezée-Longchamps, 04.05.1997. A. Joris.*

fidification est bien suivie dans la vallée de la Haine où un total de 15 nids plus 3-4 couples cantonnés (et 6 premiers pulli) est dénombré le 30.04 à Obourg. Un couple cantonné aussi à Harchies en avril, mais sans suite. • **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : bien que toujours rare, il apparaît plus fréquent que le Goéland argenté en province de Luxembourg, où il est observé trois fois ce printemps : 5 ex. le 17.03 à Bertrix, 1 le 04.05 à Latour et 5 le 21.05 au Gerny (Marche). Peu de données ailleurs mais 50 ex. en halte sur les vasières le 05.03 à Virelles et 80 en halte dans les champs le 15.05 à Angreau; 3 ex. de la sous-espèce *graelisii* à Visé le 19.04. • **Goéland leucophée** (*Larus cachinnans*) : 1 ex. le 01.03 aux BEH, 3 ex. à Visé le 19.04 et 2 ex. à Lixhe le même jour; puis en mai deux données en Hainaut : 1 ex. en plein champ à Angreau le 15.05 et 2 imm. le 16.05 à Harchies. • **Goéland à ailes blanches** (*Larus glaucooides*)\* : un immature deuxième hiver est observé à une date pour le moins inhabituelle (01.05) au barrage d'Ampsin-Neuville. • **Goéland marin** (*Larus marinus*) : 1 ex. le 31.03 à Warneton. • **Sterne hansel** (*Gelochelidon nilotica*)\* : à Eghezée-Longchamps, 1 ex. est observé le 03.05 et le 07.05, puis un groupe exceptionnel de 4 ex. pendant une dizaine de minutes le 18.05. Ces apparitions pourraient être en partie expliquées par la sécheresse sévissant à cette époque dans le pourtour méditerranéen sur les sites de nidification, poussant de cette façon des individus à remonter plus vers le nord. • **Sterne pierregarin** (*Sterna*



*hirundo*) : après une première très hâtive le 28.03 à Péronnes-lez-Antoing, le passage d'avril-mai peut être qualifié de dérisoire : seulement 24 migrateurs dont 8 le 29.04 à Harchies. Notons toutefois deux observations, les 26.04 et 03.05 à Latour. • **Sterne arctique** (*Sterna paradisaea*)\* : 1 ex. le 29.04 à Péronnes-lez-Antoing; il faut noter qu'un autre observateur mentionne une Sterne pierregarin le même jour au même endroit. • **Sterne naine** (*Sterna albifrons*) : 1 ex. le 18.05 à Harchies. • **Guifette moustac** (*Chlidonias hybridus*)\* : un migrateur en halte du 25 au 27.04 à Obourg. • **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : son passage peut être qualifié d'un des plus médiocres de ces 10 dernières années : à peine 40 oiseaux pour le Hainaut et encore moins en Hesbaye (maximum 11 ex. le 04.05 à Eghezée-Longchamps); seul Oost-Marland attire l'attention avec 29 et 28 ex. les 03 et 04.05.

**Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : très faible migration début mars. • **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : arrivées au compte-gouttes : premières le 22.04 à Villers-sur-Lesse et Boeur, 2 ex. le 27.04 à Dailly, les 3 premières le 03.05 à Genappe... L'espèce n'est ensuite renseignée qu'en très petits nombres, sauf exceptions : 11 migratrices le 17.05 à Harchies, 26 le même jour dans une jeune plantation d'épicéas à Tournay (Neufchâteau), 8 ex. le 29.05 à Hargimont, 2 chanteurs et 1 couple construisant sur 5 km<sup>2</sup> le 17.05 à Boussu-en-Fagne, 1 ex. le 31.05 à Uccle, etc.

**Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : un premier chanteur est entendu le 31.03 à Châtillon; suivent des coucous notés le 06.04 à Harchies, le 10.04 à Virelles et au Luxembourg, le 17.04 à Eghezée-Longchamps, le 19.04 à Villers-sur-Lesse. Les retours deviennent plus fréquents à partir du 23.04 mais les premiers ne reviennent que le 02.05 en fagne de Malchamps (retard classique des retours en haute Ardenne par rapport à d'autres régions). Passages manifestes autour du 17.05; des chants nocturnes le 18-19.05 à Neufvilles et Mont-Ste-Genviève; toujours rare, une femelle de phase rousse le 10.05 à Hensies.

**Hibou grand-duc** (*Bubo bubo*) : des niches sont renseignés à Beauraing, à Le Roux, en bordure du plateau du Gerny, dans les vallées de l'Eau Blanche (couvaion le 02.03) et de l'Eau Noire, ainsi que des cantons à Vaucelles en avril, à Remouchamps, Modave, Hermalle-sous-Huy, Ben-Ahin, Durnal et Hemptinne. Un cadavre en bord de route le 15.05 à Yvoir. • **Chouette chevêche** (*Athene noctua*) : elle semble avoir souffert de l'hiver en Ardenne, où elle n'est plus retrouvée sur un ensemble de 8 villages de la région de Bastogne. • **Hibou moyen-duc** (*Asio otus*) : médiocre reproduction, sans doute en raison de la rareté des micro-mammifères. • **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 1 ex. le 19.05 à Vance. • **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : après l'abondance de 1996, 1997 est une année de reproduction presque nulle : un seul cas établi.

**Engoulevent d'Europe** (*Caprimulgus europaeus*) : un premier mâle est de retour le 03.05 à Lagland. • **Martinet noir** (*Apus apus*) : retours sporadiques à partir du 16.04, massifs dès le 01.05. Premières données locales : 1 ex. le 16.04 à Laîche, le 17.04 à Eghezée-Longchamps, le 18.04 à Barvaux-sur-Ourthe, 1 ex. à Latour, 2 ex. à Genval et 1 ex. à Mariembourg le 20.04, plusieurs le 24.04 à Huy et à Namur, 4 ex. le 25.04 à Spa, 5 ex. le 26.04 à Virelles, 20 ex. le 27.04 à Korbeek-Dyle, 53 ex. le 29.04 à Harchies... • **Martin pêcheur** (*Alcedo atthis*) : une très forte diminution était prévisible après l'hiver que nous avons connu. De ce fait, le Martin a fait l'objet d'une attention accrue. Au Luxembourg, les pertes sont estimées de l'ordre de 90%. Ailleurs, la dégringolade est un peu moins forte et la Meuse semble jouer son rôle de zone ressource (relire l'article de R. Libois et C. Hallet "Situation critique de populations de Martin-pêcheur après le rude hiver 1984-1985" dans le Bulletin Aves 1985 : 257-264). On renseigne 1 couple à Harchies, des oiseaux réguliers en mai à Oud-Heverlee, la présence en mars-mai à Roly, des observations à Lasne, Sart-Dames-Avelines, Souleme, Mariembourg, Nismes, Couvin, Vierset-Barse et Vaux-sous-Chèvremont, des niches à Chertal, Namèche, Bas-Oha, Goyet, Chevetogne, Virelles, Serville, Beignée, Monti-

gnies-le-Tilleul, Dave, Annevoie, Vaucelles, Fontaine-Valmont, Labuissière, Ham-sur-Meuse et Vireux-Wallerand. Il n'y a qu'un site occupé entre Aywaille et Poulseur, contre 4 en 1996. • **Guêpier d'Europe** (*Merops apiaster*)\* : 3 ex. se posent quelques minutes dans les arbres entourant un jardin à Rancimont-Léglise le 15.05. • **Huppe fasciée** (*Upupa epops*) : quelques arrivées peu après la mi-avril : 1 ex. le 18.04 à Lierneux, le 19.04 à Chiny, du 20.04 au 03.05 à Lagland et le 24.04 aux Awirs.

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) : à la même époque que les huppées, 1 ex. le 17.04 à Herve. L'espèce confirme sa présence de 1996 en Famenne : premier le 12.04 à Marche où 3 cantons s'établissent ensuite, 1 ex. le 30.04 à Beauraing, le 04.05 à Noisieux et le 17.05 à Hour. Ailleurs en mai, 1 ex. le 14 à Latour et le 31 à Liège (nicheurs?). • **Pic cendré** (*Picus canus*) : un chanteur le 08.03 à Bronromme (La Reid). La population de haute Ardenne liégeoise est réduite : 6-8 cantons. Pas de données de Lorraine mais 1 chanteur le 22.04 en forêt de Rulles (Ardenne méridionale). En revanche, des observations inattendues proviennent de régions franchement en dehors de l'aire de répartition connue : 1 chanteur\* le 15.05 à Bernissart, dans des saules bordant le ruisseau dit du Courant des Quinze Paris, et 1 ex. le 20.05 à Beauraing\*.

• **Pic noir** (*Dryocopus martius*) : un nouveau site occupé dans la vallée de la Haine : 1 canton au bois d'Havré. On notera aussi 1 ex. en vol à Hensies-Pommeroeul le 15.05, 2 cantons dans les bois de la Gelbressée au nord de Marche-les-Dames et 1 canton à Seilles, outre des contacts fréquents dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse et en Ardenne-Lorraine. L'hiver ne semble pas avoir été trop mal supporté. • **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) : 1 chanteur les 01-02.03 à Roly, 1 ex. le 02.03 et le 07.05 à Géronsart, 1 ex. le 31.03 à Villers-aux-Tours, 1 ex. le 19.04 à Lorcé. Un nouveau canton hors aire connue dans le bassin de l'Ourthe : 1 chanteur le 24.04 dans le bois de La Roche. Plus insolite est cet autre chanteur contacté les 08 et 10.03 dans les bois au nord de Marche-les-Dames. A Châtillon, 1 chanteur était encore hors de la forêt le 09.03, dans un site irrégulièrement visité en hiver.

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : à Péronnes-lez-Antoing, le dernier contact (11 ex.) avec le groupe d'hivernants a lieu le 03.03. La migration est perceptible dès début mars avec notamment 12 ex. le 07 au Gerny (Marche). Les sites de reproduction sont progressivement réoccupés au cours de ce mois : max. de 6 chanteurs dans la réserve de Seilles (2-3 couples nicheurs probables), 9 cantons à Lagland (Arlon) le 29.03 et 13 chanteurs dans le camp de Marche en avril. Encore une migratrice attardée le 19.04 à Wiers tandis que des chanteurs cantonnés isolés sont notés en mai à Engis et Huy. • **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : espèce quasi oubliée par la plupart des observateurs.

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : après une avant-garde en mars (isolés à Fontenoy le 08, Quévy le 13, une dizaine à Labuissière le 25), le retour se généralise à la fin de la première décennie d'avril : Eghezée-Longchamps le 09, Eprave et Comblain-au-Pont le 10, Oud Heverlee et Neerijse le 12; 16 trous sont déjà occupés le 17.04 à Chertal (Liège). Quelques colonies semblent florissantes : 52 couples nicheurs à Genappe (+10 par rapport à 1996), 90 à Frasnes-lez-Couvin, 100 à Ham-sur-Heure et surtout 173 à Péronnes. • **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : les premières migratrices sont notées durant la seconde quinzaine de mars : le 17 à Harchies, le 19 à Roly, le 21 à Achène, le 22 à Latour, le 23 aux BEH... C'est vers la mi-avril que le passage bat son plein : par exemple, le retour des nicheurs locaux est noté le 08 à Sart-en-Fagne, le 18 à Pailhe et Evelette.

• **Hirondelle rousseline** (*Hirundo daurica*)\* : 1 ex. le 28.04 à Nismes. • **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : traditionnellement plus tardives que celles de cheminée, les premières sont observées en avril : le 04 à Fouvillers, le 06 à Bousval, le 07 à Halma et le 09 à Comblain-au-Pont. Le passage culmine fin avril - début mai : plusieurs centaines à Harchies le 27.04 et à Virelles les 05 et 06.05.

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : cinq isolés de passage : Liège (Chertal) 08 et 17.04, Châtillon 19.04, Tavigny (Boeur) 21.04 et Pommeroeul 15.05. • **Pipit des arbres** (*An-*

*thus trivialis*) : un premier migrateur précoce le 14.03 à Bertrix, avant des dates plus classiques : 31.03 à Lorcé, 02.04 à Romerée, la fin du passage étant notée le 04.05 à Genappe. Une diminution des nicheurs se confirme : l'espèce est absente de sites de nidification antérieurs à Philippeville, Sautour, Vodecée et Jamagne; 3 chanteurs sont décelés sur 6 km à La Reid, contre 8 en 1996. • **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : sporadique en mars, le passage culmine durant les deux premières décades d'avril avec des bandes dépassant parfois la centaine d'ex. : environ 300 par petites bandes le 02.04 à Aublain, 2-300 le 05 à Fagnolle, au moins 200 le 14 à Mariembourg, 200 le 20 à Rochefort... • **Pipit à gorge rousse** (*Anthus cervinus*)\* : quatre données début mai ne sont pas un fait courant : Gaurain-Ramecroix le 01, Lagland (Châtillon) le 03, 1 ex. en plumage nuptial à Focant les 06-07 et à Genappe du 07 au 13. • **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : quelques groupes relativement importants en mars : 20 ex. à Warchin le 06 ainsi qu'à Virelles le 09, 34 ex. à Pommeroeul le 17 et 14 ex. à Warneton le 23. Derniers le 17.04 à Latour et le 19.04 à Villers-en-Fagne. • **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : premières à Hensies et Quévy les 20 et 30.03 mais c'est après la mi-avril que le passage s'intensifie : par exemple 75 ex. à Virelles le 23.04. En mai, des couples nicheurs isolés sont notés au Gerny (Marche), à Niverlée et Roly, tous sites où l'espèce n'était guère présente avant. A Verlaine, en Hesbaye, 14 cantons sont recensés sur 650 ha. • **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergi*) : notée à partir de fin avril (2 ex. le 29 à Mariembourg), c'est en mai que l'espèce est le plus remarquée, avec comme maximum 20 ex. au Gerny (Marche) le 20. • **Bergeronnette printanière flavéole** (*Motacilla flava flavissima*) : 9 exemplaires entre le 18.04 et le 27.05 : Quévy 18.04 et 14.05, Fontenoy 22.04, Hensies 27.04, Warneton 03 (3ex.) et 07.05, Genappe 27.05. • **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : à Achène (Taviet), un couple est de retour sur le site de nidification le 04.03. • **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : c'est après la mi-mars que le passage culmine : ainsi à Harzé, 200 ex. le 18 et 70 le 22 alors que curieusement la première n'est

notée que le 19 à Francorchamps. Un premier jeune volant le 12.05 à Harzé. • **Bergeronnette de Yarrell** (*Motacilla albayarelli*) : 1 ex. les 18-20.03 à Roly, 1 mâle le 24.03 et 1 femelle les 16 et 22.04 à Fontenoy.

• **Rossignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : premiers le 12.04 à Lessive, le 13 à Auffe, le 15 à Harchies et aux Marionville, le 17 (3 ex.) à Mariembourg, le 20 à Champagne (Waimes) ... Pas un seul en mai à Pilot (3 en 1995), 8 chanteurs sur 165 ha en mai à Amay, au moins 20 fin avril sur Mariembourg / Frasnès / Fagnolle, 5 sur 450 m le 13.05 à Frasnès-lez-Couvin. • **Gorgebleue** (*Luscinia svecica*) : premiers retours très précoces le 02.03 (passage?) à Rosières et le 08.03 à Harchies, où un second mâle chanteur est noté le 15. Ensuite, 4 ex. le 25.03 à Labuissière, 2 le 30 à Ploegsteert, 2 le 31 à Vilvorde (4 le 17.04) et 11 le 31 à Harchies. Côté sites récents, confirmation pour Eghezée-Longchamps avec 2 chanteurs (1 en 96), toujours 1 à Floriffoux mais sur un autre site que les années précédentes, 2 à Hollogne-sur-Geer, 1 à Chertal et 1 à Hermalle-sous-Huy (nouveau site). • **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : nombreux retours précoces dès la première décade de mars : le 02 à Frasnès-lez-Couvin, le 03 à Aywaille, le 04 à Ciergnon, le 05 aux BEH et à Eghezée-Longchamps, le 06 à Namur et Merlemont, le 07 à Anderlecht, le 08 à St-Denis-Bovesse, Anhée, Angre et Hensies, etc. Ensuite passage bien marqué et installations généralisées entre le 10 et le 25. 5 chanteurs sur 700 m le 26.04 à Strainchamps. Un mâle hybride niche à Mariembourg (voir article de M. Lambert : *Aves*, 34 : 32-38). • **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : premiers contacts le 10.04 à Lomprenz, Sohier, Petit-Waret, Harchies et aux Marionville, le 11 à Hour et Heyd, le 13 à Liège, le 19 à Herve ... Plus fréquent par la suite mais quand même peu signalé, sauf en Fagne où il semble vraiment bien représenté : par exemple au moins 4 cantons sur 3-400 m dans un lotissement forestier le 30.04 à Senzeille, 5 ou 6 dans le parc de l'étang de Virelles le 20.05. Un migrateur tardif le 17.05 à Roisin. • **Traquet tarier** (*Saxicola rubetra*) : 2 migrants extrêmement hâtifs début mars : le 03 à



Femelle de Traquet pâtre, transport de poils pour le nid; Lorcé, 21.04.1997. R. Dumoulin.



Traquet tarius; Aywaille, 03.05.1997. R. Dumoulin.

Erprave et le 05 à Pommeroeul. Ensuite 3 ex. le 31.03 à Stoumont et 1 ex. le 01.04 à Dailly, eux aussi très hâtifs puisque le passage ne se développe réellement qu'à la fin avril et début mai et se prolonge jusqu'à la fin mai avec par exemple 1 ex. le 24 et 2 le 29 à Woluwe-St-Lambert, 1 le 29 à Houtain-le-Val. L'enquête menée par la COA confirme la situation critique de l'espèce : absence totale en Ardenne namuroise notamment. • **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : les retours très précoces, déjà nombreux en février, continuent début mars avec de nombreux sites de reproduction occupés dès ce moment dans toutes les régions. L'espèce est en outre régulièrement signalée en très nette augmentation et des installations ont lieu en plus grand nombre sur des sites habituellement peu ou pas occupés ces dernières années. La situation semble plus particulièrement favorable en Hainaut occidental et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Quelques exemples : fin mars, déjà 11 cantons à Roly, 3 en plaine cultivée à Castillon / Clermont et au moins 6-7 sur 40 ha de coupes à blanc d'épicéas à Cul-des-Sarts; 70-80 couples pour la vallée de la Haine; 5 couples dans une clairière de Forêt de Soignes (Auderghem); 12 couples et 2 mâles célibataires sur 165 ha à Amay, 3 couples sur 9 ha à Lorcé, 3 en fagne de Malchamps. Premiers nourrissons le 19.04 à Flénu, généralement 3 à

5 jeunes à l'envol pour les premières nichées à Amay. Seules notes négatives : seulement 2 cantons en basse Sambre contre 5 en 1992 et seulement 1 couple nicheur possible pour tout le terrain militaire de Lagland. • **Traquet motté** (*Oenanthe oenanthe*) : premiers migrateurs le 06.04 à Jemelle (Gerny), le 07 à Castillon et Stockay (2 ex.), le 09 à Mons, le 13 (3 ex.) à Chercq, le 19 à Waterloo. Plus régulier en fin de mois et surtout pendant la première quinzaine de mai, où le passage est bien fourni; par exemple : régulièrement 10-12 ex. du 03 au 11 à Genappe, 15 le 03 à Gembloux, 18 le 07.05 au Gerny, 8 le 15 à Douvrain. Derniers le 26.05 au Gerny et le 28.05 à Grand-Manil. • **Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : premiers migrateurs le 31.03 à Woluwe-St-Lambert, le 03.04 à Aublain, le 06.04 au Gerny, le 09 à Mons, le 10 au Mont-Rigi... Le passage apparaît exceptionnellement fourni (ou bien suivi?) en Luxembourg avec un total de 86 oiseaux entre le 01.04 et le 04.05, les plus gros groupes comptant 11 ex. le 19.04 au camp de Lagland et 15 ex. le 28.04 à Beth (Opont). Cette abondance n'est pas constatée ailleurs. • **Merle noir** (*Turdus merula*) : 1 jeune (au nid?) le 03.04 à Bruxelles, premiers jeunes le 28.04 à Huy. • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : passage sensible un peu partout, surtout jusqu'à la mi-mars, avec des groupes de 2-300 ex., plus



irrégulièrement jusqu'à fin avril : par exemple 1.000 ex. le 09.04 à Sommerain, 250-300 le 10.04 à Burg-Reuland, 100-120 le 13.04 à Flobecq, 150 le 14 à Fagnolle, 1.000 le 19 à Bastogne, 75 le 26 à Laplaigne. La population nicheuse est en baisse en Fagne : moins de 20 couples nicheurs pour 6 localités. • **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : de nombreux retours ont déjà eu lieu fin février et continuent début mars, la migration se prolongeant jusqu'en avril : plus de 50 migrateurs le 08.04 à Mariembourg. Densités : plus de 15 chanteurs le 30.03 autour de l'étang de Virelles, 5 sur 2,5 km le 07.03 à Villers-en-Fagne, 3 sur 1 km le 09 à Soumoy. • **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : passage et stationnements jusqu'à début avril, notamment près de 300 ex. le 03.03 à Harchies, 200 le 05 à Cul-des-Sarts, plusieurs dizaines tout le mois de mars à Mariembourg, plusieurs centaines le 15.03 et plus de 100 le 29 à Roly, 150 le 21 à Spa. Dernières : 50 ex. le 02.04 à Frasnes-lez-Couvin, 20 le 06.04 à Rosée, 2 le 23 à Ny et le 26 à Marvie. • **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : 150 ex. le 21.03 à Spa, 7 chanteurs les 04 et 15.03 à l'étang de Virelles.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : printemps faste pour l'espèce à Harchies, malgré la rudesse de l'hiver : jusqu'à 10-11 chanteurs en mars et 8 cantons confirmés en mai. • **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : retours notés classiquement à partir du 20.04 en Luxembourg, le 25 à Mariembourg, à partir du 26 en province de Liège. 5 chanteurs à Harchies le 29.04, 8 en fagne de Malchamps le 02.05, 11 sur 165 ha en mai à Amay. En Brabant et Hainaut, 1 ex. le 03.05 en forêt de Soignes et 1 les 23 et 30.05 dans le Bois de la Houssière (Braine-le-Comte). • **Locustelle lusciniôide** (*Locustella luscinioides*) : 1 chanteur les 18.04 et 16.05 à Virelles. • **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : 1 ex. précoce le 31.03 puis 3 le 10.04 à Harchies où l'effectif se stabilise au nombre, élevé, de 18 chanteurs en mai. Autres sites renseignés : Warneton (2 ex.), les Marionville (1) et Labuissière (1). Quelques migrateurs sont en outre signalés dans plusieurs régions jusqu'en mai, notamment le 25.04 à La Hulpe, les 08 et 17.05 à Sart-Dames-Avelines et le 24.05 dans

une haie et une coupe forestière à Fagnolle. • **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : une première le 02.05 à Woluwe-St-Lambert puis retours à la période habituelle, après le 10 mai : le 13 à Harchies et Wodecq, le 14 à Herve, le 15 à Bernissart, Warchin, Frasnes-lez-Couvin et Mariembourg, etc. Au moins 10 chanteurs en fin de mois aux décanteurs de Genappe. • **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*) : premier ex. hâtif le 10.04 à Warchin ensuite arrivées à Harchies à partir du 23.04 et des migrateurs signalés par-ci par-là jusqu'à la fin mai, par ex. le 26 à Jamioulx, le 27 à Stavelot (peut-être nicheur), le 30 à Chertal, les 30-31 à Genappe. • **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*) : 1 couple nicheur probable à Harchies, chanteur à partir du 01.05, plus 4-5 migrateurs en halte les 10, 17-25 et le 18. • **Hypolaïs icterine** (*Hippolais icterina*) : retours le 12.05 à Celles (Hainaut), le 14 à Pommeroeul et à Genappe, le 16 à Houtain-le-Val, le 17 à Hensies et Mortier... La Famenne accueille à nouveau quelques icterines : 1 ex. le 30.05 à Lavaux-Ste-Anne et 3 chanteurs le même jour à Melreux. Densité ponctuelle : 3 chanteurs sur 5 ha à Celles. • **Hypolaïs polyglotte** (*Hippolais polyglotta*) : premiers retours précoces le 27.04 à Fagnolle, le 30 à Virton, le 01.05 à Ciergnon. 3 ex. se disputent un territoire d'un are seulement le 17.05 à Fronville. Une donnée ardennaise : 2 chanteurs le 17.05 à Verlaine (Neufchâteau). • **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : longtemps bloquée dans sa migration par les conditions climatiques défavorables dans le sud-est de l'Europe en avril, la Babillarde (voir Aves-Contact 4/97 pp. 13-14) est particulièrement tardive et peu abondante cette année : à part une mention à l'époque normale, soit le 12.04 à Battincourt, puis le 25 à Oneux et le 26 à Mariembourg, les retours ne sont généralement signalés qu'en mai, parfois seulement dans la seconde quinzaine : le 01 à Flemalle, le 02 à Angre, le 04 à La Roche, le 15 à Herve (toujours vers le 20.04 depuis 16 ans). Il y a parfois des densités paraissant normales, voire élevées (4 sur 1 km les 13 et 26.05 à Romedenne) mais il s'agit d'exceptions, l'avis général s'accordant sur des densités faibles; 1 seul chanteur sur 165 ha à Amay (2 en 94 et 1995, 6 en 1996). • **Fauvette grisette**

(*Sylvia communis*) : la première mention, très précoce, est ardennaise : le 03.04 à Rendeux, ensuite le 10 à Harchies, le 11 à Hour, le 12 à Quévy, le 15 à Fagnolle, le 17 à Vilvorde et Romerée, le 19 à Waremme... Le gros des retours n'a lieu qu'après les 23-24. Les densités sont plutôt élevées : 39 chanteurs sur 165 ha fin mai à Amay, 12 sur 1 km les 13 et 26 à Romedenne. • **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : à part deux données très précoces isolées le 09.04 à Philippeville et le 10 à Flobecq, les retours sont signalés un peu partout, classiquement, au cours de la 3ème décennie d'avril ou début mai. • **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : l'hivernant repéré en janvier à Yvoir est toujours présent en mars. Les premiers retours sont signalés le 15.03 à Harchies et le 16 à Jambes, ensuite ça et là au cours de la 3ème décennie : le 21 à Houyet, le 22 à Merlemont, Forest et en province de Liège... Déjà 5 chanteurs le 23 à Couvreur. Toutes les régions sont atteintes pour la fin du mois et pas seulement par des d'avant-gardes : par exemple 9 chanteurs le 30 à Wiers, 15 le 31 à Harchies. • **Pouillot siffleur** (*Phylloscopus sibilatrix*) : premiers le 20.04 à Rochefort et le 23 à Heyd. Les effectifs sont le plus souvent très faibles : quasi absent le 03.05 en forêt de Soignes, 25-30 % de l'effectif maximum dans une hêtraie à Yernée... mais 5 ex. sur 800 m en chênaie-hêtraie le 15.05 à Harzé et 5 sur 1 km au Sart-Tilman le 30.05. • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : le mouvement entamé en février se poursuit, concrétisant un des retours les plus précoces jamais enregistrés pour cette espèce : les premiers retours sont légion dès les premiers jours de mars et généralisés dès la seconde décennie. 65 cantons en avril à Harchies, 13 cantons sur 1 km en mai à Romedenne. • **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : un retour très hâtif le 03.03 à Serinchamps, puis le 16 à Grand-Leez, le 20 à Ellezelle, le 21 à Chanxhe, le 24 à Harchies... ensuite un peu plus fréquent, surtout au cours de la première semaine d'avril. A Harchies, 1 ex. le 24.03, 2 le 26, 9 le 31. 7 chanteurs sur 2 ha le 26.05 à Romedenne, 10 sur 4 km le 16.05 au Sart-Tilman. • **Roitelet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : quelques retours et migrants signalés au cours de la première semaine de mars dans le Luxembourg,

le 09 à Uccle, le 07 à Ere (Tournai), le 09 à Angre, durant tout le mois (mais déjà en février) à Harchies.

• **Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : premier le 27.04 à Melreux, ensuite le 04.05 à Celles (Ht) (construction du nid dès le 10), le 05 à Hyon, le 06 au Sart-Tilman. Très peu mentionné. • **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : un peu plus précoce : 1 ex. dès le 18.04 en Luxembourg et le 19.04 à Herve, ensuite (seulement) dix données entre le 20.04 et le 10.05 en province de Liège, un peu plus en Luxembourg; des oiseaux cantonnés sont signalés dans les forêts de Rulles, Anlier, Halma et Paliseul.

• **Mésange à moustaches** (*Panurus biarmicus*) : 2 ex. le 01.03 à Ploegsteert, 1 le 09 à Harchies. • Aucune information "utile" sur les "vraies" mésanges, ni sur la migration, ni sur la reproduction! • **Sittelle torchepot** (*Sitta europaea*) : quelques observations dans des sites inhabituels du Hainaut suggèrent un mouvement de retour en mars après les déplacements notés en automne : 14.03 à Godarville, les 20, 24 et 26 à Hensies, 2 ex. le 24 à Harchies. • **Grimpercau des bois** (*Certhia familiaris*) : 1 chanteur en Famenne le 23.05, dans le bois de Grandhan. • **Mésange rémiz** (*Remiz pendulinus*) : une seule mention de migrateur à Harchies le 12.03, 4 à Latour (3 ex. le 21.03, les 12 et 26.04 et le 04.05) et, plus inhabituel, 1 ex. le 11.04 à Eupen. En Basse-Meuse, notée les 19.04, 01 et 08.05 à Hermalle-sous-Argenteau, le 19.04 (3 ex.) à Petit-Lanaye et un couple nicheur en mai à Oost-Maarland. A Harchies, 2 mâles chanteurs du 16 au 20.05, un seul par la suite.

• **Loriot d'Europe** (*Oriolus oriolus*) : premiers retours le 24.04 à Wiers, le 27 à Harchies, le 03.05 à Feschaux. En Haute-Belgique, il semble bien se porter dans ses rares stations de Famenne et, surtout, de Gaume : cantons à Bomal, Melreux, Rochefort, Hour, Han-sur-Semois, Gennevaux, Lamorteau, Latour, St-Mard, Signeulx, Selange. 9 ex. cantonnés à Harchies en mai.

• **Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collu-*



*Pic-grièche grise*; Lorcé, 08.04.1997. R. Dumoulin.

*rio*) : premiers retours le 02.05 à Froidfontaine et au camp militaire de Marche, le 03 à Bastogne, Matagne et Fagnolle puis surtout au cours de la deuxième décennie de mai. Dans la région d'Aywaille, premier territoire occupé le 13.05 et retour d'environ 50 % de la population le 20. L'espèce continue à augmenter ses effectifs et à conquérir de nouvelles régions. • **Pic-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : des hivernants encore présents fin mars à Froidchappelle et aux BEH, 1 ex. le 10.03 à Achêne-Taviet et une série classique de données çà et là en Ardenne. En Entre-Sambre-et-Meuse, 3 couples nicheurs en Fagne (BEH, Roly, Sart-en-Fagne) et 1 ou 2 à Cul-des-Sarts. • **Pic-grièche à tête rousse** (*Lanius senator*)\* : retour assez tardif du couple nicheur le 25.05 à Lamorteau.

**Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*) : après l'afflux de l'automne, des mouvements migratoires de retour sont décelés en avril-mai dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, du 10.04 au 02.05 dans le Luxembourg et début mai


en Hainaut occidental : par ex. 100 ex. sur la matinée du 18.04 à Fays-les-Veneurs et 34 ex. vers le nord le 01.05 à Harchies. • **Pic bavarde** (*Pica pica*) : inédits : 2 ex. le 03.03 et 3 le 05 en "vol migratoire" à Fontenoy; 1 ex. attrape une chauve-souris en vol puis la mange le 24.05 vers 15h à Xhoris; 1 ex. tue un Martinet noir à coups de bec, le plume et l'emporte le 30.05 à Jumet (capture non observée). • **Corbeau freux** (*Corvus frugilegus*) : le contrôle de la plupart des colonies de l'ensemble de la région indique une tendance à la baisse des effectifs par rapport à 1996 : de 4,6 % en ESM, de 15 % en Tournaisis par exemple. • **Corneille mantelée** (*Corvus corone cornix*) : 1 ex. le 02.03 à Virelles. • **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : hors zone connue, 1 ex. le 07.04 à Ciergnon, 1 en mai à Achêne-Taviet et à Oignies-en-Thiérache.

**Etourneau sansonnet** (*Sturnus vulgaris*) : à Harchies en mars, un dortoir estimé à environ 30.000 ex. sert de garde-manger à un Faucon pèlerin. Retour des nicheurs locaux fin mars à Uccle. Envol des premières nichées en Condroz le 19.05. • **Moineau domestique** (*Passer domesticus*) : au moins 2 nids dans des cyprès en mai à Mariembourg. • **Moineau friquet** (*Passer montanus*) : petite colonie de 5 couples dans les murs du cimetière de Muno.

**Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : quelques rares mentions d'isolés ou tout petits groupes jusqu'aux premiers jours d'avril. Seules exceptions : plus de 150 ex. le 29.03 à Roly et un "nuage" de 5 à 10.000 ex. s'abat sur le sol d'un taillis sous futaie le 15.03 dans le camp militaire de Marche. Fin mars - début avril à Lagland, quelques dizaines (avec de nombreux autres fringilles) exploitent les cônes de pin sylvestre en train de s'ouvrir. • **Serin cini** (*Serinus serinus*) : premier retour précocement le 03.03 à Huy, rapidement suivi du reste de la population locale qui totalise 12 couples en mai. Ailleurs, les passages et retours sont notés à partir du 12-15.03 et s'étalent au moins jusqu'à la fin avril. La tendance est plutôt favorable chez cette espèce. • **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : très peu signalé; plusieurs dizaines consomment des graines de pin le 02.04 à Seilles

et début 04 à Châtillon / Lagland. • **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : présence régulière fluctuante, de quelques ex. à plusieurs dizaines en mars à Ombret. Peu de groupes importants mais un passage d'une certaine importance est mentionné fin mars-début avril, surtout en province de Namur; maxima : 80 ex. le 14.03 à Coq, 200 le 02.04 à Villers-aux-Tours et plusieurs centaines les 01-07.04 dans les pinèdes de Lagland et environs. Cantonnement le 16.04 à Ochamps. • **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : passage noté du 22.03 au 28.04 en province de Liège, avec des groupes ne dépassant jamais 40 ex.; retour des nicheurs le 30.03 à Pailhe. Ailleurs, maxima de 120 et 100 ex. les 22 et 24.03 à Fontenoy. • **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : à part une présence régulière en petit nombre (max. 10) à Ombret tout le mois de mars, quelques mentions çà et là, en mars également; au plus 16 ex. le 30 à Maubray. • **Bec-croisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : absence quasi totale : quelques mentions en Ardenne, au plus 15-20 ex. ensemble sauf une bande de 150 le 01.03 à Luchy. Un groupe se nourrit de bourgeons de cerisiers le 05.03 à Wibrin. • **Grosbec cassenois** (*Coccothraustes coccothraustes*) : plus répandu qu'en 1996, notamment en Famenne et en Lorraine.

**Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : 7 cantons sur 1 km lcs 13 et 26.05 à Romédienne; en région bruxelloise, 1 mâle à Jette le 25.05. • **Bruant fou** (*Emberiza cia*)\* : 1 femelle du 03 au 06.04 à Remouchamps. • **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : trois mâles capturés et bagués les 30.04 et 01.05 aux Awirs, 1 femelle le 03.05 à Genappe. • **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : passage relativement précoce et bien fourni en Hainaut occidental, dans le Namurois et en Luxembourg : maxima de 80 ex. le 10.03 à Harchies, 70 ex. le 22.03 à Grand-Leez, pic entre le 10 et le 25.03 (max. 15 ex. ensemble) à Achêne-Taviet; entre le 11 et le 14 en Luxembourg avec 25 ex. le 11 à Hotton, 26 ex. bagués le 13 à Marche et 55 le 14 au Grand Vi-



Linotte mélodieuse; Harzé, 13.05.1997. R. Dumoulin.

vier de Longchamps. Par contre, seulement 12 captures en avril aux Awirs contre 130 en 96. Au moins 10 chanteurs à Virelles le 16.05, 5-6 à Roly le 26.04. • **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : outre quelques mentions classiques en Moyenne-Belgique, y compris une présence toujours assez fournie à Angre-Angreau (max. 34 ex. le 04.03) et un passage "important" à St-Denis-Bovesse en mars, c'est un retour spectaculaire en Famenne et en Gaume, après 10 ans d'absence, qui constitue un des évènements importants de cette saison : de Bomal-Herbet à Hour, une quinzaine de cantons sont repérés (arrivées à partir du 30.04) et 5-10 en Gaume. Hors zones habituelles, à noter aussi 1 ex. les 26.04 et 07.05 à Roly, 1 ex. le 24.05 à Vodecée et un cantonnement en mai dans les bassins de décantation de Genappe (niche dans les campagnes mais jamais dans les bassins depuis 1990).



## Ont contribué à cette chronique :

Baltus O., Baugnée J.-Y., Baye J.-M., Bedoret H., Bihain B., Blyth M., Bocca S., Borsu B., Buckinx G., Burnel A., Charlier J.M., Chiwy B., Claerhout P., Clesse, B., Collard Ph., Coppée J.-L., Coppée J.-Lo., Coppée J.-Ph., Crickillon D., Daulne J.M., Debaere T., De Broeyer A., Defays (Mme), Deflorenne Ph., Degossely Ph., Dehem C., Delbecque F., Delcourt J., Delooz E., Deloyer P., Delvaux J., Demonty L., Depasse A. P., Dermien F., Dernier A., Deroanne M., Derouaux A., Desablens P., Deschamps D., Deschamps (Mme), Detaille R., Dewitte Th., Doblestain F., Dortu Ch., Dufourny H., Dujardin R., Dumoulin R., Durant M., Duyck B., Evrard P., Fanon Y., Farinelle C., Flon Y., Fouarge J., Fraipont R., Gailly P., Gallez J., Georges A., Goebels W., Grégoire D., Guillaume M., Hamende F., Hanse P., Hanus B., le Hardÿ F., Héla F., Hendrick O., Henne Th., Henry de Frahan B., Hubert M., Iweins B., Jacob J.-P., Jacquemin M., Jacquet R., Janssens M., Janssens X., Jardon B., Jenard Ph., Joris A., Jortay A., Kempeneers Y., Kinet Th., Kuciapa W., Lacroix J., Lambert M., Laudelout A., Laurent B., Lauwers J., Ledoux L., Lefèvre U., Lemaître F., Lepinois J.-C., Libois R., de Liedekerke R., Lienart Ja. et Jo., Loison M., Loly P., Lucas Ph., Mardulyn H., Mary P., Matagne J., Matgen O., Maus J.-M., Mengal J., Molitor B., Moncousin M., Moniotte S., Monmart A., Moreels M., Motte G., Nicolas M., Paquay M., Paquay N., Paquet J.-Y., Percsy C. et N., Philippart B., Pierre P., Piraux B., Pirson C., Potvlieghe R., Poumay J., Pourtois A., Quere L., Rabosée D., Ravet P., Renard F., Renoy A., Rose D., Rotsaert G., Rousseau C., Ruyschaert F., Sacré P., Schoebrechts O., Sédek J., Sente F., Teerlynck H., Testaert D., Thonnard P., Tricot J., Vanbellinghen V., van der Elst D., Vandevyvre X., Vanhove F., Van Volsem J., Van Zuylen R., Verroken D. et L., Vieuxtemps D., Voituren D., Watelet M., de Wavrin H., Willame A., Willem G., Wouters R., Zeicher M., les observateurs de la Trientale (C.N.B.) et de Latour, le groupe de Genappe, le stage d'Ave-et-Auffe et les excursions d'Aves,... et quelques autres, sans doute, que nous avons oubliés. Qu'ils soient bien persuadés que cela est tout à fait involontaire.

Les données ont été rassemblées par les délégués régionaux de la COA : J-Lo Coppée, P. Loly, D. Muyschont, P. Degossely, D. Vieuxtemps, A. Monmart et H. de Wavrin.

Rédaction : Emile Clotuche, François Hupet, Jean-Paul Jacob, René de Liedekerke et Dominique Testaert.

### Note du Comité de Rédaction et de la Centrale Ornithologique

Les chroniques saisonnières de la Centrale Ornithologique rapportent régulièrement des observations plus ou moins anecdotiques de comportements un peu particuliers, peu courants voire inconnus chez les espèces concernées. C'est le cas par exemple, dans la chronique ci-dessus, des observations de capture et consommation d'une chauve-souris et d'un martinet par des pies. Noyées dans les chroniques, ces observations risquent fort de passer tout à fait inaperçues et d'échapper aux auteurs de travaux de synthèse ou de compilations telles que les Zoological records.

Le Comité de Rédaction et la Centrale Ornithologique lancent donc un appel afin que ces observations paraissent sous forme de courtes notes alimentant une rubrique de "brèves" de façon régulière. Les notes consisteraient en de simples relations des faits accompagnées d'un minimum de bibliographie permettant de souligner l'intérêt de l'observation. L'effort rédactionnel est donc minimal et à la portée de tous.