

Centrale ornithologique Aves<sup>1</sup>

## Observations récentes : juin - août 1997

### CONDITIONS CLIMATIQUES

Un été en deux temps. La météorologie de juin a surtout été déterminée par une succession de dépressions (6-8 et 12-30). Après une belle période chaude en début de mois, le temps s'est sensiblement dégradé, avec des pluies excédentaires, surtout en Gaume et dans le Tournaisis. Cette météo dépressionnaire s'est prolongée en juillet, donnant un mois fort quelconque, rythmé par les "influences maritimes" (valeurs dites normales de température, pluviométrie, ensoleillement). Il fallut attendre l'arrivée de courants continentaux à partir du 7 août pour voir grimper les températures dans un ciel très dégagé. Ce mois chaud, ensoleillé et sec a battu de nouveaux records : 254 h de soleil contre 188 en moyenne, mais surtout des températures supérieures de 3 à 5 °C aux moyennes, un total de 21 jours d'été (max. 25 °C, normale = 5,9 jours) et de 4 jours de chaleur (max 30 °C, normale = 0,8). La température moyenne d'août 1997 établit un nouveau record depuis le début des observations en 1833 (précédent record en 1911).

### FAITS SAILLANTS.

Un bilan plutôt maussade pour cet été 1997. Tout d'abord en ce qui concerne les deux butors, les deux sarcelles, le Chipeau, le Busard des roseaux, la Rousserolle turdoïde, la Locustelle luscinioïde : pour ces nicheurs très rares, nous sommes au seuil de l'extinction car seuls des estivants ou des oiseaux isolés ont été notés. D'autres voient leurs populations décliner, de manière locale ou générale (évolution durable ou seulement "une mauvaise année?") : Tadorne, Avocette, Echasse, Tourterelle des bois, Martin-pêcheur, Traquet tarier, Pouillot siffleur, Grive litorne, Sizerin. Quant aux nicheurs occasionnels ou irréguliers, on retiendra l'absence de nidification du Grèbe à cou noir et du Tarin mais celles de la Rémiz et de la Pie-grièche à tête rousse, le score assez bon du Râle des genêts et des données intéressantes de Torcols et d'Engoulevents. La reproduction a été mauvaise pour les rapaces consommateurs de micomammifères, notamment la Chouette de Tengmalm.

Tout n'est quand même pas négatif, quelques espèces améliorent ce bilan : le Héron cendré et le Grand Cormoran continuent à augmenter, le Faucon hobereau aussi, semble-t-il, mais plus discrètement. Première preuve de nidification depuis 1987, et sans doute le début d'une installation durable, pour le Faucon pèlerin. Année très bonne voire exceptionnelle pour la Caille, en tout cas au sud de la Meuse. L'Hirondelle de rivage se stabilise. Le Serin cini et le Chardonnet se portent de mieux en mieux. Un afflux de Bruants proyers est noté en Famenne et en Lorraine. Cela sans parler des Traquet pâle et Pie-grièche écorcheur, dont la bonne santé actuelle fait oublier la situation alarmante d'il y a quelques années.

---

(1) Centrale Ornithologique AVES

c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

En ce qui concerne la migration, on notera surtout la faiblesse du passage des limicoles, un petit afflux de Beccroisés et un assez bon passage de Pipits rousselines fin août. A ce moment, un changement des conditions météorologiques provoque l'arrêt d'assez nombreux migrateurs, de l'Ortolan par exemple.

Parmi les observations estivales remarquables, on notera un Plongeon imbrin à la mi-juin, le Grèbe jougris (peut-être un estivant), des Cigognes blanches en juin et juillet, deux Nettés rousses, un Nyroca en août, un Milouinan fin juin - début août, deux Pilets début juin, quelques Busards cendrés et Saint-Martin (mais pas de nidification), un Bécasseau maubêche, une Marouette ponctuée à la mi-juin, deux Huppés et un Traquet motteux nicheur probable.

Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre Sambre et Meuse, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf précision utile.


## DETAIL DES OBSERVATIONS

**Plongeon imbrin** (*Gavia immer*)\* : observation remarquable d'un adulte en plumage nuptial le 14.06 à Obourg.

**Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : l'espèce se porte bien en Hainaut occidental : 34 couples nicheurs à Harchies, plusieurs à Obourg, aux Marionville, à Quévy et dans le Tournaisis et un, hors zone habituelle, à Lessines (en carrière); 7 aussi à Gozée, 6 à Virelles et 6 à Eghezée-Longchamps (15-17 jeunes). Plusieurs sites occupés par 1-3 couples dans les autres régions. • **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : stabilisation par rapport à 1997 avec 47 couples nicheurs en Basse-Meuse et 12 couples dans le Tournaisis. Ailleurs, on note 18 couples nicheurs à Harchies, 7 à Roly et à Gozée, 5 à Virelles. En province de Luxembourg, deux couples se reproduisent à Freux et à Latour. Le passage post-nuptial est noté dès la mi-juillet à Taviet. • **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : 6 observations à Obourg, sans doute du même oiseau : 1 adulte les 16 et 17.06 puis les 04, 08 et 13.07 et enfin 1 ex. le 05.08. • **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : en juin, un à deux oiseaux à Harchies et un cantonnement sans suite à Quévy. Après 1 ex. le 28.07 à Harchies, le passage est noté à partir du 06.08 à Eghezée-Longchamps, Obourg (7 ex. le 06.08), Gozée et Harchies.

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : la progression des colonies hennuyères continue avec 104 couples nicheurs à Obourg et 68 à Harchies, où l'on compte 129 jeunes pour 54 nichées, soit 2,4 jeunes/nid. Ailleurs, les estivants ne dépassent jamais 20 oiseaux (Basse-Meuse, Virelles) et une nidification est suspectée en Meuse à Jambes.

**Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : l'espèce ne niche pas à Harchies. • **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*) : une seule donnée : une femelle le 22.06 à Harchies. Cette observation restant isolée, il n'y a donc aucune nidification en Wallonie cette année. • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : on signale la bonne santé de la population de la vallée de la Haine où l'on obtient des productivités respectives de 2,48 jeunes/nid et de 2,25 jeunes/nid pour 75 et 35 nichées contrôlées à Harchies et à Obourg. Très peu de données ailleurs, notamment des régions où il devient "trop" commun, comme en Meuse et en Hesbaye liégeoises. • **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : un adulte posé dans un champ le 16.08 à Cortil-Noirmont. • **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : observée durant toute la période, dont plusieurs nidifications possibles, par exemple en Condroz namurois. Le passage a principalement lieu fin de la deuxième décade d'août avec entre autres 4 ex. le 29.08 à Luchy et 9 ex.



Remarquable à l'œil  
et à la main

Héron pourpré (Ceryle alcyon)  
Séjour adulte, en habitat pur  
dans clair  
à cette époque, l'adulte  
de ce en portant les jeunes (voir) par  
s'accrochant en dessous de la  
sur l'eau (♀). Major. sp. - El Acabado 1-04-96

Les adultes de ce genre : les plus beaux  
se trouvent sur l'eau. L'adulte est plus  
pale.

Héron pourpré. Andalousie, 1er avril 1996. Dessins C.H. BORN

le 30.08 à Modave. Hors zone, 1 ex. le 07.07 à Harchies. • **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : toujours suite à la perturbation du retour printanier de l'espèce, le mois de juin totalise 6 données dont 3 ex. posés le 04.06 à Gouvry et 3 ex. en vol le 17.06 à Gosselies. Par la suite, elle est notée à deux reprises mi-juillet (Ben-Ahin et Maulde) et le 25.07 à Montigny-le-Tilleul. Une seule mention en août : 2 ex. les 13 et 14 à Villers-devant-Orval.

**Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) : 8 couples dont 4 nicheurs en Basse-Meuse, 1 couple nicheur et 20 estivants à Harchies, 3 couples dont un nicheur à Roly et nidification d'un couple à Saint-Denis. A Virelles, aucune nidification malgré 2 à 4 estivants. • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : un couple nicheur à Grand-Leez, un autre élève deux jeunes à Warneton et 19 ex. sont présents du 06 au 08.08 à Eghezée-Longchamps. • **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) : un couple élève 6 jeunes à Tervueren et un autre s'approprie et élève 3 oies domestiques à Tournai. Ailleurs, jusqu'à 38 ex. à Jambes, 15 ex. en juillet en Basse-Meuse et 85 ex. le 22.08 à Zemst. On note également 3 ex. le 22.06 et un vol de 7 ex. le 24.07 à Uccle. • **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) : 14 ex. durant toute la période en Basse-Meuse et 2 ex. en juin à Jambes. • **Ouette d'Égypte** (*Alopochen aegyptiaca*) : 10 ex. dont 3 couples non nicheurs en Basse-Meuse, 7 ex. dans le parc de Frant-Waret et 1 ex. le 07.06 à Roly. Par la suite, l'espèce est notée à partir de la mi-août, notamment à Ampsin (14 ex. en vol le 13.08), à Zemst (12 ex. le 22.08) et à Stockay (1 ex. le 25.08). • **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : nidification faible en Hainaut occidental avec seulement deux couples à Warneton. Ailleurs, trois couples nichent à Zemst, un à Melsbroeck et un à Hollogne-sur-Geer. Dès le mois d'août, l'espèce est notée de passage à Taviet, Lens-sur-Geer et Hermalle-sous-Argenteau.

**Canard siffleur** (*Anas penelope*) : mis à part les deux oiseaux du 07.07 à Virelles, les quatre autres données sont du mois d'août avec 1 ex. le 03 à Virelles et respectivement 1, 5 et 1 ex. les 13, 16 et 23 à Harchies. • **Canard chi-**

**peau** (*Anas strepera*) : l'espèce niche à Zemst, où deux couples élèvent 13 et 10 pulli. Seules quelques observations ponctuelles sont effectuées à Harchies, à Obourg et à Roly, soulignant la régression du Chipeau en Wallonie. • **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : cette année encore, aucune mention de nidification en Wallonie. Mis à part les 1 à 5 ex. observés en juin à Waremme, aucune mention de séjour. L'espèce quitte Harchies le 05.06 pour y réapparaître le 09.08. Le passage est noté dès le 19.07 à Eghezée-Longchamps. Virelles se singularise par la date des observations : 1 couple le 29.06 et 1 ex. le 05.07 (estivage?). • **Canard pilet** (*Anas acuta*) : 2 ex. le 05.06 à Harchies. • **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : aucune preuve de nidification malgré le séjour prolongé de 1 à 2 couples à Virelles en juin. Un couple est noté le 08.06 à Hollogne-sur-Geer, sinon les autres observations sont effectuées à partir de la mi-juillet. • **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : aucune nidification n'est renseignée. En dehors des 1 à 6 ex. de fin-juin à début juillet à Virelles, l'espèce est notée à partir de la troisième décennie de juillet, notamment à Eghezée-Longchamps.

**Nette rousse** (*Netta rufina*) : une femelle le 05.06 à Hensies et un mâle en éclipse le 06.08 à Obourg. • **Fuligule milonin** (*Aythya ferina*) : la population nicheuse augmente légèrement par rapport à 1997 : 10 couples à Virelles (8 en 97), 5 en Basse-Meuse (1 en 97), 4 à Harchies (2 en 97), 1 à Obourg (idem 97) et 1 aux Marionville (0 en 97). Quelques observations d'isolés en juin et juillet, sauf à Virelles où le maximum est atteint le 30.06 avec 180 ex. • **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)\* : un mâle le 21.08 au Rouge-Cloître à Auderghem. Origine douteuse. • **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : année record pour les décanteurs d'Eghezée-Longchamps avec un minimum de huit nichées. L'espèce niche également à Warneton (8), à Virelles (3), à Obourg (2), aux Marionville (2); des couples solitaires à Harchies, à Escanaffles, à Gozée, à Boussu-lez-Walcourt, à Zemst et à Vielsalm. Le maximum de non-nicheurs est noté en juillet à Obourg avec 30 à 40 ex. • **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) : à des dates inhabituelles, une femelle les 30.07 et 07.08 à Obourg. • **Eider** à

**duvet** (*Somateria mollissima*) : le mâle de Jambes est toujours présent.

• **Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : l'espèce paraît bien représentée cet été et de nombreux cantons sont signalés, principalement en Fagne et Famenne. Un noyau est bien établi dans le Hainaut occidental : Roisin, Ellezelles et surtout Frasnes-lez-Buissenal (4 couples). Si le passage est déjà perceptible le 22.07 avec 4 ex. en vol vers le sud-ouest aux Epioux (Lacuisine), il augmente classiquement à la mi-août : 4 ex. le 13 à Borlon (Oneux) et un groupe de 12 ex. le 14 à Achène. Encore 1 juv. au nid le 25.08 à Wiesmes. • **Milan noir** (*Milvus migrans*) : nidification réussie à Thommen où 2 juv. s'envolent début juillet; au moins trois couples nicheurs à Etalle-Nantimont. Une douzaine d'isolés en juin, trois en juillet mais 7 ex. à Habay-la-Neuve le 04.07. • **Milan royal** (*Milvus milvus*) : quelques cas de nidification sont signalés dans le Luxembourg : Freux, Houdemont (Nantimont) et Villers-la-Bonne-Eau. Par contre très peu d'information sur ceux des Cantons de l'est : le couple cantonné en juin à Thommen n'a apparemment pas niché. Environ 45 mentions d'isolés répartis assez régulièrement durant la période, la plupart dans le Luxembourg. • **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : alors qu'à Virelles des parades les 15 et 27.06 restent sans suite, on note classiquement quelques estivants (3 ex. "bruns" et 1 mâle) dans les plaines du Hainaut occidental (Givry, Vellereille-le-Sec) et de Hesbaye. Les effectifs augmentent nettement vers la mi-août : un dortoir d'au moins 12 ex. dans un champ de betteraves à Clermont-lez-Walcourt, min. 9 ex. sur 40 km<sup>2</sup> à Gembloux ainsi qu'autour de Givry, 1-4 ex. entre Perwez et Noville-sur-Mehaigne. • **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : quelques données d'erratismo estival : 1 mâle le 04.06 à Villers-en-Fagne, 1 femelle le 06.06 à Brûly ainsi qu'à Castillon le 04.07, 1 ex. à Villeroux le 20.07. Un mâle séjourne en août à Noville-sur-Mehaigne ainsi que 5-6 juv. autour d'Angre. Le passage augmente durant les derniers jours d'août. • **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : même si un couple est noté à Castillon le 09.06, aucun indice de nidification n'est renseigné. Six données en juin-

juillet : en juin, 1 femelle le 07 à Bersillies-l'Abbaye, 1 mâle le 25 à Quévy-le-Grand, 1 femelle le 05 à Anseroel et le 06 à Cortil-Noirmont; 1 mâle le 07.07 à Sommethonne et 1 femelle le 23.07 à Vellereille-le-Sec. Toujours aussi rare en août : 1 femelle le 07 à Villers-l'Évêque, 1-2 juv. les 17-21 et 1 femelle le 23 au sud de Mons, 1 juv. le 25 à Boneffe. • **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : nidification tardive à Houtain-le-Val : 1 juv. venant de quitter le nid le 28.07.

• **Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : premier passage le 27.07 aux Epioux (Lacuisine) puis 13 ex. signalés en août, dont près de la moitié à Harchies.

• **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : 5 cantons sont recensés à Harchies tandis que des juv. à peine sortis du nid sont notés à Baillièvre le 21.07. 1 ex. avec un étourneau dans les serres à Boussu-en-Fagne le 10.06. • **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : l'espèce se porte bien et est notée sur de nombreux sites durant l'été, principalement en Ardenne, Famenne et Fagne, même si les cas de nidification certaine sont peu nombreux : Flobecq, Thuillies (un seul juv. à l'envol - première preuve de nidification en ESM), Annevoie (Hun), Longchamps (Bastogne), Amblève (Born - 3 juv.), Auderghem (Rouge-Cloître - 3 juv.). L'espèce est observée à plusieurs reprises au cœur de Bruxelles durant l'été tandis qu'à Harchies, un max. de 10 ex. est noté le 05.07. Signalons encore des parades fin juin à Vezin et des oiseaux cantonnés à Jamioux et Fagnolle. • **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : plus de 20 données réparties un peu partout durant la période, dont certaines pourraient laisser soupçonner d'autres cas de nidification que celui de Seraing. Ainsi 3 ex. sont notés à Custinne le 25.06 tandis que 2 ex. houspillent un Grand-Duc le 27.07 à Bastogne. Des juv. isolés sont observés à Frasnes-lez-Couvin le 21.07, Ottignies le 22.07 et Fays-les-Veneurs le 27.07. Un adulte le 21.08 sur une tour de refroidissement de la Centrale de Drogenbos.

• **Tétrasyr** (*Tetrao tetrix*) : des plumes de femelle sont trouvées dans la Fagne de Malchamps le 13.08. • **Perdrix grise** (*Perdix per-*

*dix*) : nidification tardive : un couple accompagné de 10 poussins le 31.08 à Hermée. • **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*) : alors que la saison est signalée comme "exceptionnelle" ou "très bonne" en Ardenne, Famenne et Condroz avec des chanteurs renseignés sur plusieurs dizaines de sites, il semble curieusement qu'au nord du sillon Sambre-et-Meuse, l'espèce ne soit pas plus abondante que d'habitude : "plusieurs" chanteurs à Xhendremael le 10.06, 4 chanteurs sur 100 ha en juillet à Angre. Un chanteur jusqu'au 15.08 à Noville-sur-Mehaigne, 1 chanteur plus 1 ex. le 27.08 à Meux.

**Rôle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : renseigné nicheur à Roly (3-5 couples), à Virelles et à Harchies (7 cantons). En juin, des isolés sont renseignés dans l'ESM, au Barrage de la Plate-Taille et à Romedenne. • **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : 1 ex. entendu la nuit le 15.06 au sud des BEH. • **Rôle de genêts** (*Crex crex*) : une année plutôt bonne : 5 chanteurs entre début juin et mi-juillet en Famenne et jusqu'à 6-7 à Cerfontaine, au sud des BEH. Si on ajoute 4 chanteurs à Boussu-en-Fagne, 1 à Feschaux, à Bas-Oha ainsi qu'à Jalhay, on arrive à un total voisin de 20 oiseaux. Vu les dates de fauche, la nidification a peut-être pu être menée à terme par certains. • **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : la nidification concerne 25 couples à Virelles, de 15 à 17 à Roly, 42 (36 en 1996) à Harchies et 10 à Obourg (3,5 jeunes par nichée pour ces deux derniers sites). Les nombres augmentent ensuite progressivement en août avec deux concentrations importantes à mentionner : 521 ex. le 02.08 à Harchies et 300 ex. le 31.08 à Virelles. • **Poule d'eau** (*Gallinula chloropus*) : mauvaise année à Achêne avec l'observation d'un quart de l'effectif habituel et aucun jeune visible; ailleurs, une seule concentration mérite d'être citée : 89 ex. le 26.08 à Warneton.

**Huitrier pic** (*Haematopus ostralegus*) : l'espèce est rencontrée sur trois sites classiques : un couple le 13.06 puis 3 et 4 ex. les 21-23.07 à Vilvorde, 1 ex. le 04.07 à Zemst, 2 ex. le 21.06, 4 ex. le 18.07 et 2 ex. le 21.07 à Oost-Maarland. • **Echasse blanche** (*Himantopus himantopus*) : seulement quelques données éparées : 2 ex. le


01.06 et 1 le 11.07 à Fontenoy, 1 ex. du 04 au 14.06 et du 05 au 14.07 à Genappe. • **Avocette** (*Recurvirostra avosetta*) : observée à Fontenoy avec 2 ex. du 07 au 11.07, 1 mâle le 28, un couple le 30.07, 1 ex. jusqu'au 03.08 puis 5 ex. (2 ad. et 3 jeunes) le 08.08. Au fil des ans, Fontenoy se construit la réputation du site le plus régulier pour cette espèce en Wallonie.

**Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*) : l'espèce est renseignée comme nicheuse à Chertal (1), en vallée de la Haine à Obourg, Harmignies (1) et Douvrain (4-5) ainsi qu'à Genappe (3). Le passage se traduit par une augmentation des effectifs dès début juillet avec un maximum de 9 ex. le 07 à Genappe et de 11 ex. le 13 à Hermalle-sous-Argenteau; il se poursuit en août, où le pic de passage (10 ex.) est observé le 10 à Eghezée-Longchamps. • **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : la migration pré-nuptiale se termine le 01.06 à Genappe (5 ex.). L'observation d'un ex. le 21.06 à Escanaffles concerne probablement le premier migrateur postnuptial; en août, l'espèce n'est observée que sur trois sites : 5 ex. le 03.08 à Hermalle-sous-Argenteau, 2 ex. le 30.08 à Lens-sur-Geer et présente à Eghezée-Longchamps du 12 au 19.08 avec un maximum de 6 ex. le 12.08. • **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : les premiers migrateurs postnuptiaux sont observés le 09.08 à Rouveroy et à Givry, puis quelques données d'isolés durant la deuxième quinzaine du mois d'août avec un maximum de 4 ex. le 21.08 à Eghezée-Longchamps. • **Pluvier guignard** (*Charadrius morinellus*)\* : les recherches systématiques menées en Hesbaye dans les champs de pois n'ont donné aucun résultat; le passage postnuptial apparaît particulièrement maigre avec seulement deux données et 3 individus : 2 ex. dans un champ de lin récolté les 28-29.08 à Thuillies et une audition le 25.08 à Angre. • **Vanneau huppé** (*Vanelus vanellus*) : la seule donnée concernant la nidification renseigne une diminution de l'espèce en Condroz. Les premiers mouvements postnuptiaux sont observés en province du Luxembourg à partir du 05.06 au Gerny (max. 100 ex. le 16.06), puis augmentation des nombres en juillet avec max. 350 ex. le 31.07 à Houtain-St-Siméon. En août, les effectifs continuent


à progresser sans atteindre des chiffres spectaculaires puisque la seule concentration importante concerne 6-700 ex. les 11 et 12.08 à Givry.

**Bécasseau maubêche** (*Calidris canutus*) : une seule donnée d'un adulte le 31.07 à Taviet. • **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : premier migrateur le 15.07 à Castillon, suivi d'une vague d'adultes du 24.07 au 08.08 (max. 6 ex. le 27.07 à Eghezée-Longchamps). Le passage des juvéniles, observé classiquement après celui des adultes, est noté à partir du 27.08 à Eghezée-Longchamps. • **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : deux données d'isolés dans des sites habituels : 1 ex. le 06.08 à Genappe et 1 juv. les 25-26.08 à Eghezée-Longchamps. • **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : faible passage observé fin juillet-début août : 1 ex. en plumage nuptial le 20.07 à Genappe et des adultes entre le 29.07 et le 07.08 (max. 3 ex.) à Eghezée-Longchamps. • **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : premiers migrateurs post-nuptiaux le 29.06 à Fontenoy (2 ex.) suivis d'1 ex. le 07.07 à Gozée et le 20.07 à Genappe. Le passage se poursuit faiblement en août avec quelques maigres données d'isolés à Eghezée-Longchamps, Genappe, Hollogne-sur-Geer et Hermalle-sous-Argenteau. • **Combatant** (*Philomachus pugnax*) : le passage commence classiquement dès début juillet avec 1 ex. le 05.07 à Genappe puis se développe faiblement au cours du mois, sans pic bien marqué; les maxima sont obtenus fin juillet-début août avec 10 ex. les 29.07 et 08.08 à Eghezée-Longchamps. • **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : retour à partir de la troisième décennie de juillet : 20.07 à Genappe, 24.07 à Aublain, 27.07 à Eghezée-Longchamps et 01.08 à Boeur. Le passage discret du mois d'août culmine en fin de mois avec 12 ex. le 30 à Warneton et 15 ex. le 31 à Eghezée-Longchamps. • **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : passage nocturne de plusieurs ex. le 14.06 à Daily. Séjour, inhabituel chez nous, d'1 ex. du 29.06 au 12.07 à Fontenoy (2 ex. le 07.07). 1 ex. le 03.08 à Gaurain-Ramecroix, probablement déjà la fin du passage. • **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : seulement deux données nocturnes renseignées : plusieurs migrateurs se répendant à Schaerbeek le

23.07 et 1 ex. le 07.08 à Mariembourg. • **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : le premier migrateur postnuptial est noté le 01.06 à Escanaffles; le passage qui se développe ensuite n'a rien d'exceptionnel (total de 13 ex.) et se répartit sur toute la période avec un maximum de seulement 3 ex. le 27.06 à Noisieux et le 31.08 à Houtain-St-Siméon. A noter également le séjour étonnant de 2 ex. à Genappe du 11 au 29.08. • **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : les deux seules données confirment la rareté relative de ce chevalier par rapport aux autres espèces de son groupe : 1 ex. en plumage nuptial le 14.07 à Genappe et 1 juv. le 19.08 à Eghezée-Longchamps. • **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : encore 8 données d'isolés dans les deux premières décades de juin; le passage postnuptial peut être qualifié de dérisoire avec un total de 12 individus différents, dont maximum 4 ex. le 29.08 à Sohier. • **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : dernière donnée d'un migrateur pré-nuptial le 03.06 à Genappe. Le passage postnuptial débute, comme souvent, à la mi-juillet (1 ex. le 15.07 à Fontenoy) mais ne se développe que très faiblement en août, sauf à Eghezée-Longchamps où 25 ex. sont observés le 01.08, pic de passage dans ce site. • **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : les premiers migrateurs postnuptiaux apparaissent dès le 01.06 à Genappe, le 05.06 à Hensies et le 18.06 en province du Luxembourg (Dion); le passage est ensuite continu jusqu'à fin août. Les pics de passage se situent principalement en dernière décennie de juillet, avec 21 ex. le 27.07 à Genappe, et en première décennie d'août, avec un maximum de 26 ex. les 07-08.08 à Eghezée-Longchamps. • **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : les premiers retours sont notés dès le 18.06 à Achêne, le 21.06 à Hollogne-sur-Geer, le 22.06 à Waremme (4 ex.), le 26.06 à Genappe et le 01.07 en province du Luxembourg. Le passage, bien fourni pour cette espèce, est ensuite continu du 19.07 à fin août à Eghezée-Longchamps avec de 1 à 10 ex. et un maximum de 12 ex. à Hollogne-sur-Geer le 23.07. • **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : les derniers migrateurs pré-nuptiaux sont observés les 01 et 06.06 à Genappe, où apparaissent les premières guignettes de retour, à une date assez précoce, le 28.06. Les suivantes sont



*Mouette pygmée juvénile; décan-teurs d'Eghezée-Longchamps, août 1997. A. Joris*



*Mouette mélanocéphale juvénile; décan-teurs d'Eghezée-Longchamps, août 1997. A. Joris*

notées à partir du 07.07 dans l'ESM et en province du Luxembourg et le passage culmine en août avec 37 ex. le 03 à Genappe, 18 ex. le 17 à Escanaffles et 45 ex. le 19 à Eghezée-Longchamps. • **Tourne-pierre à collier** (*Arenaria interpres*) : 1 adulte du 06 au 08.08 à Eghezée-Longchamps.

• **Mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*) \* : 1 juv. du 06 au 08.08 à Eghezée-Longchamps. • **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : une seule donnée : 1 juv. du 25 au 28.08 à Eghezée-Longchamps. • **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : la nidification est renseignée à Zemst (1 poussin le 06.06), à Hologne-sur-Geer (1 nid, 2 poussins) et à Genappe (6 couples mais un seul poussin); pas de renseignements concernant la colonie qui totalisait 250 nids fin mai à Fontenoy. Deux observations d'individus leucistiques (ou du même, signalé depuis plusieurs années?) en Meuse liégeoise : le 25.07 à Lanaye et les 08 et 19.08 à Hermalle-sous-Argenteau. • **Goéland cendré** (*Larus canus*) : l'excellent suivi de cette espèce dans la vallée de la Haine permet de dresser un bilan complet des nidifications : total de 34-38 couples cantonnés dont 18 nicheurs avec une moyenne faible d'un jeune à l'envol par couple. En Meuse, la nidification est suspectée avec l'observation répétée d'individus en juin à Mai-





*Tourterelle des bois*; Géronsart, 4 juin 1997.  
R. Dumoulin

zeret et à Jambes. • **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : le passage commence réellement à partir de la mi-juillet et se développe en août, où de belles concentrations se forment, notamment à Stockay (460 ex. le 25.08) et à Cour-sur-Heure (630 ex. le 14.08). Pour ce dernier site, ces oiseaux sont plus que probablement ceux du dortoir d'Obourg. • **Goéland leucophée** (*Larus cachimans*) : observé uniquement en provinces de Liège et de Hainaut; les observations commencent le 21.07 en Basse-Meuse puis les effectifs augmentent rapidement début août avec de beaux groupes de 30 ex. le 25.07 à Hermalle-sous-Argenteau et 50 ex. le 05.08 à Lixhe; ailleurs, quelques données d'isolés en Hainaut, dont 2 ex. de la ssp. *michaellis* le 26.07 à Pommeroeul. • **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : cette période est classiquement celle où cette espèce est la moins observée : quelques isolés en juillet en provinces de Liège et de Namur, au plus 10 ex. le 21.07 à Hermalle-sous-Argenteau. • **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) : les

derniers migrateurs sont observés en juin : 3 ex. le 07.06 à Harchies, 1 ex. le 15.06 à Frasnes-lez-Couvin et un beau groupe de 20 ex. le 09.06 à Virelles. Le mois de juillet offre deux données : 1 ex. le 15.07 à Ampsin-Neuville et 2 ex. le 17.07 à Virelles. • **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : 3 données en juin concernent les derniers migrateurs pré-nuptiaux attardés. Le passage post-nuptial est précoce : il commence dès le 04.08 à Péronnes-lez-Antoing et se poursuit ensuite timidement au cours du mois (total d'environ 25 individus différents) avec le passage principal entre le 19 et le 31.08 à Eghezé-Longchamps.

• **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : 50 chanteurs sur 3,5 km le 10.06 à Frasnes-lez-Buissenal. • **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : éteinte à Bruxelles, l'espèce est encore répandue en Wallonie mais, le plus souvent, elle n'est signalée qu'en petit nombre : ainsi, 5 cantons à Harchies, 2 chanteurs + 2 ex. sur 4 km le 18.06 à Frasnes-lez-Buissenal, 10 chanteurs en juin autour de Dion. Des chanteurs dans nombre de localités de Fagne-Famenne, de Lorraine et d'Ardenne; toutefois, ce ne sont souvent que des cantons isolés comme à Bomal, Sinsin, Hogne, Habergy, Longvilly, Noville, Vaux-sur-Sûre, Nisramont, Wibrin, etc. Curieux groupes en juin : 15 ex. le 14.06 à Hargimont et 20 le même jour à Harsin. Les rassemblements estivaux atteignent 15 ex. le 14.08 à Wihogne, 60 ex. le 22.07 à Givry et 90 ex. le 31.08 à Angre; le passage est, sinon, assez insignifiant.

• **Perruche à collier** (*Psittacula krameri*) : à Bruxelles, un albinos accompagne en juillet les perruches regagnant le dortoir d'Evere; 1 ex. le 17.06 à Neufvilles (Ht).

• **Chouette effraie** (*Tyto alba*) : la reproduction est fort moyenne mais non catastrophique : sur 134 sites du nord de la province de Liège, 55 sont occupés dont 32 avec reproduction (moyenne de 2,5 jeunes à l'envol contre 4 en 1996). • **Chouette chevêche** (*Athene noctua*) : bonne reproduction dans la région d'Anderlues. • **Chouette hulotte** (*Strix aluco*) : reprise des chants dès juillet-août. • **Hibou moyen-duc** (*Asio otus*) : des oiseaux en chasse diurne le

04.06 à Haut-le-Wastia et le 21.07 à Eghezée; dans l'ESM, en forêt de Soignes, au Luxembourg et dans d'autres régions encore, la reproduction 1997 est médiocre : par exemple, 2 nichées seulement le 08.06 dans le camp de Marche-en-Famenne. • **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 1 ex. le 19.06 sur une friche humide aux BEH (Plate Taille). • **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : 25 cas de nidification pour 1997, dont un seul en cavité naturelle; c'est l'année présentant l'effort de reproduction le plus faible depuis 1988. La production de jeunes est en outre très faible : sur 15 cas de nidification, 2 seulement ont produit des jeunes, dont un seul a survécu jusqu'à l'envol à la mi-juin. La seule reproduction en cavité naturelle s'est déroulée en un endroit où un nichoir occupé jusqu'en 1996 a disparu : ceci confirme l'importance de ne pas placer de nichoirs à proximité de sites naturels, sous peine de voir ces derniers délaissés.

**Engoulevent d'Europe** (*Caprimulgus europaeus*) : 2 ex. le 01.06 à Villers-sur-Lesse, 5 sites occupés en juillet à La Reid, 1 chanteur le 15.07 en fagne de Malchamps, 1 ex. le 04.08 à la Croix-Scaille (il y a longtemps que l'espèce n'y avait plus été signalée), 1 ex. le 28.08 à Olloy-sur-Viroin et signalé en août à Beauraing (Chapry). • **Martinet noir** (*Apus apus*) : 45 couples à Tournai - ville; envol de jeunes signalé dès le 03.07 à Bruxelles mais nourrissage au nid encore noté le 04.08 à Marloie. Des rassemblements (pré) migratoires comptent jusqu'à 120 ex. le 24.07 et 300 le 02.08 à Angre, 300 le 07.08 à Ampsin. Passage de 150 ex. de 15 à 17 h le 01.08 à Nismes. Nombreux départs après le 08.08 dans les régions de Charleroi et de Huy. Rare partout après le 15 : 5 ex. le 15 et 3 le 24 à Gembloux, 3 le 19 à Yvoz-Ramet, 1 le 20 à Braine-le-Comte, 9 le 22 à Pailhe, 1 le 24 à Ampsin, 2 le 24 à Angre, 1 le 25 à Spa. • **Martin pêcheur** (*Alcedo atthis*) : signalé seulement à Harchies (échec probable de la reproduction), Chertal (couple avec 2 jeunes le 19.06), Godinne (nourrit au nid le 26.06), Roly (nicheur), Virelles, Mariembourg, Lomporet, Vodelée, Boutonville, Rosières, Seneffe; en dispersion estivale, apparaît en août à Gembloux et Taviet. Insolite, 1 ex. fait le

St-Esprit au-dessus d'une petite mare en plein plateau agricole à Herbet (Bomal) le 23.07. • **Huppe fasciée** (*Upupa epops*) : 1 ex. le 15.06 à Rosoux (Lg), 1 ex. du 22 au 25.07 à Ghlin.

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) : encore 2 chanteurs le 21.06 au camp de Marche (3 cantons en 1997), 1 ex. le 11.07 à Elsenborn. Passage noté à partir du 17.08 : 1 ex. le 17.08 à Awagne (Dinant), le 19.08 à Oneux, le 21.08 à Taviet; 5 bagués du 23.08 au 06.09 aux Avirs. • **Pic vert** (*Picus viridis*) : 10 cantons à Harchies (pour seulement 5 de Pic épeiche). • **Pic noir** (*Dryocopus martius*) : observations éparses dont plusieurs à Harchies. • **Pic épeiche** (*Dendrocopos major*) : dispersion après nidification à partir du 03.06 à Lagland (Châtillon). • **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) : en marge d'aire, 1 ex. le 26.07 à Matagne-la-Grande et 1 ex. le 23.08 à Chéoux (Rendeux). • **Pic épeichette** (*Dendrocopos minor*) : signalé d'une quinzaine de localités dont Wibrin.

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : la population nicheuse se maintient bien et quelques nouveaux sites sont occupés. En plus des camps de Marche (15 couples) et Lagland (au moins 20 couples), on note 3 couples à Rochefort, 1 à Avel-et-Auffe, Hotton et Athus. Des chanteurs sont également entendus fin juin à Romedenne et Engis tandis qu'un adulte et deux juv. sont notés à Seilles le 02.08. • **Alouette des champs** (*Aldaia arvensis*) : deux données quantitatives ponctuelles : 7 chanteurs sur 10 ha le 15.06 à Hermalle-sous-Argenteau et 30 chanteurs sur 3.500 m le 05.06 à Anseroeul.

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : les recensements des différentes colonies semblent indiquer que la chute des effectifs est stoppée, bien qu'il faille rester prudent : plusieurs observateurs renseignant le nombre de trous sans estimation du taux d'occupation. Quelques chiffres : Péronnes 271 trous, Obourg 85 trous, Momignies 18 trous, Harmignies 15 couples, Frasnes-lez-Couvin env. 100 couples, Ben-Ahin env. 60 trous, Horion-Hozémont (Fontaine) 60 couples, Metzert env. 150 couples. L'espèce est signalée en augmentation sur le Viroin mais en



*Hirondelle de  
fenêtre; Comblain-la-  
Tour, juin 1997.*

R. Dumoulin


diminution sur l'Ourthe entre La Roche et Bomal. Encore 3 nichées au nid le 13.08 à Comblain-au-Pont. • **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : alors que les premiers juvéniles s'envolent le 25.06 à Comblain-au-Pont, un dortoir rassemble plusieurs centaines d'ex. dès le 17.07 à Virelles. • **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : plusieurs recensements locaux débutent ou se poursuivent et permettront de se forger une opinion sur l'évolution des populations locales. Ainsi à Mormont, 42 nids contre 27 en 1966, mais à Mons 101 nids, en constante diminution depuis 1990. Ailleurs, 372 nids dans l'agglomération regroupant Amay et Ampsin et 91 nids à Godinne, dont 60 au seul collège St-Paul. Un albinos le 19.08 à Chercq (Tournai).

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : passage très net fin août dans toutes les régions : au moins 36 ex. signalés entre le 17 et le 31, dont un groupe de 6 le 26 puis de 11 le 28 dans une étéule de lin à Meux. • **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : signalé localement en augmentation, notamment à Yvoir et Godinne. Premiers migrateurs le 02.08 à Harchies. • **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : alors que des nichées en céréales sont notées à Sommière, dans le Condroz, ainsi qu'une nouvelle fois sur le Plateau du Gerny (Marche-en-Famenne), un couple

nicheur est trouvé dans du maïs à Chassepierre. Dans la Fagne également, l'espèce s'est installée progressivement dans les cultures depuis le début des années 1990 et on note même des augmentations locales (BEH, Senzeille, Soumoy, Baileux, Lompret, Nismes...). Par contre, l'espèce diminue dramatiquement dans les milieux humides d'Ardenne. Le passage débute classiquement à la mi-août avec un pic à la fin du mois.

• **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergi*) : une seule donnée : 1 ex. avec 50 *flava* le 29.08 à Achène (Taviet). • **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : des rassemblements précoces sont signalés : 30 ex. le 25.06 à Hologne-sur-Geer, dortoirs de 80 ex. le 01.07 à Frasnes-lez-Couvin et de 208 ex. le 07.08 à Antoing. A Achène, courant juin, 1 ex.s'attaque à son reflet dans un rétroviseur de voiture! • **Bergeronnette de Yarrell** (*Motacilla alba yarellii*) : 1 ex. présentant des caractères hybrides entre *M. a. alba* et *M. a. yarellii* le 20.06 à Aublain.

**Rosignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : 12 cantons à Harchies-Hensies, où une nidification tardive est notée à la mi-juillet; 6 chanteurs sur 2,5 km le 03.06 à Sautour. • **Gorgebleute** (*Luscinia svecica*) : en dehors du complexe d'Harchies, où la population est évaluée à 24 couples, confirmation sur quelques sites ré-



*Pipit des arbres et Pipit farlouse.* Ph. Moës



cents : en Hainaut, 1 couple à Warchin et à Mouscron (nouveau site); en province de Namur à Floriffoux, Tamines, Eghezée-Longchamps; en province de Liège à Hologne-sur-Geer (2 couples avec jeunes fin juin) et Hermalle-sous-Huy. 5 observations de migrateurs dans les cultures entre le 03 et le 24.08 à Angre-Angreau.

• **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : présent dans la plupart des villages de la région de Gedinne, de même que dans celle de Mariembourg, où ses effectifs sont estimés en hausse. Plus marginal, un couple à Anderlues, dans un verger enclavé dans les habitations (nourrissage le 02.06). • **Traquet tarier** (*Saxicola rubetra*) : dernier réduit de l'espèce en province de Namur, Cul-des-Sarts accueille 5-7 couples nicheurs. En province du Luxembourg, l'enquête COA n'a permis de découvrir que 25 cantons; la production de jeunes a, de plus, été faible. Il est un peu plus répandu dans les cantons de l'est mais seule la région de Sourbrodt / Elsenborn accueille encore une population fournie. Passage classique en août dans toutes les régions : deux données relativement

précoces le 07.08 à Cour-sur-Heure et à Roisin, à partir du 11 à Woluwe-St-Lambert et plus généralement après le 15. • **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : situation inverse pour le Pâtre, à propos duquel les bonnes nouvelles affluent de la plupart des régions, notamment des occupations de nouveaux sites. A ajouter aux chiffres cités dans la chronique précédente : 70 cantons dans le camp militaire de Marche-en-Famenne (46 en 1990 et quasi absent 10 ans auparavant - voir D. van der Elst dans *Aves* 27 (1990) : 209-244), population estimée à plus de 200 couples pour tout le sud de l'ESM. L'évolution est moins spectaculaire (tout en étant aussi très favorable) en Ardenne, où l'espèce occupe surtout les grandes coupes forestières. En Hainaut occidental, aucun site n'est trouvé en dehors de la vallée de la Haine, qui totalise 75 à 82 couples, soit moins qu'en 1996. Un juvénile migrateur (ou en dispersion) dès le 26.07 à Eghezée-Longchamps alors qu'une nichée quitte à peine le nid le 15.08 à Castillon. • **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : nidification probable sur le crassier d'Athus où un mâle alarme fortement le

15.06. Un migrateur tardif le 05.06 à Jehonville et deux précoces les 14 (Spa) et 19.07 (Champlon), suivis du passage classique surtout après le 15.08. • **Merle noir** (*Turdus merula*) : 1 ex. imite le cri de parade de la Bondrée le 16.06 à Fagnolle. • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : peu d'informations si ce n'est pour signaler sa régression, notamment en Fagne (nicheurs isolés ou colonies réduites) et en Hainaut occidental. • **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : premiers rassemblements : 15 ex. le 16.07 à Spa, 50 ex. le 24.08 à Focant, 25-30 ex. le 26.08 à Flobecq.

**Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : 3 chanteurs à Haut-le-Wastia le 13.06, 6 à 8 cantons à Harchies, encore plusieurs chanteurs en juin-juillet sur une dizaine de sites en Luxembourg. 13 ex. bagués du 20.08 au 04.09 aux Awirs. • **Locustelle lusciniôide** (*Locustella luscinioides*) : 1 ex. bagué le 05.08 à Ampsin. • **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : hors marais d'Harchies, où l'effectif est finalement évalué à 22 cantons, 1 canton à Warchin fin juin. 1 migrateur dans du maïs le 01.08 à Angre, les 05, 08 et 24.08 (bagués) à Ampsin, le 30.08 à Virelles, 24 ex. bagués de début août à début septembre aux Awirs. • **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : quelques densités : 8 sur 3.500 m le 05.06 à Anseroel, 5 sur 1 km le long du Viroin le 01.06 à Mazée, 5 sur 300 m le 04.06 à Nismes, 25 sur 20 ha le 04.06 à Hermalle-sous-Huy, 12 sur 3 km le 07.06 à Othée, 22 sur 165 ha à Amay ... Migration dès mi-juillet : 60 ex. bagués du 17.07 au 30.08 à Ampsin, 347 aux Awirs. • **Rousserolle effarvatte** (*Acrocephalus scirpaceus*) : encore un migrateur le 03.06 (en pleine ville) à Marchen-Famenne et le 07 à Boeur; peut-être nicheurs, 3 chanteurs début juin à Stavelot et 2 le 12.06 au parc de Woluwe-St-Pierre. 4-5 couples à Achêne-Taviet, 7 à 9 cantons dans les marais bordant la Semois à Laiche, 2 chanteurs jusqu'à début juillet à Latour, 25 à 30 cantons à Harchies. Premiers migrateurs le 31.07 à Ampsin où 94 ex. furent bagués en août, pour 838 de début août à mi-septembre aux Awirs. • **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*) : 1 chanteur jusqu'au 14.06 et un autre jusqu'au 12.07 à Harchies, mais pas de preuve de nidification. • **Hy-**

**polais icterine** (*Hippolais icterina*) : la Famenne continue à accueillir quelques couples : chanteurs le 05.06 à Melreux, le 09 à Honnay, le 10 à Wiesme et le 21 au camp de Marche. Ailleurs, seulement quelques données ponctuelles de Hesbaye et de Hainaut occidental, notamment 3 couples dans les parcs de Tournai en juin et plusieurs chanteurs dans la région d'Ath-Lessines; nourrissages fin juillet à Flobecq (envol de 4 jeunes le 03.08) et à Tournai. 12 ex. bagués sur le mois d'août aux Awirs; première capture le 08.08 à Ampsin. • **Hypolaïs polyglotte** (*Hippolais polyglotta*) : bien présente dans tout le sud de l'ESM et en Famenne (Resteigne, Serinchamps, Oppagne, Marche, Fronville, Dion, Petit-Han, Javingue, Ambly, Otton); en Condroz, signalé à Netinne, Haid, Pessoux et Achêne, où elle augmente d'environ 10% cette année; en Lorraine, à Latour et Sterpenich; en Ardenne à Ourt, Verlainne et Bellefontaine. Migrateurs le 12.08 à Hermalle-sous-Argenteau et le 22.08 à Angreau. • **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : retours très tardifs début juin à Nisramont et à Chiny, diminution confirmée à Achêne, seulement 12 ex. bagués en août aux Awirs ... Toutes les informations vont dans le même sens. Une exception : 5 chanteurs sur 1 km<sup>2</sup> le 12.06 à Romedenne. • **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : généralement signalée en bonne santé, voire en augmentation : 6 chanteurs sur 3 ha le 16.06 à Samart, 9 sur 1 km<sup>2</sup> le 18 à Romedenne, en augmentation dans les régions de Philippeville et Mariembourg, 4 couples et 3 chanteurs sur 4 km le 18.06 à Frasnes-lez-Buissenal ... 155 ex. bagués de mi-juillet à début septembre aux Awirs avec un maximum 10 ex. le 18.08. • **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : 46 ex. bagués du 03 au 31.08 à Ampsin, 479 de début août à mi-septembre aux Awirs (maximum le 18.08). • **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : 15 chanteurs sur 3-4 km en forêt de Stambruges le 05.06. Passages notés à partir de la troisième décade d'août à Ampsin et aux Awirs. • **Pouillot siffleur** (*Phylloscopus sibilatrix*) : rareté confirmée : quasi absent à Achêne, aucun contact le 05.06 sur une chaîne de points d'écoute en forêt de Stambruges, absent du bois d'Anway à Yvoir (6 en 1995). Tout de même 8 chanteurs le 03.06 au Sart-Tilman. • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus*

*collybita*) : 27 chanteurs sur 3,5 km le 10.06 à Frasnès-lez-Buissenal. • **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : 4 chanteurs le 05.06 en forêt de Stamburges. Passage à partir de mi-juillet aux Awirs avec un pic dès le 28. • **Roitelet huppé** (*Regulus regulus*) : 30 chanteurs sur 25 ha de résineux à Yvoir. • **Roitelet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : 15 chanteurs sur la même zone à Yvoir.

**Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : envols de secondes nichées le 04.08 à Achêne (Taviet), le 15.08 à Renaix et le 18.08 à Pailhe. 5 cantons autour de Renaix : 2 sur 850 m et 3 sur 2.700 m. Passages notés à partir du 08.08. • **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : déjà 1 ex. le 21.07 à Bailleul ensuite passage diffus à partir de début août; 12 ex. bagués en août aux Awirs.

**Mésange à longue queue** (*Aegithalus caudatus*) : déjà un groupe de 31 ex. le 26.06 au Sart-Tilman, un de 17 ex. le 23.07 à Achêne-Taviet. • **Mésange noire** (*Parus ater*) : premiers mouvements signalés par 1 ex. le 23.08 à Harchies et le 24 à Ellezelle. • **Mésange charbonnière** (*Parus major*) : une bande de 40 ex. le 16.07 à Spa-Malchamps. • **Sittelle torchepot** (*Sitta europaea*) : dispersion postnuptiale : 1 ex. le 28.07 à Harchies et 2 ex. en vol vers le NE le 14.08 à Angre. • **Mésange rémiz** (*Remiz pendulinus*) : plusieurs mentions de 1 ou 2 oiseaux en juillet et en août à Harchies, mais toujours pas de preuve de nidification. Par contre, une première nidification est notée en province du Luxembourg : 1 adulte accompagné de 2 juv. à peine envolés du 28.06 au 04.07. Une nichée de 4-5 jeunes le 22.06 à Oost-Maarland, 4 ex. le 05.08 à Chertal.

**Loriot d'Europe** (*Oriolus oriolus*) : aucun contact en forêt de Stamburges le 05.06, 2 sur 2 km le 18.06 à Frasnès-lez-Buissenal, 9 cantons à Harchies. Dans l'ESM, présent à Roly, Vodecée, Mont-Ste-Geneviève (3 sites), Virelles, Viesville, Pont-à-Celles, Sart-en-Fagne, Cerfontaine, Neufvilles, Matagne-la-Grande. 1 ex. à la réserve de Feschaux, seule donnée du sud Namurois. En août, 1 ex. le 02 à Latour et 7 le 06 à Wiers.

**Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : de nombreux recensements confirment l'augmentation ou la progression de cette espèce vedette; trop nombreux pour être rapportés ici mais une synthèse est en cours de rédaction. Les chiffres les plus significatifs sont : 115 chanteurs au camp de Marche-en-Famenne, 58 sur Mormont / Durbuy, 37 sur 20 km<sup>2</sup> dans la région d'Aywaille et plus de 250 en ESM, soit 20 % de plus qu'en 1996. Nouvelles installations en Condroz namurois : 1 chanteur à Haut-le-Wastia, 1 ou 2 à Achêne-Taviet. • **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : nidification prouvée à Mochamps, Lamorteau, Prouvy, Ste Cécile, St Mard, Han-sur-Semois, Harsin, Manhay, Odeigne, Hogne; des cantons à Spa, Bihain (Petites-Tailles), Elsenborn, Desnié, Emmels et Deifelt (Beho). En province de Namur, 1 ex. le 21.06 à Porcheresse, le 14.07 à Louette-St-Pierre et le 22.07 à Carlsbourg mais sans preuve de nidification. Dans l'ESM, 5 nichées à l'envol, mais tardives et peu productives, à Falemprise, Roly, Sart-en-Fagne, Cul-des-Sarts et Brûly; un second couple à Cul-des-Sarts mais peut-être pas nicheur. Deux cas de prédatations sur des pipits : un le 29.06 à Buissonville et une capture de Pipit des arbres migrateur le 31.08 à Marche. • **Pie-grièche à tête rousse** (*Lanius senator*)\* : nichée réussie de 3 jeunes en août à Lamorteau.

**Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*) : abondant en juin dans la région d'Achêne; 12 ex. à une mangeoire en forêt le 29.08 à Spa. • **Cas-senoix moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : 1 ex. le 15.06 à Odeigne, 3 le 26 à Spa-Bérinzenne, 1 le 07.07 à Heyd, 1 le 09.08 à la Croix-Scaille, 1 le 20.08 et 10 le 31.08 à Spa, 1 les 22 et 30.08 à Vierves-sur-Viroin.

**Etourneau sansonnet** (*Sturnus vulgaris*) : 5-10.000 en pré-dortoir le 15.08 à Henri-Chapelle, dortoir de 30-50.000 aux cimenteries d'Obourg.

**Moineau friquet** (*Passer montanus*) : 3 couples nicheurs + 5 contacts sur 3.500 m le 05.06 à Anseroeul; 2 bandes stationnent tout le mois d'août à Angre, maxima de 80 ex. le 22 pour l'une et de 100 ex. le 30 pour l'autre.



*Pie-grièche  
écorcheur  
femelle;  
Comblain-au-  
Pont, juillet  
1997. R. Du-  
moulin*

**Serin cini** (*Serinus serinus*) : en progression : en région hutoise, 12 cantons à Huy, 3 à Ainsin, 3 à Amay, plus quelques isolés; 12 chanteurs sur la commune de Libramont; minimum 6 à Mons-ville... 1 chanteur le 21.06 en lisière de pessière à Gembes, loin de tout village. Quelques mouvements notés à partir de début août. • **Verdier** (*Carduelis chloris*) : répandu en région hutoise; 10 à 12 cantons à Harchies, 3 sur 500 m à Renaix. Groupe de plus de 100 ex. le 24.08 à Angre. • **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : nidifications constatées un peu partout en juin en Luxembourg, où l'espèce se porte très bien. Groupes de 67 ex. le 24.08 dans la réserve de Feschaux, de 40 ex. le 24 à Wiers (présence tout le mois). • **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : aucune donnée de nidification mais 2 ex. le 21.06 à Marche, 2 chanteurs le 05.07 à Dochamps, 1 ex. le 10.07 à Olloy-sur-Viroin et 1 couple le 03.07 à Wibrin. ensuite 3 ex. le 21.08 à Couvin et 15 ex. en vol le 30.08 à Spa-Malchamps. • **Linotte mélodieuse** (*Carduelis can-*

*nabina*) : bonne nidification soulignée par plusieurs observateurs en Luxembourg. Quelques rassemblements estivaux sont signalés : 200 ex. le 15.06 à Xhendremael, 90 le 05 et 80 le 16.07 à Roly, 100 le 24.07 à Longueville... puis en août, notamment 300 le 22 à St-Georges-sur-Meuse. • **Sizerin flammé** (*Carduelis flammaea*) : recherches vaines à la Croix-Scaille; 1 chanteur les 09.06 et 11.07 à Spa, 1 couple nicheur à Waimmes le 11.07, 1 ex. le 23.07 à Desnié. Le Sizerin n'arrive décidément pas à s'installer durablement. En août, 1 ex. le 07 à Ombret et 1 le 08 à Emael. • **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : après une quasi absence remarquée depuis 1995, un afflux a lieu à partir de juin : plusieurs dizaines de petits groupes (généralement moins de 10-20 ex.) sont signalés surtout en ESM, en Ardenne namuroise et en Famenne, curieusement très peu en province de Liège. Les plus gros groupes : 50 ex. le 15.06 à Anlier, 50 le 18.06 à Frasnes-lez-Buissenal, 30 le 10.07 à Heyd, 35 le 22.07 à Luchy, 27 le 02.08 à Seilles.

• **Grosbec cassenois** (*Coccothraustes coccothraustes*) : premiers signes de dispersion postnuptiale (groupes de 5-6 ex.) le 21.06 à Achène; nombreux en juin-juillet dans les régions de Huy et d'Aywaille. Jeunes volants le 20.06 à Engis.

**Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : 6 chanteurs sur 4 km le 18.06 à Frasnes-lez-Buisenval, 8 sur 2,5 km le 03.06 à Sautour, 6 sur 1 km<sup>2</sup> le 19.06 à Philippeville, au moins 15 à Jamagne en juillet, 10 sur 50 ha le 19.06 à Stockay, 5 sur 500 m de haie le 20.06 à Hoyémont. • **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : 1 juvénile le 26.08 à Hour. • **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : très rare dans les prés humides de

la région de Gedinne; 6 + 2 chanteurs le 28.06 à Roly, au moins 10 le 02.06 à Virelles; 4 à Chertal en juin, 4 à Crombach, 1-2 sur une dizaine d'autres sites. • **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : l'afflux noté au printemps en Famenne et Lorraine se confirme : 1 canton à Feschaux, Honnay, Valansart, Dampicourt, Longueville, 2 à Tohogne et Sommethonne, 3 à Fontenoille et au camp militaire de Marche. Hors zones habituelles aussi : 1 chanteur le 04.06 à Ampsin et le 15.06 à Hermalle-sous-Argenteau, 2 + 1 ex. le 04.06 à Jamagne. 5 chanteurs sur 3.500 m le 05.06 à Anseroel. Rassemblements postnuptiaux : 30 ex. les 17 et 24.08 à Haulchin, 45 ex. le 31.08 à Houtain-St-Siméon.

## Ont contribué à cette chronique :

Ameels M., Anciaux, Bertrand L., Bihain B., Blyth M., Bodart Ph., Bocca S., Brouyère G., Buckinx G., Burnel A., Carré P., Charlier J.M., Chiwy B., Clesse, B., Collard Ph., Collinet M.-C., Coppée J.-Lo., Crespeigne A., Daulne J.M., Debaere T., Debiève J., De Broyer A., Deflorenne Ph., Degossely Ph., Delahaye L., Delbecque F., Delcourt J., Deloyer P., Dernien F., Deroanne M., Deroiaux A., Desablens P., Détaillé R., Dewitte Th., Doblestein F., Dortu Ch., Dufourny H., Dujardin R., Dumoulin R., Duyck B., van der Elst D., Eysermans F., Fanon Y., Farinelle C., de Favreau M., Flon Y., Fouarge J., Fraipont R., de Francquen Ch., Ghem M., Gilles S., Giot Y., Greindl R.-F., Hanse P., Hanus B., le Hardy F., Hauteclair P., Héla F., Herbecq F., Hubert M., Jacob J.-P., Jacquemin B., Jacquemin M., Jacquet R., Jardon B., Jenard Ph., Joris A., Jortay A., Kempeneers Y., Kinet Th., Lambert M., Lambillon J., Laudelout A., Lebrun A., Ledoux L., Lefèvre U., Lemaître F., Lepinois J.-C., de Liedekerke R., Loly P., Lucas Ph., Mardulyn H., Mary P., Matagne J., Matgen O., Mengal J., Merial A.-M., Michel X., Minet G., Moës Ph., Molitor B., Moncousin M., Monmart A., Nicolas M., Paquay M., Paquay N., Paquet J.-Y., Percsy C. et N., Philippart B., Pierre P., Quere L., Rabosée D., Ravet P., Remacle A., Renard F., Rolin J.P., Rousseau C. et L., Rousseau D., Ruyschaert F., Ryelandt D. E., Ryelandt Ph., Sacré P., Sédek J., Sente F., Swinnen V., Teerlynck H., Testaert D., Thonnard P., Tricot J., Vandervelden J., Vanhove F., Van Zuylen R., Verroken D. et L., Vieuxtemps D., Viseur S., Voituren D., Walet M., de Wavrin H., Willame A., Willem G., Wouters R., les observateurs de la Trientale (C.N.B.) et de Latour, le groupe de Genappe... et quelques autres, sans doute, que nous avons oubliés. Qu'ils soient bien persuadés que cela est tout à fait involontaire.

Les données ont été rassemblées par les délégués régionaux de la COA : J.-Lo. Coppée, P. Loly, D. Muysfont, Ph. Degossely, D. Vieuxtemps, J.Y. Paquet et H. de Wavrin.

Rédaction : Emile Clotuche, François Hupet, Jean-Paul Jacob, René de Liedekerke et Dominique Testaert.