

## Centrale ornithologique Aves<sup>1</sup>

# Observations de décembre 1997 à février 1998

### CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Un mois de décembre doux, surtout après le 17 (courants maritimes d'origine tropicale), a clôturé une nouvelle année chaude. Avec une température moyenne de 10,8 °C (normale 9,8), 1997 est en cinquième position au classement des années les plus chaudes depuis 1833, après 1989 (11,3 °C.), 1990 (11,2), 1994 (11,1) et 1995 (10,9). Cette série a d'inévitables relents de réchauffement climatique.

La douceur s'est maintenue jusqu'au 18 janvier, avec des journées déjà printanières du 10 au 14 janvier (maxima de 15 °C). Du 19 janvier au 4 février, le retour à une météorologie plus hivernale s'est produit sous la prédominance de courants continentaux. Petite froidure accompagnée de quelques chutes de neige fin janvier et avec un minimum nocturne de -17 °C en haute Ardenne le 25. Le redoux qui s'est amorcé le 5 février a marqué le mois, à l'exception des deux derniers jours, maussades. En particulier, le week-end des 14-15 février fut extrêmement printanier, avec des maxima atteignant 19 °C.

L'hiver 1997-98 fut sans conteste un nouvel hiver doux. La rareté des jours avec gel nocturne (17 à comparer à une moyenne de 37) et avec gel diurne (2 par rapport à 10) suffit à s'en convaincre.

### FAITS SAILLANTS

La douceur de cet hiver contraste avec les coups de froid des deux précédents. Première conséquence immédiate, et prévisible, l'abondance de la plupart des espèces d'oiseaux d'eau est revenue à son modeste niveau normal. Les résultats des recensements le montrent à suffisance (voir LOLY & JACOB, Bulletin 1997/4, pages 225-234).

Cette même douceur hivernale a engendré, à l'inverse, un nombre inhabituellement élevé d'observations à des dates "hors norme" : migrateurs attardés, candidats à l'hivernage, retours précoces, la différence n'étant pas toujours évidente et certaines espèces cumulant le tout. On notera par exemple les observations de Grèbe à cou noir, des deux cigognes, du Grand Butor, de la Grande Aigrette, des deux milans, du Balbuzard, du Pluvier doré et du Vanneau, du Chevalier guignette, de la Mouette pygmée, de l'Alouette des champs, de la Bergeronnette grise, des Pipits spioncelle et farlouse, du Rougequeue noir, du Traquet pâle, du Pouillot véloce (une seule de Fauvette à tête noire par contre), du Serin cini... et même de deux Hirondelles de fenêtre en février.

---

(1) Centrale Ornithologique AVES  
c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

Cela n'empêche toutefois pas la liste des hivernants rares d'être relativement bien fournie : Plongeon imbrin, Grèbe esclavon, Cygne de Bewick (et bien sûr les Cygnes sauvages de Roly), Buse pattue, Goélands bourgmestre, à ailes blanche et à bec cerclé, Mouette tridactyle... On retiendra à l'inverse la rareté de trois rapaces, liée sans doute, pour les deux premiers, à celle des micro-mammifères, qui se confirmera au printemps : Busard Saint-Martin, Hibou moyen-duc et Faucon émerillon. Quant au Martin-pêcheur, il n'a pas encore récupéré les pertes subies au cours des deux hivers précédents. Le Pigeon ramier était lui-aussi assez peu abondant.

La douceur explique aussi des comportements territoriaux relativement précoces, notamment en janvier (les chants étaient nets vers le 10-14 janvier, Alouette des champs par exemple, pour se calmer tout à fait à partir du 18 lors d'une dégradation de la météo), ainsi que des reproductions hivernales insolites (Pic épeiche probable, Effraie, Tourterelle turque, Merle noir).

Chez les granivores, plutôt peu abondants (Tarin, Sizerin, Beccroisé, Pinson du Nord...), on remarquera à l'inverse l'abondance croissante ou inhabituelle des Chardonnerets, Bouvreuils, Bruants jaunes et Bruants des roseaux. Pour les deux premiers, l'augmentation est sans doute liée au moins en partie à une diminution de la pression de tenderie depuis 1993.

Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre-Sambre-et-Meuse, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf précision utile.

## DETAIL DES OBSERVATIONS

**Plongeon arctique** (*Gavia arctica*) : un immature est présent jusqu'au 26.02 aux BEH.  
• **Plongeon imbrin** (*Gavia immer*)\* : 1 ex. tout l'hiver aux BEH.

**Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : mis à part Obourg, qui accueille 25 à 30 ex. durant toute la période (maximum 34 ex. le 14.12), peu de sites comptent plus de dix oiseaux : 10 à 15 aux BEH, 12 à 16 en février à Vielsalm et 11 ex. le 17.01 à Tihange. L'hivernage est qualifié de faible sur l'Ourthe et sur la Semois, qui totalisent cependant 72 ex., soit 40% de l'effectif dénombré en Wallonie et à Bruxelles à la mi-janvier. • **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : le couple hivernant à Luchy (fait rare en Ardenne) est indicateur d'un hiver doux. Dans l'ensemble, l'hivernage est normal. Les maxima connus sont respectivement, pour les mois de décembre, janvier et février : 181, 136 et 289 ex. en Basse-Meuse et 160, 120 et 170 ex. aux BEH. En Haute-Meuse, on note 83 ex. à la mi-janvier. En Hainaut occidental, il n'y a que 100 hivernants en janvier. Les parades commencent dès le milieu de ce mois, alors que le retour des couples sur les sites ardennais a lieu durant la dernière décade de

février. • **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*)\* : trois données malgré un hiver doux : 1 ex. le 16.12 à Obourg, 1 ex le 17.01 et le 01.02 aux BEH. • **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : 1 ex. le 26.12 à Ploegsteert et, fait rare en hiver, 1 ex. le 03.02 aux BEH.

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : les dortoirs hors Meuse continuent à voir leurs effectifs augmenter et de nouveaux (petits) dortoirs se créent sur des rivières comme l'Ourthe, la Lesse et la Chiers. En Meuse, ceux de Gives et de Jambes comptent un peu plus de 700 ex. en février alors qu'à Chertal on ne dépasse pas les 850 ex. Pour plus de détails sur l'évolution des effectifs, voir LOLY & JACOB, 1997.

**Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : Roly est incontestablement le meilleur site d'hivernage; la présence du Butor y est constatée à partir du 22.01 et le maximum, 7 ex., est atteint le 04.02. Harchies accueille 1 à 2 hivernants et cinq autres sites donnent lieu à l'observation d'1 ex. : le 07.12 à Framont (Paliseul), le 24.12 à Oost-Maarland, les 16 et 23.01 à Virelles, le 02.02 à Saint-Denis et le 21.02 à Longchamps

(Bertogne). • **Grande Aigrette** (*Egretta alba*)\* : Harchies et Roly constituent les deux seuls sites d'hivernage : 1 à 2 ex. durant toute la période et 3 ex. le 17.12 pour le premier, 1 ex. à partir du 13.01, rejoint par un deuxième oiseau le 20.02, pour le second. Quatre autres sites sont également visités : La Hulpe les 23 et 24.12, Ploegsteert le 26.12, Matagne-la-Petite le 13.01 (oiseau de Roly?) et Godinne le 27.01, en compagnie de Hérons cendrés. • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : une bonne année avec un total de 560 ex. en janvier, malgré un hivernage plutôt faible dans certaines régions comme à Harchies et en province du Luxembourg. Les plus gros groupes sont notés à Bonlez (42 ex. le 25.01), à Liège-Monsin (39 ex. le 02.02), à Roly (35 ex. le 13.01) et à Nalinnes (30 ex. le 18.01). L'occupation des nids est signalée dès la fin du mois de janvier et des pontes sont notées début février à Jambes. Côté anecdotes, notons, le 01.12 à Heer-sur-Meuse, un héron partageant avec des poules les restes de nourriture qu'on leur lançait. • **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : deux données surprenantes : 1 ex. très précoce les 20 et 21.01 à Bouillon (Les Hayons) et 2 ex. vers le nord-ouest aux Isnes le 17.02. • **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : cinq données hivernales : 1 ex. du 24 au 28.12 à Tournai, 1 ex. les 06, 07 et 08.01 à Warchin (le même oiseau?), 3 ex. posés le 23.01 à Nodobaix, 1 ex. le 28.01 vers le nord à Oost-Maarland et 1 ex. également vers le nord le 28.02 à Drogenbos.

**Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) : malgré la douceur de l'hiver, la Wallonie et Bruxelles totalisent 220 ex. en janvier; voir LOLY & JACOB, 1997. • **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) : le séjour de cette espèce en Wallonie est inhabituel : Harchies en accueille 1 à 9 ex. (le 13.12) de décembre jusqu'au 11.01; 4 ex., sans doute issus de ce groupe, notés ensuite le 24.01 à Quevaucamps puis le 19.02 à Wadelincourt. • **Cygne sauvage** (*Cygnus cygnus*) : sur l'unique site d'hivernage wallon de Roly, l'effectif atteint 15 ex. du 20.12 à janvier et passe même à 21-23 ex. fin janvier - début février. Ailleurs, on note 2 ex. le 06.02 à Kain et 1 ex. le 18.02 à Gaurain-Ramecroix. • **Cygne noir** (*Cygnus atratus*) : 1 ex. à Woluwe-Saint-Pierre, 1 ex. à Namur et 1 ex.

à Chênée tout l'hiver. • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : en décembre, on note 500 ex. de passage en 1 h 30 le 01 à Escanaffles, 15 ex. le 27 à Grimbergen, 2 ex. le 13 à Virelles et 2 ex. le 21 à Focant, sans compter 137 à 154 semi-domestiques à Meise. Le passage de printemps débute à la mi-février et totalise 520 à 530 ex. durant la deuxième quinzaine dans le Hainaut occidental. Il est moins perceptible ailleurs mais on note par ex. 25 ex. vers le nord le 13.02 à Oost-Maarland, 35 ex. le 15.02 à Genappe et 35 ex. vers le nord le 28.02 à Tervueren. • **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) : mis à part 5 ex. en halte le 03.12 à Havay, toutes les données concernent des oiseaux en vol : 1 ex. le 21.12 à Harchies, 230 vers le sud le 21.01 et 25 vers le nord le 13.02 à Hermalle-sous-Argenteau, 2 ex. le 25.02 aux Isnes. 6 à 12 oiseaux (échappés?) séjournent à Oost-Maarland. • **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) : après 1 ex. le 28.12 à Waremme, 5 ex. *rossicus* en halte le 31.01 à Oost-Maarland, où séjournent en outre 5 à 12 oiseaux dont l'origine sauvage n'est pas certaine. • **Oie à bec court** (*Anser brachyrhynchus*)\* : 6 ex. le 07.12 à Waremme. • **Oie des neiges** (*Anser caerulescens*) : une échappée en février à Oost-Maarland. • **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) : la région bruxelloise abrite une bonne partie des hivernants et on note par exemple 28 à 64 oiseaux en décembre à Meise, 22 à 31 ex. en décembre et maximum 70 ex. en février à Woluwe-Saint-Pierre. Ailleurs, l'espèce est signalée principalement à Jambes (maximum 31 ex. le 17.01), à Houx (22 ex. en décembre), à Godinne et à Oost-Maarland (tous les deux 11 ex. en décembre). Deux couples s'installent à Taviét-Achêne. Tout cela sans compter la population du Condroz liégeois, qui approche les 200 ex. • **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) : même scénario mais les effectifs sont beaucoup plus faibles, par exemple 7 ex. en décembre à Meise, 5 ex. le 17.12 à Tervueren. L'espèce est également notée à Oost-Maarland, où 10 à 11 oiseaux séjournent, 1 ex. en décembre à Jambes et 1 ex. le 22.12 à Gozée. L'origine captive de ces oiseaux ne fait aucun doute. • **Oie de Magellan** (*Chloephaga picta*) : un couple échappé le 24.02 à Oost-Maarland. • **Ouette d'Égypte** (*Alopochen aegyptiacus*) : record de

239 ex. le 20.12 au parc Sobiesky à Bruxelles. Ailleurs, 1-2 ex. sur 6 sites et la Basse-Meuse compte jusqu'à 46 ex. le 15.02 alors que les effectifs sont en dessous de 10 ex. tout le reste de l'hiver. Une nichée très hâtive à Boitsfort avec trois poussins juste éclos le 29.01. • **Tadorne casarca** (*Casarca ferruginea*) : 2 ex. en janvier à Woluwe-Saint-Pierre et les 17 et 18.01 à Laeken, 1 ex. le 26.12 à La Hulpe. • **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : la plupart des hivernants sont concentrés en Hainaut occidental, qui abrite jusqu'à 50 à 60 ex. en janvier et 30 à 40 ex. en février. Ces oiseaux se répartissent essentiellement sur les sites de Ploegsteert, Warneton et Warcoing. Dans le reste du Hainaut, Nimy accueille 37 ex. le 21.12 et les Marionville jusqu'à 10 ex. en décembre. Vient ensuite la région bruxelloise, où l'espèce est notée à Grimbergen (max. 10 ex. le 05.02) et Vilvorde (max. 8 ex. le 15.01). Quelques observations plus occasionnelles de 1-3 ex. en Hesbaye, dans l'ESM et à Achêne-Taviet.

**Canard carolin** (*Aix sponsa*) : 1 ex. en décembre et janvier à Frasnère. • **Canard mandarin** (*Aix galericulata*) : 6 ex. le 14.12 à Auderghem, maximum 5 ex. le 26.12 à Visé et en février à Jambes, 2 ex. le 13.12 à Waremme. • **Canard siffleur** (*Anas penelope*) : Warneton constitue le site d'hivernage le plus important, avec comme maxima mensuels : 72 ex. le 26.12, 75 ex. le 04.01 et 54 ex. le 08.02. Ce sont d'autres sites hennuyers qui accueillent presque tout le reste des hivernants : jusqu'à 30 ex. les 10.01 et 14.02 aux BEH, jamais plus de 20 à Harchies, Obourg et Quévy. Hors Hainaut, l'espèce est signalée ponctuellement à Genappe, Waremme, Yvoir, Hermalle-sous-Argenteau, Vielsalm et Latour. • **Canard chipseau** (*Anas strepera*) : le passage se termine en décembre et seuls quelques sites accueillent l'espèce durant le reste de l'hiver : 15 à 40 ex. séjourment aux BEH, Harchies et Oost-Maarland ont pour maxima de janvier et février : 45 et 30 ex. pour le premier, 22 et 50 ex. pour le second; plus surprenant, 1 hivernant à Vielsalm. L'espèce fait des apparitions ponctuelles sur d'autres sites comme Tubize, Auderghem, Warneton et Latour. • **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : des

mouvements sont notés jusqu'en décembre un peu partout avec pour maxima : 360 ex. le 06 à Waremme, 330 ex. le 13 à Virelles, 160 ex. le 25 à Eghezée-Longchamps, 150 ex. le 15 à Genappe et 120 ex. les 06 et 13 aux Marionville. Les effectifs diminuent sensiblement en janvier mais ce sont les mêmes sites qui accueillent toujours les plus gros groupes; l'espèce est toutefois présente en nombre aussi à Obourg, aux BEH, à Hallembaye ainsi qu'à Luchy et à Latour. En février, les rares groupes qui dépassent les 50 oiseaux sont localisés à Vilvorde (95 ex.), Harchies (60 ex.), Latour (70 ex.) et Oost-Maarland (65 ex.). Seuls Waremme et Eghezée-Longchamps accueillent plus de 100 ex. durant tout l'hiver. • **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : retour à un hivernage normal avec des effectifs plus faibles et plus dispersés qu'en 1996-97. Globalement ceux-ci diminuent au cours de la période : à Waremme par exemple, on passe de 780 ex. le 13.12 à 535 ex. le 17.01 et 475 ex. le 07.02. De même, les totaux en milieu de mois de la Basse et Moyenne-Meuse chutent de 1.203 ex. en décembre à 876 ex. en janvier et 837 ex. en février. Roly évolue différemment, passant de 90 ex. le 13.12 à 350-400 ex. le 26.01 et seulement un peu plus de 100 ex. à la mi-février. L'hivernage est considéré comme faible en Luxembourg, où les maxima sont de 275 ex. le 04.01 à Latour et de 200 ex. le 05.01 à Luchy. • **Canard pilet** (*Anas acuta*) : fin de passage en décembre : maxima de 7 ex. aux BEH et 5 ex. le 26 à Warneton; jamais plus de 5 ex. voire souvent un seul ailleurs. En janvier et février, on ne dépasse jamais 2 ex. sauf à Harchies (7 ex. le 28.02), à Roly et à Virelles (jusqu'à 4 ex.). En Ardenne, un mâle les 23 et 26.02 à Thommen. • **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : une femelle échappée d'une collection est présente tout l'hiver à Hermalle-sous-Argenteau. Il n'y a pas que les bernaches et les Mandarins qui s'échappent. • **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : après la fin du passage en décembre (max. 122 ex. le 12 aux Marionville), les effectifs ne dépassent que rarement les vingt oiseaux : 30 ex. en janvier à La Hulpe, 30 le même mois à Harchies et 30 en janvier-février aux Marionville. Seuls les sites hennuyers d'Harchies et des Marionville accueillent l'espèce tout l'hiver.

**Nette rousse** (*Netta rufina*) : mis à part un mâle observé régulièrement du 28.12 au 27.01 à Hermalle-sous-Argenteau, il s'agit toujours d'observations ponctuelles : 5 ex. les 27.01 et 04.02 au bassin Vergote à Bruxelles, 2 femelles le 26.12 à Harchies, 4 ex. le 06.02 aux BEH et 1 ex. à la mi-février aux Marionville. • **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : retour à un hivernage normal après les hivers records de 1995-96 et 1996-97. A la mi-janvier on compte 4.380 ex. pour l'ensemble du territoire dont 61 % en Basse-Meuse (voir LOLY & JACOB, 1997). En Hainaut occidental, on note des effectifs très fluctuants mais jamais de grandes concentrations, la plus forte étant de 500 ex. le 20.02 à Harchies. Les comptages mensuels donnent pour la Basse et Moyenne-Meuse : 2.955 ex. en décembre, 2.802 ex. en janvier et 3.097 ex. en février. Ailleurs, rarement plus de 500 oiseaux : 754 ex. le 29.01 au bassin Vergote à Bruxelles et 731 ex. le 08.02 à Gastuche. Un mâle hybride **Fuligule nyroca** x **F. milouin** le 30.01 au bassin Vergote à Bruxelles-Laeken. • **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : même scénario que pour le Milouin : 1.276 ex. à la mi-janvier pour l'ensemble du territoire dont 45 % en Basse-Meuse. Même constatation également en Hainaut occidental, où le maximum est de 162 ex. le 26.12 à Warneton. Les comptages mensuels donnent pour la Basse et Moyenne-Meuse : 692 ex. en décembre, 685 en janvier et 530 en février. Ailleurs, quelques groupes de plus de 100 ex. : jusqu'à 200 le 08.02 au bassin Vergote à Bruxelles, 100 à 110 le 13.12 et 110 le 14.02 aux BEH. • **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) : mis à part 2 immatures le 12.12 à Warneton, toutes les données proviennent de Meuse et essentiellement de Basse-Meuse : 2 ex. le 13.12 à Jambes, de 2 à 5 à partir du 14.12 à Hermalle-sous-Argenteau et 1-2 ex. à Oost-Maarland à la même période. • **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : à côté de l'habituel mâle de Jambes, on signale 1 ex. le 10.01 à Lixhe et 3 ex. en janvier à Andenne. • **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : 2 femelles du 27.12 au 04.01 à Oost-Maarland et 1 mâle le 03.02 aux BEH. • **Macreuse brune** (*Melanitta fusca*) : 2 femelles séjourneront jusqu'au 13.12 à Obourg, 2 femelles du 18.12 au 04.01 à Oost-Maarland et 1

femelle ou immature le 13.12 aux BEH. • **Garrot à oeil d'or** (*Bucephala clangula*) : apparaît en petit nombre sur tout le territoire, même en Ardenne : 2 femelles le 28.12 à Rienne et un couple le 07.01 à Freux. Les BEH fournissent les totaux les plus élevés : de 3-7 ex. jusqu'au 21.12, on passe à au moins 20 le 24.12, maximum 7 en janvier, puis à nouveau 24 le 05.02 et 45-50 le 14.02. Ailleurs, les maxima sont : 15 ex. le 23.02 à Roly, 14 ex. le 27.01 à Lanaye, 11 ex. le 26.12 à Oost-Maarland et 10 ex. en janvier à Harchies. Sur les lacs de l'Est, 2 à 6 ex. à La Gileppe à partir du 13.12 et 7 ex. le 02.01 au lac d'Eupen. • **Harle piette** (*Mergus albellus*) : régulier sur plusieurs sites classiques dès le début du mois de décembre avec un pic d'abondance à la fin de ce mois : 14 ex. le 20 à Roly, 12 ex. le 25 à Oost-Maarland, 11 ex. le 20 à Hermalle-sous-Argenteau et 10 ex. le 26 à Harchies. En janvier, d'autres sites accueillent l'espèce : Jambes, Tihange, La Gileppe... mais seulement Obourg, pour le Hainaut occidental, alors qu'1 ex. séjourne à Rienne, en Ardenne. L'espèce apparaît en plus grand nombre lors du passage de février : 30 ex. les 17 et 23 à Roly, 25 ex. le 03 aux BEH, 14 ex. le 04 et 12 le 20 à Obourg et 10 ex. le 11 à Godinne, puis les effectifs diminuent. • **Harle huppé** (*Mergus serrator*) : une femelle les 04.12 et 03.02 aux BEH. • **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : les oiseaux sont déjà bien présents à la mi-décembre : 50-60 ex. aux BEH, 50 ex. à Virelles, 19 ex. à Harchies et 14 ex. en Basse-Meuse. Les effectifs augmentent par la suite pour atteindre les maxima à la mi-janvier pour certains sites (80 ex. en Basse-Meuse et 47 ex. à Roly), à la mi-février pour d'autres (150 ex. aux BEH et 37 ex. à Harchies). Notons jusqu'à 18 ex. à Coe en février, 14 ex. le 18.01 à Bütgenbach et 10 ex. le 07.01 à Rienne. L'abondance de cette espèce, comme celles du Harle piette et du Garrot, est finalement plutôt élevée pour un hiver aussi doux ; il s'agit sans doute d'une conséquence de l'hivernage record de l'année précédente. • **Harle couronné** (*Mergus cucullatus*) : une femelle peu farouche (échappée de captivité) est observée irrégulièrement à partir du 02.11 aux étangs Mellaerts à Woluwe-Saint-Pierre.

**Milan noir** (*Milvus migrans*) : 1 ex. anormalement précoce le 22.02 à Heinstert.

• **Milan royal** (*Milvus milvus*) : quatre observations hivernales, toutes en décembre : Jamoigne le 11, Aywaille le 18, Temploux le 23 et Chassepierre le 24. Premier migrateur le 08.02 à Esneux, puis nette augmentation durant la seconde quinzaine avec 22 mentions dans le Luxembourg. • **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : hivernage très faible, ainsi les seuls dortoirs signalés ne dépassent pas 2-3 ex. (Roly, Wardin). • **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : comportement rarement noté, un ex. se nourrit sur un cadavre de Canard colvert pris dans la glace le 25.01 à Achêne (Taviet). • **Buse variable** (*Buteo buteo*) : pas d'hivernage spectaculaire à l'exception d'une vingtaine d'ex. sur le plateau du Gerny (Jemelle) le 02.02, juste après une période de fortes gelées. Passage dès la seconde quinzaine de février : 10 ex. en 1 h le 18.02 à Havay. Au moins 15 ex., dont plusieurs paradent, le 20.02 au-dessus des bois d'Angre et de Boutenier (Angre/Autreppe/Roisin) • **Buse pattue** (*Buteo lagopus*)\* : 1 ex. le 10.02 à Bévécé.

**Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : exceptionnel en hiver, 1 ex. aux Marionville le 18.01.

**Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : aucune idée de densité hivernale... espèce trop peu notée. • **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : avec 6 observations pour toute la période, la rareté de l'espèce en tant qu'hivernante est confirmée une fois de plus. • **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : observations régulières aux alentours des centrales électriques mosanes; à celle de Drogenbos, une femelle rejoint le mâle observé depuis la fin de l'été et les premières parades sont notées à la mi-février. D'autres sites d'hivernage régulier sont à nouveau fréquentés par 1-2 ex. comme les BEH, Harchies et Houtain-le-Val. Une dizaine de mentions ailleurs, essentiellement en janvier-février, dont un hivernant dans la plaine de Boneffe.

**Gelinotte des bois** (*Bonasa bonasia*) : trois observation de 1 ex. : Bertrix le 14.12, Toernich (Udange) le 02.02 et surtout Bende

(Jenneret) le 21.12. Cette dernière donnée, dans le Condroz et nettement en dehors de la zone où l'espèce est connue, suggère que des reliquats de population isolés subsistent peut-être encore ici et là. • **Perdrix grise** (*Perdix perdix*) : toujours rare dans le Condroz, un couple à Haut-le-Wastia et 1 ex. à Purnode à la mi-décembre.

**Rôle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : alors que 2-3 ex. sont présents à Harchies en décembre-janvier, 8 cantons y sont déjà notés en février. Ailleurs, l'espèce est renseignée en très petit nombre (max. 2 ex.) sur moins de 10 sites, principalement en Brabant wallon. • **Poule d'eau** (*Gallinula chloropus*) : les recensements hivernaux confirment l'impression générale de raréfaction de l'espèce, sauf peut-être dans le Hainaut occidental : ainsi à Warneton, les effectifs oscillent entre 170 et 300 ex. A Achêne (Taviet), l'espèce réapparaît le 22.02. • **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : c'est en général en décembre que les maxima sont atteints sur les principaux sites d'hivernage. Ainsi à Harchies, 970 ex. le 13.12, 450 le 07.01 et 350 en février. De même aux BEH, 1.000 ex. en décembre, 600 à la mi-janvier et 258 le 24.02. Par contre les effectifs restent ± stables durant la période en Basse Meuse, variant entre 1.000 et 1.300 ex.

**Gruc cendrée** (*Grus grus*) : une dernière vague passe en décembre avec six vols dans les provinces de Liège et du Luxembourg entre le 01 et le 18; notamment 40 ex. à Hermalle-sous-Argenteau le 01 et 170 ex. à Aywaille le 02. Plus surprenant, 2 ex. séjournent dans la vallée de la Sûre à Fauvillers (Strainchamps) du 12 au 22.01 tandis que des vols de 60 et 150 ex. sont notés à Chassepierre et Wibrin le 12.01. La migration printanière est notée dès le 14.02, principalement en Lorraine où le passage est quotidien (2.500 ex. comptabilisés du 14 au 28.02), plus ponctuellement ailleurs : 72 ex. le 20 à Feschaux, 25 le 20 à Awan (Aywaille), 2 ex. à Virelles le 27, 8 ex. posés à Achêne (Taviet) le 27.02.

**Huitrier pie** (*Haematopus ostralegus*) : renseigné uniquement en province de Liège: un accouplement le 24.02 et 3 ex. le 28.02 à Oost-Maarland, 1 ex. le 27.02 à Roberville.

**Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : le séjour automnal exceptionnel à Boneffe se termine rapidement début décembre avec l'apparition du gel : 700 ex. le 01.12, seulement 56 ex. le 06.12 et 1 ex. le 18.12 mais à nouveau 108 ex. le 11.01. Ailleurs, une mention étonnante de 3 ex. posés dans la neige le 06.12 au Gerny (Marche). En février, les premiers mouvements sont renseignés en deuxième décennie : 135 ex. le 19.02 à Thuillies et 300 ex. le 26.02 à Givry, bon passage à Angre à partir du 17.02, notamment jusqu'à 266 migrateurs en halte le 24.02, et 45 ex. en vol le 25.02 au Gerny.

• **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : l'hiver relativement doux a favorisé la présence de cette espèce dans de nombreuses régions : en décembre les plus gros groupes totalisent 800 ex. le 01.12 à Boneffe, 1.000 ex. le 03.12 à Matagne-la-Petite et 1.200 ex. le 21.12 à Gaurain-Ramecroix. En janvier, des bandes sont renseignées presque exclusivement en Hainaut, sans diminution réelle des effectifs, avec entre autres 1.200 ex. le 06.01 à Hensies et 1.000 ex. le 11.1 à Warneton. Une augmentation est notée en février, mais sans passage actif marqué : 2.100 ex. le 15 à Harchies, 1.200 ex. le 19 à Thuillies et 1.000 ex. le 23 à Angre.

**Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : premier migrateur le 27.02 à Latour. • **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : une vingtaine de données réparties sur l'ensemble des provinces témoigne d'une présence continue de l'espèce. A côté des individus isolés, on note 3 ex. le 06.12 à Warchin, 3 ex. le 13.12 à Roly, 5 ex. le 01.01 à Ochamps et un oiseau trouvé mort le 06.12 au bord d'une route à Mont-St-Guibert.

• **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : l'hivernage est variable selon les régions : quasi absence en province de Namur avec maximum 4 ex. le 18.01 à Eghezée et effectifs plutôt réduits ailleurs, sauf en Hainaut où l'on observe 31 ex. le 17.01 à Esquelmes et 19 ex. le 04.12 à Warchin. En février, la disparition des hivernants est presque généralisée sauf 19 ex. le 02.02 à Libramont et 15 ex. le 15.02 à Genappe.

• **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : l'espèce est renseignée en février sur de nombreux sites en provinces de Namur (Houyet,

Custinne, Falmignoul...) et du Luxembourg, où plusieurs cas d'hivernage sont observés (Wibrin, Heyd, Robelmont...). Ailleurs, seulement 1 ex. le 13.02 à Ganshoren. • **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : les premiers migrateurs sont classiquement observés en deuxième décennie de février : 7 ex. en vol le 16.02 à Nimy, 2 ex. le 27.02 à Latour et 1 migrateur en halte le 28.02 à Harchies. • **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : après deux derniers observés début décembre, l'espèce réapparaît en février : 6 ex. le 15.02 à Oost-Maarland, 1 ex. le 28.02 à Harchies et une donnée curieuse d'1 ex. trouvé mort le bec cassé le 20.02 à Presgaux. • **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : 1 ex. le 13.12 à Harchies. • **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : 1 ex. le 18.01 à Gozée. • **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : des hivernants sont observés sur de nombreux sites dont Vilvorde, Genappe, Warcoing (2 ex.), Maisières, Fagnolles, Roly, Wanlin et surtout Latour et Lamorteau, qui accueillent chacun 4 ex. : les 21.12 et 27.02 pour le premier, du 01 au 12.02 pour le second. • **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : plusieurs données, ce qui est plutôt inhabituel pour une espèce généralement absente en hiver : 1 ex. les 05 et 13.12 au canal d'Hensies, 1 ex. les 27 et 31.01 à Hermalle-sous-Huy, 1 ex. le 03.02 au barrage d'Ampsin-Neuville, 1 ex. le 04.02 à Ohourg et 1 ex. le 14.02 aux BEH.

**Mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*)\* : un adulte est observé le 06.12 et du 12 au 17.01 au dortoir de Nimy; ces données concernent probablement deux oiseaux différents. • **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : donnée plutôt étonnante d'1 ex. en "plein hiver" le 17.01 à Virelles. • **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : la rareté de l'espèce en province du Luxembourg (seulement 6 données dont maximum 5 ex. le 08.01 à Melreux) contraste avec son abondance aux dortoirs classiques : à Engis, on enregistre 8.000 ex. le 02.12, 1.800 ex. le 09.12, 3.500 ex. les 24.12 et 31.12 et 4.700 ex. le 13.01. A Genval, environ 10.000 ex. le 06.12 et 1.500 ex. le 04.01; à Nimy 5.000 ex. le 10.01 et 4.000 ex. le 10.02. Présence d'un individu leucistique tout l'hiver à Visé et à Jambes les 24, 25 et 28.01. Les premiers cantonnement sont



*Hibou moyen-duc*. Wonck, 02.1998. (R. Dumoulin)

signalés à Warcoing fin février. • **Goéland cendré** (*Larus canus*) : nombres réduits en décembre (max. 300 ex. aux dortoirs) puis forte augmentation fin janvier avec l'arrivée du froid : plus de 1.000 ex. le 31.01 aux BEH et 1.400 ex. le 01.02 à Oost-Maarland. Un adulte bagué observé le 10.01 à Maisières (Les Wartons) avait été bagué le 27.03.97 à Copenhague. Les premiers cantonnements sont signalés fin février à Harchies (1-2 couples) et à Obourg (13 adultes). • **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : les effectifs hivernants sont faibles, maximum 22 ex. le 14.02 à Nimy, sauf aux BEH où on signale 26 ex. le 05.12, plus de 160 ex. le 17.01, 150 ex. le 31.01 et 35 ex. le 24.02. • **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : observé surtout aux dortoirs ou pré-dortoirs, où les nombres restent modérés : 700 ex. le 31.12 et 1.100 ex. le 13.01 à Engis, 4-500 ex. en janvier à Genval, 230 ex. le 05.02 à Obourg et 210 ex. le 05 à Nimy. Un individu leucistique est présent les 16 et 21.12 à

Nimy-Obourg. • **Goéland leucophée** (*Larus cachinnans*) : régulier tout l'hiver sur quelques sites : maximum 4 ex. les 02 et 24.12 à Engis, 9 ex. le 18.01 et 15 ex. le 15.02 à Visé, hivernage de quelques exemplaires aux BEH et présence continue aux dortoirs d'Obourg et de Nimy, où les représentants de la sous-espèce *michaellis* prédominent (max. 7 ex. le 03.12) mais parfois accompagnés d'un *cachinnans*. L'espèce est également observée à Roly (2 ex. le 20.12 et 1 ex. le 17.01) et à Jambes (le 04.12). • **Goéland à ailes blanches** (*Larus glaucooides*)\* : 1 ex. de deuxième hiver est trouvé agonisant à Genval le 23.12. • **Goéland à bec cerclé** (*Larus delawarensis*)\* : sous réserve d'homologation, un adulte les 06 et 08.01 au dortoir de Nimy. • **Goéland bourgmestre** (*Larus hyperboreus*)\* : 1 ex. blessé recueilli à Lasne fin décembre. • **Goéland marin** (*Larus marinus*) : des observations d'isolés, principalement adultes, sur 6 sites : le 18.12 à Herstal, les 03 et 24.01 à Hermalle-sous-Argenteau, les 08 et 10.01 à Ampsin-Neuville, le 14 et les 19-21.01 à Genval, le 01.12 à Nechin, le 12.02 à Nimy et 1 ex. mazouté au même endroit le 13.02. • **Mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*) : 1 jeune du 11 au 14.01 à Genval et 1 ex. le 12.01 sur la Meuse à Dinant.

**Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : reprises de chants signalées à partir du 08.01 (Harchies), mais seulement fin janvier en Haute Belgique. Aucune concentration importante (maximum 25 à Wiers en janvier), mais des oiseaux aux confins de l'Ardenne en janvier (6 ex. le 08.01 à Harzé). • **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : les dortoirs sont un moyen trop peu utilisé pour évaluer l'importance des populations; exemples urbains : 10.000 ex. au dortoir du parc royal de Laeken le 27.12 (dispersion vers le SE au moins jusqu'à Ixelles et Etterbeek) et 1.350 à celui de Liège Citadelle le 06.01. De manière générale, l'hivernage est assez faible (une seule bande de plus de 200 ex. signalée : 800 les 03 et 28.02 à Jamagne) et dispersé. La douceur permet la présence d'un petit nombre d'oiseaux en Ardenne, jusque dans l'Hertogenwald. • **Tourterelle turque** (*Streptopelia decaocto*) : 1 ex. mélanique le 28.01 à



Jette. Première éclosion le 28.02 à Celles-en-Hainaut. Aucune concentration de plus de 60 ex. n'est renseignée.

**Perruche à collier** (*Psittacula krameri*) :

1 ex. attaqué par un épervier le 13.12 à Meise. A Bruxelles, les oiseaux regagnent le soir le dortoir d'Evere via plusieurs pré-dortoirs relais, comme ceux du bois de la Cambre, du parc Roodebeek à Woluwe-Saint-Lambert et du Poelbos à Jette. Le temps doux incite des perruches à visiter des cavités dès fin décembre.

**Chouette effraie** (*Tyto alba*) : reproduction hivernale : un couple nourrit des jeunes les


1er et 4 décembre à Waremme. • **Hibou grand-duc** (*Bubo bubo*) : une plumée trouvée le 07.12 à Chéoux (Rendeux), prédateur inconnu. Un oiseau à Heure-le-Romain en décembre et des chanteurs e.a. à Modave, Ben Ahin, Comblain-au-Pont. • **Chouette chevêche** (*Athene noctua*) : une observation le 15.02 à 570 m d'altitude à Samrée est assez haute sur les crêtes de l'Ardenne. Reprises de chants signalées à la mi-février. • **Chouette hulotte** (*Strix aluco*) : des chants sporadiques en décembre-janvier, reprise nette également à la mi-février. • **Hibou moyen-duc** (*Asio otus*) : l'occupation de plusieurs dortoirs est nulle à minime. • **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 1 ex. le 22.01 à Castillon. • **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : en dehors de l'aire normale, 1 ex. le 07.12 dans un bosquet d'épicéas à Couvin.

**Martin pêcheur** (*Alcedo atthis*) : relative

rareté de l'espèce dans toutes les régions; données de Roly, Mariembourg, les BEH, Virelles, le canal Charleroi-Seneffe, Taviet, Mormont, Mery, Hermalle-sous-Huy, Hermalle-sous-Argenteau, Battincourt, Latour, Buzenol, Houdrigny, Beth (Opont), Lamorteau, Suxy, Strainchamps.

**Pic cendré** (*Picus canus*) : 1 ex. à Spa-

Malchamps le 10.02. • **Pic noir** (*Dryocopus martius*) : en Hainaut occidental, un hivernant à Harchies et 1 ex. le 28.12 à Bléharies, près de Tournai. • **Pic épeiche** (*Dendrocopos major*) : nidification hivernale probable : un mâle



*Pic épeiche femelle. Limbourg, 01.1998. (F. Renard)*

apporte de la nourriture à la femelle au nid le 14.02 à la Citadelle de Namur. L'oiseau mélanique de Pailhe (voir DE LIEDEKERKE, ce bulletin, p. 69) est à nouveau présent pendant tout l'hiver au poste de nourrissage. • **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) : cet hiver donne lieu à une nouvelle série d'observations sur la marge de l'aire récente, mais aussi à distance de sites connus : 1 ex. le 27.01 à La Hulpe, 1 ex. le 13.01 à Géronsart, 1 ex. les 18 et 2 1.01 à Roly, 2 ex. le 13.02 à Sart-en-Fagne, 2 sites occupés en hiver à Colonster (Angleur). L'observation d'un couple dans une chênaie de Wépion en février attire l'attention sur la possible colonisation de massifs proches de Namur. Au Luxembourg, des oiseaux viennent à nouveau aux mangeoires : à Chiny tout l'hiver, le 14.12 à Chéoux, le 19.12 à Mochamps et du 18.01 au 07.02 à Mormont.

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : un premier migrateur le 10.02 à Roly, puis une dizaine de données de passage durant la seconde moitié de février, dont un groupe de 9 ex. le 23 à Fagnolle. Retour au camp de Marche dès le

15.02 et déjà 6 chanteurs le 21. • **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : conséquence d'un hiver peu enneigé, l'espèce est assez répandue en décembre-janvier avec des groupes dépassant parfois la centaine; par ex. respectivement 120 et 250 ex. au Gerny (Marche) les 07.12 et 24.01, 150 ex. le 28.01 à Braine-le-Château. Passage remarqué à partir de la seconde semaine de février avec un max. de 1.000 ex. le 23 à Dampicourt.

**Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : que faisaient 2 ex. à Tournai le 17.02 ? Même s'il s'agit d'une conséquence des températures anormalement douces régnant à cette époque, cette observation tout à fait exceptionnelle constitue une "première" pour février.

**Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : hivernage sporadique avec parfois des groupes importants en Moyenne Belgique : 90 ex. à Grimbergen le 27.12, 23 ex. à Harchies le 31.01. Le passage printanier est très net à partir de la seconde moitié de février. • **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : bon hivernage, semble-t-il; les effectifs des dortoirs plus ou moins suivis atteignant parfois des chiffres élevés : par exemple 50 ex. à Virelles et Oost-Maartland le 15.12, 25-40 ex. à Roly de décembre à février ainsi que 20-30 ex. à Walhorn, 20 ex. à Aubange, 10-20 ex. à Pécrot, Warchin et Marcourt. L'espèce est encore ponctuellement renseignée en petit nombre (1-10 ex.) sur une vingtaine d'autres sites. Départ des hivernants et passage remarquables à partir de mi-février. • **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : 10 ex. sur 15 km le long de l'Ambève le 05.12. Hivernage clairsemé ailleurs; par ex. une quinzaine de données pour Liège-Luxembourg, essentiellement sur la Meuse et l'Ourthe. • **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : l'hivernage semble devenir de plus en plus régulier et répandu, le groupe le plus important étant 15 ex. le 14.12 à Ere, dans le Tournaisis. Des hivernantes isolées sont renseignées sur une douzaine de sites en janvier (vallée de la Meuse, la Haine, BEH, Latour... ). Premier passage le 06.02 à Kain et retours se généralisant dans la troisième décennie de février, mais un dortoir rassemblant 40 ex. est déjà noté le 14.02 à Anseremme.

**Jaseur boréal** (*Bombycilla garrulus*) : une seule mention pour cet hiver : 3 ex. le 22.02 à Philippeville.

**Cincle plongeur** (*Cinclus cinclus*) : une des espèces nicheuses les plus précoces : cantonnement avec chants noté dès début janvier sur l'Ourthe en province du Luxembourg; un nid terminé et couvaillon en cours le 26.02 à Mormont. • **Troglodyte mignon** (*Troglodytes troglodytes*) : 13 ex. dont 7 chanteurs le 15.02 à Harchies, 20 ex. dont 18 chanteurs sur 3,3 km le 21.02 à Renaix. • **Accenteur mouchet** (*Prunella modularis*) : seulement la moitié de l'effectif habituel aux mangeoires à Achêne-Taviet. Premier chant le 17.01 à Vierves-sur-Viroin; 12 chanteurs sur 3,3 km le 21.02 à Renaix

**Rougegorge** (*Erithacus rubecula*) : reprise des chants assez généralisée dès janvier; 12 chanteurs sur 3,3 km le 21.02 à Renaix. • **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : quelques mâles candidats à l'hivernage à Asse le 03.12, Mariembourg le 18.12, Harnois du 20 au 27.12, Sorinnes le 27.12, Angleur le 08.01, peut-être aussi Melreux 06.02 et Vierves-sur-Viroin le 12.02 (début de chant). Retours hâtifs ensuite, à la fin du mois : le 21 à Habay-la-Neuve, le 23 à Frasnes-lez-Couvain, le 25 à Mariembourg et Bois-et-Borsu. • **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : quinze mentions de retours en février, entre autres 1 mâle le 15 et 4 le 23 aux BEH, 2 mâles cantonnés le 21 à Marche-en-Famenne, 1 couple le 21 à Frasnes-lez-Couvain, 1 mâle cantonné le 23 à La Reid, 3 mâles et 1 femelle (premier chant) le 24 à Mons. • **Merle noir** (*Turdus merula*) : quelques densités en hivernage : 64 ex. sur 8.400 m le 07.12 à Wiers, au moins 43 ex. sur 3 prairies le 22.01 à Mariembourg et 37 ex. sur 3,3 km le 21.02 à Renaix. Premier chant le 11.02 à Wiers. Un jeune merle recueilli à Boitsfort est né dans les premiers jours de février. • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : en décembre, les plus grosses bandes sont observées dans le Hainaut et en province de Namur : maxima de 400 ex. à Achêne-Taviet et 500 ex. à Celles pour 180 à Sart-lez-Spa. Des arrivées sont notées vers le 10 janvier et début février :

174 ex. à Asse le 09.01, 1.200 à Aublain le 11.01, plusieurs centaines à Mariembourg le 01.02 et 200 à Hoyemont (Lg) le 04.02. Un passage plus marqué débute dans la deuxième décade de février : 300 ex. le 12 à My, petits groupes de migrants les 16 et 18 à Wiers, le 19 à Angre et passage soutenu le 26 à Pailhe. En province du Luxembourg, hivernage complet de quelques groupes, de 100 ex. à Bomal à 250 ex. à Boeur.

• **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : moins de dix données hivernales, toutes en Brabant et en Hainaut occidental sauf 1 ex. le 28.01 à Hour, en Famenne. Les premiers chants sont notés dans ces mêmes régions dès la mi-janvier, le 11 à Jette et le 17 à Wiers, mais seulement à la mi-février ailleurs : le 17 à Houyet et le 24 Waremme, par ex. Retours et passages déjà importants à ce moment en Hainaut et Brabant : 24 chanteurs sur 11 km le 22 à Wiers, un groupe de ± 40 ex. en forêt de Soignes le 25. • **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : rareté soulignée dans toutes les régions en décembre-janvier; seules exceptions notables : 60 ex. le 25.12 à Roly et de gros stationnements les 10 et 17.01 à Pailhe. Un peu plus fréquente en février avec du passage en fin de mois mais la plupart des groupes se limitent à quelques dizaines d'ex., le maximum étant de 120 le 28 à Roly. Le seul groupe signalé en hivernage complet compte 20 ex., à Hotton.

• **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : peu d'informations sur l'hivernage. Premiers chants dès le 20.12 à Chéoux (Rendeux) et le 25.12 à Quévy, dans presque toutes les régions à partir du 10.01; "abondante" à Aywaille en janvier.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : à Harchies, 1 à 4 ex. en décembre, 10 chanteurs en janvier et 8 en février. • **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : 1 mâle cherchant des insectes dans des baldingères le 11.01 à Bomal, 1 mâle le 23.01 à Jette, 1 autre à une mangeoire le 12.02 à Obourg. • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : l'hivernage fut le plus abondant des cinq dernières années. Au nord de Bruxelles plus particulièrement, où 11 ex. sont observés en décembre pour Jette, Anderlecht, Vilvorde et Asse. Observé aussi en décembre à Hermalle-sous-Argenteau, Ampsin, Viesville et Harchies et 2 données en Ardenne, le 04.12 à



Rougegorge et Mésange bleue. Limbourg, 01.1998. (F. Renard)

Saint-Hubert et le 06.12 à Mortehean. Encore 12 données de janvier à mi-février, dont un chanteur à La Hulpe le 17.01. Ensuite, des retours hâtifs (ou encore des hivernants?) sont notés dans toutes les régions : isolés le 16.02 à Huy, le 20 à Mariembourg, le 21 aux BEH, le 23 à Angreau, 3 ex. le 22 à Durnal et le 23 à Hoyemont, 3 + 1 le 23 à Mariembourg. Premiers chanteurs le 16 à Huy, le 20 à Mortehean et le 21 à Rosières; déjà 6 chanteurs le 24 à Harchies et 4 sur un ha le 26 à Hermalle-sous-Huy. • **Roitelet huppé** (*Regulus regulus*) : afflux constaté en pessière le 30.01 à Wiesmes. Premiers chants le 09.01 à Ivoz-Ramet et à partir du 10.02 en province du Luxembourg. • **Roitelet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : observations éparées tout l'hiver, plus particulièrement en Brabant : La Hulpe, Uccle, Woluwe-Saint-Lambert, Jette en décembre-janvier, Oneux le 31.12, Ombret le

12.01, Ciergnon le 29.01. Premier chanteur le 21.02 à Uccle, ensuite couple cantonné.

**Mésange à moustaches** (*Panurus biarmicus*) : à Harchies, maximum 7 ex. le 20.12, 2 le 10.02 et 12 le 14.02, entendue aussi les 10-11.01 et 15.02. • **Mésange à longue queue** (*Aegithalus caudatus*) : groupes maxima : 40 ex. à Ivoz-Ramet le 17.01 et 30 ex. à Harchies le 08.02 et à Awagne le 20.02. • **Mésange nonnette** (*Parus palustris*) : 27 ex. sur 1 km le 21.12 à Yvoir. • **Mésange huppée** (*Parus cristatus*) : observation inhabituelle d'un ex. le 10.02 à Harchies. • **Grimpereau des bois** (*Certhia familiaris*) : 1 chanteur tout à fait hors zone, le 06.01 à Wiesmes; sinon, 1 ex. le 18.01 à Nisramont et le 28.02 à Luchy. • **Grimpereau des jardins** (*Certhia brachyactyla*) : 6 chanteurs à Harchies le 15.02 et 4 sur 3,3 km le 21.02 à Renaix

**Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : les données hivernales proviennent des provinces du Luxembourg (22) et de Namur-est (7), de l'ESM (7) et de l'est de la province de Liège (14). L'hivernage complet est noté au camp militaire de Marche-en-Famenne (7 ex.), à Feschaux (2 ex.) et à Monceau-en-Ardenne (2 ex.). Plus inhabituel, 1 ex. de mi-janvier à mi-février à Evegnée, dans le pays de Herve.

**Pie bavarde** (*Pica pica*) : quelques résultats de comptages en dortoirs : maximum de 114 ex. le 09.01 à Nimy, 130 le 12.01 à Ans, 100 le 14.01 à Laeken et au moins 200 ex. fin janvier à Mariembourg, où un individu rechargeait déjà un nid le 06. L'albinos renseigné en novembre à Battincourt sera présent tout l'hiver. • **Casse-noix moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : en dehors de son aire de répartition, 1 ex. le 11.12 dans des noisetiers à Marenne et 1 ex. le 15.02 à Villers-la-Bonne-Eau. • **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : importants groupes d'hivernants à Mont-Saint-Guibert (200 ex. le 06.12), au sud de Mons (400 ex.), à Hensies; l'hivernage est toutefois considéré comme faible sur ce site malgré des maxima de 400 ex. en décembre, de 700 ex. 06.01 et de 500 ex. le 08.02. Quelques individus présentant des caractères

de la sous-espèce *soemmeringii* sont signalés : 1 ex. en décembre et en février à Hensies, 1 le 17.01 à Tournay et 4 le 09.02 à Chéoux (Rendeux). La migration printanière est amorcée dès le 15.02 à Harchies. • **Corbeau freux** (*Corvus frugilegus*) : le dortoir de Ciney compte 500 ex. en décembre et celui de Grand-Manil (mixte Choucas - Corneille - Freux) 3.500 ex. pour ces trois espèces en janvier. Les premiers signes de réoccupation des corbeautières sont perceptibles dès la mi-février à Saint-Sauveur et en province de Namur; 250 ex. fin février à la colonie de Philippeville. • **Corneille mantelée** (*Corvus corone cornix*) : 1 ex. dans un vol migratoire de Freux le 20.02 à Meux. Deux hybrides Corneille noire X Corneille mantelée le 28.01 à Saint-Ghislain (voir X. VANDEVYVRE, ce bulletin, p. 71). • **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : outre quelques mentions dans la vallée de la Semois, dont 8 ex. ensemble le 13.12 à Mortehan, notons 3 observations en bordure du plateau de la Baraque de Fraiture : 1 ex. le 13.12 à Samrée, le 17.01 à Maboge et le 25.02 à Achouffe.

**Étourneau** : peu d'informations sur les dortoirs; seul celui de Ciney dépasse les 10.000 ex. en décembre. Passage soutenu le 26.02 à Pailhe.

**Moineau friquet** (*Passer montanus*) : rare en Brabant wallon et en Ourthe-Ambloève. Les groupes les plus importants sont notés le 17.12 à Gozin (250 ex.), le 29.12 à Nouvelles (80-100 ex.) et le 15.02 (110 ex.) à Villers-le-Gambon. • **Moineau domestique** (*Passer domesticus*) : construction d'un nid le 06.02 à Mariembourg.

**Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) : hivernage plutôt faible, les groupes les plus importants ne dépassant pas 50 ex. à Harzé le 05.12 et à Limbourg le 30.01. Des migrateurs sont observés le 11.02 à Tilff (120 ex. en halte) et le 24 à Vielsalm (200 ex.). Les premiers chants sont entendus le 11.02 à Angre et le 12 à Waha. • **Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : apparemment rare partout; quelques bandes sont quand même notées en décembre-janvier : 300 ex. le 12.12 à Chéoux (Rendeux),

50 le 29.12 à Nouvelles, jusqu'à 20 ex. en janvier à Genappe et respectivement 60 et plus de 100 à Maubray et à la Croix-Scaille le 25. • **Serin cini** (*Serinus serinus*) : 3 ex. le 11.12 à Woluwe-Saint-Lambert. Les premiers retours sont enregistrés le 16.02 à Mons, le 20 à Vierves-sur-Viroin, le 20 à Tournai (chanteur) et le 23 à Mariembourg. • **Verdier** (*Carduelis chloris*) : quelques groupes sont signalés à Bruxelles et en Brabant wallon en décembre : 60 ex. le 06 à Sart-Dames-Avelinnes, 40 le 13 à Ittre... Le 28, un dortoir de 170 ex. est noté dans une haie à Grimbergen tandis que celui de l'avenue Louise à Bruxelles est occupé en décembre et janvier, comme l'hiver précédent. Ailleurs, l'espèce semble peu abondante. En Luxembourg par exemple, un maximum de seulement 20 ex. est présent au nourrissage en janvier à Chiny. • **Chardonneret** (*Carduelis carduelis*) : fréquence assez inhabituelle, surtout en décembre-janvier. Il est par ex. très commun en Brabant mais il y a rarement plus de 10 ex. par groupe, le maximum étant de 29 ex. le 27.12 à Vilvorde. Ailleurs, notons les maxima de 35 ex. le 02.12 à Harchies, 33 ex. le 06.12 à Wibrin, 30 ex. le 11.12 à Bévercé, 45 ex. le 13.12 à Grand-Leez, 35 ex. le 28.12 à Tournai, 45 ex. le 30.12 à Marvie et 60 ex. le 18.01 à Oost-Maarland. • **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : régulier en petit nombre durant tout l'hiver en Moyenne-Belgique, où de nombreux groupes de quelques dizaines d'ex. sont observés, dont deux atteignant la centaine le 03.12 à Roly et tout le mois de décembre à Ombret. En Haute-Belgique, le Tarin semble par contre particulièrement peu abondant, tant en Ardenne liégeoise qu'en province du Luxembourg (max. 40 ex. le 22.12 à Chiny et 50 le 30.12 à Melreux). La migration printanière est constatée dès la première quinzaine de janvier, avec reprise début février. • **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : 1 ex. le 07.12 à Havay, 1 ex. le 15.12, 16 le 27.12 et 4 le 15.01 à Vilvorde, 50 ex. le 30.01 à Zemst, 20 ex. le 27.01 et 25 le 08.02 à Hermalle-sous-Argenteau. Un groupe de 23 ex. le 24.02 à Oneux annonce peut-être le début des retours. • **Sizerin flammé** (*Carduelis flammæa*) : présent en petit nombre dans toutes les régions sauf en Hainaut occidental (seulement 1 ex. le 06.01 à

Harchies); le plus souvent des isolés ou moins de 10 ex. à la fois. Maxima : 22 ex. le 06.12 à Bastogne, 30 ex. le 17.12 à Braine-l'Alleud, 25 le 31.12 à Moiry et 60 ex. le 22.01 au Sart-Tilman. • **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : globalement lui aussi peu abondant, bien que présent dans toutes les régions, sauf le Hainaut occidental; la plupart des groupes comptent moins de 5 ex. Maxima : 20 ex. le 14.12 à Waterloo, 20 le 24.12 à Esneux, 20 le 26.02 à Malonne et 20 le 01.01 à Genappe. A Uccle, il est régulier en décembre (max. 30 ex. le 27.12), mais moins qu'en novembre, et absent en janvier. • **Bouvreuil pivoine** (*Pyrrhula pyrrhula*) : abondance inhabituelle signalée dans plusieurs régions de Haute Belgique, surtout en décembre : partout en Luxembourg, dont 30 ex. régulièrement dans le camp militaire de Marche, très abondant à Achêne-Taviet (nombreux groupes de 4-8 ex.) et dans la région d'Awagne-Yvoir, dans l'est de la province de Liège et autour d'Aywaille. La Moyenne Belgique semble également concernée, quoique de façon moins évidente : 4 contacts sur 500 m le 10.01 dans le bois de l'Ermitage à Villers-la-ville, présent tout l'hiver à Harchies (max. 8 ex.), noté aussi aux Marionville, à Tournai et à Bruyelle. • **Grosbec cassenoiaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : assez répandu mais sans grande abondance, notamment en Brabant et surtout dans l'est de la province de Liège et la région d'Ombret, où il est franchement rare. Maxima : 30 ex. le 01.01 à Xhoris, 20 le 13.01 à Awan (Aywaille), 55 le 17.01 à Frasnieres, 30 le 17.01 à Maboge, 20 le 07.02 à Opont et une trentaine en février à Achêne-Taviet.

**Bruant des neiges** (*Plectrophenax nivalis*)\* : 1 ex. de premier hiver le 04.01 à Oost-Maarland, 1 mâle (peu farouche) le 24.02 à Wibrin. • **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : signalé seulement en petit nombre en Moyenne Belgique : maxima de 25 ex. le 02.01 à Incourt, 30 ex. le 29.12 et 45-50 le 28.01 à Nouvelles. En Haute Belgique, le Condroz et la Fagne-Famenne concentrent les observations; notamment : 150 à 200 ex. tout l'hiver à Mariembourg, 150 le 06.12 à Jemelle (Gerny), 150 le 04.01 à Géromont, 100 le 02.02 à Vierves-sur-Viroin.

Une certaine augmentation se fait sentir en février, tandis que se font entendre les premiers chants, le 09 à Mazée, un peu plus tard ailleurs; ils sont déjà 12 sur 1 km le 24 à Oneux. • **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*): alors qu'il est resté anormalement rare à Genappe tout l'hiver (première mention le 22.02), il est renseigné régulièrement partout ailleurs et particulièrement fréquent, voire abondant, en Ardenne, sur les plateaux fagnards: abondant en Hautes Fagnes en décembre dans les coupes à

blanc, 50 ex. le 01.01 à Robertville, au moins 10 en dortoir le 01.01 à Eisenborn, régulièrement 15 à 35 à Mochamps. Retours et mouvements perceptibles à partir du 20.02, notamment 150 ex. en halte le 23 à La Reid. • **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*): hormis 2 ex. en janvier à Roly, hors zone habituelle, les seules observations significatives proviennent de la plaine de Bonneffe-Branchon: 80-100 ex. en janvier et déjà 20-30 chanteurs en février. Retour local dès le 16.02 à Meux, 25 ex. le 23 et 37 le 25 à Angre.

## Ont contribué à cette chronique :

Ameels M., Barbusiaux M., Batteux A., Baye J.M., Bihain B., Blyth M., Bocca S., Born C.-H., Brouyère G., Buckinx G., Bulteau V., Burnel A., Charlier J.M., Chiwy B., Clesse, B., Collard P., Collas Ph., Constant A., Coppée J.-Lo., Crickillon D., Dautne J.M., Debaere T., Deflorenne Ph., Degossely Ph., Dehousse L., Delbecque F., Delcourt J., Delogne P., Deloyer P., Depasse A. P., Delvaux J., De Ridder G., Dermien F. (GTOF), Deroanne M., Descamps D., Detaille R., Dewitte Th., Dielen V., Doblestein F., Doffagne S., Dortu Ch., Dubois A., Dufour D., Dufourny H., Dujardin R., Dumoulin R., Durant M., van Esbroeck J., Etienne F., Eysermans F., Fanon Y., Farinelle C., Félix J.J., Flon Y., Fouarge J., Gallez J., Gauquie B., Ghem M., Ghysenberghs B., Gilles S., Goebels W., Grégoire D., Habay F., Hanus B., le Hardy F., Héla F., Hubert M., Hupet F., Iweins B., Jacob J.-P., Jacquemin M., Janssens M., Jardon B., Jenard Ph., Joris A., Jortay A., Kempeneers Y., Kinet Th., Kuciapa W., Lafontaine R.M., Lambert M., Laudelout A., Ledoux L., Lemaître F., Lepinois J.-C., de Lespinay A., Libert C., de Liedekerke R., Loison M., Loly P., Lucas Ph., Mardulyn H., Malengreau A., Martin N., Mary P., Matagne J., Matgen O., Mengal J., Minet G., Moës Ph., Molitor B., Monmart A., Mossaix P., Muysshont D., Nicolas M., Paquay M. (GTOF), Paquay N., Paquet J.-Y., Peero M., Peten S., Philippart B., Pierre P., Piette J., Piraux B., Rabosée D., Ravet P., Renard F., Renoy A., Roland St., Rousseau C., Ruyschaert F., Sacré P., Schmitz L., Schoebrechts O., Sedek J., Segers M., Sente F., Sorbi S., Stassin P., Swinnen V., Teerlinck H., Testaert D., Thonnard P., Thonon Ph., Tricot J., Vandevyvre X., Vangeluwe D., Van Halst V., Vanhove F., Van Volsem J., Verhegghen E., Verleure Ph., Verroken D. et L., Vieuxtemps D., Voituren D., Walravens E., Walravens M., Watelet M., de Wavrin H., Willame A., Xhardez Ch., les observateurs de la Trientale et du Viroinvol (C.N.B.) et de Latour, le groupe de Genappe... et quelques autres, sans doute, que nous avons oubliés. Qu'ils soient bien persuadés que cela est tout à fait involontaire.

Nous les remercions tous pour leur collaboration.

Les données ont été rassemblées par les délégués régionaux de la COA : J.-Lo. Coppée, P. Loly, D. Muysshont, Ph. Degossely, D. Vieuxtemps, J.Y. Paquet et H. de Wavrin.

Rédaction : Emile Clotuche, François Hupet, Jean-Paul Jacob, Thierry Kinet, René de Liedekerke, René Dumoulin et Dominique Testaert.