

Un Pic épeiche (*Dendrocopos major*) mélanique à Pailhe (Condroz liégeois)

par René DE LIEDEKERKE¹

Début janvier 1997, une bonne dizaine de centimètres de neige recouvre le sol et il gèle sans interruption depuis plusieurs jours. Conséquence immédiate, on se bouscule au nourrissage, depuis la Buse variable (*Buteo buteo*) jusqu'aux inévitables mésanges et autres pinsons. Mon attention est attirée par un mâle de Pic épeiche (*Dendrocopos major*) qui vient régulièrement sur une boule pour mésanges et dont le plumage paraît particulièrement sombre.

Examiné aux jumelles, l'oiseau se révèle être un exemplaire mélanique : la poitrine et le cou sont entièrement noirs, jusqu'aux moustaches noires propres à l'espèce tandis que les deux taches blanches de part et d'autre de la nuque sont absentes.

Seul le haut de la gorge est blanchâtre et forme une petite bavette sous le bec. Les côtés de la poitrine sont blancs et les liserés blancs des rémiges sont très peu marqués et réduits à un fin pointillé peu visible. Curieusement, le dessin des ailes est asymétrique : posé, l'oiseau présente une aile droite entièrement noire tandis que la gauche montre la tache blanche sur les couvertures, mais nettement plus petite que la normale. Le reste du plumage est classique, ventre rouge et manteau noir notamment.

L'oiseau fut noté régulièrement par la suite et était toujours présent au début d'août 1997. Il a peut-être niché à proximité car des jeunes volants furent notés sur le même site dès la mi-juin. L'hiver suivant, il fréquenta à nouveau le même site de nourrissage avec assiduité jusqu'au printemps 1998, ses visites alternant avec celles d'une femelle normale. Après de nouvelles apparitions à la mangeoire en février 1999, il est observé à la mi-mars, posé sur le même arbre qu'une femelle, ce qui confirme l'hypothèse d'une nidification régulière.



Les récents articles de GAILLY (1996 et 1997) sur les aberrations de plumage mentionnent principalement l'albinisme et SAGE (1962) précise d'ailleurs que le mélanisme est beaucoup moins fréquent, même en tenant compte du fait qu'il est a priori beaucoup moins visible que l'albinisme. Ayant recensé toutes les données d'espèces affectées de couleurs aberrantes en Grande-Bretagne, il relève 162 espèces atteintes d'albinisme pour 43 mélaniques et le Pic épeiche est le seul picidé concerné tant par l'albinisme que par le mélanisme, deux autres espèces (Pics vert et épeichette - *Picus viridis* et *Dendrocopos minor*) ayant fourni uniquement des données d'albinisme.

(1) Rue des Haies, 20 B - 4560 Pailhe.

SUMMARY - A melanic Great Spotted Woodpecker at Pailhe (Condroz).

Since January 1997, a melanic male (see photos) was regularly observed near a birdtable. It was still present during springs 1998 and 1999 and probably nested nearby.

Bibliographie

GAILLY, P. (1996, 1997) : Des oiseaux de toutes les couleurs... *Aves, Feuille de contact 1996* : 207 - 210 & 247 - 250; *Aves Contact 1/1997* : 9 - 11.

SAGE, B.L. (1962) : Albinism and melanism in Birds. *British Birds*, 55 : 201 - 225.

Duo insolite Pic noir (*Dryocopus martius*) - Pic épeiche (*Dendrocopos major*)

par Jean-Paul JACOB¹

Le 12 avril 1998, je termine à Châtillon (Lorraine belge) un point d'écoute en hêtraie au cours d'une chaîne de la surveillance des nicheurs mise en place en Wallonie. A ce moment, le mâle de Pic noir (*Dryocopus martius*) repéré depuis plusieurs minutes vient se percher à proximité. Après une vingtaine de secondes, il émet un premier cri d'appel (le "kliuu" bien connu). Immédiatement, un Pic épeiche (*Dendrocopos major*) mâle, perché deux hêtres plus loin, tambourine. Commence alors un duo qui va durer environ quatre minutes, jusqu'à l'envol du Pic noir. Chaque cri du Pic noir provoque le tambourinement du Pic épeiche dans la fraction de seconde qui suit. Au total, ce duo insolite se répète 23 fois, chacun restant perché au même endroit.

Ce genre d'interaction doit être rare entre ces deux espèces. Dans la région, des réactions vocales s'observent plutôt entre le Pic épeiche et le Pic mar (*Dendrocopos medius*). Dans le cas présent, la réaction territoriale du Pic épeiche me paraît surtout avoir eu une valeur d'intimidation vis-à-vis d'un grand pic s'approchant de son nid, situé dans l'arbre où il se trouvait. A ce moment de l'année, la couvaison était en cours ou sur le point de commencer et cette forme de réponse agressive n'est pas surprenante, d'autant plus que le Pic noir est connu pour dominer à l'occasion le Pic épeiche (par exemple conflit pour des cavités-dortoirs - cfr divers auteurs in CRAMP *et al.*, 1985). Il doit cependant être bien peu fréquent que l'antagonisme prenne l'allure d'un duo (mentionné seulement entre Pics épeiche et épeichette, *D. minor*, dans CRAMP *et al.*, 1985).

SUMMARY - Unusual duo Black Woodpecker (*Dryocopus martius*) - Great Spotted Woodpecker (*Dendrocopos major*).

On 12th April 1998, a male Black Woodpecker settles near a Great Spotted Woodpecker's nest and arouses an antagonistic behaviour of the latter. Each contact call of the Black Woodpecker is immediately followed by the drumming of the Great Spotted Woodpecker. The duo lasts about 4 minutes and is repeated 23 times.

CP

(1) Rue Janquart 7, B - 5081 Meux.