

## Centrale ornithologique Aves<sup>1</sup>

# Observations de juin à août 1998

### CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques du mois de juin ont été déterminées principalement par des dépressions. Les températures ont été proches de la normale. La dépression centrée à l'ouest de l'Irlande du 18 au 21 a envoyé des courants maritimes d'origine tropicale produisant les températures maximales absolues du mois (entre 28 et 34 °C). Les températures minimales absolues ont varié entre 0 °C et 9 °C à la mi-juin. Les moyennes régionales des précipitations furent toutes supérieures aux normales. Il y a eu 16 jours accompagnés de phénomènes orageux et 6 jours accompagnés de grêle.

Tout le mois de juillet a été marqué par des courants maritimes faiblement perturbés à l'origine d'un léger déficit des températures. Le 20 juillet est le seul jour pendant lequel les températures ont dépassé les 25 °C. Il y a eu 7 jours accompagnés de phénomènes orageux. Le mauvais dégagement du ciel du début du mois fait que ce mois de juillet 1998 est le plus sombre depuis 10 ans.

En août, notre temps a été déterminé par des courants maritimes secs du 01 au 10 puis du 14 au 24. Entre ces deux périodes, un anticyclone situé sur l'Europe de l'Est fut à l'origine des courants continentaux très chauds. Notre pays a été envahi à la fin du mois par des courants maritimes d'origine polaire ramenant les températures à des valeurs proches de la normale. Les moyennes régionales des précipitations sont presque toutes inférieures à la normale. Il y a eu 5 jours accompagnés d'orages et de la grêle fut observée le premier du mois. Grâce à un bon dégagement du ciel au cours des deux premières décades, on a un ensoleillement supérieur à la normale.

### FAITS SAILLANTS

Le bilan de la période de nidification 1998 n'est pas très réjouissant. Alors que des nicheurs occasionnels réussissent leur nichée (Busard des roseaux et Grèbe à cou noir), la situation reste toujours préoccupante pour les espèces dont la population nicheuse est au bord de l'extinction. Le Grand Butor semble disparaître d'Harchies et ce n'est guère mieux pour les canards de surface (hormis le Colvert). Remarquons que la reproduction de la Sarcelle d'été a été prouvée cette année à Genappe soit 6 ans après le dernier cas connu en Wallonie. Cette vague de régression touche également, entre autres, la Rousserolle turdoïde et le Martin-pêcheur. La situation est encore plus alarmante pour la Grive litorne, qui voit une diminution nette de ses effectifs nicheurs, voire même

---

(1) Centrale Ornithologique AVES  
c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence 36, B - 4000 Liège.

la disparition de certaines colonies. De même pour la Bergeronnette printanière, dont la population nicheuse a presque disparu en province de Luxembourg. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles. Le Blongios nain niche à nouveau à Harchies, où l'on soupçonne même la présence d'un second couple, et c'est une année exceptionnelle pour le Rôle des genêts avec 58-60 cantons recensés cette année. L'état de santé est bon pour le Grand Cormoran, la Cigogne noire, le Grèbe castagneux, le Cygne tuberculé, tout comme pour les oiseaux des plaines tels que la Caille des blés. En province de Luxembourg, on signale également la bonne santé de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet pâte. Le Faucon pèlerin maintient sa population nicheuse et semble en bonne voie pour occuper de nouveaux sites. Hors zones connues, la nidification du Torcol est possible et celle du Pic cendré probable sur l'entité de Beauraing, voisine de la botte de Givet où ces deux espèces nichent (comm. pers., B. Moinet).

La migration est assez marquée pour certaines espèces comme la Cigogne blanche, le Grèbe à cou noir et même remarquable pour d'autres. Ainsi le suivi journalier de la migration à Honnay par le GTOF met en évidence le passage du Pluvier guignard en Haute-Belgique. Le Héron bihoreau fournit une donnée et l'Aigrette garzette deux.

Côté estivants, le Grèbe jougris est signalé à deux reprises à Obourg et 4 à 6 Nettes rousses sont observées régulièrement en Hainaut occidental. A Fontenoy, la présence continue de deux Echasses permet d'espérer une nidification prochaine.

Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre Sambre et Meuse, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf précision utile.

## DETAIL DES OBSERVATIONS

**Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : plusieurs sites accueillent de 1 à 2 couples nicheurs : Etalle, Longchamps, Paliseul, Latour, Châtillon, Naomé (1 couple a élevé 9 jeunes), Donstiennes, Roly, Virelles, Oud-Heverlee, Comblain-la-Tour et Chertal ; on note également 4 couples à Taviet-Achêne et 3 à Genappe; bonne reproduction pour le Hainaut occidental (35 couples contre 34 en 1997) avec minimum 18 couples à Harchies, 6-7 à Quévy et minimum 5 à Ploegsteert. Pour les concentrations post-nuptiales, maximum 32 ex. le 15.08 à Obourg et 26 ex. le 27.08 à Escanaffles. • **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : nidification à Freux (3 jeunes), Luchy (1 jeune), Roly (minimum 9 couples), Virelles (13 nichées), Petigny (1 nichée), Visé (5 couples), Chertal (2 couples), Maizeret (1 couple), Harchies (minimum 18 nichées avec une moyenne de 2,33 pulli/nichée), Ploegsteert (2 à 4 couples) et Warneton (5 couples). Signalons encore 45 ex. dont 9 à 10

couples nicheurs le 08.07 sur la Meuse de Dinant à Heer-Agimont. En ce qui concerne les estivants, notamment 30 à 40 ad. le 07.06 à Oost-Maarland, 32 ex. le 17.07 à Obourg et 11 ex. le 11.07 à Ploegsteert. • **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : signalé à deux reprises à Obourg : 1 ex. le 01.07 et 1 imm. le 31.08. • **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : bonne nouvelle cette année : 1 couple niche en Hainaut à Fontenoy (2 pulli); en juin, quelques oiseaux signalés à Eghezée-Longchamps et à Harchies, le dernier du mois étant observé le 21 à Hologne-sur-Geer. Après une absence durant tout juillet, les premiers oiseaux réapparaissent fin du mois avec 1 ex. le 30 à Harchies, 1 juv. le 30 à Roly et 5 ex. le 31 à Obourg. Beau passage en août en Hainaut occidental, où on note des exemplaires tout au long du mois avec maximum 19 ex. le 12 à Obourg et 5 ex. le 28 à Harchies; présence également d'un ou deux exemplaires du 7 au 30 à Eghezée-Longchamps et 1 ex. le 15 à Virelles.

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : en Hainaut, alors que la population d'Obourg se stabilise avec 109 couples nicheurs (104 en 97), on note une sensible augmentation à Harchies avec 80 nichées (68 en 97), le taux de reproduction au sein de ces deux colonies avoisine les 2,5 jeunes/nid. Ailleurs, hormis 14 ex. le 27.06 à Gives et une cinquantaine d'exemplaires en Basse-Meuse, on ne signale que des groupes de moins de 5-6 individus.

**Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : 1 ex. le 01.06 à Harchies. • **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*) : à Harchies, un couple niche à deux reprises et l'on soupçonne la présence d'un second couple. Encore 1 ex. le 18.08. • **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*)\* : 1 migrateur en vol le 18.08 à Harchies et 1 migrateur en halte le 19.08 à Obourg. • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : très peu de données concernant la nidification : 79 nichées à Harchies (2,2 jeunes/nid) et 44 à Obourg (2,15 jeunes/nid), 1 nid occupé le 12.07 à Oost-Maarland et nidification probable au camp militaire d'Elsborn. On note quelques rassemblements postnuptiaux en divers endroits : 10 ex. à Genappe le 02.07, 12 ex. le 11.07 au Grand Vivier de Longchamps, 26 ex. le 25.07 à Thommen, 11 ex. le 08.08 à Recogne, 21 ex. le 18.08 à Luchy et maximum 20 ex. à Achêne en août. Signalons l'observation d'1 ex. capturant une taupe le 13.07 à Taviet. • **Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : une quarantaine d'observations totalisent environ 80 ex., la majorité en août, avec les groupes les plus importants notés à Lamouline (8 ex. le 17.06), à Luchy (14 ex. le 08.08) et à Beauraing (7 ex. le 15.08). Deux nidifications sont notées dont l'une avec 4 jeunes. • **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : en juin, 1 ex. le 03 à Liège, 1 ex. le 18 à Melreux et 2 ex. posés le 25 à Andenne. Au mois d'août, hormis en province du Luxembourg où la migration passe pratiquement inaperçue (dont un exemplaire en compagnie d'une Cigogne noire le 07.08 à Luchy), de nombreux groupes importants sont signalés à partir du 11.08 : 47 ex. le 11 au Bois de la Cambre à Bruxelles (dont 44 ex. bagués proviennent des Pays-Bas et 2 ex. seront électrocutés à Trélon, en France, où le groupe s'est posé pour

la nuit), 14 ex. le 15 à Havelange (dont 1 ex. sera électrocuté), 19 ex. le 15 à Hoves (Enghien), 20 ex. le 17 à Villers-la-Tour, 34 ex. en 1/2h le 27 à Pessoux, 15 ex. le 27 à Wodecq, 7 ex. le 28 et 20 ex. le 31 à Flobecq, 35 ex. le 28 à Godinne.

**Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) : des couples nicheurs sont notés à Virelles (1 couple avec 8 pulli), à Roly (2 couples), à Lanaye (1 couple avec 4 pulli), à Oost-Maarland (2 couples), à Chertal (1 couple avec 4 pulli), à Méry (1 couple avec 3 pulli) et un total de 10 couples nicheurs pour le Hainaut occidental (6,1 jeunes/nichée); quelques rassemblements d'individus non-nicheurs : 40 ex. le 18.06 à Harchies et 25 ex. à Oost-Maarland en juin. • **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : l'espèce niche à Warneton (5 couples avec une moyenne de 10,4 pulli), à Warcoing (1 couple), à Hollogne-sur-Geer (2 familles) et à Zemst (maximum 52 pulli en juin), où l'on note encore 2 juv. le 14.08. Quelques exemplaires sont observés sur plusieurs sites en juin et juillet, notamment des maxima de 5 ex. le 12.06 à Harchies, 6 ex. le 28.06 à Hollogne-sur-Geer, 6 ex. le 21.07 à Fontenoy, 28 ex. en vol le 07.07 à Angre et 3 ex. le 06.07 à Virelles. Présent en août à Waremmes (10 ex. dont 9 juv. le 13), Lens-sur-Geer, Hollogne-sur-Geer et Stockay (16 ex. le 30).

**Canard chipeau** (*Anas strepera*) : une famille et 1 mâle à Zemst le 05.06, maximum 16 ex. le 28.06 à Harchies, 1 ex. le 27.06 et 2 ex. le 09.07 à Roly, 1 mâle le 06.07 à Virelles, 1 ex. le 19.08 à Hollogne-sur-Geer; 1 seul couple nicheur accompagné de 9 pulli le 28.06 à Harchies. • **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : comme en 1996-97, aucune nidification n'est signalée. En juin, de 1 à 5 ex. signalés sur plusieurs sites : Genappe, Waremmes, Hollogne et Lens-sur-Geer, Namur (île Vas-t'y-Frotte); ensuite, très peu d'observations en juillet : 3 ex. le 08 à Eghezée-Longchamps, 4 ex. le 30 à Hollogne-sur-Geer et faible passage à Genappe (maximum 6 ex. le 12). Par contre, on note une augmentation significative des mentions avec notamment : 10 ex. le 08 à Latour,

60 ex. le 19 à Hologne-sur-Geer, maximum 45 ex. à Eghezée-Longchamps, 10 ex. le 26 à Fazône (Recogne), 30 ex. le 27 à Waremme, 7 ex. le 31 à Viesville; à Genappe, pic de passage bien marqué du 12 au 14 (de 14 à 25 ex.) puis à partir du 25 (max 39 ex. le 30); dans le Hainaut occidental, l'espèce est régulière sur plusieurs sites en très petit nombre en juillet et août avec maximum 6 ex. le 08.07 aux Marionville.

• **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*): aucune information sur la nidification de cette espèce hormis à Genappe où l'on a dénombré cette année 49 nichées produisant 311 canetons (dont seulement une cinquantaine prendront leur envol, la majorité des couvées étant décimées par le froid et les renards); ailleurs, on note quelques grandes concentrations dès le début de juillet: 246 ex. le 03 à Harchies, 215 ex. le 18 à Escanaffles, 147 ex. le 26 à Fontenoy, 300 ex. le 04.08 à Gaurain-Ramecroix, 320 ex. le 15.08 à Waremme, 95 ex. le 17.08 à Latour, maximum 330 ex. le 28.08 à Genappe. • **Canard pilet** (*Anas acuta*): 1 ex. le 02.08 à Rhode-Sainte-Agathe. • **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*): nidification prouvée à Genappe avec 6 pulli le 01.06 (il n'en reste plus que 3 le 26.06); en juin, observations de quelques individus dans différents sites: 4 ex. le 03.06 à Eghezée-Longchamps, maximum 6 ex. le 21.06 à Harchies, 4 ex. le 28.06 à Hermalle-sous-Argenteau. Ensuite, augmentation du nombre d'observations à partir de fin juillet avec maximum 4 ex. le 28.07 à Harchies, 6 ex. le 28.07 à Hermalle-sous-Argenteau, 2 ex. le 08.08 à Latour, et maximum 4 ex. le 10.08 à Escanaffles, 6 ex. les 10 et 14.08 à Lens-sur-Geer et 1 ex. le 15.08 à Virelles. • **Canard souchet** (*Anas clypeata*): nidification signalée à Boneffe. Présence régulière de quelques exemplaires à Hologne-sur-Geer pendant toute la période; quelques observations en juin (6 mâles le 03 à Longchamps et maximum 6 ex. le 19 à Harchies) et en juillet (8 ex. du 24 au 27 à Latour et 8 ex. le 30 à Roly), puis légère augmentation des mentions dans le courant du mois d'août avec maximum 9 ex. le 13.08 à Genappe, maximum 130 ex. le 28 à Harchies et 8 ex. le 31.08 à Waremme.

**Nette rousse** (*Netta rufina*): durant tout l'été, 4 à 6 ex. sont observés irrégulièrement sur 3 sites: Harchies, Obourg et Escanaffles.

• **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*): le nombre de couples nicheurs signalés se monte à 19 avec 5 nichées à Genappe (cette année exceptionnelle pour ce site verra l'envol de 19 pulli sur 24), 6 nichées à Virelles, min. 4 couples à Harchies (moyenne de 3,75 pulli), 1 couple (6 pulli) aux Marionville, 2 nichées à La Hulpe; des estivants sont notés dans plusieurs sites avec maximum 61 ex. le 13.06 et 78 ex. le 28.06 à Virelles et 90 ex. le 03.07 à Harchies. • **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)\*: 1 adulte à partir du 14.08 à Obourg.

• **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*): l'espèce niche à Donstiennes (3 nichées), Genappe (2 nichées), Virelles (5 nichées), Bévercé (6 nichées dont 1 de 19 pulli), Malmédy (1 nichée), La Hulpe (2 nichées), Oud Hevertee (2 nichées), Neeruse (3 nichées), Quévy (8 pulli), Maisières (3 et 6 pulli), Obourg (9 et 8 pulli), aux Marionville (2 et 8 pulli), Escanaffles (6 et 6 pulli), Warneton (5, 8 et 8 pulli), probablement à Ploegsteert et, événement rare pour le Luxembourg, 2 couples nicheurs à Freux (7 et 9 pulli) alors que les dernières nidifications prouvées remontent à 1988 et 1992. Signalons pour les non nicheurs, 54 ex. 13.06 à Virelles, 59 ex. le 31.07 à Obourg et 102 ex. le 20.08 à Obourg.

• **Harle bièvre** (*Mergus merganser*): 1 femelle le 12.07 à Oost-Maarland.

**Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*): la nidification est signalée dans de nombreux endroits mais contrairement à 1997, elle ne l'est pas en Hainaut occidental, malgré les parades observées à Angre et à Mons. Le passage est décelé à la mi-août et un record de 114 ex. est atteint le 31 à Torgny. • **Milan noir** (*Milvus migrans*): à Thommen, nidification d'un couple et tentative d'un deuxième; un couple est observé le 27.06 à Marbehan et trois cantons sont repérés dans la vallée de la Semois. • **Milan royal** (*Milvus milvus*): la nidification est signalée en province du Luxembourg à Etalle, Opont et probablement à Tavigny. En province de Liège, un couple niche à Thommen et une famille est observée près de Saint-Vith. Le passage est décelé à la fin du mois d'août.

• **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : nidification à Boneffe et à Harchies où un couple mène au moins un jeune à l'envol. Ailleurs, une femelle estive à Angre et plusieurs autres données d'isolés en juin-juillet (Donstiennes, Mignault, Villereille-le-sec, Voroux-Goreux et Marche). Dès le début du mois d'août, les observations augmentent avec notamment 7-8 ex. durant la première quinzaine à Havay-Givry et 6 ex. durant la seconde à Angre. Le passage actif est noté à Waroux, Othée, Honnay, Beauraing, Marche, Torgny et 9 ex. passent en 3 heures le 27 à Lens-sur-Geer. • **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : un mâle le 01.06 à Niverlée et une femelle le 12.06 à Grand-Leez. Après l'absence de l'espèce durant le mois de juillet, le premier migrateur est repéré le 09.08 à Angre, suivi de 2 ex. le 17 à Marche. Le passage augmente à la fin du mois avec notamment 4 ex. en 1 heure le 27 à Lens-sur-Geer. • **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : mis à part une femelle qui séjourne du 23 au 31.07 à Angre, les autres observations sont effectuées en août : un jeune le 19 à Mariembourg, un adulte vers le sud-ouest le 21 à Meux, une femelle le 23 et un jeune le 24 à Givry. On retiendra également le séjour d'un jeune à partir du 17 sur le plateau du Gerny. • **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : aucune preuve de nidification en Hainaut occidental où 1 ex. est observé le 30.07 à Harchies et où un jeune séjourne tout le mois d'août à Angre. En Brabant, un couple niche à Villers-la-Ville. Pour l'anecdote, une femelle attaque une foulque le 25.08 à Achène-Taviet mais sans succès. • **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : comme en 1997, envol tardif d'une nichée le 27.07 à Wibrin. Le 19.07, un exemplaire capture une Grive litorne à Marvie. • **Buse variable** (*Buteo buteo*) : quelques données de densité : 7 ex. sur 25 km le 17.08 de Alleur à Othée (Hesbaye liégeoise), 19 ex. le 16.08 à Habay-la-Neuve et 20 ex. le 29.08 sur le plateau du Gerny (Jemelle). On épinglera l'observation d'un oiseau adulte rapportée à la sous-espèce *vulpinus*\* vers le nord-nord-ouest le 09.08 à Escanaffles.

**Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : encore 1 ex. le 01.06 à Harchies. Au

passage post-nuptial, le premier est repéré le 24.07 à Harchies où deux oiseaux séjourneront tout le mois d'août puis passage à partir de la deuxième décade d'août.

**Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : 3 couples nicheurs sur 1,5 km entre Sautour et Villers-le-Gambon; moyenne de 3,2 jeunes à l'envol pour 5 couples signalés en Hainaut occidental, dont un à Angre avec 5 jeunes. Le 15.08, 20 ex. sont comptés sur 20 km de Alleur à Othée. • **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : la nidification est prouvée sur plusieurs sites dont les habituels comme Born et Uccle. Dans le Hainaut occidental, elle est possible alors que la nidification réussie de Thuillies reste isolée dans l'ESM. En province du Luxembourg, 22 observations dont plusieurs cantonnements certains. Le maximum d'oiseaux est noté classiquement à Harchies avec 10 ex. le 11.07. Le passage est décelé dès le 24.08. Un exemplaire chasse un Chevalier guignette le 21.07 à Lens-sur-Geer. • **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : en dehors des sites de nidification, l'espèce est notée un peu partout. Un mâle est observé à plusieurs reprises en juin à Stoumont, où il est rejoint parfois par un deuxième oiseau et un exemplaire est régulier à Drogenbos. Dans les cantons de l'est, une femelle immature est vue le 02.07 près de Crombach et le 26.07 à Elsenborn. En août, on totalise 7 données pour l'ensemble du territoire dont deux à la limite de la Famenne et de l'Ardenne (Honnay).

**Caille des blés** (*Coturnix coturnix*) : de nombreux cantons sont renseignés ainsi que quelques données de densité : 9 chanteurs pour 540 ha à Angre-Angreau, 8 pour 100 ha à Saint-Maur, 30 entre Thuillies et Ham-sur-Heure ainsi que 2 sur 2 ha de pré de fauche à Harzé. Une première donnée pour l'Ardenne de l'ESM avec 1 à 2 chanteurs le 02.07 à Brûly. Egalement hors zone habituelle, un chanteur le 28.07 et 2 ex. le 14.08 à Hermalle-sous-Argenteau. Deux chanteurs tardifs sont encore notés le 11.08 sur le plateau du Gerny. Dernier exemplaire le 18.08 à Angre.

**Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : peu

renseigné : 1 chanteur le 29.06 à Roly, 2 en juin à Etalle, 1 ex. fin août à Longchamps (Bertogne) et à Achène-Tavier on signale une forte activité vocale du 06 au 08.08. • **Râle de genêts** (*Crex crex*) : année record pour la Wallonie avec 58-60 chanteurs recensés. Le premier est noté le 15.05 sur le plateau du Gerny (Jemelle). En mai-juin, la majorité des chanteurs sont contactés en Famenne; ensuite, tandis que leur activité se dissipe, les découvertes se multiplient en ESM, principalement en Fagne mais aussi en Thudinie où plus de 10 postes de chant sont localisés sur le plateau cultivé de Thuillies-Court-sur-Heure. Les grandes cultures accueillent d'ailleurs plus de 25 % des postes de chant cette année. La répartition globale des cantons est de 32-34 pour l'ESM dont 21-22 en Fagne, 17 en Famenne, 3 en Ardenne, 4 en Lorraine, 1 en Condroz et 1 en Hesbaye. Les observations et recherches ont permis d'apporter des indices de nidification : un adulte accompagné d'un poussin le 22.07 à Thuillies et un adulte revenant sans cesse vers un site probable de nid le 04.08 à Aublain. • **Poule d'eau** (*Gallinula chloropus*) : première éclosion le 14.06 à Achène-Tavier, moyenne de 3,7 jeunes pour 7 nichées en juin à Harchies. Absence de l'espèce sur la Semois entre Alle et Bohan le 06.07. Une dernière nichée est notée le 05.08 à Genappe. • **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : quelques données de nidification : minimum 13 couples à Ploegsteert, 8 à Chertal, 5 à Stavelot. A Harchies, un comptage le 28.07 donne 50 premières nichées (moyenne de 4,32 pulli), 28 deuxièmes nichées (moyenne 2,53 pulli) et une troisième nichée.

• **Huitrier pie** (*Haematopus ostralegus*) : 1 ex. le 13.06 à Genappe et Oost-Maarland, 1 ex. le 21.06 à Hologne-sur-Geer et 2 ex. le 08.07 à Genappe. Plus de nouvelles du couple cantonné à Vilvorde en avril-mai. • **Echasse blanche** (*Himantopus himantopus*) : présence presque continue à Fontenoy avec 2 ex. le 24.06, 2 ex. tous le mois de juillet sauf 5 ex. le 26.07, puis encore 2 ex. observés jusqu'au 04.08. • **Avocette** (*Recurvirostra avosetta*) : l'espèce niche en Hainaut occidental et en Brabant. A Warneton, 3 couples produisent 3 jeunes à l'envol (une seule nichée de 3 poussins, les deux

autres couples échouant) et, à Zemst, un seul jeune s'envole pour les 2 couples nicheurs mentionnés. L'espèce fournit également des données d'estivants ou de migrants : tout le mois de juillet à Fontenoy avec maximum 7 ex. le 20.07, 9 ex. le 02.08 sur ce même site, 9 ex. le 04.08 à Gaurain-Ramecroix, 1 ex. les 19 et 20.08 à Obourg, 2 ex. le 03.07 et 3 ex. le 14.08 à Zemst.

• **Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*) : la nidification, principalement remarquée en province du Luxembourg, est signalée à Athus, Recogne, Aubange, Sainte Ode, Marche, Stockay, Hermalle-sous-Argenteau, au Gerny (Jemelle – voir note de D. VIEUXTEMPS, p. 126) et à Frasnes-lez-Couvin. Quelques données de passage et de rassemblements postnuptiaux : les plus gros groupes sont observés début juillet avec maximum 15 ex. le 05.07 à Genappe et le 06.07 à Fontenoy; présence continue mais moins nombreuse en août sur quelques sites classiques (Eghezée-Longchamps et Genappe), et encore 13 ex. le 30.08 à Fontenoy. • **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : le passage pré-nuptial, bien développé fin mai, se termine en juin : 3 ex. le 02.06 à Genappe, 1 ex. le 04.06 à Hermalle-sous-Argenteau, 1 ex. les 07 et 19.06 à Hologne-sur-Geer et d'un dernier juvénile le 21.06 à Genappe. Présence d'un juvénile sur ce site du 14 au 19.07 et d'un autre le 30.07, puis début du passage postnuptial fort discret : 1 ex. le 04.08 et 3 ex. le 30.08 à Eghezée-Longchamps, 1 ex. le 14.08 à Escanaffles, 1 ex. le 27.08 à Pommeroel et 2 ex. le 31.08 à Hologne-sur-Geer. • **Pluvier guignard** (*Charadrius morinellus*)\* : premières mentions pour la Haute-Belgique avec 10 migrants le 25.08 et deux isolés les 27 et 31.08 à Honnay, site suivi quotidiennement. • **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : les premiers migrants sont classiquement notés en août : les 2 premiers en vol le 08.08 à Ere, puis une dizaine d'observations d'isolés en août, 1 ex. le 10.08 à Eghezée-Longchamps et 13 ex. à Tavier. • **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : premiers rassemblements postnuptiaux en juin et augmentation progressive des effectifs au cours du mois, avec maximum 210 ex. le 28.06 à Bütgenbach et 286 ex. le 21.06 à Hologne-sur-Geer. En juillet-



*Pluvier guignard, Maasvlakte (NL), 08.98. (A. Joris)*

août, l'espèce forme des groupes de taille réduite sauf 500-700 ex. le 25.07 à Thommen, 400 ex. le 10.08 à Genappe et 625 ex. le 29.08 à Focant.

**Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : 2 ex. le 02.06 à Hermalle-sous-Argenteau.  
**• Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : le passage postnuptial commence relativement tôt en juillet avec un juvénile le 13.07 à Fontenoy suivi d'un 1 ex. le 19.07 à Lens-sur-Geer. Le passage se poursuit par la suite en août avec un total de 8 données (11 oiseaux).  
**• Bécasseau tacheté** (*Calidris melanotos*)\* : une femelle adulte le 08.06 à Eghezée-Longchamps.  
**• Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : outre l'exemplaire observé le 30.06 à Genappe qui peut probablement être classé comme migrateur pré-nuptial très tardif, le passage postnuptial reprend dans la dernière décade de juillet : 1 ex. le 24.07 à Hermalle-sous-Argenteau et 2 adultes le 25.07 à Gaurain-Ramecroix. En août, l'espèce est relativement bien renseignée, avec un maximum de 5 ex. le 04.08 à Eghezée-Longchamps, un adulte les 12 et 13.08 et le 29.08

sur ce même site, 1 ex. à Fontenoy le 12.08, 1 ex. à Lens-sur-Geer le 31.08, et 2 ex. à Hologne-sur-Geer et à Waremme ce même jour.  
**• Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : les premiers migrateurs sont observés les 23 et 24.07 à Eghezée-Longchamps (respectivement 4 adultes et 1 ex.) et le 24.07 à Hermalle-sous-Argenteau (1 ex.). En août, seulement 7 mentions d'individus isolés sauf 2 ex. le 31.08 à Hologne-sur-Geer et 3 ex. du 10 au 12.08 à Fontenoy.  
**• Combattant** (*Philomachus pugnax*) : les premiers migrateurs, observés le 08.07 à Eghezée-Longchamps et le 11.07 à Genappe, amorcent un passage postnuptial fort faible : pas de groupes dépassant la dizaine d'oiseaux sauf 17 ex. le 02.08 à Fontenoy.  
**• Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : l'espèce n'est pas mentionnée en juin et réapparaît à des dates plutôt classiques : le 11.07 à Escanaffles, le 20.07 à Genappe et le 23.07 à Eghezée-Longchamps (3 ex.). En août, le passage reste très faible (voire inexistant à Genappe) avec un maximum de 13 ex. le 31.08 à Warcoing et 18 ex. le 13.08 à Hologne-sur-

Geer. • **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : renseignée comme commune dans les secteurs boisés du Brabant wallon (Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Wauthier-Braine, Tubize, Villers-la-Ville). Présente également à Stamburges, en Fagne de Malchamps, à la Croix-Scaille, à Lagland et à Marche. • **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : les 3 données témoignent de la rareté de l'espèce : 1 ex. très affaibli du 28.07 au 16.08 à Genappe, 1 juvénile du 10 au 13.08 et 2 ex. le 15.08 à Eghezée-Longchamps. • **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : observation des premiers migrants fin juillet avec 9 ex. le 23.07 à Wiers et 5 ex. le 30.07 à Angreau. Le passage se poursuit ensuite en août mais se concentre dans la troisième décade : 1 ex. le 22.08 et 5 ex. le 30.08 à Angreau, 2 ex. le 22.08 à Meux, 2 ex. le 23.08 à Genappe, 1 ex. le 22.08 à Honnay et 1 ex. le 25.08 à Légglise. • **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : les premiers mouvements sont déjà perceptibles fin juin-début juillet avec un exemplaire en passage nocturne le 27.06 à Dailly et 2 ex. posés le 09.07 à Paliseul. En août, la dizaine de données est répartie sur le mois et concerne des isolés sauf 5 ex. en vol le 24.08 à Givry et 2 ex. le 31.08 à Warcoing. • **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : deux données d'isolés le 20.06 (Harchies et Hollogne-sur-Geer) concernent probablement des migrants postnuptiaux précoces. L'espèce n'est plus signalée en juillet mais réapparaît en août pour fournir une dizaine de données (1-3 ex.) sur des sites classiques tels que Escanaffles, Hollogne-sur-Geer, Lens-sur-Geer et Genappe. • **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : presque exclusivement renseigné en provinces de Namur et de Liège : encore quelques données en juin puis passage développé avec maximum 49 ex. le 20.07 à Eghezée-Longchamps et 63 ex. le 30.07 à Hollogne-sur-Geer. Ailleurs, quelques mentions à Genappe (début juin), Recogne et Escanaffles. • **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : les premiers migrants postnuptiaux sont observés début juillet : le 03.07 à Genappe, le 04.07 à Achène-Taviet et le 08.07 à Eghezée-Longchamps. Le passage peut être qualifié de normal avec un léger pic noté en première quinzaine d'août : maximum 7 ex. le

12.08 à Fontenoy, 10 ex. les 10 et 14.08 à Lens-sur-Geer, 10 ex. les 07 et 12.08 à Eghezée-Longchamps et 12 ex. les 08 et 09.08 à Genappe.

• **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : pour cette espèce, il est toujours délicat de séparer clairement les deux passages. En effet, les derniers migrants pré-nuptiaux sont encore observés début juin à Genappe et Elsenborn, et les premiers postnuptiaux dès le 12.06 à Termes, le 13.06 à Recogne, le 15.06 à Bütgenbach et le 20.06 à Obourg et Harchies. Comme pour le Guignette, le pic de passage est noté fin juillet-début août avec des maxima de 23 ex. le 26.07 à Warcoing, 30 ex. le 01.08 à Hollogne-sur-Geer et 35 ex. les 31.07 et 03.08 à Genappe. Le passage diminue fortement après le 15.08.

• **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : dernier migrant pré-nuptial le 07.06 à Genappe. Le passage postnuptial commence dès le 28.06 à Hollogne-sur-Geer (6 ex.) et à Hermalle-sous-Argenteau (1 ex.) puis se développe principalement en juillet, les maxima sont obtenus en fin de mois : 5 ex. le 31.07 à Genappe, 10 ex. en fin du mois à Longchamps et 19 ex. en vol le 28.07 à Nismes. • **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : les premiers migrants sont observés classiquement dans la dernière décade de juin : le 21.06 à Achène-Taviet, le 26.06 à Genappe, le 28.06 à Hermalle-sous-Argenteau, le 29.06 à Harchies et le 30.06 à Lavaselle. Le passage se développe ensuite fortement pour culminer fin juillet-début août avec comme maxima 28 ex. le 09.08 à Latour, 46 ex. le 30.07 à Hollogne-sur-Geer, 55 ex. le 20.07 à Warcoing, 66 ex. le 22.07 et 59 ex. le 01.08 à Genappe; le passage reste soutenu en août. Une mention plus curieuse signale un groupe de 45 ex. le 16.08 au soir à Jambes, absent le lendemain!

**Grand Labbe** (*Stercorarius skua*) \* : première et étonnante donnée pour la province du Luxembourg avec un exemplaire recueilli le 23.08 à Menil (Hotton), revalidé puis relâché le 31.08 à la mer. • **Mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*) \* : maintenant observée à toute période de l'année, cette espèce fournit deux données : 2 exemplaires le 19.06 à Genappe et 1 juvénile le 31.07 à Obourg.



• **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : passage dérisoire avec seulement deux données : 1 ex. du 20 au 31.07 à Fontenoy et le 12.08 à Fontenoy.

• **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : l'espèce est notée comme nicheuse à Hologne-sur-Geer (33 couples), Fontenoy (34 couples), Quévy et Genappe (6-7 couples) mais il y a malheureusement peu d'informations concernant le succès de ces nidifications. En juillet-août, des groupes se reforment mais les nombres restent limités : maximum 200 ex. le 10.08 à Genappe et 470 ex. le 15.08 à Hologne-sur-Geer.

• **Goéland cendré** (*Larus canus*) : contrairement à l'espèce précédente, les informations concernant la nidification sont assez détaillées. La population de la vallée de la Haine semble stable avec 35-38 couples cantonnés dont 31 nicheurs effectifs répartis sur 4 sites (carrière d'Obourg et de Harmignies, Les Marionville et Harchies). Néanmoins, la moyenne des jeunes à l'envol reste toujours aussi faible : à Obourg, seulement 18-20 jeunes pour 24 couples. Nicheur également à Eghezée-Longchamps, où un couple produit un jeune à l'envol, et dans une carrière à Monceau-sur-Sambre (5 couples).

• **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : une seule donnée en juin avec 9 immatures le 09.06 à Obourg. En juillet, 60 ex. en vol le 14.07 aux BEH et 40 ex. le 11.07 à Gaurain-Ramecroix. En août, les données sont plus nombreuses : passage quotidien tous les mois à Genappe (1-8 ex.), maximum 89 ex. le 15.08 à Gaurain-Ramecroix et 201 ex. le 14.08 à Obourg.

• **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : parmi les espèces communes de goélands, il est devenu de loin le plus rare avec seulement 8 données pour toute la période. Celles-ci concernent bien souvent des isolés ou des petits groupes sauf 16 ex. le 12.08 à Gaurain-Ramecroix.

• **Goéland leucophée** (*Larus cachimans*) : bien renseigné en juillet-août sur quelques sites mais uniquement en provinces du Hainaut et de Liège : maximum de 32 ex. le 25.07 à Liège-Monsin, 39 ex. le 04.08 et 49 ex. le 12.08 à Gaurain-Ramecroix. Un adulte de la sous-espèce *cachimans* (= Goéland pontique)\* est également observé les 22 et 23.07, puis tout le mois d'août à Pommeroeul.

• **Sterne caspienne** (*Sterna caspia*)\* : observation d'un individu présent quelques minutes le 21.06 à

Latour.

• **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) : quelques migrateurs sont encore observés début juin : 1 ex. le 02.06 à Obourg, 2 ex. le 04.06 à Harchies et 1 ex. le 07.06 à Hermalle-sous-Argenteau. Par la suite, les mouvements postnuptiaux sont à peine perceptibles avec 1 ex. le 05.07 à Achêne-Taviet, 1 ex. le 06.07 à Virelles et 1 ex. le 09.08 à Escanaffles.

• **Guifette moustac** (*Chlidonias hybridus*)\* : le petit afflux signalé en mai se termine avec encore un exemplaire le 02.06 à Obourg. Le passage printanier se termine donc avec un total de 9 individus différents (5 mentions).

• **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : dernier migrateur pré-nuptial le 02.06 à Obourg. Le passage postnuptial, d'une ampleur plus que réduite (seulement 7 données), débute le 03.07 à Zemst. Assez curieusement, seul le site de Genappe, qui n'attire généralement pas cette espèce, recueille la moitié des observations : 4 ex. le 11.08, 1 ex. le 15.08 et 3 ex. le 29.08.

• **Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : peu de données sur la nidification bien que l'espèce semble en expansion dans le Condroz. Les plus grands rassemblements pour la période sont 60 ex., en deux groupes, le 16.07 à Frasnes et 78 ex. le 15.08 à Warcoing.

• **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : peu d'information disponible également sur la reproduction. L'espèce est toutefois signalée comme devenue peu commune dans les environs d'Aublain/Dailly et très rare en Condroz tandis qu'un minimum de 10 couples nicheurs est obtenu à Hensies. Les premiers rassemblements estivaux sont notés dès la mi-juillet : 43 ex. le 15.07 à Roly et 11 le 27 à Angre. En août, des groupes de 35 ex. le 13 à Lens, max. 77 le 22 à Angre, 28 le 25 à Mehaigne, 42 le 25 à Focant et 15 le 28 au Gerny. 64 ex. sont comptés en 24 h de suivi du 06 au 31.08 à Angre.

• **Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : aucune donnée en Condroz. A Godinne, 4 à 5 chanteurs dont un nocturne (chant vers 2 heures du matin). Dernier chant le 14.06 à Monteuville et dernier ex. le 15.08 à Genappe.

• **Chouette effraie** (*Tyto alba*) : bien plus fréquente qu'on le pense, la nidification dans les

granges peut également produire une grande nichée à l'envol comme par exemple à Pailhe où 5 jeunes sont bagués le 10.07. • **Hibou grand-duc** (*Bubo bubo*) : des cas de nidification sont signalés sur le plateau calcaire des environs de Philippeville, dans la vallée de l'Eau Blanche à Olloy-sur-Viroin ainsi qu'à Bastogne (1 adulte et 2 jeunes hors du nid le 26.07). • **Chouette hulotte** (*Strix aluco*) : l'activité diurne est signalée à deux reprises : 1 ex. chassant le 12.06 à Grand-Leez et 1 ex. chantant le 07.06 à Purnode. • **Hibou moyen-duc** (*Asio otus*) : taux de reproduction faible cette année avec seulement 8 nichées (sur 6 localités) en ESM et une seule nichée renseignée en province du Luxembourg à Opont ! • **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : un chanteur entendu le 07.06 au Plateau des Tailles durant 1/2 h tandis qu'à Bourcy, deux mâles chanteurs sont présents du 01 au 10.06, un seul jusqu'au 14.07.



Chouette chevêche, Ambressin, 07.98. (Ch. et D. Leblan)

**Engoulevent d'Europe** (*Caprimulgus europaeus*) : la région spadoise reste le fief principal de l'espèce en Wallonie avec 2 couples en Fagne de Malchamps et 6 territoires minimum à La Reid (5 en 97). Ailleurs, 2 chanteurs le 04.06 et 1 le 09.07 à la Croix-Scaille (deuxième année consécutive de présence), 1 ex. le 12.06 à Lagland (dernier site connu en province du Luxembourg) et 1 ex. le 21.07 à Matagne-la-Petite. • **Martinet noir** (*Apus apus*) : 245 nids sont comptés dans le Quartier Nord à Liège. Des rassemblements prémigratoires sont notés jusqu'au 15 à Angre (max. 280 le 15) et le 18.07 à Mariembourg (plus de 100 ex.) tandis que la migration est amorcée dès la mi-juillet. A Angre, 92 ex. sont comptés en 5 minutes le 18.07, 221 en 2 heures le 23 et 480 se concentrent sur le site le 30 tandis qu'à Mariembourg, ce sont environ 260 ex. en 2 heures le 29 et environ 80 en 3/4 heure le 30 qui sont notés. A Marloie, un gros passage en bandes de 30 à 50 individus est signalé du 25 au 29.07. La diminution est très nette dès début août même si certains oiseaux sont encore présents le 15 à Aublain ainsi que 2 ex. à Gembloux à la même date. A noter également, un groupe de 130 houpillant un Faucon hobereau le 26.07 à Mons. • **Martin pêcheur** (*Alcedo atthis*) : avec une petite dizaine

de cas de nidification, les effectifs de cette espèce ne semblent pas remonter significativement après un hiver relativement doux. En Hainaut par exemple, un seul couple nicheur certain (à Saint-Denis) est rapporté. A Aywaille, une troisième nichée est prête à l'envol le 31.08.

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) : un chanteur au-dessus d'un nichoir le 14.06 au camp militaire de Marche et un autre le 15.06 à Beauraing sont les deux seules données de nicheurs possibles. Le passage post-nuptial semble, de manière classique, amorcé dès la mi-août : 1 ex. le 15 à Ellezelles, 5 ex. du 19 au 28 aux Awirs et 1 ex. le 29 à Bütgenbach. • **Pic cendré** (*Picus canus*) : découverte de l'espèce dans l'entité de Beauraing (voir note), 1 ex. le 01.08 à Elsenborn et 1 le 07.08 à Jalhay. • **Pic vert** (*Picus viridis*) : 1 ex. mange des fourmis dans les rochers le 12.06 à Marche-les-Dames. 5 chanteurs sur 7 km le 29.06 à Wiers et 6 à Harchies. • **Pic noir** (*Dryocopus martius*) : hors zone connue, la nidification est possible à Harchies. • **Pic épeiche** (*Dendrocopos major*) : 7 couples nicheurs sur 2 km en chênaie le 09.06 à Frasnès.

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : en dehors des sites classiques, la nidification est probable à Hensies. A Fronville, un nouveau mâle se cantonne le 25.06 et à Marche, les chants reprennent classiquement entre le 05 et le 30.06. Une donnée de productivité : un couple élève 2 jeunes à Stockay le 15.08. • **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : un nouveau canton est occupé tardivement le 12.07 à Achêne-Taviet.

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : 15 données de colonies occupées totalisent environ 1.030 couples dont au moins 300 à Péronnes-lez-Antoing. Les effectifs semblent stables par rapport à 1997 excepté à Heure-le-Romain où la colonie passe d'un couple en 1997 à 21 couples cette année. La migration est décelée dès la mi-août. • **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : la population nichant à l'extérieur des bâtiments dans le centre de Florenville se maintient et totalise 21 couples. Des rassemblements sont signalés dès le début du mois d'août et la migration débute le 25. • **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : 18 recensements locaux totalisent 1.150 nids. Parmi ceux-ci, on remarque la stabilisation de la population montoise (110 nids) et une chute des effectifs à Amay-Ampsin, où l'on passe de 372 nids en 1997 à 280 nids cette année. A Solre-sur-Sambre, les 103 nids à la ferme du Clocher constituent hélas une observation bien trop rare. Les premières migratrices sont notées le 23.08.

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : le passage débute durant la troisième décade d'août avec 5 ex. le 20 et 1 ex. le 21 à Honnay et 3 ex. le 21 à Hogue. De façon étonnante, on ne signale aucune observation en Hainaut occidental. • **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : quelques données de nidification : 10 chanteurs en lisière le 07.06 à Roly, 4 sur une pelouse calcaire le 19.06 à Sossoye, 4 à Malchamps et 3-4 dans une chênaie le 09.06 à Frasnes. Premier migrateur le 10.08 à Marloie. • **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : un adulte nourrit toujours le 15.08 à Aublain. • **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : pas de nidification en province du Luxembourg, où la situation était

hélas prévisible, mais nicheuse ailleurs dont 13 couples sur 650 ha à Verlaine (Hesbaye) et 4 couples sur 1.000 ha entre Gesves et Ohey (Condroz). Le passage débute le 10.08 et l'on compte déjà à la fin du mois 154 ex. en 1 heure le 30 à Stockay et 128 ex. en 2 heures le 31 à Torgny. • **Bergeronnette printanière flavéole** (*Motacilla flava flavissima*) : 1 ex. le 25.08 à Quiévrain. • **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : un couple rupestre élève trois jeunes sur une falaise rocheuse à Barvaux; envol le 18.07. • **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : à Achêne-Taviet, la couvaison d'une deuxième nichée débute le 12.06 et un adulte nourrit encore au nid le 10.08 à Meux. Un suivi régulier en août à Hollogne-sur-Geer met en évidence les mouvements de dispersion avec respectivement 10, 70, 80, 30, 25 et 15 ex. les 01, 08, 15, 17, 19 et 31. A Antoing, on signale un dortoir de 120 ex. le 13.08. • **Bergeronnette de Yarrell** (*Motacilla alba yarrelli*) : 1 ex. le 14.07 à Mouscron.

**Rosignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : trahis par leurs cris d'alarme, deux couples nourrissent des jeunes le 14.06 à Marche. Aux Awirs, le passage commence à la fin du mois de juillet pour se terminer à la fin du mois d'août. • **Gorgebleue** (*Luscinia svecica*) : la population liégeoise continue à se développer avec cette année 3-4 couples à Hollogne-sur-Geer, 2 à Lens-sur-Geer et des cantons à Hermalle-sous-Huy et à Amay. En août, un migrateur est observé dans un champs le 05 à Angre et le 06 à Angreau. • **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : peu d'informations : 5 couples nicheurs à Laforêt et 4 cantons à Awagne. • **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : en juin, Mariembourg compte 3-4 cantons en chênaie et 3-4 cantons dans le village. Ailleurs, on retiendra 6 cantons à Godinne et un chanteur dans une pinède au cœur du massif de la Croix-Scaille. Le passage débute dans la dernière décade d'août notamment à Marcouray, Lacuisine, Bure et Izel. • **Traquet tarier** (*Saxicola rubetra*) : évolution de plus en plus préoccupante pour cette espèce dont l'aire de répartition continue à se rétrécir; seul l'est de la province de Liège accueille

encore une population d'une certaine importance (voir article de J. L. COPPEE, pp 97 - 102). Après un premier migrateur le 29.07 à Harzé, le passage débute vers la mi-août. • **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : quelques données de densité : 16 cantons sur 11 km<sup>2</sup> dans la plaine de l'Eau Blanche à Aublain/Dailly contre 14 en 1996; 7 cantons sur 100 ha à Hermalle-sous-Huy et 5 couples dans la Fagne de Malchamps. A Ans, une friche en pleine ville abrite 3 cantons. On signale aussi la bonne santé de l'espèce en province du Luxembourg. • **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : encore 1 ex. le 23.05 à Chapon-Seraing. Après un premier le 21.07 à Saint-Maur, le passage débute durant la dernière décennie d'août. • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : la situation de cette espèce devient inquiétante dans de nombreuses régions : forte régression en Hainaut occidental, où aucun nouveau couple nicheur ne s'ajoute aux deux connus de mai, en raréfaction dans le Condroz et dans le pays de Herve, colonie relictuelle de 5 couples maximum à Buissonville, une de 3 couples à Roly, devient rare en Ardenne namuroise... • **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : rassemblements à partir de la dernière décennie d'août : 49 ex. le 30 à Ortho, 80 ex. en deux groupes les 25 et 27 à Angre et 18 ex. le 26 à Escanaffles.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : 2 chanteurs en juin à Harchies et 1 le 02.07 à Ploegsteert. • **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : 5 cantons à Malchamps, 3 à Villers-devant-Orval, nombreux chanteurs dans les coupes à blanc et jeunes plantations à la Croix-Scaille; sinon quelques mentions de chanteurs isolés comme à Hermalle-sous-Argenteau, à Ans, à Libin. Rappelons que seuls des recensements vespéraux permettent de déceler correctement l'espèce. Nourrissage tardif le 16.08 dans le camp militaire de Marche. • **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : le passage aux Awirs débute le 31.07 et se termine le 01.09. En août, un migrateur en halte dans un champ le 05 à Angre et un chanteur le 16 à Escanaffles. • **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : en juin, 50 chanteurs sur 80 ha de friche à Hermalle-sous-Huy, entre 8 et 14 dans une friche à Godinne et 8 sur 2 ha à Slins.



Rougequeue noir, Strainchamps, 11.07.98 (F. Delbecq)

Encore un chanteur le 30.06 à Marche. Passage à partir du 18.07 à Ampsin, avec des pics les 20, 23, 25.07 et 01.08, très faible après le 15.08. • **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*) : un comptage partiel aux marais d'Harchies donne un minimum de 19 cantons pour le marais d'Hensies. En juillet, quelques cantons sont notés sur la Moyenne-Semois. Passage à partir du 23.07 à Ampsin avec des maxima du 14 au 20.08 et du 25.08 au 01.09. • **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*) : un chanteur le 03.07 à Harchies. • **Hypolaïs icterine** (*Hippolais icterina*) : un oiseau chante encore durant la deuxième quinzaine de juillet à Angreau. On renseigne peu l'espèce ailleurs : Milmort, Roisin, Harchies. A Melreux, la nidification est prouvée pour la quatrième année consécutive et constitue la seule donnée de cet oiseau rare en province du Luxembourg. • **Hypolaïs polyglotte** (*Hippolais polyglotta*) : peu renseigné; seulement deux cantons sur le plateau de la Croix-Scaille, un canton et un

couple probable à Awagne et 3 couples minimum à Laforêt. La situation semble stable en Fagne-Famenne. • **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : 3 cantons à Godinne et à Yvoir, 2 cantons à Awagne. Un couple nourrit encore le 25.07 à Escanaffles. Le passage se déroule du 27.07 au 08.09 aux Awirs. • **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : 21 cantons sur 80 ha de friche à Hermalle-sous-Huy. Pics de passage aux Awirs le 10.08 et le 01.09. • **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : 6 cantons sur 2 ha à Slins, 6 à Houx et 6 à Awagne. Pic de passage aux Awirs du 15.08 au 02.09 (10 à 21 ex. capturés par jour), du 12.08 au 01.09 à Ampsin. • **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : début du passage vers le 18.08 à Ampsin, s'intensifiant en fin de mois avec 20-30 captures par jour. • **Pouillot siffleur** (*Phylloscopus sibilatrix*) : quelques données de densité : 3 cantons sur 300 m de hêtraies-pessières à Hockay, 2 sur 2 km de chênaie à Frasnès et 3-4 sur 1 km de chênaie à Roly. L'espèce est signalée comme irrégulière et peu abondante en Fagne en juin-juillet. • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : 11 chanteurs sur 1 km le 29.06 à Romerée. Passage à partir de la mi-juillet aux Awirs. • **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : passage très précoce aux Awirs : 67 ex. capturés dès le 25.07, ensuite nettement plus réduit sauf le 31.08 avec 28 ex.

**Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : 3 cantons sur 1 km de chênaie claire le 08.06 à Soulme, 3 nichées à Purnode dont une dans un nid d'Hirondelle de fenêtre. Envol des dernières nichées d'Achêne le 12.08 et à Angre le 25.08. Passage dès le 20.08. • **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : après 1 ex. le 21.07 à Matagne-la-Petite et 1 ex. le 01.08 à Wiers, c'est à partir de la mi-août que le passage se déroule.

**Mésange à longue queue** (*Aegithalus caudatus*) : quelques groupes post-nuptiaux d'importance moyenne : 20 ex. le 23.06, 30 le 30.08 à Gembloux et 35 ex. le 23.06 à Awagne. • **Mésange rémiz** (*Remiz pendulinus*) : 1 ex. le 01.06 et un chanteur le 12.06 à Harchies; une nichée de 6 jeunes s'envole à la mi-juin à Oost-Maarland.

**Loriot d'Europe** (*Oriolus oriolus*) : encore un exemplaire en migration le 01.06 à Pailhe. En période de nidification, 1 chanteur fin juin à Hollogne-sur-Geer; en Lorraine, 10 cantons de Villers-sur-Semois à Etalle et 4 données ailleurs; signalé à Walhain-Saint-Paul, des données de 3 sites de l'ESM et minimum 14 cantons en juin à Harchies. Premier migrateur en vol vers le sud-ouest le 27.07 à Angre.


**Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : bien que les données soient parfois contradictoires, la progression de l'espèce semble globalement marquer le pas. Stabilité dans l'ESM, 65 données pour les trois régions en province du Luxembourg, 17 territoires dans la région de Sourbrodt (pour trois signalés en 1996), statu quo dans la région d'Aywaille. Les dernières familles sont observées vers le 15.08, mais des jeunes sont encore nourris le 31 à Izel.

• **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : les données de nidification proviennent essentiellement de la province du Luxembourg : 4 en Ardenne, 3 en Lorraine et un en Famenne. Quatre données estivales en Famenne namuroise et dans l'ESM; dans l'est, un couple à Malchamps et un dans la vallée de l'Emmels (Born). Des individus erratiques sont observés en août à Opont, Boeur, Chéoux et Marche.

**Pic bavarde** (*Pica pica*) : 3 ex. se cachent sous des voitures pendant un orage violent à Louvain-la-Neuve. • **Cassenoix moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : observé principalement en août, à Raeren, Spa, Malchamps, Francorchamps, Wibrin et Honnay. Remarquons que l'oiseau de Honnay a été suivi sur plusieurs kilomètres volant vers le sud-est sans pour autant pouvoir dire qu'il s'agisse d'un migrateur. Quatre exemplaires dans des noisetiers le 25 à Marcouray.

• **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : 1 ex. les 17 et 20.06 à Chéoux, un couple le 20.06 à la Croix-Scaille, 1 ex. le 24.06 à Louette-Saint-Pierre, le 26.07 à Bande, 1 adulte le 20.08 à Florenville, 1 ex. le 22.08 à Erneuveville, 2 ex. le 25.08 à Marcouray et 2 le 29.08 à Honnay.

**Étourneau sansonnet** (*Sturnus vulgaris*)



*Pies-grièches écorcheurs, Harzé et Comblain-au-Pont, 08.98 (R. Dumoulin)*

*ris*) : dortoirs de 5.000 ex. le 19.07 et 25.000 le 02.08 à Lens-sur-Geer, prédortoir de 6.000 le 03.08 à Lantin.

**Moineau domestique** (*Passer domesticus*) : un couple niche à moins d'un mètre d'un couple de Mésange charbonnière en juin à Pailhe, ce qui est rare lorsqu'on connaît l'agressivité territoriale de cette dernière. • **Moineau friquet** (*Passer montanus*) : à Condoux, le 11.07, un couple réaménage son nid dans le même nichoir pour la troisième fois, les nichées précédentes ayant donné chaque fois 5 jeunes à l'envol. Attroupements de 40 ex. à Laiche et 50 ex. à Focant le 27.08.

**Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) : regroupement postnuptial de 100 ex. le 28.07 dans un champ d'avoine à Chéoux. • **Serin cini** (*Serinus serinus*) : les nombreuses données, provenant de toutes les régions, reflètent le dynamisme actuel de l'espèce; très commun à Beez, minimum 4 cantons à Namur centre, 5 couples à Marche, 8 cantons à Beauraing, 3 à

Amay et 4 à Ampsin. Plus surprenant, un couple à Boeur, en Ardenne luxembourgeoise, et 4 territoires à Bütgenbach, en Haute-Ardenne.

• **Chardonnet** (*Carduelis carduelis*) : outre les sites évoqués dans la chronique précédente, au moins 5 couples le 05.07 à Mazée et nicheur à Awagne. Quelques attroupements postnuptiaux : 20 ex. le 01.07 à Libramont et Ortho, 30 ex. le 23.08 à Grandcourt et 15 ex. le 24.08 à Beth. • **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : présent dans la région d'Elsenborn-Robertville, seules données pour l'été. • **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : premiers rassemblements de 80 ex. le 22.07 à Wiers et 150 ex. le 30.07 à Angreau. En août, maximum 100 ex. le 29 au Gerny, 320 ex. le 27 dans la plaine de Focant et 400 le 23 à Roisin. • **Sizerin flamme** (*Carduelis flammea*) : à nouveau un bilan bien maigre : seulement un terroir à Sourbrodt et un cantonnement tardif le 01.08 à Elsenborn. • **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : 1 ex. à Châtillon les 04 et 08.06, 2 ex. à la Croix-Scaille le 20.06, 3 ex. en vol le 19.06 au Sart-Tilman et une famille le 13.06 à Elsenborn. En

août, un jeune le 03 à Membach, 1 ex. le 23 à Stoumont et 8 ex. le 28 à Harzé; une femelle et 4 ou 5 jeunes le 17.08 à Achêne-Taviet.

**Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : 6 chanteurs sur 1 km le 06.06 à Sautour, 10 chanteurs sur 2 km le 29.06 à Romerée, 6 chanteurs à Awagne. Encore un transport de brindilles le 29.07 à Pailhe. • **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : un migrateur le 25.08 à Honnay. • **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : 20 à 22 chanteurs sur 11 km<sup>2</sup> dans la plaine de l'Eau Blanche à Aublain-Dailly, dont 6 chanteurs sur 1 km<sup>2</sup>; environ 15 cantons en juillet à Roly. En Luxembourg, des nicheurs dans 14 localités. Très rare à Achêne-Taviet.

Premières dispersions post-nuptiales : 1 ex. le 27.07 et 3 ex. le 01.08 dans un champ à Angre.

• **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : en Condroz, 4 cantons sur 10 km<sup>2</sup> entre Gesves et Ohey dont au moins trois couples nicheurs. Quinze chanteurs sur 650 ha à Verlaine en juin; la plaine d'Hermalle-sous-Argenteau compte 3 cantons, les premiers et les seuls de la vallée de la Basse-Meuse. L'espèce se maintient en petite quantité en Lorraine : 1 couple avec jeunes le 07.06 à Turpange, 1 ex. le 13.06 à Autelbas et le 19.06 à Sainte-Cécile, 2 ex. le 19.06 à Breuvanne et 1 ex. le 16.08 à Termes. Rassemblements post-nuptiaux ; 7 ex. le 13.08 à Angreau et maximum 15 ex. en fin de mois à Givry; 12 ex. au dortoir à Lantin le 13.08.

## Oiseaux hybrides

**Rougequeue noir et à front blanc** (*Phoenicurus ochruros x p. phoenicurus*) : nouvelle nidification de l'hybride Rougequeue

noir x Rougequeue à front blanc à Mariembourg. Le couple nourrit 3-4 jeunes le 22.06.

## Oiseaux à plumage atypique

**Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : l'exemplaire partiellement mélanique est toujours présent le 15.08 à Herminelle-sous-Argenteau. • **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : retour de plus en plus précoce de l'individu leucistique d'Hermalle-sous-Argenteau, revenu cette année

le 26.07. • **Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : 1 ex. leucistique le 16.07 à Frasnes. • **Moineau domestique** (*Passer domesticus*) : 1 ex. albinos le 07.06 à Philippeville.

## Oiseaux échappés de captivité

**Cygne noir** (*Cygnus atratus*) : 1 ex. toute l'année à Namur sur la Meuse, 1 ex. fin juillet à Roly. 1 couple élève 3 jeunes à Rhode-Sainte-Agathe, 1 couple construit le 19.08 à Jannée mais sans suite, 4 ad. et 1 juv. le 16.08 à Grimbergen. • **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) : mention d'au moins 6 couples nicheurs : 2 à Zemst (6 pulli), 1 à Melreux (5 pulli), minimum 3 à Jannée. Ailleurs, on note des groupes de plusieurs dizaines d'exemplaires avec entre autres : environ 80 ex. (dont 40 juv.) le 30.07 à Jambes, 78 ex. le 14.08 à Zemst, 51 ex.

le 17.08 à Bois-et-Borsu, 34 ex. en vol le 17.08 à Escanaffles et maximum 60 ex. en août à Grimbergen. Signalons enfin 246 ex. pour le Condroz occidental, soit une augmentation de 25 % par rapport à 1997, et une famille le 01.08 à Esneux. • **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) : 1 ex. présent à Grand-Leez en 06, 1 ex. le 04.06 à Visé, 4 ex. le 22.08 à Ocquier et 1 adulte accompagné de deux immatures hybrides en Haute-Meuse. • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : 1 ex. en vol à Louvain-la-Neuve le 12.06; 19 ex. séjourner du 11.07 au 05.08 à Longchamps.

• **Ouette d'Égypte** (*Alopochen aegyptiacus*): hormis en Basse-Meuse, où quelques exemplaires sont observés régulièrement (maximum 5 ex. le 26.07 à Hermalle-sous-Argenteau) et en région bruxelloise, où deux groupes importants sont signalés à Woluwe-Saint-Lambert (28 ex. le 21.07) et à Zemst (10

ex. le 14.08), on ne note que quelques observations : 1 ex. en juillet et le 22.08 à Roly, 1 ex. le 24 et 31.07 à Longchamps et 11 ex. le 23.07 à Stockay. Signalons une tentative de nidification à Genappe mais le nid est trouvé le 23.08 avec un œuf non éclos. • **Erismaire rousse** (*Oxyura jamaicensis*) : 1 mâle le 02.08 à Neerijse

### Ont contribué à cette chronique par l'envoi de leurs données d'observations :

Baye J.-M., Beys B., Beys R., Bocca S., Born C.-H., Brouyère G., Buckinx G., Burnel A., Calberg C., Chable M., Claes T., Collard Ph., Collinet B., Coppée J.-L., Crickillon D., Danthinne Ph., De Broyer A., de Harenne C., de l'Espinau A., de Liedekerke R., de Liedekerke M., de Thier T., de Wavrin H., de Woot F., Deflorenne P., Degossely P., Delbecque F., Deloyer P., Delvaux A., Depasse A.-P., Dermien F., Derume M., Desablens P., Deshormes O., Detaille R., Dewitte T., Dielen V., Doblestein F., Dufourny H., Dujardin R., Dumoulin R., Durant M., Farinelle C., Flon T., Flon Y., Fouarge J., Gallez J., Gauquie B., Ghem M., Gilles S., Goebels W., Grégoire, D., Hanus B., Héla F., Herbecq F., Herrent P., Hilgers B., Hubert M., Hupet F., Imbreckx E., Jacob J.-P., Jacquemin M., Jadoul G., Janssens M., Jardon B., Jenard, P., Joris A., Jortay A., Kempeneers Y., Kinet T., Kuciapa W., Lambert M., Laudelout A., Lays A., Lebailly J.-L., Lebbe O., Ledoux L., le Hardy F., Lemaître F., Lepinois J.-C., Libert C., Loison M., Loly P., Loneux-Walravens M., Louis E., Lovinfosse J.-M., Lucas P., Malengreau A., Mardulyn H., Mariage T., Matagne J., Matgen O., Maus J.-M., Mengal J., Mersch T., Michaux P., Minet G., Molitor B., Monmart A., Muyshont D., Nicolas M., Paquay M., Paquay N., Paquet J.-Y., Pierre P., Portier B., Rabosée D., Ravet P., Rega A., Renard F., Roland S., Rotsaert G., Rousseau C., Ruyschaert F., Ryelandt Ph., Sacré P., Schmitz L., Sedek J., Sente F., Stassin P., Teerlynck H., Testaert D., Tewys A., Thonnard P., Thonon P., Tricot J., Van Cutsem M., Van Halst V., Van Hove F., Van Volsem J., Verroken D., Verroken L., Vieuxtemps D., Watelet M., Weiserbs A., Willame A., Xhardez C., les observateurs du groupe de Genappe, de Latour, de la Trientale (CNB) et du Groupe de Travail Ornithologique de Famenne (GTOF), et quelques autres, sans doute, que nous avons oubliés. Qu'ils soient bien persuadés que cela est tout à fait involontaire.

Nous les remercions tous pour leur collaboration.

Les données ont été rassemblées par Ph. Degossely, J.-Lo. Coppée, C. Rousseau, H. de Wavrin, D. Testaert et D. Vieuxtemps.

Rédaction : Th. Debaere, R. Dumoulin, F. Hupet, Th. Kinet, R. de Liedekerke, H. Teerlynck et D. Testaert; coordination, D. Testaert; supervision, J.P. Jacob.