

L'évolution de la population nicheuse de la Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) en Belgique et premiers résultats des programmes européens de marquage coloré.

par Renaud FLAMANT¹ & P.L. MEININGER²

Avant 1970, la Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) était une espèce nicheuse rare et irrégulière en Belgique et aux Pays-Bas. Depuis le début des années 70, elle y niche annuellement et en nombre croissant. En 1998, l'effectif nicheur était de 275 couples pour la Belgique et de 410 couples pour les Pays-Bas. Etant donné l'accroissement de la population, le développement de cette espèce en Europe et tenant compte d'un taux de réussite de la nidification continu et élevé, une population nicheuse de plus de 1.000 couples pour la Belgique et les Pays-Bas vers l'an 2000 paraît possible. Cependant, ceci dépendra fortement de la disponibilité de sites de nidification appropriés.

Depuis 1990, un programme de marquage par bagues de couleur a été mis sur pied aux Pays-Bas et en Belgique. Les premiers résultats de cette étude sont présentés, et plus particulièrement l'hivernage et la migration de la population néerlandais-belge. Jusqu'en 1998, ces oiseaux ont généré plus de 10.000 observations grâce à 275 observateurs. Des résultats très intéressants ont été obtenus, tant au niveau de la population qu'au niveau d'individus.

Une première série de cartes reprend la dispersion des oiseaux de première année par périodes de deux à trois mois. Une seconde série de cartes concerne les mouvements des oiseaux adultes.

Ensuite, les effectifs des oiseaux sont repris mensuellement par catégorie d'âge, pour 4 régions d'Europe : le nord-ouest de la côte française, le sud-ouest de la côte française, le nord-ouest de la côte espagnole et la côte méditerranéenne espagnole et italienne.

Il apparaît que les sites de Boulogne - Le Portel, Le Havre, Douarnenez et la partie sud-est du Golfe de Gascogne sont régulièrement fréquentés par nos oiseaux. Les curriculum vitae d'un nombre de Mouettes mélanocéphales montrent que certains individus sont très mobiles, alors que d'autres restent très fidèles quant à leurs sites de nidification, de migration et d'hivernage. En effet, une Mouette mélanocéphale née en Italie, est venue nicher successivement en Zélande, en Vendée et en Belgique, alors que certains oiseaux viennent systématiquement nicher dans une des colonies du delta, passent ensuite en migration par Boulogne - Le Portel, pour finir par hiverner en Baie de Douarnenez.

(1) Rue de l'Orme 23, B - 1040 Bruxelles. E-mail : Renaud.Flamant@skynet.be

(2) Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), PO Box 8039, NL - 4330 EA Middelburg. Pays-Bas.

E-mail : p.l.meininger@rikz.rws.minvenw.nl