

- RADFORD, A.P. (1984) : Rooks chasing small bats. *Brit. Birds*, 77 : 119 -120.
- ROSAIR, D.B. (1975) : Swallows chasing bats. *Brit. Birds*, 68 : 248.
- RUPRECHT, A.L. (1993) : Breitflügelfledermaus (*Eptesicus serotinus*) von Mauerseglern (*Apus apus*) angegriffen. *Nyctalus (N.F.)*, 4(6) : 669 - 670.
- SKIBA, R. (1987) : Erster Nachweis einer Zweifarbfledermaus, *Vespertilio discolor* Natterer, im Bergischen Land. *Natur und Heimat*, 47 : 147 - 149.
- TUGENDHAT, M. (1966) : Swallows mobbing Pipistrelle Bat. *Brit. Birds*, 59 : 435.
- TUGENDHAT, M. (1967) : Swallows mobbing Pipistrelle Bat. *Brit. Birds*, 60 : 174-175.
- VIEWEG, A. (1989) : Kleiber beteiligt sich an der Fütterung einer Starenbrut. *Falke*, 36 (5) : 164 - 165.
- ZUCCHI, H. (1977) : Notizen zum Anhasen von Fledermäusen durch Kleinvögel im Winter. *Anz. orn. Ges. Bayern*, 16 : 187 - 190.

Capture d'une Taupe (*Talpa europaea*) par un Epervier (*Accipiter nisus*)

par François LE HARDY DE BEAULIEU¹

Achêne-Taviet, 14 octobre 1998. Par la fenêtre du salon, je vois arriver à ma droite, un peu en contrebas, une jeune femelle d'Epervier. Je la vois presque par dessus. Elle rase le sol à un mètre de haut environ et file ainsi sur une soixantaine de mètres avant de donner un petit coup de "frein". Le temps pour moi de remarquer que, sous elle, une Taupe est en train de courir entre deux taupinières, dégoûtée sans doute par les grosses quantités d'eau infiltrées dans le sol ces derniers jours, très pluvieux. D'un crochet sur l'aile improvisé, l'Epervier tombe sur la taupe et reste posé là quelques instants, le temps de donner quelques coups de bec "distracts" dans sa proie, de repartir en l'emportant puis de disparaître de ma vue.

Il est bien connu que les mammifères ne représentent en général qu'une infime part du régime alimentaire de l'Epervier : moins de 3 % selon les divers auteurs cités par CRAMP & SIMMONS (*The Birds of Western Palearctic*, vol. 2, 1980) et par Géroudet (*Les rapaces diurnes et nocturnes d'Europe*, 1965). Dix-sept espèces sont répertoriées, dont les campagnols et jeunes lapins, les plus fréquents, et la Taupe, tout à fait occasionnelle. Plus précisément, UTTENDÖRFER (1952 : *Neue Ergebnisse über die Ernährung der Greifvögel und Eulen*. Neumann-Neudamm) a trouvé 2,3 % de mammifères sur 59.463 proies en période de nidification et GLUTZ *et al.* (1971 : *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Band 4), citant TINBERGEN (1964 : *Ardea*, 34 : 1- 213) et UTTENDÖRFER (1952, op. cit), donnent 5 taupes pour 1.521 mammifères. Dans le cas présent, il apparaît clairement que la capture n'était pas préméditée : la taupe est sortie de terre juste au mauvais moment et la décision de l'attaquer a été prise en réaction immédiate, pour profiter de l'opportunité. Ce genre de réaction est d'ailleurs chose courante chez l'Epervier, lors de ses vols d'exploration, mais plutôt dirigé vers des oiseaux.

SUMMARY - Catching of a mole (*Talpa europaea*) by a Sparrowhawk (*Accipiter nisus*).

(1) Le Moulin de Taviet, B - 5503 Dinant.