

Centrale ornithologique Aves¹

Observations : de décembre 1999 à février 2000

Conditions météorologiques

La prédominance de masses d'air maritime associées à des dépressions est à l'origine d'un excès des températures durant presque tout l'hiver. Ce climat doux et pluvieux est interrompu deux fois par des courants maritimes d'origine polaire, devenant ensuite continentaux du 14 au 22 décembre et du 14 au 28 janvier.

Le mois de décembre fut fort pluvieux et les moyennes régionales des précipitations furent toutes supérieures aux normales. Les précipitations furent en tout ou en partie accompagnées de neige pendant 21 jours et donnèrent lieu à des enneigements du 04 au 06 et du 13 au 31, principalement sur les hauts plateaux. Le médiocre dégagement du ciel entraîna une durée d'ensoleillement inférieure à la normale. Les vents furent orientés principalement dans les secteurs OSO à O.

Les moyennes régionales des précipitations du mois de janvier furent par contre inférieures aux normales. Durant 14 jours, les précipitations furent en tout ou en partie de neige, entraînant un enneigement du 14 au 16 et du 20 au 29, principalement sur les hauts plateaux. Le ciel fut dégagé durant la première et la dernière décades du mois et la durée de l'ensoleillement fut légèrement supérieure à la normale. Les vents furent orientés principalement dans les secteurs SSO à OSO et NO à NNO.

Le mois de février fut fort pluvieux et les moyennes régionales des précipitations furent toutes supérieures aux normales, comme en décembre. Les précipitations furent en tout ou en partie accompagnées de neige durant 15 jours. Elles donnèrent lieu à un enneigement du 09 au 13 et du 16 au 23, principalement sur les hauts plateaux. Le ciel fut toutefois bien dégagé au cours des deux dernières décades, entraînant donc une durée d'ensoleillement supérieure à la normale. Les vents furent orientés principalement dans les secteurs SSO à OSO.

FAITS SAILLANTS

Des migrations se sont terminées en décembre : derniers passages de Cormorans, Oies cendrées, Grues. L'hiver doux et pluvieux a permis l'hivernage ou l'essai d'hivernage pour plusieurs oiseaux (Busard des roseaux, Chevalier guignette, Serin cini...), mais nous a du même coup amené peu d'hivernants nordiques (Busard Saint-Martin, aucune Corneille mantelée). Les quelques jours

(1) Centrale Ornithologique Aves. c/o Maison Liégeoise de l'Environnement, rue Fusch 3, B - 4000 Liège.
e-mail : coa@aves.be

de froid n'ont pas provoqué de réel afflux de Goélands cendrés, de harles et de garrots, pour ne citer qu'eux. Nous avons cependant eu quelques visiteurs remarquables : rares, en nombre ou observés à une date inhabituelle.

Peu d'oiseaux plongeurs sortent du lot : un Plongeon catmarin le 02.12 aux BEH, jusqu'à 4 Grèbes jougris à Harchies et un esclavon du 27.01 au 13.02 en Meuse. L'hivernage du Grand Cormoran se place dans la ligne des précédents, tout comme celui des quelques Butors et Grandes Aigrettes. Certains grands échassiers nous surprennent par les dates d'observation : une Cigogne blanche début décembre, un Bihoreau le 20.12, une Aigrette garzette à Harchies en janvier et à Nimy en février. Pour les deux premiers, l'interprétation reste difficile en raison des populations introduites, peu migratrices, dans les régions voisines. Les données de Garzettes se placent dans le contexte de la progression de l'espèce vers le nord. Côté anatidés, maximum 14 Cygnes de Bewick hivernèrent à Harchies et 19 Cygnes chanteurs à Roly. Un autre Cygne chanteur fut trouvé à Ciergnon. Plusieurs vols d'Oies des moissons furent observés, ce qui était devenu rare ces derniers hivers. L'hivernage des canards de surface et fuligules fut faible dans son ensemble. Aucun Nyroca ne fut trouvé, par contre il y eut un Fuligule à bec cerclé hivernant entre les sites de Ploegsteert et Warneton. Parmi les rapaces, une Buse pattue a hiverné à Focant et une autre a été vue à Harchies. Une donnée hivernale de Balbuzard est, quant à elle, tout à fait exceptionnelle.

Tout aussi exceptionnels sont les Grands Labbes observés à Oost-Maarland et à Latour. Les Jaridés, dont essentiellement les goélands "à pattes jaunes", furent bien suivis et donnèrent des résultats intéressants, qui mettent en évidence depuis quelques années des changements de proportions des espèces présentes. Ainsi, les Goélands argentés se font de moins en moins nombreux alors que les leucophées/pontiques augmentent : un phénomène à suivre. Quelques mentions de Goélands marins, Mouettes mélanocéphales et une Mouette tridactyle.

Les passereaux que l'on appelle parfois "hivernants méditerranéens" laissent de petits contingents sous nos latitudes par temps doux. Ainsi, plusieurs Pouillots véloces ont hiverné, plusieurs données de Rougequeue noir; la Grive musicienne fut notée tardivement en Famenne; le Traquet pâtre et la Fauvette à tête noire fournirent également des données hivernales. Peu de beccroisés. Abondance assez normale d'autres hivernants, même s'ils ne sont que fort imparfaitement renseignés.

Quelques débuts de migration sont notés en janvier (Oie cendrée le 23, Vanneaux et Pluviers dorés en fin de mois), tandis que des nicheurs réoccupent leurs territoires ou nids (Héron cendré dès fin décembre). Les amorces apparentes de passage en février sont assez classiques : Grue le 5, Huitrier et Alouette lulu le 6, Milan royal le 9, Bergeronnette grise le 20, Combattant et Barge à queue noire le 25.

Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre-Sambre-et-Meuse, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf précision utile.

DETAIL DES OBSERVATIONS

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*) : 1 ex. le 02.12 aux BEH.

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : Obourg reste un site important d'hivernage avec 25 à 35 ex. durant l'hiver, tout comme les

rivières avec par exemple l'Ourthe, qui totalise 33 ex. de Comblain à Tilff le 15.01. • **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : environ 170 hivernants en Hainaut occidental, 180 ex. le 02.01 à Oost-Maarland, 150 ex. le 29.01 aux BEH. Ailleurs, toujours moins de 50 oiseaux. Rare en

province de Luxembourg en hiver : 1 ex. les 19 et 21.12 à Beho. • **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : 2 ex. du 01 au 05.12, 1 ex. le 06.12, 3 ex. le 26.01 et 4 ex. le 15.02 à Harchies, 1 ex. du 01 au 26.12 et le 09.01 à Pommeroeul (sur le canal). • **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*)* : 1 ex. du 27.01 au 13.02 à Herstal.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : derniers migrateurs actifs le 13.12 en Hainaut occidental. Côté dortoirs : maximum 836 ex. le 15.01 à Chertal, 668 ex. le 15.01 à Jambes, 410 le 04.12 à Gives. La population hivernante totalise environ 3.500 ex. A Anseremme, un couple construit un nid à partir du 13.02 mais l'abandonnera plus tard).

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) : au minimum 1 hivernant, 2 ex. le 18.12 et 5 ex. le 25.01 à Harchies; 1 ex. le 03.01, 3 ex. le 27.01 et 2 ex. le 06.02 à Roly. • **Bihoreau gris** (*Nycticorax nycticorax*) : 1 subadulte en vol le 20.12 à Harchies. Cette date surprenante cache peut-être une origine suspecte de l'oiseau. • **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*)* : 1 ex. les 03 et 04.01 à Harchies et 1 ex. en vol le 06.02 au Grand Large de Nimy. La progression de l'espèce permet depuis peu de l'observer chaque année en Wallonie, même en hiver. • **Grande Aigrette** (*Egretta alba*) : minimum 1 hivernante, 2 ex. le 09.01, 4 ex. le 05.02, 2 ex. les 06, 13 et 27.02 à Harchies; 1 ex. en vol le 01.01 à Douvrain. • **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : en Hainaut occidental, maximum 53 ex. le 13.02 à Harchies. Réoccupation des nids dès le 28.12 à Jambes puis le 15.01 en région bruxelloise.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : première hâtive : 5 ex. le 27.02 vers le NE le 27.02 à Amay. • **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : 1 ex. d'origine inconnue le 02.12 à Mont-Saint-Guibert.

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) : la vallée de la Lys reste un gros noyau d'hivernage avec 42 ex. le 15.01 à Warneton, 54 ex. le 02.02 à Ploegsteert. Ailleurs, 25 ex. en décembre à Oost-Maarland, sinon toujours moins de 10 ex. ensemble. • **Cygne de Bewick** (*Cygnus be-*

wickii) : uniquement à Harchies : 9 ex. présents depuis le 01.11 séjournent jusqu'au 25.12, 11 ex. le 05.12, 14 ex. le 06.12; ensuite diminution avec 6 ex. le 27.12, 2 ex. le 29.12 puis remontée à 8 ex. jusqu'au 25.02. 4 ex. les 26 et 27.02 (dernière date d'observation). • **Cygne chanteur** (*Cygnus cygnus*) : à Roly, 5 ex. jusqu'au 11.12 puis augmentation progressive pour arriver à maximum 19 ex. en février. Ailleurs, 1 ex. le 15.01 à Ciergnon. • **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) : 7 ex. vers le SE le 22.12 à Martouzin-Neuville, 1 ex. vers le N le 26.12 à Herseaux, 2 ex. du 21 au 31.01 à Warneton, 1.850-1.900 ex. en 15' vers l'O le 26.12 et 4 ex. posés le 13.02 à Oost-Maarland, 33 ex. le 05.01 à Torgny et 71 ex. vers le NE le 30.01 à Gaurain-Ramecroix. • **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) : 54 ex. en vol le 26.12, 3 ex. le 16.01, 5 ex. le 06.02 et 8 ex. le 26.02 à Oost-Maarland; 12 ex. le 02.01 à Castillon. • **Oie cendrée** (*Anser anser*) : dernière vague de passage avec un total de 121 ex. du 05.12 au 30.12 en Hainaut occidental. A Oost-



Grands Cormorans au dortoir de Chanxhe, janvier 2000 (R. Dumoulin)

Maarland, des oiseaux séjournent en janvier avec 37 ex. le 02 puis 36 ex. le 16. Le passage pré-nuptial débute le 23.01 avec 5 ex. vers l'est à Genappe 30.01 suivi de 50 ex. vers le NE le 30.01 à Nimy. En février, jusqu'à 9 ex. à Tavier pendant la première décade et plusieurs vols, dont maximum 100 ex. le 14 à Bléharies. • **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : hivernage classique sur 7 sites en Hainaut occidental avec des maxima de 26 ex. le 03.02 à Warcoing, 23 ex. le 02.01 à Gaurain-Ramecroix, 11 ex. le 05.12 à Harchies. Hors Hainaut, maxima de 22 ex. le 30.12 à Vilvorde, de 6 ex. le 08.01 à Genappe sinon toujours moins de 4 ex. (Saint-Ghislain, Waremme, Hollogne-sur-Geer, La Hulpe, Genappe, Neerpede).

Canard siffleur (*Anas penelope*) : petit hivernage classique : le Hainaut occidental et les BEH abritent la majorité des hivernants avec les maxima de 88 ex. le 15.01 à Ploegsteert, 80 ex. le 19.12 et 65 ex. le 27.02 à Harchies, 67 ex. le 15.01 à Quévy-le-Grand, 52 ex. le 06.02 aux BEH et 46 ex. le 23.01 à Obourg. En dehors de ces sites, maximum 6 ex. le 26.02 à Virelles. • **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : Harchies est le noyau d'hivernage de l'espèce avec une

vingtaine d'hivernants et des maxima ponctuels de 48 ex. le 18.12, 99 ex. le 29.12, 36 ex. le 03.01, 35 ex. le 15.01. Autres sites importants avec leurs maxima : Oost-Maarland (50 ex. le 26.12), Ploegsteert (51 ex. fin février), Warneton (27 ex. en janvier) et les BEH (25 ex. le 09.01). Ailleurs, toujours moins de 10 ex. • **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : les effectifs sont assez élevés dès la mi-décembre avec des maxima locaux de 360 ex. le 26.12 à Waremme et 160 ex. le 13.12 aux Marionville. Sur les autres sites majeurs d'hivernage que constituent Latour et Harchies, les effectifs sont les plus importants début février avec 97 ex. le 10 pour le premier et 150 ex. le 06 pour le second. D'autres sites accueillent l'espèce durant tout l'hiver mais il n'y a jamais plus de 100 oiseaux excepté à Virelles où l'on en dénombre 164 ex. le 23.01. • **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : l'hivernage culmine durant les deux dernières décades de décembre avec notamment 800 ex. le 12 à Waremme, 623 ex. le 19 à Gaurain-Ramecroix, 517 ex. le 30 à Latour, 330 ex. le 26 à Virelles et 326 ex. le 19 à Genappe. • **Canard pilet** (*Anas acuta*) : quelques données mais jamais de plus de 3 ex. aux BEH, à La Gileppe, à Latour, Hollogne-sur-Geer, Genappe, Harchies, aux Ma-



Oie des moissons (A.C. Zwaga)

ronville, à Roly, Virelles et Warcoing. Une donnée fait exception : 7 ex. le 20.02 à Virelles.

• **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : Harchies est le site principal d'hivernage (40 à 100 ex.) et totalise maximum 140 ex. le 25.01. Ailleurs, nous retiendrons 44 ex. le 15.01 à Ploegsteert, 21 ex. le 05.12 à Waremme. 18 ex. le 31.12 à Meise et 8 ex. le 13.12 à Moyen.

Milan royal (*Milvus milvus*) : premier migrateur le 09.02 à Amay puis seulement une dizaine d'oiseaux renseignés en février, tous à l'est de la Meuse. • **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : 1 ex. le 10.01 à Oost-Maarland, puis 2 isolés les 03 et 06.02 à Harchies.

• **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : avec environ 75 données, l'hivernage peut être qualifié de médiocre à l'instar de celui de l'année précédente. Aucun dortoir n'est signalé. Premiers migrateurs le 27.02 à Velaine. • **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : des parades nuptiales sont notées en février, le 05 à Comblain-la-Tour, le 11 à Roisin et le 27 à Awagne.

• **Buse variable** (*Buteo buteo*) : hivernage plus important que les années précédentes, notamment en Condroz, en Famenne et dans la vallée de la Semois. Premières parades fin février à Awagne et à Han-sur-Lesse. • **Buse pattue** (*Buteo lagopus*) * : à Focant, 1 femelle subadulte est trouvée le 03.01 puis séjourne jusqu'au 20.03 tandis qu'un ex. passe le 25.02 à Harchies.

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*) : donnée exceptionnelle d'un oiseau de passage le 12.01 à Hodister (Chéoux).

Faucon émerillon (*Falco columbarius*) : des isolés les 07 et 13.02 à Angre, les 18.12 et 02.01 à Hologne-sur-Geer, le 12.01 à Warneton, le 27.01 à Bierset, le 16.02 à Faimies, les 22 et 29.02 à Erneuveille. • **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : une bonne trentaine de mentions dont plusieurs concernent des couples présents en janvier-février sur différents sites de nidification potentiels ou avérés. L'espèce est régulière en décembre autour de la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. Un accouplement est noté le 26.02 au Val-Saint-Lambert (Seraing).

Rôle d'eau (*Rallus aquaticus*) : une dizaine d'exemplaires en janvier, 6 en février dont plusieurs chanteurs à Harchies. Ailleurs, il est signalé sur 7 sites, majoritairement en Brabant. Hivernage complet d'un oiseau dans un bassin d'orage à Nodebais. • **Poule d'eau** (*Gallinula chloropus*) : faible hivernage, aucun mouvement ni concentration notables n'étant signalés.

• **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : quelques sites bien suivis montrent des effectifs fluctuant au gré des passages et déplacements. A Harchies, les chiffres oscillent entre 250 ex. (début décembre et fin février) et 100 ex. (début janvier). Si la concentration la plus importante est notée à Ploegsteert (860 ex. à la mi-janvier), beaucoup d'autres sites dépassent la centaine d'oiseaux : par exemple, en Brabant, La Hulpe (Gris Moulin - 120 à 190 ex.), les étangs Mellaerts (Auderghem) et la vallée de la Woluwe (plus de 400 ex.); au barrage de La Gileppe dans l'Est (150 ex. début janvier). Sur l'étang de Taviet à Achêne, de futurs nicheurs arrivent en février.

Grue cendrée (*Grus grus*) : en décembre, une arrière-garde tardive comportant plusieurs groupes de nombre indéterminé est notée le 04 à Rochefort, le 13 à Sourbrodt et le 22 à Hodister. Le passage printanier débute tôt, dès le 05.02 avec 11 ex. à Ombret et 18 ex. à Gomery. Après quelques vols entre le 21 et le 23.02, le passage s'intensifie brusquement pour atteindre un pic le 27.02, le tout en Ardenne et en Gaume; ainsi, 700 ex. le 25 à Battincourt suivis de plusieurs vols nocturnes, de 300 ex. à Arlon, 2.000 ex. à Habay-la-Neuve et 600 ex. à Heinsch le 26. Enfin, l'apothéose avec plus de 50 vols signalés le 27 pour un total approximatif probable de 15.000 oiseaux. En dehors du couloir de migration, 40 ex. le 28 à Thuillies.

Huitrier pie (*Haematopus ostralegus*) : l'occupation du site de nidification d'Oost-Maarland (côté Pays-Bas) se manifeste par la présence d'un exemplaire dès le 06.02; ils y sont 2 le 19.02.

Pluvier doré (*Phlvialis apricaria*) : observations régulières jusqu'au 04.01 en Hainaut occidental (max. 61 ex. le 26.12 dans les champs

d'Escanaffles). Cette espèce remonte tôt vers le nord : 2 ex. le 18.01 à Marche-en-Famenne, 1 ex. le 05.02 à Xhendremael. Au total, plus de 1.400 ex. sont mentionnés en février, dont plus de la moitié dans le Hainaut occidental. Nombres les plus importants : 180 au Gerny (Marche-en-Famenne) le 25.02, 115 ex. en mouvement vers le nord-est la journée du 15.02 à Roisin. • **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : des rassemblements sont notés un peu partout en décembre et janvier. Ils sont importants surtout en Hainaut occidental (1.100 le 08.12 à Herseaux, 1.500 ex. le 31 à Pottes). Pour les autres régions, les nombres sont plus modestes (max. 250 ex. le 22.12 à Marche-en-Famenne). La migration pré-nuptiale devient sensible dès la fin janvier (500 ex. le 31.01 à Marche, 1.100 le 02.02 à Tournai, 1.000 le 03.02 à Warneton). Elle devient importante dans la seconde quinzaine de février avec 2.460 ex. répartis en 28 groupes en 2 h le 15 à Angreau, 705 ex. en 1 h 45' le 21 à Roisin, 1.000 ex. le 20 et 2.500 le 25 au Gerny (Marche), 2.500 à 3.000 ex. à Renaumont et de 2 à 3.000 à Remoifosse le 26. Des manifestations territoriales sont notées dès le 06.02 à Sourbrodt; un ex. parade à l'écluse de Pommeroel le 20 et des vols nuptiaux sont notés à Douvrain le 27.

Bécasseau variable (*Calidris alpina*) : seulement deux mentions : 1 ex. le 25.02 à Gaurain-Ramecroix et Warneton. • **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : quelques mentions (22 ex. au total dont 7 à Renaumont) de migrants pré-nuptiaux dès le 25.02. • **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : une quinzaine d'ex. de cette espèce discrète sont signalés du 20.12 au 13.02, surtout en province du Luxembourg. • **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : l'hivernage est décelé surtout en province du Luxembourg (maxima : 47 ex. le 19.12 à Libramont, 46 ex. les 29.12 et 02.01 à Boeur, 46 ex. le 05.01 à Dampicourt) et en Hainaut occidental (maxima : 97 ex. le 22.01 aux Prés d'Amour de Warchin, 94 ex. le 25.02 au Pont Cocu (Pommeroel). • **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : espèce très discrète en hiver et peu renseignée : 25 ex. au total de la période, dont 8 levés à Angre le 11.12. • **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : la migration débute le 25.02 avec 19 ex. à Roisin; au total, il y passera 107 oiseaux du 25.02 au 14.03 : record régional. • **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : deux observations sur l'hiver : 13 ex. à Oost-Maarland le 02.01 et 1 ex. en vol le 26.02



Bécassine des marais (A.C. Zwaga)

à Maubray. • **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : quelques hivernants sont régulièrement observés sur des sites habituels : de 6 à 9 ex. à Warcoing, de 1 à 4 à Hensies, de 1 à 3 aux décanseurs de Genappe, de 1-2 à Escanaffles, 1 à Maisières, Latour et Etalle. D'autres mentions ponctuelles à Hollogne-sur-Geer (2 ex. le 09.01), aux BEH (1 ex. le 02.01), aux Marionville (1 le 05.02) peuvent aussi correspondre à des hivernages non suivis. • **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : également quelques hivernants régulièrement observés (1 à 2 à Hermalle-sous-Huy, 1 à Maisières, 1 à Obourg) et une mention ponctuelle (1 ex. à Vivegnis le 31.01)

Grand Labbe (*Catharacta skua*)* : 1 ad. le 30.12 à Oost-Maerland et 1 imm. du 01 au 03.01 à Latour. Cette dernière constitue la première donnée "réellement" wallonne, l'espèce ayant déjà été mentionnée à quelques reprises sur le site frontalier hollandais d'Oost-Maerland. En hiver, l'espèce est peu nombreuse en Manche et mer du Nord. Des oiseaux s'égarer parfois dans l'intérieur : par exemple en France, une vingtaine de mentions sur tout le territoire dont une série d'oiseaux originaires de Foula (Ecosse).

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) * : l'espèce est devenue un visiteur annuel en très petit nombre en Wallonie : 1 ex. de 2^{ème} hiver le 02.12 aux BEH, 1 ad. le 13.02 à Obourg et 1 ex. de 2^{ème} été le 24.02 à Eghezée-Longchamps. • **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : comptage aux dortoirs : 6.000 ex. le 04.12 à Obourg, 5.000 à 7.000 ex. le 09.01 aux BEH, 2.500 à 3.000 ex. le 22.02 au Lac de Genval, 1.786 ex. le 17.01 à Gaurain-Ramecroix et 1.500 à 2.000 ex. le 06.02 à Nimy. Premiers comportements territoriaux le 25.02 à la colonie d'Hensies. • **Goéland cendré** (*Larus canus*) : pas de réel afflux cet hiver bien que les effectifs aient augmenté fin janvier : maximum 600 ex. le 29.01 à Obourg, où il y en avait 300 ex. le 22.12, et 200 ex. le 26.01 à Nimy. • **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : le gel de la mi-décembre provoque le départ de la plupart des oiseaux. A Obourg, on passe ainsi de 350 ex. le 04.12 à 10 ex. le 22.12.

Les effectifs réaugmentent fin janvier début février : maximum 92 ex. le 06.02 à Virelles et 53 ex. le 28.01 à Gaurain-Ramecroix. • **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : la diminution des effectifs hivernants remarquée les années précédentes en Basse-Meuse continue et s'observe maintenant également en Hainaut occidental. A Obourg, les dortoirs comptent 150 ex. le 04.12, 300 ex. le 15.12 et 305 ex. le 16.01. Ailleurs, 115 ex. le 21.01 à Nimy, 50 ex. le 28.12 à Lixhe et le 22.02 au lac de Genval. Des adultes isolés de la sous-espèce *L. a. argentatus* sont identifiés le 11.12 et le 23.12 sur le canal d'Hensies à Pommeroeul et le 15.12 à Obourg. L'oiseau du 23.12, porteur d'une bague colorée, a été bagué comme pullus le 02.08.96 à Lappepennant dans le sud-est de la Finlande. • **Goéland leucophée** (*Larus c. michaellis*) : plus rare en hiver que le Pontique, quelques oiseaux sont néanmoins repérés : 1 ad. le 11.12 et 2 ex. le 23.01 à Amay, 7 ex. le 12.12 à Gaurain-Ramecroix, 1 ad. le 20.12 à Breuvanne, 2 ex. le 22.01 à Oost-Maerland, jusqu'à 4 ex. le 23.01 à Obourg, 1 ex. le 27.01 aux BEH et 1 ad. le 06.02 à Roly. • **Goéland pontique** (*Larus c. cachinnans*) * : la Basse-Meuse accueille toujours autant d'oiseaux en cette saison : 30 ad., 2 ex. 1^{er} hiver, 2 ex. 2^{ème} hiver et 1 ex. 3^{ème} hiver le 11.02, 14 ad. et 1^{er} hiver le 22.02. En Moyenne-Meuse, 1 ad. le 12.12 et le 26.02 à Seraing, 1 ad. le 15.01, 1 ex. 2^{ème} hiver le 05.02 et 2 ad. le 13.02 à Tihange et 1 ad. le 13.02 à Gives et à Engis. Les autres données proviennent du Hainaut : 1-2 ex. du 11 au 25.12 puis du 16 au 27.01 sur le canal d'Hensies à Pommeroeul, 1 ex. le 15.12 à Nimy, 1-2 ex. du 18 au 27.12 à Obourg, 1 ex. le 02.01 à Gaurain-Ramecroix, 1 ex. le 15.01 à Harchies, 1 ex. du 15.01 au 15.02 à Warneton, 2 adultes le 27.01 aux BEH et 1 ad. les 12 et 27.02 à Péronnes-lez-Antoing. • **Goéland marin** (*Larus marinus*) : 1 ad. les 19 et 25.12 à Gaurain-Ramecroix, le 03.01 à Tournai et le 12.01 à Warneton. • **Mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*) : 1 ad. mazouté le 26.12 à l'écluse d'Hensies.

Pigeon colombin (*Columba oenas*) : reprise de l'activité territoriale au début du mois de février. • **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : espèce notée très souvent, dans toutes les ré-

gions, avec quelques dortoirs imposants comme 3.000 ex. à Givry et 2.700 ex. à Laeken. Retours de migration notés le 05.02 à Genappe et le 23.02 à Roisin. • **Tourterelle turque** (*Streptopelia decaocto*) : une concentration de 100 ex. sur 300 m de rues est observée à Angre durant tout l'hiver.

Grand-Duc d'Europe (*Bubo bubo*) : entendu à Comblain-au-Pont et à Pailhe du 15.01 au 29.02. • **Chouette chevêche** (*Athene noctua*) : un individu chanteur "répondant" aux pétaards des fêtes de fin d'année et annonçant le nouveau millénaire à Daussoulx; un autre ex. chantant en plein soleil le 11.02 à Maransart; un accouplement le 08.02 à Celles. • **Hibou moyen-duc** (*Asio otus*) : le dortoir de Warneton accueille un maximum de 8 individus. Premier chanteur entendu le 15.01 à Vichenet. • **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : en province du Luxembourg, deux données en provenance de Moinet* le 11.02 et de Bourcy* le 25.02.

Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*) : l'espèce a reconstitué ses effectifs après les hivers doux de ces dernières années : 104 données (de 1 à 4 ex.) en provenance de toutes les régions pour cet hiver.

Pic vert (*Picus viridis*) : plusieurs chanteurs sont déjà entendus au mois de décembre. Généralisation des chants en février pour cette espèce qui se porte décidément bien. • **Pic noir** (*Dryocopus martius*) : un exemplaire en vol au-dessus de l'autoroute à Saint-Ghislain le 27.12. Premier chanteur à Sclaigneaux le 09.01. • **Pic épeiche** (*Dendrocopos major*) : premier tambourinage timide le 15.01 à Hyon-Spiennes. • **Pic mar** : renseigné surtout dans le Hainaut (Angre, Bon-Secours, Colfontaine) et dans le Luxembourg (Chiny, Chéoux, Journal, La Forge) au nourrissage hivernal. • **Pic épeichette** (*Dendrocopos minor*) : relativement peu de données (Oost-Maarland, Aineffe, Awagne, Grune, Chéoux, Audregnies) pour cette espèce discrète.

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : l'espèce est renseignée à partir du 06.02 à Aix-sur-Cloix.

Un chanteur au marais d'Harchies le 20.02; 9 ex. le 26.02 à Bon-Secours; 2 couples cantonnés au camp militaire de Marche-en-Famenne le 20.02. • **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : 50 à 100 ex. hivernent au Gerny près de Marche. Des stationnements à Angre, Harzé, Audregnies, Hermée, Relegem, avec également quelques chanteurs sporadiques le 06.02 à Bierset ou le 13.02 à Frasnes-lez-Buissenal. A noter un exemplaire atteint d'albinisme partiel symétrique dans les ailes et rappelant un Bruant des neiges à Angreau le 22.12.

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) : quelques beaux groupes : 36 ex. au dortoir aux BEH le 02.12, 50 ex. à Angre le 13.12, 80 ex. à Villers l'Évêque le 23.01, 45 ex. à Othée le 05.02 mais aussi 11 ex. à Aubange (espèce rare en hiver en Lorraine) : l'espèce était sans doute présente dans toutes les régions cet hiver ! Premier chanteur à Marche-en-Famenne le 20.02. • **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : l'espèce est renseignée surtout en Hainaut occidental, en province de Luxembourg et dans l'est de la province de Liège. Un dortoir de 100 oiseaux environ est observé à Harchies le 05.02. • **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : des hivernants traditionnels le long de la Meuse mais signalés aussi, cette année, sur divers étangs, ruisseaux, décanteurs et canaux, dans toutes les régions. • **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : le dortoir de Mons reste le mieux fréquenté de Wallonie (120 ex. le 19.12, 153 ex. le 28.12, 120 ex. le 15.02 et 80 ex. le 20.02). Ailleurs, les observations sont régulières mais en quantité variable : 17 ex. à Tibange le 27.12, 1 ex. à Martué en Moyenne Semois. Les premiers retours s'amorcent à partir du 23.02 à Roisin et Battincourt.

Jaseur boréal (*Bombicilla garrulus*) : 1 ex. le 02.02 à Philippeville.


Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : quelques données hivernales d'isolés : les 05.12, 04 et 15.01 au barrage de la Gileppe, le 28.12 à Obourg, le 27.12 à Erneuveville, le 31.12 à Tertre et le 07.02 à Metzert. • **Traquet pâtre** (*Saxicola torquata*) : 1 ex. du 11 au 20.01 à War-

neton puis retour dès le 20.02 avec 1 ex. à Escanaffles puis le 25.02 à Hermalle-sous-Huy, le 27 à Douvraim, à Visé et à Florenville et le 29 à Battincourt. • **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : quelques bandes remarquables, mais néanmoins normales, à partir de janvier en Ardenne : 1.000 ex. le 09.01 à Louette-Saint-Denis et le 22.01 à Boeur, où il y en aura 3.000 le 26.02. • **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : encore 4 ex. le 06.12 à Marche-en-Famenne, région où l'espèce n'hiverné pas normalement. • **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : pas de grosses concentrations durant cet hiver doux : maximum 250 ex. le 29.02 à Hamoir.

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : 7 chanteurs en janvier et février à Harchies. • **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : 1 ex. le 08.01 à Uccle et 1 ex. à partir du 27.01 à Jette; ce dernier se nourrit de baies de houx et, à la mangeoire, sur des boules "pour mésanges". • **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : l'hiver doux apporte de nombreuses données hivernales : 3 hivernants à Harchies, 1 ex. le 04.12 à Moyen, 1 ex. le 07.12 à Baudour, 3 ex. le 18.12 et 1 ex. le 16.01 à Oost-Maarland, 1 ex. le 28.12 à Anderlecht et

à Woluwe-Saint-Lambert, 1 ex. le 15.01 à Genappe et à Thieu, 1 ex. le 16.01 à Jannée, 1 ex. les 19 et 26.01 à Warneton et 1 ex. le 21.01 à Renaumont. Le retour débute le 26.02 avec 1 ex. à Ombret-Rawsa suivi de plusieurs données les jours suivants.

Mésange à longue queue (*Aegithalus caudatus*) : les couples commencent à s'isoler le 02.02 à Aywaille, où un oiseau à tête blanche est observé pour le deuxième hiver consécutif. Migration rampante de 3 ex. le 23.02 à Quévy-le-Grand. • **Mésange nonnette** (*Parus palustris*) : premiers chants le 17.01 à Awagne, le 13.02 à Hyon et le 18.02 à Hamois. • **Mésange boréale** (*Parus montanus*) : premiers chants le 23.01 à Harchies, le 26 à Libramont et le 18.02 à Hamois. • **Mésange noire** (*Parus ater*) : premiers chants le 25.01 à Aywaille, le 24.02 à Chéoux. Retour massif de migration le 15.02 à Spa. • **Mésange bleue** (*Parus caeruleus*) : un groupe d'une centaine d'oiseaux le 18.12 en forêt de Bonsecours. Après des premiers chants hâtifs le 22.12 à Uccle, c'est à partir du 08.01 qu'ils deviennent plus fréquents. • **Mésange charbonnière** (*Parus major*) : les chants reprennent dès la fin du mois de décembre (le 29.12 à Uccle).



Mésange charbonnière, janvier 1998 (F. Renard)

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) : premiers chants le 14.02 à Nassogne et premières parades le 21.02 à Chéoux.

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) : premiers chants le 13.02 à Awagne et à Harchies où deux couples paradent le 25.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : 70 données cet hiver, soit le double de l'hiver précédent. Les 35 données de février comprennent partiellement les premiers retours. La majorité des observations, réparties dans les régions habituelles, concernent des oiseaux isolés. Quelques exceptions : 2 ex. le 13.01 à la Croix-Scaille et à Focant, 3 ex. le 16.01 à Boeur, 2 ex. le 18.01 à Marche-en-Famenne, 2 ex. le 06.02 à Robertville, 3 ex. le 13.02 à Gedinne, 10 ex. le 31.01 en Moyenne Semois et 10 ex. le 20.02 au camp militaire de Marche (record du lieu).

Pie bavarde (*Pica pica*) : quelques données de dortoirs : 175 ex. le 01.01 au Parc Roi Baudouin, 100 ex. le 02.01 à Laeken et le 07.01 au Beverbos, 50 ex. le 26.01 à Mons, 140 ex. le 26.01 à Nimy et 33 ex. le 18.02 à Marche-en-Famenne. Des oiseaux transportent déjà des matériaux pour leur nid le 27.12 à Liège.

• **Casenoix moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : des isolés à partir du 29.12 à Journal, Nasogne, Grand-Halleux, Solwaster, Aywaille et à la Croix-Scaille. • **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : (pré-)dortoirs importants en Hainaut occidental : 1.500 ex. le 05.12 à Mons (ville), 800 ex. le 29.12 à Harveng, 1.000 ex. le 03.01 à Givry et 1.300 ex. le 25.01 à Mons (arsenal). Le retour printanier débute durant la dernière décade de février. Choucas des tours de type oriental (*Corvus m. sommeringii*) : 2 ex. le 18.01 à Marche-en-Famenne, 1 ex. le 25.01 à Habay-la-Neuve et 2 ex. le 30.01 à Wardin.

• **Corbeau freux** (*Corvus frugilegus*) : (pré)dortoirs hennuyers : 1.700 ex. le 05.12 à Mons (ville), 1.000 ex. le 29.12 à Harveng et 2.000 ex. le 25.01 à Mons (arsenal). Premières activités dans les colonies le 11.01 à Marche-en-Famenne. Début des retours de migration durant la dernière décade de février. • **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : 1 ex. le 14.01 à Nothomb, 1 ex. le 16.01 à Wisembach, 2 ex. les 17 et 19.01 à Monceau-en-Ardenne et le 20.01 à la Croix-Scaille, 2 ex. le 13.02 à Gedinne et 1 ex. le

même jour à Dinez et 2 ex. en février à Mo-champs.

Moineau domestique (*Passer domesticus*) : dortoir de 100 ex. le 01.01 à Velaine.

• **Moineau friquet** (*Passer montanus*) : les groupes d'hivernants sont dans l'ensemble peu importants : 60 ex. le 15.12 à Angreau, 120 ex. le 29.12 à Boeur, 60 ex. le 06.02 à Wardin, 120 ex. le 16.02 à Angre et 100 ex. le 29.02 à Comblain-au-Pont.

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : hivernage relativement peu abondant, peu de grosses concentrations : 50 à 100 ex. le 12.12 à Genappe, 150 ex. le 09.01 à Noville et 80 ex. le même jour à Pommeroel. Premiers chants le 02.02 à Loncée et au Sart-Tilman. Les premiers migrateurs sont repérés le 13.02 à Pommeroel avec 7 ex. vers le N et retour massif le 26.02 à Malmedy. • **Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : hivernage peu abondant avec 4 données de plus de 10 oiseaux : 100 ex. le 15.12 à Ombret-Rawsa, 35 ex. le 19.12 à La Gileppe, 50 ex. le 15.01 à Tournai et 17 ex. le 02.02 à Ploegsteert. Remontée massive de migrateurs le 28.02 à Spa. • **Serin cini** (*Serinus serinus*) : 1 ex. en vol le 05.12 à Harchies; premiers retours dès le 23.02 avec 2 ex. à Ploegsteert. • **Verdier d'Europe** (*Carduelis chloris*) : dortoir de 86 ex. le 01.01 à Strombeek-Bever, 70 ex. le 06.12 à



Choucas des tours,
juillet 2001
(A. Joris)

Angreau, 150 ex. le 07.12 à Angre et 90 ex. le 09.01 à Liège. Il est peu abondant à l'est de la Meuse. Premiers chanteurs le 03.02 à Chéoux.

• **Chardonneret élégant** (*Carduelis carduelis*) : quelques groupes assez importants : 40 ex. le 05.12 à Oost-Maarland, 50 ex. le 31.12 à Hyon, 25 ex. le 08.01 à Ampsin et le 20.01 à Louette-Saint-Denis, 33 ex. le 06.02 à Harchies et 30 ex. le 19.02 à Halanzy. Un dortoir de 15 ex. le 12.02 à Fontenesbach. Premier chant le 26.02 à Awagne.

• **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : bon hivernage dans toutes les régions avec des maxima de 150 ex. le 05.12 à Roly, 200 ex. le 24.01 à Wyompont, 150 ex. le 26.01 à Comblain-au-Pont, 200 ex. le 01.02 à Ombret-Rawsa, 350 ex. le 13.02 à Oost-Maarland et 200 ex. le même jour à Hermalle-sous-Huy. A Ombret-Rawsa, deux oiseaux bagués proviennent de Norvège et de Lituanie. Le retour débute le 25.02 et s'amplifie fortement les jours suivants.

• **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : signalée en nombre seulement en Hainaut occidental : 40 ex. le 18.12 à Obourg, 60 ex. le 16.02 à Angre et 80 ex. le 17.02 à Tournai. • **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : observé principalement à l'est de la vallée de la Meuse avec des maxima de 12 ex. le 25.12 à Bastogne, 30 ex. le 15.01 à Tihange et 53 ex. le 17.01 à Malmedy. Ailleurs, 7 ex. le 01.01 à Uccle et 1 ex. le 13.02 au Kauwberg (Uccle). • **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : 21 ex. le 10.12 à Heyd, 2 ex. le 20.12 à Moinet, 3 ex. le 31.01 à la Croix-Scaille et le 07.02 à Angleur, 6 ex. le 27.02 à La Gileppe, 8 ex. le 28.02 à Louette-Saint-Pierre et

quelques isolés dans le sud-est du pays. • **Bouvreuil pivoine** (*Pyrrhula pyrrhula*) : bien répandu : 6 ex. le 04.12 à Wibrin et le 18.12 à Nisramont, 30 ex. le 06.12 au camp militaire de Marche, 12 ex. le 14.12 à Angre, 9 ex. le 29.12 à Galhausen, 10 ex. en décembre à Nassogne, 13 ex. le 03.01 à Comblain-la-Tour, 30 ex. le 09.01 aux BEH et 10 ex. le 26.02 à Bonsecours. Premier chanteur le 14.02 à Saint-Ghislain. • **Grosbec casse-noyaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : pas de grands groupes signalés : 2 de 50 ex. le 09.01 aux BEH, 35 ex. le 27.02 à Awagne, 18 ex. le 16.01 à Wisembach, 15 ex. le 25.02 à Chiny, 12 ex. le 15.02 à Spa; sinon jamais plus de 10 ex.

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) : bon hivernage en Hainaut occidental avec notamment 45 ex. le 20.01 à Angre. Dans la partie sud du pays, les groupes les plus importants sont de 120 ex. le 15.01 à Bebange, 100 ex. le 26.01 à Wardin et 70 ex. le 29.12 à Boeur. Premier chant le 17.02 à Pailhe. • **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : excepté le gros pré-dortoir de 150 ex. en novembre et décembre dans un bassin d'orage à Nodebais, l'hivernage apparaît faible ailleurs : sur la base d'observations en journée, jamais plus de 12 oiseaux. La migration est notée à partir du 20.02 à Warchin. • **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : peu de données : 45 ex. le 06.12 et 28 ex. le 15.02 à Angreau, 6 ex. le 03.02 à Gembloux, 2 migrateurs le 21.02 à Roisin et un chanteur le 26.02 à Ligny.

Oiseaux à plumage atypique

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : l'oiseau leucistique a à nouveau hiverné à Hermalle-sous-Argenteau. • **Corneille noire** (*Corvus*

corone) : 1 ex. "brun comme une poule faisanne" en février à Willaupuis Leuze-en-Hainaut.

Oiseaux échappés de captivité

Bernache du Canada (*Branta canadensis*) : observée sur les sites habituels avec maximum 54 ex. le 15.01 à Jambes. • **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) : 1 ex. le 28.12 aux

étangs Mellaerts et 14 ex. le 31.12 à Meise. • **Oie à tête barrée** (*Anser indicus*) : 11 ex. les 11.12 et 09.01 à La Calamine. • **Oie de Magellan** (*Chloephaga picta*) : 1 mâle et 3 femelles le

28.12 au parc de Woluwe et 3 ex. à Laeken.

• **Ouette d'Égypte** (*Alopochen aegyptiacus*) : signalée principalement en région bruxelloise, où on en recense maximum 154 ex. le 15.01 à Laeken, mais aussi jusqu'en province du Luxembourg. • **Tadorne casarca** (*Casarca ferruginea*) : 1 ex. le 15.01 au parc de Woluwe et 1 ex. le 27.02 aux décanteurs de Genappe. • **Aix carolin** (*Aix sponsa*) : 1 mâle le 14.12 à Jamoigne, jusqu'à 3 mâles le 31.12 à Meise et 1 ex. à

la mi-janvier au Rouge-Cloître (Auderghem).

• **Aix mandarin** (*Aix galericulata*) : 1 ex. du 06 au 31.12 au lac de Warfaz (Spa), 1 ex. à la mi-janvier et le 06.02 à Jambes, maxima de 4 ex. à la mi-janvier au Rouge-Cloître et 3 ex. le 31.12 à Meise, sinon plusieurs données d'isolés en région bruxelloise. • **Nette rousse** (*Netta rufina*) : une femelle le 15.01 à Laeken. • **Erismaure rousse** (*Oxyura jamaicensis*) : 1 ex. le 29.01 aux BEH.

Ont contribué à cette chronique par l'envoi de leurs données d'observation :

Anrys P., Auverlot C., Baye J.-M., Beys B., Beys R., Bocca S., Bourlard F., Bronne L., Brouyère G., Bulteau V., Burnel A., Calonne E., Camberlain P., Capelle C., Capelle I., Chable M., Chaufouraux J.-P., Claerhout P., Colon J., Cuvelier E., Daulne J.-M., de Broyer A., de Liedekerke R., de Wavrin H., Debaere T., Debiève J., Degossely P., Degros A., Dehem C., Delbecque B., Delbecque F., Deloyer P., Dermien F., Derume M., Desablens P., Deschamps D., Dewulf J., Dielen V., Dragonetti J., Dubus P., Dufour D., Dufourny H., Dujardin R., Dumoulin R., Durant M., Dutoit N., Eeckout A., Farinelle C., Feryn Y., Fouarge J., Gailly Ph., Gallez J., Gauquie B., Gée L., Georges Y., Gérard M., Gérard M.-H., Gerckens N., Gijs F., Gilles S., Godart P., Godding E., Gonze F., Goubout M., Gruwier C., Habay F., Hanus B., Héja F., Herbecq F., Hubert M., Jacob J.-P., Janssens M., Jardon B., Jenard P., Jortay A., Lamant M., Lambert M., Laudelout A., le Hardÿ F., Lebaillly J.-L., Leclercq J.-A., Loison M., Loly P., Lucas P., Malengreau A., Mardulyn H., Maroy M., Matagne J., Minet G., Moës P., Molitor B., Moncousin M., Monmart A., Moreels M., Muyshont D., Nicolas M., Olivier G., Paquay M., Paquay N., Paquet A., Paquet J.-Y., Percsy C., Percsy N., Petit J., Philippart B., Pierre P., Piette J., Pourtois A., Quévy P., Rabosée D., Rega A., Renard F., Roland S., Rotsaert G., Rousseau C., Ruyschaert F., Sacré P., Schmitz L., Sedek J., Selosse N., Swinnen V., Teerlynck H., Testaert D., Thonnard P., Thonon P., Tricot J., Van Halst V., Van Hove F., Van Thorre P., Van Volsem J., Vandevyvre X., Verbanck K., Verleure P., Verroken D., Verroken L., Vieuxtemps D., Walravens E., Watelet M., Willame A., Willocq S., Xhardez C. et Zimmer N.

ainsi que les observateurs de Genappe, de Latour, de La Trientale et du GTOF

Les données ont été encodées par R. Gonze, M. Hubert, W. Kiucapa, J. Trembsky et P. de Gottal; la gestion de la base de données est assurée par Th. Kinet.

Rédaction : A. Burnel, R. Dumoulin, C. Farinelle, R. de Liedekerke et D. Testaert; coordination : D. Testaert; supervision : J.-P. Jacob.