



Découverte d'un cadavre frais de Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*) dans la plaine de Boneffe

Thibault MARIAGE

La plaine hesbignonne de Boneffe (prov. de Namur) est réputée comme site de halte migratoire du Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*). Le 16 septembre 2003, un cadavre frais de ce pluvier est découvert en bordure d'un chemin de remembrement. Il s'agit d'un individu en plumage juvénile : le rachis blanc qui orne la rémige primaire externe est diagnostique, de même que la couleur "chaude" de l'oiseau et son large sourcil crème (détails en matière d'identification dans l'article de J.S. ROUSSEAU : "Observations récentes du Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*) en Wallonie. Statut de l'espèce en Belgique et notes sur ses habitudes et son identification." *Aves* 32, 1995 : 177 - 206).

La position de l'oiseau lors de sa découverte, au sommet d'un petit talus bordant le chemin de remembrement, plaide en faveur d'une prédation naturelle et non d'une mort par collision avec un véhicule. Le trafic est rare à cet endroit et habituellement lent (engins agricoles). L'excellent état du plumage plaide également en ce sens. De plus, le lieu même de la découverte est situé au sommet d'une déclivité et offre donc un excellent point de vue à l'éventuel prédateur occupé à consommer sa proie. En outre, à cet endroit précis, le chemin longe un grand champ de pois récoltés, milieu de stationnement privilégié de cette espèce en Hesbaye (obs. pers. & ROUSSEAU, 1995). Il est probable que le pluvier a été capturé dans le champ de pois puis transporté au sommet du talus pour y être dévoré. Le cadavre est frais (le sang brille encore) et est quasi intact; ne manquent que les muscles pectoraux du bréchet, prélevés par le prédateur ainsi que les viscères qui sont visibles au sol à moins d'un mètre.

L'identification du prédateur est délicate. Le type de consommation (prélèvement unique des muscles pectoraux) est typique de la façon de procéder des faucons et notamment du Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*); qui a pour habitude d'arracher immédiatement la tête du corps de sa proie mais peut aussi parfois la laisser intacte. Une autre espèce possible est le Faucon émerillon (*Falco columbarius*), sympatrique du Pluvier guignard dans une partie de son aire de nidification et susceptible, malgré sa taille réduite, de capturer des oiseaux de l'envergure du Guignard (voir le Handbook de CRAMP *et al.*, 1980). Ces deux espèces s'observent régulièrement à Boneffe en période inter-nuptiale. D'autres rapaces figurent au rang des prédateurs potentiels, surtout s'il s'agissait d'un oiseau affaibli : les busards, la Buse variable (*Buteo buteo*), voire le Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) qui, en ville, capture régulièrement des Pigeons domestiques. La prédation par un mammifère, comme le Renard roux (*Vulpes vulpes*) ou un chat haret est exclue vu l'état du cadavre.

SUMMARY - Discovery of a fresh corpse of Dotterel (*Charadrius morinellus*) in the plain of Boneffe.

Description of the discovery of a fresh corpse in September 2003 in Boneffe (Province of Namur) and discussion about the possible predator.

Thibault MARIAGE
Rue de Frise, 10 E
B - 5310 Mehaigne
tmariage@hotmail.com