

# OBSERVATIONS DE MARS À MAI 2007

Centrale Ornithologique Aves  
Groupe de travail « Chroniques »\*



C.-H. Born

## Le printemps 2007

Une grande douceur a continué à prévaloir tout au long du printemps, avec des températures qui contribuèrent à faire de 2007 l'année la plus chaude depuis le début des mesures météo à Uccle. La période de sécheresse exceptionnellement longue qui sévit entre fin mars et le 6 mai (36 jours sans pluie) et les températures élevées qui y furent associées sont évidemment l'élément météorologique le plus exceptionnel de ce printemps.

En mars, la douceur prolongée a accéléré la poursuite des passages, freinés en première décennie par un temps pluvio-venteux. Les dernières grandes bandes de Vanneaux et d'Alouettes de champs ont fait halte à ce moment-là. La réoccupation de sites de reproduction fut rapide, par exemple chez la Cigogne noire, la Mouette rieuse, le Bruant des roseaux ou l'Alouette lulu dont la migration est passée presque inaperçue. Faibles migrations également chez d'autres espèces, comme le Chardonneret et la Linotte mélodieuse. De manière prévisible, on a enregistré une série de premières observations hâtives en mars-avril (Balbuzard le 6 mars, Milan noir le 12 mars, Torcol 13 mars, Hirondelle de cheminée le 15 mars, Fauvette babillarde le 2 avril, Loriot le 3 avril, Pie-grièche écorcheur le 21 avril...), des pics migratoires précoces (Canard souchet) et des départs d'hivernants plus ou moins rapides. Encore un net passage de Grues cendrées en mars. Les Rémiz hivernant en Meuse sont restés jusqu'au 30 mars, une date normale pour le début de la migration.

À partir d'avril, la fréquence des Huppes et des Merles à plastron est à souligner. Parmi les vagues de migrateurs, on soulignera les haltes de limicoles du 9 au 12 mai et le petit afflux de Guifettes leucoptères en mai. Les autres visiteurs exceptionnels du printemps furent une Bécassine double le 13 avril, un Oedicnème fin avril, un Bécassin à long bec le 13 mai, un jeune Aigle de Bonelli le 16 mai, un Ibis falcinelle le 20.05, un Bécasseau falcinelle les 20-21 mai. Le Goéland à ailes blanches de l'Eau d'Heure est resté jusqu'au 3 mars et un jeune Goéland bourgmestre fut pointé à trois reprises en mars à Mont-Saint-Guibert. Quelques raretés plus « régulières » : plusieurs mentions de Pluviers guignards, des observations isolées de Guifette moustac, de Guêpier, de Pie-grièche à tête rousse et deux cantonnements de Bruant zizi, dont le retour comme nicheur en Wallonie n'est pas exclu.

Parmi les nicheurs remarquables figurent les ardéidés de Hensies : nidification pour la deuxième année consécutive du Bihoreau et de l'Aigrette garzette, tentative d'installation du Héron garde-boeufs et même des velléités chez la Spatule. Pointons aussi les reproductions hennuyères d'Oie cendrée et d'Avocette, celles des trois busards, la poursuite de l'augmentation du Canard chipeau, un cantonnement de Marouette ponctuée. Une nouvelle fois, très peu de Râles des genêts ont été entendus et 2007 fut un printemps misérable pour le Butor et le Blongios. Quelques petits passe-reaux compensent, comme 3 chanteurs de Locustelle luscinoïde, 2 cantonnements de Cisticoles, la présence de Panures en période de nidification et la reproduction de plusieurs couples mixtes

\*Rédacteurs de la présente chronique : A. Burnel, C. Farinelle, T. Mariage, T. Ory, Ph. Vanmeerbeeck et J.-P. Jacob.



de *Bergeronnettes grises* et de *Yarrell*. Certains estivants non nicheurs attirent aussi l'attention tel le nombre de *Goélands leucophées* et l'estivage de jeunes *Goélands pontiques*.

À côté de nicheurs presque « hivernaux » comme le *Grand Cormoran* (premiers envols le 26 mars), quelques indications de reproductions fort hâtives ont été obtenues : des nichées en mars pour le *Grèbe huppé* et la *Mésange charbonnière*, début avril pour la *Foulque*, début mai pour le *Tadorne de Belon*. C'est peu, sans doute en raison du peu d'attention portée par nombre d'observateurs au suivi des reproductions. Soulignons enfin qu'en 2007, la douceur persistante a conduit de nombreux sédentaires à décaler leurs périodes de chant et sans doute à nicher tôt.

Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par Internet (site *Aves et Aves-Lux*), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collationnées par le GT *Le Guignard* (Hainaut occidental) et la cellule de l'*Entre-Sambre-et-Meuse* (« *La Grièche* »).

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure. Le complexe marécageux de Harchies-Hensies-Pommeroeul est souvent simplement libellé « Harchies ».

## Détail des observations

**Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : malheureusement peu de données communiquées; parmi les concentrations, 6 ex. le 10.03 à Quévy, et minimum 15 ex. le 26.03 à l'étang de Fazône (Bastogne), plus de 20 le 11.04 à Ploegsteert. Premier poussin signalé à Hensies le 21.04. **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : un poussin dès le 10.03 à Auderghem; le 28.05 à Hensies, un seul poussin parmi 48 individus. **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : premiers retours début mars à Frasnes-lez-Buissenal et Éghezée-Longchamps où 3 ex. sont vus le 25.03. En avril, 1 ex. le 06.04 à Péronnes puis un record local pour l'espèce avec 18 ex. le 07.04 à la Plate Taille (BEH). Fin avril, la population nicheuse de Ploegsteert compte un maximum de 46 ex. (au moins 80 le 2 mai 2006); 9 aux décanteurs de Hollogne-sur-Geer.

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : les remontées migratoires sont signalées un peu partout en mars et en avril. Quelques chiffres du dernier recensement au dortoir en mars : min 30 ex. à Labuissière, 71 à Lessines, 84 à Coq, 28 à Roly, 74 aux BEH, 38 à Virielles. Au moins un nid est occupé le 01.03 à l'île Vas-t'y-Frotte à Jambes. Les premiers jeunes sont prêts à l'envol le 26.03 à Obourg; 16 nids sont occupés en carrière à Lessines dans le courant du mois d'avril.

**Butor étoilé** (*Botaurus stellaris*) : une seule observation de printemps : 1 ex. le 03.04 à Harchies. **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*) : une femelle le 19.05 à Harchies. **Bihoreau gris** (*Nycticorax nycticorax*) : nouvelle reproduction à Hensies. **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : parmi les mentions de nids occupés, 27 à l'île Vas-t'y-Frotte, au moins 14 à Erbaut (Jurbise), 12 à Nettinne, au moins 6 à Aywaille, 49 à Ploegsteert, 10 aux BEH, 29 à Rixensart et 151 à Hensies. **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : 2 ex. le 21.04 à Escanaffles, à une date normale pour les premiers migrateurs. **Grande Aigrette** (*Casmerodius albus*) : encore de nombreux contacts dans différentes localités wallonnes dans le courant de mars et d'avril. Certains dortoirs rassemblent des effectifs importants : 19 le 08.03 à Hensies, 12 le 10.03 à Roly. Notons l'observation de 26 ex. le 14.03 à Virielles. La dernière pour ce printemps est mentionnée le 27.05 à Latour. **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) : au moins 13 ex. le 08.03 au dortoir de Hensies où l'espèce niche à nouveau en 2007 (3 couples). **Héron garde-bœufs** (*Bubulcus ibis*)\* : 3 ex. du 03.04 au 07.04 à Pommeroeul, et 1 ex. le 21.04 à Harchies où plusieurs couples ont tenté de nicher.

**Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : le retour s'amorce dès le 02.03 mais l'essentiel des mentions datent d'avril. Des oiseaux souvent solitaires sont signalés en divers sites d'Ardenne et de Famenne. **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : passage normal. Par exemple, 7 le 29.03 à Mont-Saint-Guibert, 8 le même jour à Alleur (Liège), 5 le 12.04 à Soignies, 6 le 22.04 à Comines. Parmi la quinzaine de mentions ultérieures, il est dif-

Les espèces dont l'observation est soumise à homologation sont marquées d'un \*.



ficile de distinguer des migratrices tardives d'estivants erratiques. Parades et accouplement le 25.03 pour le couple de Horion-Hozémont. Un échappé de Paradisio séjourne depuis environ 2 ans à Blicquy (Leuze-en-Hainaut). **Ibis falcinelle** (*Plegadis falcinellus*)\* : 1 ex. de passage le 20.05 à La Hulpe. **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) : une seule migratrice le 26.05 à Gaurain-Ramecroix.

**Cygne chanteur** (*Cygnus cygnus*) : encore 4 ex. aux alentours des BEH le 04.03, le dernier à Erpion le 11.03.

**Cygne de Bewick** (*Cygnus columbianus bewickii*) : onze adultes hivernant aux marais de Harchies sont encore présents le 01.03 sur un site de nourrissage à Quevaucamps.

**Oie cendrée** (*Anser anser*) : le passage se poursuit en mars, dont des volées de 120 oies à Nasogne, 80 à Lavacherie et 60 à Amay. L'espèce reste un nicheur rare : à pointer les nidifications de Farciennes (4 pulli le 10.04) et Harchies où 3 oisons accompagnent leurs parents au mois de mai. **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : présence tout au long du printemps dans le Hainaut, parfois en nombres élevés : 18 ex. le 27.03 à Harchies, 23 ex. le 01.05 à Warneton, 27 ex. le 06.05 à Hensies. Sur les décanteurs, 6 couples sont observés le 08.04 à Éghezée-Longchamps, 37 ex. le 21.04 à Warcoing, 11 le 10.05 à Escanaffles et 10 le 11.05 à Hologne-sur-Geer. Plusieurs nichées sont déjà observées en mai : elles comptent 7 pulli le 06.05 sur le canal entre St-Léger et Warcoing, 15 aux Marionville, et 5 aux décanteurs de Genappe à la fin mai.

**Canard siffleur** (*Anas penelope*) : encore signalé en mars et début avril mais en effectif très faible par rapport à l'an dernier : 8 ex. le 17.03 à Virelles, 5 le 27.03 à Pommeroeul (contre 57 le 27.03.06) et 8 ex. le 10.04 aux BEH. La dernière observation signalée concerne 3 femelles le 15.04 à Amay.

**Canard chipeau** (*Anas strepera*) : les principales données proviennent de Hensies : 49 ex. le 14.03, 91 le 02.04, et un maximum de 79 dont 21 pulli en 4 nichées le 28.05. Notons encore 10 ex. le 25.03 à Virelles et 11 ex. le 26.05 à Éghezée-Longchamps.

**Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : cette espèce reste encore régulière dans la première moitié d'avril mais c'est en mars que les effectifs sont les plus importants : 260 le 09.03 à Latour, 73 le 13.03 à Éghezée-Longchamps, 141 le 14.03 au marais de Hensies. Un mâle le 21.05 à Harchies.

**Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : de retour dès le début du mois de mars comme l'indiquent les 2 premiers ex. signalés le 08.03 à Léaucourt. En avril, présence en petit nombre avec maximum 10 ex. le 08.04 à Hensies, 5 ex. le 14.04 à Éghezée-Longchamps, 4 ex. le 15.04 à Thommen et 5 ex. le 16.04 à Hologne-sur-Geer.

**Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : trop peu de données nous sont parvenues. Il semblerait que la population soit en recul comme précédemment constaté dans le Hainaut Occidental (cf. le Guignard – synthèse

ornithologique 2006). Présence de 325 ex. le 11.03 aux décanteurs d'Éghezée-Longchamps. **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : passage précoce en mars avec 230 ex. le 02.03 à Hensies suivi de 55 le 16.03 à Harchies et 43 le lendemain aux Marionville. En avril, 65 ex. sont notés le 04.04 à Éghezée-Longchamps, et 86 le 10.04 à la gravière d'Amay. Les BEH détiennent un nouveau record avec 182 ex. comptés le 15.04. Quelques oiseaux sont encore signalés en mai dont 8 adultes et 6 canetons le 28.05 à Hensies.

**Canard pilet** (*Anas acuta*) : passage en mars et dans les sept premiers jours d'avril dont quelques groupes, 9 ex. le 12.03 à Ploegsteert, 10 ex. le 16.03 à Harchies, 20 ex. à Roly et 37 ex. à Virelles le 17.03 ainsi que 22 ex. le 25.03 à Boneffe. Une femelle séjourne jusqu'au 14.04 à Virelles.

**Nette rousse** (*Netta rufina*) : 1 ex. le 10.03 à Chênée, 1 couple le 19.04 à Amay, 1 ex. le 22.04 à Ploegsteert, 1 mâle le 21.05 et le 25.05 à Hensies.

**Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : à Virelles, principalement concerné par l'hivernage, les nombres diminuent au fil des jours (240 ex. le 03.03, 180 ex. le 17.03 et 34 ex. le 06.04). Une baisse moins importante est aussi notée sur des sites de nidification comme Hensies (80 ex. le 14.03 et 28 ex. le 28.05) et Hologne-sur-Geer (69 ex. le 11.03 et 30 ex. le 15.05). Ici, un ex. portant une marque nasale placée en Loire atlantique le 27 octobre 2006 est observé de la fin avril à la mi-mai.

**Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : les groupes les plus importants sont 132 ex. le 14.03 à Hensies, 140 ex. le 05.04 à Virelles et 107 le 08.04 à Éghezée-Longchamps. En mai, observation à Hologne-sur-Geer d'un ex. marqué en Loire atlantique le 27 novembre 2004 (marque nasale) et revu à Noirmoutier le 24 janvier 2005.

**Fuligule morillon x Fuligule à bec cerclé** (*Aythya fuligula x Aythya collaris*) : un hybride le 28.03 à Douvrain.

**Fuligule morillon x Fuligule milouin** (*Aythya fuligula x Aythya ferina*) : 1 mâle le 22.04 et probablement le même revu le 06.05 à Hensies.

**Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) : 1 femelle le 02.03 à Hensies et 1 mâle le 10.03 à Escanaffles. Observation tardive d'une femelle le 03.04 à Éghezée-Longchamps.

**Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)\* : 1 ex. le 19.04 à Ploegsteert et le 25.05 à Hensies.

**Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : une femelle le 17.05 sur le canal entre Nimy et Maisières.

**Garrot à œil d'or** (*Bucephala clangula*) : maximum 9 ex. à Hensies le 14.03 et 17 à Harchies les 10 et 12.04. La dernière observation, assez tardive pour l'espèce, a lieu le 29.04 aux BEH.

**Harle piette** (*Mergus albellus*) : un mâle à Harchies le 03.03; les 9 individus observés ensemble le 10.03 à Roly partent en migration quelques jours plus tard.

**Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : certains dortoirs sont encore très fréquentés en mars comme celui de Pommeroeul avec 26 ex. le 2 ou Coq avec 48 ex. le 17. Le 04.03, 20 ex. sont signalés à Butgenbach et 22 à Boiron (Gedinne).



Les effectifs diminuent partout dès la fin mars et les 2 derniers ex. sont signalés à Tiff le 26.04, dont un mâle blessé, toujours présent fin mai. **Érismature rousse** (*Oxyura jamaicensis*) : en mars, un mâle à Virelles et un couple parade à la gravière d'Amay le 27.

**Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : première mention le 24.04 à Wierde; les retours s'intensifient à partir du 01.05. À noter 17 migratrices le 26.05 à Éghezée-Longchamps. **Milan noir** (*Milvus migrans*) : après un premier le 12.03 à Regné, quelques exemplaires apparaissent aux dates traditionnelles : 1 ex. le 24.03 en Moyenne Semois, 1 ex. le 27.03 à Thommen, Neufchâteau et Habay et le 31.03 à Freux. Ensuite, les nicheurs s'installent, surtout en Lorraine et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. **Milan royal** (*Milvus milvus*) : noté à près de cent reprises par les observateurs de toutes les régions, notamment 3 ex. en halte le 03.04 aux Hauts-Sarts de Herstal. **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : seulement 4 mentions concernant au plus 5 ex. avant le 27.03; l'espèce est ensuite régulièrement observée jusqu'à la mi-mai, notamment à Harchies où la présence est continue mais en nombre variable, maximum 5 ex. le 10.05. Par après, seulement 2 mentions, un couple le 19.05 à Harchies et une femelle le 27.05 à Gaurain-Ramecroix. **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : les mentions restent régulières jusqu'à la mi-avril; seulement sept observations pour 7 ex. du 15.04 au 10.05. **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : premier le 14.04 à Burdinne. Ensuite, une femelle le 24.04 à Lens-Saint-Remy, une femelle à Saint-Jean-Geest le 27.04, une femelle le 27.04 et un mâle le surlendemain à Boneffe, un mâle le 29.04 à Thieusies, un mâle et une femelle à Clermont-lez-Walcourt le 01.05. **Buse variable** (*Buteo buteo*) : 65 ex. le 04.03 à Hermeton-sur-Meuse ainsi que 11 ex. ensemble le 12.03 à Verviers, 23 ex. le même jour à Chenogne et 8 ex. le 09.04 à Gedinne. **Aigle de Bonelli** (*Hieraaetus fasciatus*)\* : un immature survole les marais de Harchies le 16.05.

**Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : première mention le 06.03 à Robertville. Du 25.03 au 29.05, une quarantaine d'observations dont un à deux ex. assez régulièrement à Freux.

**Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : 7 données en mars, 6 en avril et encore 3 en mai, la dernière le 5 à Gages. **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : bien noté dans toutes les régions et notamment à Hensies avec de 3 à 5 ex. du 29.04 au 31.05. **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : ponte aux alentours du 09.03 à Bruxelles; naissances début avril et envols fin mai à Bruxelles, aux Awirs, à Dinant, à Ronquières.... À Lessines, le mâle bagué semble être d'origine norvégienne.

**Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : le complexe des marais de Harchies et le site de Ploegsteert fournissent la majorité des données du printemps (max. : 12 ex. les 16.03 et 10.05 à Harchies). L'espèce est renseignée plus ponctuellement sur une dizaine d'autres sites mais semble absent de Hologne-sur-Geer où il avait niché en 2006.

**Râle des genêts** (*Crex crex*) : quatre chanteurs se manifestent en mai : le 19 dans la région de la Basse-Vierre, le 25 dans les prés de fauche de la région d'Érezée, le 28 à Boneffe et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : les restes d'un ex. sont trouvés le 02.04 à Fleurus; un chanteur est entendu le 01.05 à Gedinne. **Foule macroule** (*Fulica atra*) : premiers pulli signalés le 08.04 à Limal (Louvain-la-Neuve). À Harchies, 566 ex. dont 86 couples nicheurs le 21.05. 1 ex. aux pattes orange est noté le 10.05 sur le canal à Hensies. **Gallinule poule-d'eau** (*Gallinula chloropus*) : 199 ex. sont dénombrés le 08.03 sur 40 km de canal et de Dendre canalisée. Les premiers pulli sont signalés le 10.05 sur le canal à Pommeroeul.

**Grue cendrée** (*Grus grus*) : le passage pré-nuptial, entamé début février, se poursuit en mars avec un total de 24.635 ex. en trois vagues. La plus importante totalise près de 19.000 ex. dont 15.000 ex. le seul dimanche 04.03, parmi lesquels 8.462 ex. en 10 heures au Signal de Botrange. Des vols passent aussi dans l'ouest de la Wallonie à Wihéries (Dour), Ham-sur-Heure, les Isnes (Gembloux), Gedinne, Couthuin, Marchin, Amay, Flémalle... entre le 01 et le 06. Un deuxième flux (plus de 3.000 ex. du 11 au 14) est suivi d'un troisième de même intensité du 25 au 27. Le passage se termine début avril : 7 groupes (267 ex.) survolent nos régions les 01 et 02.04. Un immature séjourne du 25.04 au 01.05 à Mageret (Bastogne).

**Huïtrier pie** (*Haematopus ostralegus*) : hormis 1 ex. le 22.04 à Hologne-sur-Geer, l'espèce est exclusivement observée en Hainaut au cours du printemps. Un couple est accompagné de 2 pulli le 15.05 à Escanaffles. Une autre tentative de nidification à Pottes - Hérinnes semble ne pas avoir abouti. **Échasse blanche** (*Himantopus himantopus*) : une femelle le 25.04 à Warneton.

**Avocette** (*Recurvirostra avosetta*) : le passage pré-nuptial se remarque dès le 15.03 à Gaurain-Ramecroix, au marais de Harchies et à Éghezée-Longchamps où le groupe le plus important de la période (24 ex.) est observé le lendemain. Un couple s'installe fin avril à Warneton; la couvaison y est signalée début mai. Un autre couple s'établit du 12.04 au 10.05 à Éghezée-Longchamps – accouplement le 19.04 – mais, suite aux nombreux dérangements, semble être passé du 12 au 28.05 à Hologne-sur-Geer où la tentative de nidification échoue également. **Oedicnème criard** (*Burhinus oedicnemus*)\* : 1 ex. le 29.04 à Ragnies.



**Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*) : les premiers retours sont notés le 17.03 à Éghezée-Longchamps. Les parades suivies d'accouplements et de pontes sont signalées dès le 28.03 à Douvrain puis en avril - mai à Warneton, Warcoing, Tournai, Ghislenghien, Anderlecht, Éghezée-Longchamps et Hologne-sur-Geer.

**Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : les migrateurs de mars, attribués à la sous-espèce *hiaticula*, ne fournissent aucune donnée ce printemps. Il faut attendre la fin du mois d'avril pour noter le passage de la sous-espèce *tundrae* (1 ex. le 22.04 à Gaurain-Ramecroix).

Ces contingents nordiques traversent nos régions en mai avec, comme maxima, 18 ex. le 12.05 et 13 ex. le 13.05 à Hologne-sur-Geer, 14 ex. le 27.05 à Éghezée-Longchamps.

**Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : amorcée dès la mi-février, la migration printanière se poursuit en première quinzaine de mars avec, parmi les groupes les plus importants, 69 ex. le 04 à Thieusies, 80 ex. le 06 à Boneffe, 250 ex. le 07 à Ploegsteert, 70 ex. le 11 à Braine-le-Comte. Une dernière mention en avril : 11 ex. en vol le 07 au marais de Hensies.

**Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : une mention exception-

nelle d'une quarantaine d'ex. en vol le 09.05 à Roly est suivie d'un ex. nuptial le 12 et le 27.05 à Gaurain-Ramecroix.


**Pluvier guignard** (*Eudromias morinellus*) : 4 données totalisent 7 ex. du 22.04 au 05.05 : 1 mâle en halte dans un champ de lin le 22.04, 2 ex. en plumage nuptial le 01.05 à Clermont-lez-Walcourt, 1 ex. du 03 au 05.05 à Boneffe et 3 femelles le 05.05 au Gerny (Marche-en-Famenne).

**Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : les conditions climatiques clémentes du mois de février ayant permis la remontée de nombreux oiseaux, les grandes troupes sont peu rencontrées en mars ce printemps. Le groupe le plus important (395 ex.) est signalé le 04.03 à Thieusies. Les premières parades sont observées le 17.03 à Saint-Sauveur puis régulièrement renseignées de toutes les régions en avril; les premiers pulli sont signalés le 18.04 à Lens-sur-Geer et Gaurain-Ramecroix.

**Bécasseau maubèche** (*Calidris canutus*) : les conditions météorologiques favorables ont permis l'observation de groupes importants en Flandre le 09.05 (154 ex. au Mechels Broek, 52 ex. à Tirlemont) et de nombres



**Photo 1** Faucons pèlerins / Peregrine Falcons – Seraing – 13.03.07 (photo : Gabriel Rasson)



bien plus modestes en Wallonie; 7 observations totalisent 12 ex. du 09 au 13.05 à Warneton, Warcoing, Moulbaix (Ath), Virelles, aux BEH, à Éghezée-Longchamps et Hollogne-sur-Geer. **Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : 5 données pour 7 ex. : 1 ex. le 09.05 à Virelles, 2 ex. le 09.05 à Latour, 1 ex. nuptial le 10 puis 2 ex. le 15.05 à Hollogne-sur-Geer et 1 ex. le 22.05 aux BEH. **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : 1 ex. le 03.05 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 08 et 3 ex. nuptiaux le 10.05 à Hollogne-sur-Geer, 2 ex. le 09.05 à Gaurain-Ramecroix et 3 ex. le 17.05 à Waremme. **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : après un oiseau précoce le 18.04 à Gaurain-Ramecroix, l'espèce fait halte en mai à Éghezée-Longchamps (3 ex. du 02 au 05, 1 ex. le 06 et le 07), Latour (1 ex. le 07), Warcoing (2 ex. le 12), Hollogne-sur-Geer (2 ex. le 12, 1 ex. le 21) et Gaurain-Ramecroix (1 ex. le 27). **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : 2 ex. le 01.05 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. les 26 et 27.05 aux BEH. **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : passant en très petits nombres du 10.03 au 16.04, un premier flux fait halte à Ploegsteert, Warcoing, Tournai, Baudour, Castillon, Éghezée-Longchamps, Hollogne-sur-Geer. La première quinzaine de mai fournit des données plus régulières et des groupes plus importants, avec par ex. : 6 ex. le 07 à Latour, 7 ex. nuptiaux le 12 à Hollogne-sur-Geer, 5 ex. le 12 à Warcoing. **Bécasseau falcinelle** (*Limicola falcinellus*)\* : 1 ex. les 20 et 21.05 à Mont-Saint-Guibert. Cette donnée exceptionnelle constitue, si elle est homologuée, seulement la septième mention de l'espèce en Wallonie depuis 1896 ! **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : après 3 premiers oiseaux notés dès le 03.03 à Obigies-Léaucourt, l'espèce est régulièrement observée du 14.03 au 19.03 puis du 04.04 au 05.05 à Éghezée-Longchamps mais aussi à Warcoing, Gaurain-Ramecroix, Brugelette, Ghislenghien, Clermont-lez-Walcourt, Roly, Ambresin, Hollogne-sur-Geer... Les groupes sont peu fournis (maxima : 8 ex. le 30.04 à Éghezée-Longchamps, 17 ex. le 01.05 à Hollogne-sur-Geer, 8 ex. le 01.05 à Warcoing). Un dernier mâle fait halte les 24 et 25.05 à Éghezée-Longchamps.

**Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : 7 données pour 11 ex. en mars et 5 données pour 6 ex. en avril, c'est peu. Retenons 3 ex. le 23.03 à Amay, 2 ex. le 22.03 à Stockay-Saint-Georges et 2 ex. le 25.03 à Bambois. Une dernière est levée le 18.04 à Sclaigneaux. **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : février et ses températures relativement douces ayant autorisé la remontée de nombreux oiseaux, des bécassines sont signalées très régulièrement en mars et jusqu'en seconde décennie d'avril, mais les rassemblements dépassant la vingtaine d'ex. sont l'exception (maxima : 34 ex. le 09 et 31 ex. le 28.03 à Latour, 29



Photo 2 Bécassin à long bec / Long-billed Dowitcher – Mont-Saint-Guibert – 13.05.07 (photo : Bruno Marchal)

ex. le 17.03 à Tournai et 40 ex. le 02.04 à Marche-en-Famenne). Les dernières sont rencontrées en mai : 1 ex. le 04 à Hollogne-sur-Geer et 1 ex. le 06 à Warcoing. **Bécassine double** (*Gallinago media*)\* : les mentions de printemps sont très rares : 1 ex. le 13.04 à Tournai. **Bécassin à long bec** (*Limnodromus scolopaceus*)\* : tout à fait exceptionnelle est l'observation d'un oiseau en plumage nuptial en halte le 13.05 à Mont-Saint-Guibert. Une première régionale pour cette espèce néarctique. **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : contactée régulièrement en mars, les premières parades sont signalées dès le 02.03 à Chevetogne.

**Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : peu fréquente ce printemps avec cependant deux groupes importants en première quinzaine de mars : 23 ex. en vol le 03 au marais de Harchies et 19 ex. en halte le 16 à Éghezée-Longchamps. Les autres mentions (8 données pour 10 ex.) se répartissent sur toute la période, une dernière barge étant observée en halte le 22.05 à Éghezée-Longchamps. **Barge rousse** (*Limosa lapponica*) : en mai, 1 ex. le 04 à Hollogne-sur-Geer, du 10 au 17 à Éghezée-Longchamps et le 12 à Gaurain-Ramecroix. **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : bien rare ce printemps avec seulement une donnée en mars et deux en avril – 1 ex. en vol le 04.03 à Huy, 1 ex. le 15.04 au marais de Harchies et 1 ex. en migration active le 16.04 à Russeignies. **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : 9 données pour 13 ex. : 1 ex. le 04 puis le 08.04 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 14.04 à Virelles, 1 ex. le 24.04 au marais d'Hensies, 1 ex. le 28.04 à Warneton, 2 ex. le 29.04 à Stave, 2 ex. le 03.05 au Gerny (Marche-en-Famenne), 3 ex. le 09.05 à Roly et 1 ex. le 17.05 à Éghezée-Longchamps.



**Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : 8 données pour 12 ex. à Hensies, Hologne-sur-Geer et Éghezée-Longchamps. Sur ce dernier site, après 1 ex. du 09.04 au 11.04 et un le 24.04, le passage continue jusque fin mai (1 ex. en plumage nuptial les 22 et 24). **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : quelques éclaireurs stationnent en première quinzaine de mars à Escanaffles, Éghezée-Longchamps et Hologne-sur-Geer. Le mouvement se poursuit sur un mode mineur en avril et s'amplifie en mai avec un net pic de passage autour du 12 (7 données pour 63 ex.). De petites troupes font halte à Warcoing (17 ex. le 12.05), Warneton (15 ex. le 12.05), Éghezée-Longchamps (24 ex. le 09.05), Hologne-sur-Geer (15 ex. le 10.05, 18 ex. le 12.05). **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : les premiers migrateurs font halte le 10.04 à Éghezée-Longchamps et le 13.04 à Mehogne. Le passage, régulier après ces dates, est surtout concentré en mai avec un pic principal les 04 et 05 et un secondaire aux environs du 12. Un seul groupe approche la vingtaine d'ex. : 19 ex. le 17.04 à Éghezée-Longchamps où deux derniers oiseaux sont rencontrés le 25.05. **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : à Warcoing, des rassemblements assez importants sont relevés dès les premiers jours de mars (16 ex. le 02, 12 ex. le 08) et font suite aux observations de janvier et février. Ailleurs, la migration printanière n'est vraiment remarquée qu'à partir de la mi-mars; elle s'amplifie en première décade d'avril pour se terminer à la fin de ce mois. Les effectifs dépassant la dizaine d'oiseaux sont assez fréquents en mars à Warcoing et en avril à Éghezée-Longchamps. Quatre derniers migrateurs pré-nuptiaux sont signalés le 04.05 à Hologne-sur-Geer et un le 08.05 à Éghezée-Longchamps. **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : après 3 premiers oiseaux le 13.04 à Ghislenghien, les mentions s'égrènent à l'unité en avril puis le passage est net en première décade de mai (3 données pour 58 ex. le 01 : 2 ex. à Warcoing, 11 ex. à Éghezée-Longchamps et, surtout, 45 ex. à Hologne-sur-Geer). Il diminue après le 13.05 et se termine après le 25 (1 ex. à Éghezée-Longchamps). **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : en avril, 40 données totalisent 82 ex.; les observations deviennent plus nombreuses après le 10 avec un pic le 21 (16 ex. sur les berges du canal Hensies-Pommeroeul). Elles se multiplient et concernent davantage d'oiseaux dès le début de mai (74 données pour 404 ex.). Il faut cependant patienter jusqu'au 10 mai pour constater un passage important (8 données pour 80 ex. le 10), se maintenant dans une moindre mesure jusqu'au 17. Quelques oiseaux sont encore renseignés ensuite jusqu'au 29 (1 ex. à Ghislenghien). **Tournepie à collier** (*Arenaria interpres*) : 1 ex. les 07 et 19.05 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 09.05 à Gaurain-Ramecroix et 1 ex. le 12.05 à Lens-sur-Geer.

**Mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*) : 1 oiseau de premier hiver le 04.03 à Donstiennes, 1 ad. le 05 à Maubray, 1 imm. les 26-27.03 aux marais d'Harchies. En avril, 1 ad. est noté les 08, 09 et 16 à Éghezée-Longchamps et 2 ad. le 18 à Hologne-sur-Geer. En mai, 2 ex. le 04 à Éghezée-Longchamps, 4 ex. le 18 et 2 ex. le 22 à Hologne-sur-Geer. **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : les derniers gros rassemblements pré-nuptiaux sont notés en mars : 3.500 ex. le 01.03 aux BEH et 1.710 ex. le 21.03 en Basse Meuse. Dès le 04.03, on enregistre des retours à la colonie d'Éghezée-Longchamps. Le 29.04, installation d'une petite colonie (5 nids) aux marais d'Hensies, les premiers nids sont couvés à la même date aux décancteurs de Brugelette. En mai, premières éclosions le 17 et 40 nids comptés le 26 à d'Éghezée-Longchamps. **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : 1 oiseau de premier hiver du 08 au 11.03 et les 25 et 26.03 à Éghezée-Longchamps. Le faible passage se clôture en avril : 1 ad. et 2 imm. le 07, 1 imm. les 15-16 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 11 puis 6 ex. le 19 et 1 ex. le 24 aux BEH, 16 ad + 1 imm. le 18 aux marais d'Harchies. **Goéland cendré** (*Larus canus*) : encore 230 ex. le 01.03 au dortoir de la Plate-Taille (BEH); retours généralisés sur les sites classiques de nidification en mars : Hensies (6 couples), Éghezée-Longchamps (2 couples), Obourg et Harmignies (6 couples). **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : peu renseigné en mars en dehors des BEH (500 ex. le 1er au dortoir de la Plate-Taille) et d'Erpion (130 ex. le 16.03). Alors qu'ailleurs la taille des groupes chute sensiblement, on en observe encore 100 ex. le 03.04 aux BEH et 59 ex. le 16.04 à Gaurain-Ramecroix. Toujours présent en mai avec 40 oiseaux le 03 mais déjà 350 (majorité d'imm.) le 18 aux BEH. Autre groupe significatif : 43 ex. le 22.05 à Éghezée-Longchamps. **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : 250 ex. le 01.03 au dortoir de la Plate-Taille (BEH) et 500 ex. le 16.03 à Mont-Saint-Guibert. Observé sur seulement trois sites en avril (Pommeroeul, les BEH et la Basse-Meuse). Deux données en mai : 1 imm. le 03 aux BEH et 2 le 27 à Gaurain-Ramecroix. **Goéland leucophée** (*Larus michahellis*) : c'est encore une fois aux BEH qu'on observe le plus d'oiseaux durant le printemps (une centaine à la fin mai); ailleurs seuls des adultes ou des immatures isolés sont signalés. **Goéland pontique** (*Larus cachinnans*) : observé en mars sur trois sites : 20 imm. le 01 au dortoir de la Plate-Taille (BEH), 2 ex. le 16 à Mont-Saint-Guibert et 14 ex. le 21 en Basse Meuse. Ensuite, 7 ex. le 04.04 en Basse-Meuse et, fait peu banal, 2 à 3 immatures durant toute le printemps aux BEH. **Goéland marin** (*Larus marinus*) : 1 imm. le 18.05 à Hologne-sur-Geer. **Goéland à ailes blanches** (*Larus glaucooides*)\* : l'adulte hivernant est encore observé le 03.03 aux BEH. **Goéland bourgmestre** (*Larus hyperboreus*)\* : 1 oiseau de



premier hiver le 16 puis du 29 au 31.03 à Mont-Saint-Guibert.

**Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) : les premières sont observées en avril : 2 ex. le 10 et 1 ex. le 12 à Virelles, 1 ex. le 16 à Éghezée-Longchamps. Ensuite, 1 ex. les 09, 10, 11 et 19.05 à Éghezée-Longchamps, 2 ex. le 12.05 à Hollogne-sur-Geer, 2 ex. le 22.05 à Péronnes-lez-Antoing et la dernière de la période le 22.05 à Harchies. **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : les premières nous reviennent assez tardivement à la fin du mois d'avril : 2 ex. le 21 à Frasnes-lez-Buissenal, 1 ex. le 27 et 2 ex. le 29 à Hollogne-sur-Geer, 4 ex. le 29 et 10 ex. le 30 à Éghezée-Longchamps. En mai, le passage s'étend sur tout le mois et totalise environ 70 exemplaires sur seulement 7 sites avec, comme groupes, maximum 7 ex. le 19 à Éghezée-Longchamps, 9 ex. le 21 aux BEH et 9 ex. le 30 à Péronnes-lez-Antoing. **Guifette moustac** (*Chlidonias hybridus*)\* : 3 ex. le 23.05 au grand étang de Neerpede (Anderlecht). **Guifette leucoptère** (*Chlidonias leucopterus*)\* : l'afflux considérable noté aux Pays-Bas dès la mi-mai touche aussi la Wallonie (voir note séparée dans ce Bulletin pages 59-61).

**Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : les premiers retours ont lieu dans la dernière décade d'avril. En mai, des mentions de chanteurs proviennent de l'ensemble de la région mais très peu de données renseignent plus de deux chanteurs par site, cette espèce reste donc répandue mais fort peu abondante. **Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : encore un groupe de 11 ex. le 18.03 au Gerny (Marche). Ailleurs, une prospection des carrières hennuyères s'avère rentable pour l'espèce : 2 colonies de 10 couples le 20.03 à Soignies (carrière du Clypot et carrière du Hainaut) et plusieurs dizaines de couples le 12.05 à Harmignies.

**Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : de retour dès le début d'avril, cette espèce semble à nouveau un peu plus fréquente car des données proviennent d'une soixantaine de localités en avril et d'une quarantaine durant le mois de mai. Par ailleurs, son chant typique est entendu dans des régions où il n'avait plus été signalé depuis longtemps.

**Chouette hulotte** (*Strix aluco*) : encore quelques mentions de chanteurs en mars : 6 le 08 à Nassogne, 7 le même jour à Colfontaine et 5 le 13 à Baudour; 2 jeunes juste sortis du nid le 31.03 à Ottignies. L'année est renseignée comme « moyenne » dans les nichoirs dans la région de Spa-Jalhay. **Hibou grand-duc** (*Bubo bubo*) : 1 (échappé ?) le 21.04 à Renaix. Deux oiseaux sont récupérés en mai dans la région de Huy : une femelle avec plaque incubatrice le 08 à Bas-Oha et 1 jeune

mâle le 11 à Ampsin. On signale 3 jeunes le 13.05 à Havelange. Peu renseignée, cette espèce discrète malgré sa taille imposante et son chant sonore se porte pourtant très bien dans notre région avec sans doute plus de 60 couples dont une dizaine dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 1 oiseau en chasse le 19.05 à Léaucourt. **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : 1 chanteur est signalé dès la fin mars à Nassogne, ensuite, 3 chanteurs le 11 et le 16.04 au même endroit. Ailleurs, 2 chanteurs le 09.04 à Elsenborn et 1 le 27.04 à Blanche-Fontaine (Vielsalm).

**Engoulevent d'Europe** (*Caprimulgus europaeus*) : 1 ex. le 17.04 à Neufchâteau. **Martinet noir** (*Apus apus*) : les premiers sont de passage dès le début de la seconde décade d'avril mais les retours ne se généralisent que vers la fin du mois. On note encore des groupes importants (> 100 ex.) jusque fin mai. **Huppe fasciée** (*Upupa epos*) : la migration fut particulièrement sensible dès le début du mois d'avril. Des isolées sont observées le 7 à Sart-Bernard, le 11 à Hautrage, le 13 à Bure, le 14 à Buissonville et à Ostiche (Ath), le 16 à Nassogne, le 17 à Thieusies, le 20 à Bersillies-l'Abbaye, le 21 à Botthey (Gembloux), le 23 à Fléron et le 29 à Molinfaing (Neufchâteau). En mai, un oiseau est encore signalé le 04 à Avin (Hannut), un autre chante tous les matins du 06 au 15 à Racour (Lincen) et une dernière séjourne durant la première quinzaine du mois à Soumagne. Au total, pas moins de 14 oiseaux auront transité par notre région ce printemps. **Guêpier d'Europe** (*Merops apiaster*) : 5 à 6 ex. le 14.05 à Cul-des-Sarts.

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) : après un exemplaire très hâtif le 13.03 à Erpent, le passage se poursuit de manière plus normale dès le début de la seconde décade d'avril : 1 chanteur le 11.04 à Nassogne, 1 ex. le 16.04 à Lillois, 2 chanteurs le 21.04 à Malchamps, 1 chanteur le 24.04 à Froidchapelle, 1 chanteur le 25.04 à Mochamps, 3 ex. le 27.04 à Béringenne (Spa) et 1 ex. en halte le 30.04 à Cahay (Vielsalm). Peu de mentions en mai : 1 ex. le 1er à Gouvy, le 3 à Boneffe, 3 cantons confirmés ce même jour à Nassogne et un dernier oiseau de la période le 22.05 à Assenois. **Pic cendré** (*Picus canus*) : très peu de mentions pour notre pic le plus rare, malgré des prospections ciblées dans la région comprise entre les Hautes-Fagnes et le Luxembourg; une audition le 23.03 et une observation le 12.04 à proximité d'Eupen, une mention en mars à proximité de Rodgen (massif de Gross Bohlscheid). **Pic vert** (*Picus viridis*) : au contraire de l'espèce précédente et parallèlement au phénomène observé en Ardenne, ce pic semble opérer une véritable percée dans les Cantons de l'est (13 couples) dans des zones pourtant particulièrement forestières telles que de





petites hêtraies perdues dans de grandes parcelles résineuses. **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) : l'espèce confirme sa bonne santé en Hainaut occidental avec un chanteur cantonné le 04.03 à Beloeil, 5 nouveaux cantons le 11.03 à Colfontaine, 1 chanteur le 12.03 à Frasnes-lez-Buissenal, 4 cantons le 13.03 à Baudour, 2 chanteurs le 20.03 à Graty (Soignies) et 8 chanteurs le 19.04 à Blaugies.

**Alouette lulu** (*Lulula arborea*): le retour précoce sur les sites de nidification se confirme avec un chanteur le 03.03 à Harzé, 7 le 07.03 à Hermalle-sous-Huy, 2 le même jour à Clermont-sous-Huy et 1 le lendemain à Sclaigieux. Peu de migrateurs signalés : 5 en halte le 07.03 aux Awirs, et un ex. le 08.03 à Ellezelles, le 17.03 à la Croix-Scaille et le 26.03 à Benonchamps.

**Alouette des champs** (*Alauda arvensis*): la migration pré-nuptiale se termine très tôt, le dernier groupe important (110 ex.) étant vu le 08.03 à Benonchamps.

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*): les premières sont 2 ex. le 22.03 à Amay et 1 ex. le 29.03 à Virelles. Il faut attendre le 06.04 pour les mentions suivantes : 30 ex. à Mont-Saint-Guibert et 1 ex. à Amay. Le lendemain, plus de 20 ex. à Virelles et 10 à Ploegsteert où les retours se poursuivent jusqu'en fin de mois. Dans l'ensemble, l'espèce est trop peu signalée. **Hirondelle rustique** (*Hirundo rustica*) : malgré l'oiseau particulièrement précoce de février, les premiers retours ne se produisent qu'à des dates plutôt habituelles, avec des isolés le 16.03 à Nivelles et le surlendemain à Roly, Éghezée-Longchamps et Boitsfort. Le premier groupe,

une trentaine, apparaît le 29.03 aux BEH. Les retours s'intensifient au cours de la première décade d'avril et se prolongent tout le mois. Les premiers jeunes sont bagués tôt (15.05 en région liégeoise) et les premiers jeunes volants sont repérés le 31.05 à Treignes. **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbicum*) : les premières sont très hâtives : 1 ex. le 15.03 à Virelles et le 24.03 à Nalines. Quelques oiseaux sont signalés çà et là, y compris sur les sites de nidification, dans la première quinzaine d'avril. Les retours s'intensifient au cours de la seconde quinzaine et se poursuivent encore en mai; aucune sur les petites colonies connues le 26 à Arc-Ainières, nombreuses le 27 à Anlier.

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : en avril, 1 ex. le 16 à Hollogne-sur-Geer, le 19 à Boneffe et à Mesnil-Saint-Blaise. **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : les premiers retours ont lieu le 05.04 à Vielsalm, Mazée et Treignes. L'espèce est assez bien renseignée en avril-mai; les premiers nourrissages sont mentionnés le 27.05 à Remience (Vaux-sur-Sûre). **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : parades et chants se poursuivent au cours de mars et avril; quelques mentions de nourrissage en mai. Les migrateurs nordiques traversent la région au cours du mois d'avril, avec un pic du 6 au 15 : 68 ex. en 2h le 6 à Havinnes, 17 en migration active et 23 en halte le 9 à Arc-Ainières, passage continu par petits groupes le 12 à Bailièvre, migration presque continue le 14 à Erbisoeul et le 15 à Horrues, nombreux en halte migratoire le 15 dans le val de l'Espierres... **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : les observations se poursuivent en mars avec de nombreux



**Photo 3** Huppe fasciée / Hoopoe  
– Fléron – 23.04.07  
(photo : Jean-Marie Poncelet)



individus en plumage nuptial. Parmi les mentions de groupes : 109 ex. le 03 au dortoir du Vivi à Roly, 30 au dortoir le 11 à La Buisnière, 15 le 16 à Éghezée-Longchamps, 18 le 27 à Harchies, plus d'une dizaine le 28 à Wiers. En avril, l'espèce se raréfie avec seulement dix mentions pour une dizaine d'individus, le dernier le 18 à Mehogne.

**Bergeronnette printanière** (*Motacilla f. flava*) : la première mention date du 26.03 à Romerée, les suivantes du 09.04 à Ragnies, Éghezée-Longchamps, Anseroeul, Arc-Ainières. Les autres retours suivent rapidement courant avril. En mai, impression d'une forte présence de nicheurs : ainsi, 38 en couples ou mâles isolés sur 8km le 4 entre Anseroeul et Arc-Ainières, 50 territoires en Hesbaye liégeoise, nombreuses à Gages. **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergi*) : difficile à repérer en dehors de groupes en halte, 4 mâles le 29.04 et 1 le 06.05 à Harzé, 1 le 03.05 à Burdinne. **Bergeronnette flavéole** (*Motacilla flava flavissima*) : trois mentions hennuyères, un chanteur le 16.04 à Vaudignies (Chièvres), 1 ex. le 21.04 à Baileux et un mâle le 02.05 à Athis (Mons). Un hybride *flava x flavissima* en mai à Pommeroel. **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : les jeunes apparaissent dès la mi-avril. **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : le passage et les retours se poursuivent en mars. La première mention de nourrissage est obtenue le 19.04 à Saint-Sauveur. **Bergeronnette de Yarrell** (*Motacilla alba yarrellii*) : quelques migrateurs en mars et avril, dont un groupe de 15 ex. le 25.03 à Bertrix. À côté, quatre à cinq couples mixtes, où généralement la femelle est

une *yarrellii*, sont signalés dont un à Andenelle pour la deuxième année consécutive; deux jeunes y naîtront. Plusieurs hybrides *alba x yarrellii* sont également observés : Juprelle, Houtain-le-Val, Molembaix, Pommeroel.

**Rossignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : premier chanteur le 09.04 à Mariembourg. Les oiseaux suivants sont notés le 15.04, date à laquelle l'espèce devient plus régulière. On note déjà 5 chanteurs le 20.04 à Rochefort et 15 chanteurs le 25.04 au camp militaire de Marche-en-Famenne. Bien renseigné en mai dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, avec notamment 20 chanteurs autour de Mariembourg. **Gorgebleue à miroir** (*Luscinia svecica*) : la première est entendue le 12.03 à Ploegsteert où au moins 7 chanteurs sont présents le 12.04. L'espèce est surtout présente dans le Hainaut où elle se reproduit aussi dans les cultures entrecoupées de petits fossés. Elle se cantonne aussi dans les décanteurs d'Éghezée-Longchamps et de Hollogne-sur-Geer (chaque fois 2 chanteurs). Pour la deuxième année consécutive, le site de la gravière d'Amay accueille trois couples. **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochrurus*) : les premiers retours sont notés le 12.03 à Froidchapelle, le 17.03 à Frasnes-lez-Buisenal et Ocquier, précédant une arrivée massive entre le 20 et le 25 mars. La migration se prolonge apparemment jusqu'à la mi-avril (une femelle baguée le 18 aux Awirs). **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : premier dès le 02.04 à Virelles. À partir de cette date, les données deviennent régulières et un nombre important de nicheurs sont présents fin



**Photo 4** Hybride Bergeronnette grise x Bergeronnette de Yarrell / Pied x White Wagtails Hybrid – Juprelle – 08.03.07 (photo : Bernard Bouckenooghe)



**Photo 5** Hybride  
Bergeronnette  
printanière x Berge-  
ronnette flavéole /  
Yellow x Yellow-hea-  
ded Wagtail hybrid  
– Pommeroeul  
– Mai / May 2007  
(photo : Luc Ver-  
roken)

avril. Comme chaque année, la présence est assez forte dans les villages du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse : par exemple, 9 ex. dont 7 chanteurs le 23.04 à Olloy-sur-Viroin et 9 cantons à Mariembourg courant mai. Quelques migrateurs sont encore signalés début mai : 1 ex. le 01 à Waterloo et le 02 à Etterbeek. **Tarier des prés** (*Saxicola rubetra*) : premier migrateur le 11.04 à Pommeroeul, suivi par quelques observations d'isolés jusqu'au 21, date à laquelle le passage s'intensifie mais sans effectifs notables. Seulement 35 ex signalés en mai, dont 8 ex. le 11 à Nassogne et 6 ex. le même jour à Mariembourg; les derniers le 13.05 à Stockay et Onoz. **Tarier pâtre** (*Saxicola torquata*) : les retours sur les sites de nidification débutent à la mi-mars, avec une majorité de mâles jusqu'à la fin du mois. En avril, les deux tiers des nicheurs sont rentrés le 04 à la Croix-Scaille, mais les retours continuent jusqu'à la fin du mois. En mai, la densité et le succès de reproduction y sont toutefois faibles. 1 ex. en halte est noté le 20.04 à Autreppe. **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : les premiers passent fin mars : 1 ex. le 21 à Xhendremael et le 27 à Montgauthier. En avril, les données sont presque quotidiennes, mais le passage ne prend de l'ampleur qu'à partir du 20. Aucun groupe important n'est toutefois signalé, hormis 12 ex. le 24 à Sprimont et 18 ex. le 30 à Gonrioux. En mai, un pic est noté en début de mois, avec par exemple 13 ex. le 02 à Benonchamps, 12 ex. à Remicourt le 04 et 11 ex. le 11 à Saint-Aubin. La migration se poursuit jusqu'à la fin du mois, mais concerne la plupart du temps des oiseaux isolés.

**Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : la remontée printanière des oiseaux scandinaves de la sous-espèce *torquatus* est bien renseignée cette année. Le passage débute dès la fin du mois de mars avec 1 ex. le 25 à Mons et le 28 à Anlier, Jamagne et au Mont Saint-Aubert. Le mois d'avril voit un passage massif et bien étalé avec plus de 242 ex. signalés aux quatre coins de la Wallonie. Pas de pic notable, si ce n'est au milieu du mois. Le passage se termine début mai : 3 ex. le 1er à Quesnoy, 1 mâle le 02 à Nassogne et le 04 à Pailhe. **Merle noir** (*Turdus merula*) : des rassemblements de 20 à 40 ex. sont signalés en Famenne durant la première décennie de mars. **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : des groupes hivernant sont régulièrement notés jusqu'à la mi-mars, période durant laquelle les premières remontées sont observées. Le passage s'intensifie alors, avec par exemple plusieurs milliers le 14.03 à Nassogne et des groupes de plusieurs centaines en halte un peu partout jusqu'à la fin du mois. Peu de litornes sont renseignées début avril et une bande de 35 ex. est encore pointée le 15.04 à Anseroeul. Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, où l'espèce est devenue rare, deux colonies sont signalées à Hemptinne et Petigny. **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : le passage est bien entamé dès début mars, avec, par exemple, 40 ex. ensemble le 01 à Villers-sur-Lesse. Il se poursuit durant tout le mois, avec un pic notable et de nombreuses arrivées à partir du 20 mais aussi en avril avec de petits groupes comptant jusqu'à 30 ex. Il se termine au milieu du mois. **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : en mars, les hivernants sont rejoints par les premiers groupes en migration. Le passage devient régulier dès le 10



avec un pic important le 26, jour où des milliers d'ex. sont observés à Freux, Moyen, Bellevaux et Thommen. Dernières migratrices le 17.04 à Pailhe. **Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : des retours sont encore signalés début mars, période durant laquelle un démarrage net des chants est observé en Famenne.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : en dehors des mentions traditionnelles dans le Hainaut occidental, on retiendra le baguage d'une femelle le 12.04 aux Awirs, qui illustre l'existence de déplacements chez cette espèce souvent considérée comme sédentaire. **Cisticole des joncs** (*Cisticola juncidis*)\* : profitant de l'absence d'hiver et d'un début de printemps exceptionnel, un

chanteur s'installe dès le 18.04 à Mouscron où il est rejoint par un deuxième ex. le 23.05; un chanteur aussi du 12 au 31.05 à Hologne-sur-Geer mais aucune preuve de nidification n'est apportée. **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : la première est signalée le 09.04 à la Croix-Scaille; les mentions se succèdent rapidement les jours suivants. Fin avril, le retour est généralisé même si des individus s'installent encore plus tard, comme un nouveau chanteur le 18.05 à Harchies. **Locustelle lusciniôïde** (*Locustella luscinioides*) : deux chanteurs de cet oiseau rare en Wallonie sont entendus dès le 28.04 à Harchies; l'espèce est aussi bien représentée sur le site français limitrophe cette année. De plus, un chanteur est entendu à trois

## Un site de nidification inhabituel de la Grive draine

Ce couple s'est installé au coin d'un volet entrouvert. La fenêtre donne sur une rue passante en agglomération et est située à 6 m d'un arrêt de bus. Découvert le 19 avril 2007 à Montegnée (Liège), le nid penchait dangereusement le 26 mais était toujours occupé et contenait une ponte qui fut incubée pendant une semaine. Le 30, il avait disparu. Même si la reproduction n'a pu réussir, cette installation est remarquable à double titre. D'une part, l'espèce est en général assez farouche et ne s'installe pas à proximité immédiate d'endroits fréquentés, même si les reproductions dans des zones fortement urbanisées, comme dans le cas présent, se multiplient; toutefois, un nid totalement à découvert reste une exception. D'autre part, le support du nid est original, même si l'espèce est connue pour nicher à l'occasion sur des rebords de bâtiments et des falaises (CRAMP *et al.*, 1988, p. 1021).

CRAMP *et al.* (1988) : *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Volume V. Tyrant Flycatchers to Thrushes.* Oxford University Press, Oxford.



Photo 6 Grive draine / Mistle Thrush – Montegnée – 19.04.2007 (photo : Marie-Anne Dethier)



Photo 7 Cisticole des joncs / Zitting Cisticola – Mouscron – 24.05.07 (photo : Christophe Gruwier).

reprises en mai à Virelles et un autre, probablement un migrateur en halte, le 08.05 à Roly. **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : les mentions sont peu nombreuses et le retour assez tardif; le 1er est signalé le 08.04 à Virelles, le suivant le 12.04 à Harchies où 6 chanteurs sont cantonnés le 24.04. Des arrivées peuvent être très tardives à l'exemple de deux nouveaux cantons fin mai dans ce site. Ailleurs, des chanteurs à Ploegsteert, Warcoing et Léaucourt. **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*) : la première est signalée le 16.04 à Woluwe-Saint-Lambert, la suivante le 21.04 à Virelles puis à partir du 24 sur divers sites. Ce n'est toutefois qu'à partir du 23.05 que de bonnes densités sont renseignées : nombreuses le 23 à Ploegsteert, le 24 à Léaucourt, 23 chanteurs le 31 sur 3,5 km le long de l'ancien canal Comines-Houthem. À cette époque, des migrants sont encore en halte comme un le 26 à Louvain-la-Neuve et le 31 à Theux. **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : comme chaque année, des mentions très précoces et sans lendemain (le 22.04 à Harchies, le lendemain à Wiers) sont à prendre avec circonspection (confusion possible avec des Effarvates en halte hors roselières) mais pas à rejeter a priori. Quatre mentions dans la première décennie de mai (le 03 à Alleur, le 04 à Hologne-sur-Geer, le 05 à Wattripont et Seilles) correspondent mieux à des retours précoces; ces retours se généralisent à partir du 13.05 et, en fin de mois, on signale quelques belles concentrations : plus de 35 chanteurs le 26 à Hologne-sur-Geer et 25 le 31 sur 3,5 km le long de l'ancien canal Comines-Houthem. **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*) : un chanteur est entendu le 08.05 à Hologne-sur-Geer mais ne s'y est pas attardé. **Hypolaïs ictérine** (*Hippolais icterina*) : mieux signalée cette année, surtout sous l'impulsion des recherches dans le cadre de l'atlas

dans le Hainaut. La première chantant le 29.04 à Béthomé (Gaurain) est suivie de 3 autres début mai (le 4 à Baudour, le 5 à Wattripont, le 6 à Petit-Lanaye). Les retours s'étalent ensuite tout au long des deux dernières décades de mai comme, par exemple, une le 11, une deuxième le 15 et deux encore le 28 à Ramillies. Au total, plus de 35 mentions, toutes au nord du sillon Sambre-et-Meuse sauf un chanteur le 10.05 à Fagnolle, probablement un oiseau en halte. **Hypolaïs polyglotte** (*Hippolais polyglotta*) : 1er chanteur le 03.05 à Nassogne. Parmi la vingtaine de mentions, retenons particulièrement un chanteur à Bruxelles le 23.05.

**Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : le retour est très précoce, dès le 02.04 à Fenffe (Ciergnon) puis le 07 à Lessive avant de se généraliser à partir du 11; plus de 60 mentions en avril avant que l'espèce ne devienne, comme d'habitude, plus discrète en mai. **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : la première est signalée le 10.04 à Hornu, la suivante le 12.04 à Nismes puis le lendemain entre Ramegnies-Chin et Warcoing. Le retour se manifeste dans toutes les régions à partir du 14.04. Quelques densités : 14 sur 8km le 04.05 à Anseroeul et Arc-Ainières, 14 le 13 à Éghezée-Longchamps, 7 sur 3,5 km le 31.05 en bordure de l'ancien canal Comines-Houthem. **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : premiers chanteurs le 14.04 à Forest, le 15 à Roly et Froidchapelle, le 19 à Erquennes. Le retour devient sensible dès le 22.04 et se poursuit au moins jusqu'aux premiers jours de mai. **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : les hivernants sont rejoints par quelques congénères en mars, à partir du 8 et de façon plus généralisée à partir du 25. C'est toutefois au cours de la seconde quinzaine d'avril que le passage et les retours s'amplifient comme en témoigne le graphique des captures aux Awirs (Fig. 1) où, avec 650 ex. bagués au printemps, soit un facteur 3,5 par rapport à 2006, l'année a été exceptionnelle, à l'image de la météo d'avril.




Fig 1. Nombre de captures journalières de la Fauvette à tête noire à la station de baguage des Awirs. / Daily numbers of Blackcaps captured at the Awirs ringing station.



**Pouillot siffleur** (*Phylloscopus sibilatrix*) : retours progressifs à partir du 11.04 : 1 chanteur le 11 à Havelange, le 13 à Logbiermé, 3 le 13 à Monceau-Imbrechies, 1 le 14 à Couvin et six autres entre le 16 et le 20. Le retour se généralise dans la dernière décade du mois : bien revenu en forêt le 25, plus de 20 le 27 en bordure nord de la forêt d'Anlier (Wisembach), 17 autour de Treignes le 28 et une dizaine de chanteurs le 30 à Nassogne. En mai, les mentions sont peu nombreuses; on retiendra 42 chanteurs autour du Mesnil le 10 et un nouveau cantonnement tardif le 24 à Lierneux. **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : les nombreux hivernants sont rapidement rejoints par leurs congénères, à partir du 04.03 à Treignes et du 06.03 dans la plupart des régions. L'Ardenne ne voit arriver les premiers chanteurs que le 11.03. Le passage se poursuit encore en avril avec 12 ex. bagués du 6 au 14 aux Awirs et un ex. présentant les caractéristiques de la sous-espèce scandinave *abietinus* le 12 au marais d'Hensies. L'espèce semble plus nombreuse qu'en 2006, notamment à Court-Saint-Étienne et à Gedinne. **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : les premiers oiseaux arrivent le 29.03 : un mâle bagué aux Awirs et un chanteur à Petite-Chapelle. Le flux s'amplifie rapidement dès les jours suivants : 30.03 aux Marionville, 31.03 à Resteigne et à Harchies (7 le 31.03 et 10 le 01.04)... Le passage et les retours, difficiles à distinguer, culminent entre le 9 et le 24 avril. **Roitelet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : des chanteurs le 04.03 à Treignes, Colfontaine, Spa et Tourinne-la-Grosse signalent une première vague de retours. Avec des chanteurs partout le 17.03 à la Croix Scaille, on peut considérer le retour comme généralisé à cette date.

**Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : les premiers le 27.04 à Couvin, le lendemain à Bruxelles, le 30.04 à Lantin et au Sart-Tilman (Liège). Quelques autres mentions en mai pour cette espèce discrète et sous-détectée. **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : les premiers le 15.04 à Erbisoeul et Froidfontaine puis un migrateur en halte le 16 à Pailhe. Les autres mentions concernent des nicheurs à Nassogne, à Herbeumont et en forêt d'Anlier, rentrés dans les derniers jours d'avril. Un nouveau secteur est occupé le 13 mai à Nassogne.

**Panure à moustaches** (*Panurus biarmicus*) : en prolongement des observations hivernales, 2 ex. le 04.03 à Harchies. L'espèce est aussi entendue le 11.04 à Ploegsteert. **Mésange à longue queue** (*Aegithalos caedatus*) : un ex. à tête blanche le 15.04 à la Croix-Scaille et un autre le 24.04 à Romedenne. **Mésange charbonnière** (*Parus major*) : des nidifications très précoces sont signalées : des nichées le 03.03 à Dinant et Trooz. Même si elle est plus tardive, une nichée baguée le

26.04 au Pays de Herve y est la plus précoce depuis une quinzaine d'années. **Rémiz penduline** (*Remiz pendulina*) : les deux mâles poursuivent leur hivernage à Amay jusqu'au 30.03. Une seule autre mention : 1 ex. le 09.04 à Oost-Maarland.

**Loriot d'Europe** (*Oriolus oriolus*) : le premier est signalé très tôt, le 03.04 dans le sud de la Gaume. S'ils sont 2 le 18.04 à Latour, il faut attendre le 23 pour les premières mentions dans les sites du Hainaut (Wiers, Harchies), le 26 à Baisy-Thy, le 28 à Senzeille et le 29 à Flostoy et Senzeille. Ailleurs, le retour n'est signalé qu'au début de mai et se prolonge durant toute la première quinzaine.

**Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : retours très précoces le 21.04 à Marche-en-Famenne et le lendemain à Sourbrodt et Mirwart. S'il y a encore autres trois mentions antérieures (3 ex. le 03.05 à Marche-en-Famenne, 1 le 06.05 à Torgny et Xhoris), ce n'est cependant qu'à partir du 12.05 que les retours se généralisent. On retiendra le passage d'un mâle le 13.05 à Hollogne-sur-Geer et d'un couple le 19.05 à Éghezée-Longchamps. Le cantonnement de deux couples fin mai à Stockay illustre l'expansion en cours, l'espèce débordant ces dernières années de l'aire occupée depuis des décennies au sud du sillon Sambre-et-Meuse. **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : 6 mentions de sites occupés en mars, 7 en avril et 4 en mai. **Pie-grièche à tête rousse** (*Lanius senator*)\* : un mâle adulte le 15.05 à Névaumont (Bertrix).

**Pie bavarde** (*Pica pica*) : l'ex. leucique de Limal est encore présent le 18.03; un autre est signalé le même jour à Hauset (Eynatten). **Cassenois moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : peu de données. Parmi elles, 1 ex. le 10.05 à Vierves-sur-Viroin. **Corneille noire** (*Cor-*



Photo 8 Roitelet triple-bandeau / Firecrest – Harzé – avril / April 2007 (photo : René Dumoulin).



*vus corone*) : un ex. capture une Grive draine adulte le 14.05 à Flémalle. **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : mentionné sur au moins 15 sites différents. On retiendra 7 ex. le 09.04 à la Croix-Scaille, deux couples le 10.05 aux Épioux (Florenville) et son expansion en Ardenne couvoinoise.

**Moineau domestique** (*Passer domesticus*) : 1 ex. intégralement blanc le 27.05 à Otrange. **Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) : la migration prénuptiale se déroule tout au long de mars, avec un pic entre le 26 et le 28 : modérée et assez haut le 8 à Ellezelles, très nombreux en halte le même jour à Ploegsteert, dix groupes vers le nord-est le 13 à Tarcienne, passage soutenu depuis le 26 et nombreux en halte le 28 à Vielsalm, quelques groupes vers le nord-est le 27 aux Awirs, à Neupré et à Grandmenil... **Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : en dehors de deux concentrations importantes (entre 2.000 et 3.000 ex. le 09.03 dans les bois de Nassogne et un millier le même jour à La Roche), peu de mentions d'hivernage et présence toujours réduite aux mangeoires. Le passage est signalé le 26.03 à Vielsalm et le 15.04 à la Croix-Scaille. **Serin cini** (*Serinus serinus*) : après une première observation de 3 ex. le 02.03 au Sart-Tilman et 1 ex. à Mariembourg, le retour sur les sites de nidification est signalé le 08.03 à Treignes et le 16.03 à Yvoir. Le passage est peu remarqué si ce n'est à la station de baguage d'Etthe où 126 ex. ont été bagués du 12.04 au 29.04. Par comparaison, 6 ex. seulement bagués aux Awirs. **Chardonneret élégant** (*Carduelis carduelis*) : quelques hivernants dont un groupe d'une centaine dans les mélèzes le 6 à Lavaux-Sainte-Anne sont signalés en mars. La migration prénuptiale est particulièrement faible comme en témoigne l'absence de captures aux Awirs. Une famille avec jeunes volants dès le 29.05 à Treignes. **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : des groupes d'une quarantaine poursuivent leur hivernage début mars dans la région de Gedinne. Des chants et parades sont mentionnés tout au long des mois de mars et d'avril à Mochamps, Nassogne, Gedinne, Vielsalm, Wanne, Manhay... À Lierneux, l'espèce est toujours présente le 14.05 mais n'est plus détectée la semaine suivante. **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : des mentions le 04.03 en des sites où ils n'ont pas été signalés l'hiver (une cinquantaine à Gottignies, 9 à Thieusies et un petit groupe dans la région de Freux) sont les prémisses de la migration prénuptiale. Cette dernière est peu signalée par les observateurs (plusieurs groupes vers le nord-est le 18.03 à Nassogne) et, à la station de baguage des Awirs, elle est la plus faible des vingt dernières années (375 oiseaux bagués alors que la moyenne est de 777 ex.). **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : encore quelques observations pendant la première quinzaine de mars : 1 ex. le 11 à Vielsalm,

5-6 ex. le 15 aux Épioux, une vingtaine en brève halte le 15 à Flobecq. Plus tard, seulement 1 ex. le 02.04 à Braine-l'Alleud, 1 ex. le 15.04 à Bruly-de-Couvin, 1 ex. le 14.05 à Commanster (Vielsalm) et le 25.05 à Oignies-en-Thiérache. **Bec-croisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : même s'ils sont encore nombreux le 21.03 à Gedinne, les nombres se réduisent au fil des semaines, jusqu'au 5 mai. Des jeunes volants sont signalés le 18.03 à Yvoir, le 02.04 à Mochamps et le 16.04 à Wanne. **Grosbec casse-noyaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : l'espèce reste encore bien présente en mars dont de nombreux groupes en début de mois dans la région de Gedinne, prolongeant la présence en février et de nombreux ex. le 25 à Nassogne. Les mentions et les concentrations diminuent en avril et deviennent rares en mai. Au niveau des stations de baguage, 49 ex. ont été bagués du 05.04 au 29.04 à Etthe et 14 du 27.03 au 01.05 aux Awirs, principalement des mâles.

**Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : quelques groupes sont encore signalés en mars : une cinquantaine d'ex. le 4 entre Achouffe et Dinez (Houffalize), 2 groupes dont un d'une quarantaine le 4 dans la région de Freux, 80 ex. le 10 entre Boutonville et Dailly, un groupe de 30 ex. le 11 et de 45 ex. le 25 à Benonchamps. **Bruant zizi** (*Emberiza cirius*)\* : deux chanteurs, un en brève halte le 23.04 à Liège et un séjournant à partir du 24.05 à Viroinval. **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : l'hivernage se poursuit début mars dans la région de Gedinne. Les chants résonnent tôt, dès le 04.03 à Amay, le 08.03 à Ploegsteert, le 10 à Quévy, le 11 à Hollogne-sur-Geer... Dans le même temps, la migration continue mais sur un mode mineur; les derniers migrateurs en halte sont signalés le 12.04 à Ploegsteert. **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : le retour sur les sites de nidification est lent; les mentions, dans l'ensemble assez peu nombreuses, n'incitent pas à l'optimisme pour cette espèce en fort déclin. On retiendra cependant de nombreux chanteurs le 27.04 sur le plateau entre Saint-Jean-Geest et Piétrain (Jodoigne) à proximité d'une zone en culture à l'ancienne en Flandre limitrophe ainsi que la présence de deux chanteurs le 11.05 à Castillon où il n'était pas présent en 2006.

REMERCIEMENTS - Nous remercions les très nombreux observateurs qui ont contribué à documenter cette synthèse saisonnière ! Ce sont Abel J., Adriaens P., Adriaens V., Annoye N., Auriol C., Baccaert A., Baron A., Baye J.M., Bayot A., Beckers A., Blondiau G., Blyth M., Boeckx A., Bogaert E., Bonmarchand S., Boone P., Bouchat A., Bouckenoghe B., Bouhon C., Boulangé P., Bouquiaux B., Boux K., Bronne L., Brunin C., Buchet V., Bulteau



V., Burnel A., Cantinieaux M., Carbonelle S., Carels C., Carpentier A., Cauwe F., Cavez B., Christophe B., Clesse B., Clotuche E., Collas C., Colas J.M., Cors R., Crépin L., Crohin R., Crozier D., Collaerts E., Collaerts P., Cucurnia P., Dambiermont J.-L., De Boeck B., De Broyer A., de Cal-latay H., de Favereau C., De Groot D., De Guchteneere G., de Liedekerke R., De Meirman J., De Paemelaere M., Declercq M., Decruynaere E., Deflorenne P., Degossely P., Degrave F., Dehombreux E., Delahaye L., Delneste J.L., Delsalle M., Demonty L., Denoiseux B., Depuydt J.-F., Derouaux A., Derume M., Desablans P., Detaille R., Devos D., Dewinter N., Dewitte T., Dielen V., Dilbeck V., Donnet E., Dordolo A., Dormal F., Dragonetti J., Dubois P., Duchesne P., Dufour V., Dufourny H., Duhayon G., Dujardin R., Dumont D., Dumortier C., Dumoulin R., Dupriez Q., Dutoit N., Ellis F., Englebert J.-P., Eykmans J., Fagot J., Fanon Y., Farinelle C., Fasol M., Fautsch M., Faveyts W., Fays C., Fontaine D., Fouarge J., Garnier M.A., Gauquie B., Geiregat N., George Y., Gérard M., Ghysel P., Gigalkin S., Gijis F., Gilles B., Gillon R., Giot Y., Godding E., Goffette Q., Graulich A., Gridlet T., Gruwier C., Guillebaut S., Hambersin M., Hanus B., Hendrick R., Hermant P., Hidvégi F., Horney G., Hotton J.-P., Hupperetz J., Huyghebaert C., Ide J., Ittelet M., Jancloes P., Jansen J., Janssens M., Jardon B., Jobé P., Jortay A., Kaiser A., Kervin T., Kinet T., Koob V., Kuenhen V., Kunsch A., Laffineur E., Lafontaine R.-M., Lambert A., Lambert M., Lambillon J., Lambotte A., Landrieu D., Laudelout A., Laurent G., Laurent L., Lebrun R., Leclef P., Lecohier D., Leers W., Lefèvre C., Leirens V., Lejeune B., Lenain H., Leprince P., Lescure M., Lhoest P., Loly P., Lombart A., Maniquet C., Maniquet T., Marchal B., Marchal F., Mardulyn H., Mariage T., Masi A., Matagne J., Matagne M., Mathieu G., Mayon N., Mazy B., Meeüs

T., Melon P., Mengal J., Mertens J., Meura J., Michel P., Monmart A., Morren K., Mossoux P., Nef B., Neirincq P., Nolf P., Ory T., Paquay M., Paquay N., Paques H., Paquet A., Paquet C., Paquet J.-Y., Pasau B., Pascal P., Périkel A., Perrot P., Peten S., Picard O., Pieroux A., Pierrard N., Pierret S., Piette A., Piette A., Piette J., Pironnet A., Poncellet J.M., Pourignaux F., Priels C., Querton G., Rabosée D., Rapaille J.P., Rappe D., Rasyon G., Rasyon N., Reginster J.-P., Reiter A., Renard F., Richir F., Roberfroid O., Roca M., Rommes J., Rougeron A., Rousseau C., Ryelandt F., Sainlez A., Sansdrap A., Schmitz L., Schwerts J., Seideschnur C., Senkiw P., Sevrin D., Smeets A., Smousse P., Sorbi S., Soreil C.-E., Spietz L., Squelin B., Stassin P., Sturbois J.-Y., Swinnen V., Taymans J., Teerlynck H., Testaert D., Theys M., Thunus R., Tisthoud P., Tombeur S., Van de Velde G., Van Den Abbeele F., Van Kerckhove E., Van Laethem P., Vandevyvre X., Vandeput M., Vanhove F., Vanmeerbeeck P., Vanschepdael M., Van't Westeinde, Verdonck F., Verroken D., Verroken L., Verstaete H., Verté P., Veys P., Vieuxtemps D., Vilain B., Vin J.-L., Vrancken W., Wallon J., Walravens M., Warnie G., Wathour M.M., Wauters M., Wauthier P., Windels M., Wuelche J., Xhardez C., Yernaux X., ainsi que les observateurs du Guignard, du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse (chronique dans «La Grièche») et de sites comme Latour, le Grand Vivier de Longchamps, Virelles, Harchies, les BEH... ou d'autres dont le nom aurait été omis. Merci à tous.

La compilation des données a été effectuée par Alain Baccart, André Burnel, Paola Cucurnia, Claire Huyghebaert et Philippe Vanmeerbeeck, ainsi que via une partie des encodages de données effectués dans les sections régionales.

#### SUMMARY – Observations from March to May 2007

A remarkable mildness continued throughout the spring, with a period of exceptionally long drought (36 days without rain). In these conditions, many returning and passing migrants were early, without this being completely general. Some migrators were especially frequent (Hoopoe and Ring Ouzel, for example), others rather rare (Whinchat, Goldfinch, Linnet...). Among the exceptional spring visitors, we note White-winged Terns in May, but also observations of the Glossy Ibis, Bonelli's Eagle, Dotterel, Great Snipe, Long-billed Dowitcher, Broad-billed Sandpiper, Iceland Gull, Glaucous Gull, Whiskered Tern, Bee-eater, Woodchat Shrike, and Cirl Bunting.

Among the notable nesters were the waders of Hensies: the second consecutive year for the Night Heron and Little Egret, attempted installation of Cattle Egrets and manifestation of a Spoonbill. Note also the reproduction of Greylag Geese, Avocets, and three Harriers, the continued increase of Gadwalls, and a Spotted Crake. Once again, very few Corncrakes were heard. Among the small songbirds, we note three Savi's Warblers, two Fan-tailed Warbler territories, the presence of Bearded Tits during the nesting period and the reproduction of several mixed pairs of Pied and White Wagtails. Some non-nesting summer visitors also drew our attention such as numerous Yellow-legged Herring Gulls and some young Caspian Gulls.

There were some indications of very early nesting, such as Great Crested Grebes and Great Tits in March and Shelducks at the beginning of May. (JLn)