


OBSERVATIONS DE JUIN À AOÛT 2007

Centrale Ornithologique Aves
Groupe de travail « Chroniques »*



C.-H. Born

L'été 2007

Après la douceur du printemps, le mois de juin fut assez chaud mais fort couvert et pluvieux (99 mm d'eau en 19 jours contre 67 en 15 jours en moyenne à Uccle). Juillet fut en fait assez normal en dépit d'une impression de grisaille (surtout en première décennie) et d'un temps souvent pluvieux (97 mm en 18 jours contre 74 en 17 jours en moyenne). Août connut moins de pluies, des températures normales mais un ensoleillement inférieur à la moyenne. Aux courants maritimes de la première décennie de ce mois ont succédé du 11 au 24 des dépressions plus ou moins chargées de pluies (abondantes le 21). La fin du mois fut plus sèche, sous l'influence d'un anticyclone centré à l'ouest des îles Britanniques.

L'été est souvent le temps des confirmations. Côté nidifications remarquables, on se réjouit de la reproduction d'au moins 46 couples de Grèbes à cou noir (dont 31 à Ploegsteert), de la réussite des nichées de Bihoreau et d'Aigrette garzette, d'un nombre croissant de Tadornes de Belon (même dans un site a priori marginal comme un bassin d'orage) et de Canards chipeaux, de l'envol de nichées des trois espèces de busards (avec le Saint-Martin qui devient quasi annuel), de la première nidification wallonne de la Sterne pierregarin et sans doute de la Panure à moustaches. De nouvelles avancées sont aussi enregistrées pour la Gorgebleue et la Pie-grièche écorcheur. Le cantonnement d'un Bruant zizi du 24 mai au 17 juin à Treignes attire l'attention sur le retour possible de ce nicheur disparu mais toujours bien présent en Champagne-Ardenne. Le Cassenoix se distingue par une nouvelle nidification près de Couvin mais aussi par une surprenante observation de dispersion le 3 juin à Fleurus. La présence estivale de quelques espèces retient aussi l'attention : la Grande Aigrette, la Spatule, le Balbuzard, les grands goélands (notamment le Goéland pontique), la Huppe, le Traquet motteux, la Cisticole... On regrettera toutefois le recul continu du Tarier des prés, la diminution de la Grive litorne, la rareté du Blongios, du Râle des genêts, du Bec-croisé des sapins et du Sizerin flammé. 2007 fut également une année sans Guêpier.

Une série de visiteurs rares ont aussi ponctué l'été : une Locustelle fluviatile séjournant début juin à Harchies, un Phalarope à bec étroit à Éghezée-Longchamps début juin, un Crabier chevelu nuptial à Virelles fin juin-début juillet, un Oedicnème à Viroinval en juin (les nicheurs français ne sont pas très éloignés), sans oublier les mentions en août de Faucon kobez, d'Oedicnème, de Fauvette épervière, de Busard pâle, et un passage bien fourni de Pluviers guignards. Les points d'orgue furent le second Goéland de la Baltique trouvé en Wallonie (un oiseau originaire d'une colonie de mer Blanche - Aves 44 : 201-214), l'afflux majeur de Vautours fauves entre le 16 juin et le 10 juillet ainsi qu'une capture de Rousserolle isabelle en août.

Les passages postnuptiaux furent assez modestes pour la plupart des limicoles, la Tourterelle des bois, le Torcol, la Bergeronnette printanière. Après des Grues en passage début août, la météo de la période allant du 11 au 21 a favorisé les haltes migratoires de nombreux oiseaux (Sarcelle d'été, Pluviers doré

*Rédacteurs de la présente chronique : A. Burnel, C. Farinelle, T. Mariage, T. Ory, Ph. Vanmeerbeeck et J.-P. Jacob.



et guignard, Goéland brun...). Les derniers jours du mois ont ensuite permis d'observer des pics de passages traditionnels de Bondrée, Cigogne blanche, Bergeronnette printanière, Pipit rousseline, traquets, fauvettes... mais aussi des visiteurs plus inattendus (Busard pâle, Mouette tridactyle, Hibou des marais entre autres), l'arrivée d'un nombre croissant de Grandes aigrettes ainsi que quelques passages automnaux précoces (Buse, Pipit farlouse).

Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par Internet (site Aves et Aves-Lux), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collationnées par le GT Le Guignard (Hainaut occidental) et la cellule de l'Entre-Sambre-et-Meuse («La Grièche»).

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure. Le complexe marécageux de Harchies-Hensies-Pommeroeul est souvent simplement libellé «Harchies».

Détail des observations

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : nombreuses mentions tout au long de l'été. Entre autres, 85 ex. le 18.07 à Hensies, 99 ex. dont 58 pulli le 03.08 à Harchies, 38 ex. le 04.08 à Ploegsteert, 30 ex. le 16.08 à Hologne-sur-Geer, 19 ex. dont au moins 7 juvéniles le 18.08 aux décanteurs de Genappe. **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : dès le début du mois de juin, un ou plusieurs couples nicheurs sont renseignés à Escanaffles, à Braine-l'Alleud, à Basse-Wavre et à l'étang de Gastuche dans le Brabant wallon. Au moins 5 nichées réussies à Hensies, 4 à Virelles et 3 à Falemprise (BEH). Les mois suivants, un maximum de 86 ex. le 22.07 à Hensies, 68 ex. dont 22 pulli le 03.08 à Harchies et une concentration de 60 ex. dont 28 juvéniles le 04.08 à Roly. **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : au moins 46 couples nicheurs. Douze couples pour l'ensemble des décanteurs liégeois, dont 3 nichées à Hologne-sur-Geer. L'espèce est toujours abondante à Ploegsteert avec 31 nichées cet été contre 22 en 2005. Ailleurs, 4 adultes + 6 pulli le 18.07 à Hensies, 2 ad. et 1 juvénile le 21.07 à Éghezée-Longchamps, 3 ad. et 4 pulli le 27.07 à Harchies. Enfin, 2 mentions d'individus non nicheurs : 3 adultes le 28.06 à Virelles et 1 adulte le 02.08 à Escanaffles.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : bien que les premières dispersions aient lieu dès le printemps, 4 nichées de la colonie d'Hensies n'ont toujours pas pris leur envol le 13.08. À cette date, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, 43 ex. sont présents à Farciennes et 36 ex. deux jours plus tard à Virelles.

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) : 1 femelle le 10.07 à Harchies et un juvénile du 21.07 au 01.08 à Virelles.

Héron cendré (*Ardea cinerea*) : la colonie d'Hensies a atteint 151 nids. Celle de Rosières comptait 29 nids. Notons certaines concentrations postnuptiales : 16 ex.



Héron cendré, Visé, 13 juin 2007 / Grey Heron, Visé, 13 June 2007 (photo : Jean-Marie Poncelet)

Les espèces dont l'observation est soumise à homologation sont marquées d'un *.



le 04.08 à Roly, 14 ex. le 16.08 à Xhoris, 24 ex. le 27.08 à Thommen... **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : un juvénile le 25.08 à Clermont-lez-Walcourt et du 29.08 au 01.09 à Virelles. **Grande Aigrette** (*Casmerodius albus*) : l'espèce estive et voit sa présence se renforcer dès fin août. Présente à Hensies pendant toute la période de nidification avec un maximum de 15 ex. le 16.08. À Virelles, un pic de 11 ex. le 29.08. Plusieurs autres régions sont visitées dont 4 ex. à Hologne-sur-Geer le 21.08. Des isolées sont mentionnées à Latour, Chaumont-Gistoux, Donceel, Tournai et Thommen. **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) : nicheuse depuis 2006 à l'étang « Van Damme » d'Hensies où le dortoir atteint 24 ex. le 13.08. À Harchies, 8 ex. sont présents le 23.08. Plus tôt en saison, 2 ex. sont signalés en juillet dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (Donstiennes et BEH). À Virelles, maximum 3 garzettes estivent à partir du 30.06. **Bihoreau gris** (*Nycticorax nycticorax*) : 1 ex. à Virelles le 15.07. L'espèce niche à nouveau à Hensies où 2 adultes sont accompagnés d'un juvénile le 13.08. **Crabier chevelu** (*Ardeola ralloides*)* : 1 adulte en plumage nuptial séjourne du 22.06 au 08.07 à Virelles.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : mentionnée pendant toute la période estivale dans au moins 80 localités réparties au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Quelques-unes plus au nord, à Hologne-sur-Geer, Éghezée-Longchamps, Templeuve (Tournai), ou encore Gondregnies (Ath) avec 2 ex. sur 3 bagués couleur (une d'entre elles est d'origine tchèque). La majorité des observations concernent un seul individu. Un groupe de 4 adultes et 3 juvéniles à Faulx-les-Tombes le 07.08. Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, certains nids n'ont pas été réoccupés. **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : en juin, éclosions à Horion et à Cambron-Casteau, en dehors du parc Paradisio. Les 2 jeunes d'Horion s'envolent le 30.07 grâce au nourrissage intensif assuré par le mâle suite à l'accident mortel de sa compagne fin juin. Le passage postnuptial s'intensifie dès la mi-août : 18 ex. à Chimay le 13.08, 30 ex. à Ligny le 19.08, 67 ex. à Arquennes le 21.08, 50 ex. à Jurbise le 22.08, 68 ex. à Hemptinne le 24.08, 37 ex. du 22 au 24.08 à Stave... **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) : 2 adultes tout l'été à Hensies. Une le 22.07 à Hologne-sur-Geer.

Oie cendrée (*Anser anser*) : une nichée en juin à Harchies. **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : au moins 3 nichées menées à bien à Hologne-sur-Geer (26 jeunes) et à Escanaffles (18 jeunes). Nicheur aussi à Warcoing (8 jeunes), à Éghezée-Longchamps (11 jeunes), aux décanteurs de Genappe (2 jeunes), au canal de l'Espierre (3 jeunes), à Fontenoy (13 jeunes) et sur un bassin d'orage à Omal (3 jeunes). **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : pour cette espèce en progression, 116 ex. dont 57 canetons (9 nichées) le 12.06 à

Harchies et 50 ex. dont 28 canetons le 30.06 à Hensies. Une nichée également à Escanaffles (2 jeunes) et deux à Hologne-sur-Geer. **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : les premières concentrations sont observées en août : 85 ex. le 13.08 à Hensies, 28 ex. le 18.08 à Éghezée-Longchamps, 60 ex. le 22.08 à Hologne-sur-Geer, et 23 ex. le 24.08 à Genappe. **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : présente en petit nombre sur les sites habituels : Éghezée-Longchamps, Ploegsteert, Hensies, Harchies, Virelles, Warcoing et Hologne-sur-Geer. A Hensies, 18 ex. le 31.07 et minimum 65 ex. (passage postnuptial) le 13.08. **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : 300 ex. le 17.06 à Roly, plus de 1.322 ex. le 31.07 à Hensies et 554 ex. le 25.08 sur l'Escaut entre Froyenne et Warcoing. **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : nicheur sur deux sites, Hensies en juin (18 canetons) et Hologne-sur-Geer en juillet (1 nichée). En août, les nombres augmentent avec 94 ex. le 03.08 à Harchies, 40 ex. le 18.08 à Éghezée-Longchamps et 213 ex. le 28.08 à Hensies. **Canard pilet** (*Anas acuta*) : 1 ex. le 04.06 à Éghezée-Longchamps et le 07.07 à Virelles. **Nette rousse** (*Netta rufina*) : uniquement des mâles isolés : le 20.06 à Basse Wavre, dès le 14.07 à Hensies et dès le 31.07 à Falemprise (BEH). En août, des observations à Hensies et Falemprise concernent probablement les mêmes oiseaux. **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : la nidification est seulement renseignée à Hologne-sur-Geer (2 nichées), Harchies, Gastuche, Éghezée-Longchamps, Boneffe (2 nichées), Virelles (9 nichées) et sur le canal de l'Espierre. Le 28.08, 242 ex. à Harchies et 227 ex. à Hensies. **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : nicheur notamment à Virelles (14 nichées), Falemprise (3 nichées), Boneffe (4 nichées), Fleurus, Bastogne, Freux, Escanaffles, Thommen, Hologne-sur-Geer... **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)* : un mâle le 06.06 à Harchies, revu du 21.06 au 28.08 à Hensies; un second mâle y est découvert le 16.08. **Érismature rousse** (*Oxyura jamaicensis*) : un mâle le 29.08 à Virelles.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : signalée en juin et juillet dans une cinquantaine de localités. La migration débute le 15.08 avec 1 ex. vers le sud-ouest à Nassogne. Elle culmine les 24 et 25.08 avec, le 24, 13 ex. à Heuzy, une vingtaine par petits groupes à Huy, 24 en 4 h à Bure, 16 à Marchienne-au-Pont, 8 à Louvain-la-Neuve et 24 à Torgny; le 25, 184 ex. en plusieurs groupes, dont un de 27 ex., à partir de 11 h à Fosses-la-Ville. Par après, outre des isolés, au moins 11 ex. le 25 et 6 le 27 à Freux et 13 le 27 à Ramecroix (Verviers). **Milan noir** (*Milvus migrans*) : le passage postnuptial débute le 04.08 avec plus d'une dizaine en migration active en Moyenne Semois. Des mentions plus tardives : 1 ex. sur place le 17.08 à Thommen et des migrateurs en fin de mois, 1 le 27 à Freux, 2 le



28 à Jalhay et 1 le 29 à Benonchamps. **Vautour fauve** (*Gyps fulvus*)* : afflux très important en juin. Le 17, 2 ex. en vol au-dessus de Thommen et un groupe de 60 en direction NNE à Virelles; le 19, 1 ex. à Sart-en-Fagne, 1 à Woluwe-Saint-Pierre, 1 à Frameries et 2 à Seraing; le 21, 2 ex. en vol à Malmedy, 2 à Angleur, 10 à Genval et une cinquantaine à Sainte-Marie-sur-Semois; le 25, une quinzaine sont repérés aux alentours de Waremme par un avion volant entre 800 et 1.000 mètres d'altitude; enfin, le 27, 1 ex. à Treignes. Deux mentions encore en juillet : un jeune du 06 au 09 à la décharge de Mont-Saint-Guibert et 2 ex. le 10 à Tenneville. **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : enfin des nidifications réussies dans le Hainaut occidental avec 4 juvéniles observés fin juillet aux Prés de Grand Rieu à Hautrage ainsi que 3 jeunes à l'envol à Angre et Givry début août. D'autres tentatives ont été notées à Orcq-Froidmont et dans le Brabant wallon; une femelle fuit devant la moissonneuse à Lantin mais aucun nid ne sera trouvé. En août, les mentions d'oiseaux en migration ou en halte sont monnaie courante dans les plaines du nord du sillon Sambre-et-Meuse et de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Retenons particulièrement 2 adultes et 6 juvéniles au dortoir situé dans un champ de pommes de terre le 17.08 à Angre.

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) : nidification réussie dans la plaine d'Outgaarden-Piétrain (3 jeunes à l'envol le 21.07) et dans la région de Givry (au moins 2 jeunes à l'envol). Un couple en parade est également observé début juin à Jandrain. La parade tardive pourrait être le signe d'un échec de la nidification, ce couple ayant été observé précédemment sur le site. Vingt-quatre mentions en août d'oiseaux en dispersion ou déjà en début de migration. **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : cinq nids ont été repérés dans les céréales cet été. Seulement deux (Jandrain et Entre-Sambre-et-Meuse) conduiront 5 jeunes à l'envol au total. Une seconde nichée dans l'ESM, à Clermont, s'est soldée par la mort des 4 poussins probablement liée au passage d'un prédateur. Les œufs n'ont pas éclos à Boneffe et, à Avennes, la nichée (4 poussins) a été volontairement « moissonnée » par l'agriculteur. **Busard pâle** (*Circus macrourus*)* : un mâle de 3^e année les 30 et 31.08 sur la plaine de Clermont-lez-Walcourt. **Buse variable** (*Buteo buteo*) : quelques observations marquantes en août : 25 ex. aux environs de Verlaine le 20, 15 ex. à Othée le 22, 25 ex. dont 10 en migration avec les bondrées le 25 à Fosses-la-Ville. Cette observation remarquable rappelle que le passage de la Buse variable peut s'amorcer dès la fin de l'été. **Balbuzard pêcheur**



Vautour fauve, Mont-Saint-Guibert, 5 juillet 2007 / Eurasian Griffon, Mont-Saint-Guibert, 5 July 2007 (photo : Bruno Marchal/asbl Plumalia)



(*Pandion haliaetus*) : estivant probable à Virelles avec des mentions les 17.06, 01.07 et 25.07. En août, en migration, l'espèce est notée à 24 reprises dont la plus originale est celle d'un oiseau posé dans un labour le 22 entre Chapon-Seraing et Donceel. **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : avec l'abondance des campagnes, la saison de nidification a été bonne. Plusieurs nichées ont donné 6 jeunes à l'envol, notamment à Dreye et Alleur. Les densités des rassemblements postnuptiaux sont trop peu signalées. Notons 16 ex. ensemble à Vellereille-le-Sec et une quinzaine d'individus entre Chapon-Seraing et Donceel le 22.08. **Faucon kobez** (*Falco vespertinus*)* : un juvénile du 18 au 21 août à Burdinne et un mâle immature le 21.08 à Martouzin. **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : mentionné dans plus de 50 localités au cours de l'été. **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : continue à s'installer sur de nouveaux sites comme le montre la présence répétée d'une femelle à l'église Saint-Antoine d'Etterbeek.

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : cette espèce discrète est signalée toute la période, exclusivement en Hainaut (Ploegsteert, Harchies, Ghislenghien, Virelles). Une seule preuve de nidification est apportée : un adulte accompagné de 2 poussins noirs le 04.08 à Virelles. Un premier râle est capturé et bagué le 12.08 à Nodebais. **Râle des genêts** (*Crex crex*) : hormis le chanteur entendu le 07.06 à Boneffe, les autres mentions (au moins 8 chanteurs) proviennent de l'Entre-Sambre-et-Meuse en juin-juillet. **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : notée à partir de la mi-août : 1 ex. le 12 à Ploegsteert, un premier oiseau bagué le 12 à Nodebais, 1 ex. le 18 à Hologne-sur-Geer, 1 juvénile le 28 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. les 22 et 30 puis 2 ex. le 31 à Virelles. **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : 49 nichées et 138 pulli sont recensés le 15.06 à Harchies, 62 nichées et 146 pulli le 21.06 à Hensies. Le même exercice pour la **Gallinule poule-d'eau** (*Gallinula chloropus*), début août, donne 14 juvéniles et 5 pulli répartis en 5 nichées le 03 à Harchies, 19 juvéniles et 5 pulli répartis en 5 nichées le 07 à Hensies.

Grue cendrée (*Grus grus*) : 2 ex. en vol vers le sud le 04.08 en Semois gaumaise et 1 ex. profitant d'une ascendance thermique le 13.08 à Cul-des-Sarts. Des observations aussi hâtives sont exceptionnelles.

Huïtrier pie (*Haematopus ostralegus*) : les observations (6 données en juin – 4 en juillet – 3 en août) s'égrènent sur tout l'été à Escanaffles, Pottes-Hérinnes, Warcoing, Anseroel, Nivelles, Ramegnies-Chin, Pécrot. **Avocette** (*Recurvirostra avosetta*) : la présence d'un couple accompagné de 3 pulli le 13.06 indique la nidification à Warneton. Les autres données se distribuent régulièrement sur toute la période à Warcoing, Gaurain-Ra-

mecroix, Fontenoy, mais aussi à Hologne-sur-Geer et Éghezée-Longchamps où l'espèce est beaucoup plus rare à cette époque. **Oedicnème criard** (*Burhinus oedicnemus*)* : 1 ex. le 20.06 à Viroinval et 1 juvénile le 24.08 à Boneffe.

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*) : le passage post-nuptial est peu décelé, les migrateurs rejoignant les nicheurs sur les sites de nidification. Un seul rassemblement dépasse la dizaine d'oiseaux : 19 ex. le 14.07 à Hologne-sur-Geer. **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : après un ultime migrateur pré-nuptial noté début juin aux BEH (Plate-Taille), le passage post-nuptial se remarque dès la fin du mois de juillet (1 juvénile le 29 à Warcoing) et se poursuit en août (1 ex. le 02 à Éghezée-Longchamps, 2 juvéniles le 05 à Hologne-sur-Geer et 1 ex. le 11 sur le plateau de Clermont-lez-Walcourt). **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : le passage post-nuptial débute en août (14 données, 56 ex.). Après un premier adulte en plumage nuptial le 11 à Éghezée-Longchamps, la plupart des observations du mois se concentrent du 22 au 24 à Boneffe, Flémalle, Angre, Corroy-Libersart, Vellereille-le-Sec, Clermont-lez-Walcourt, Fosses-la-Ville, Pottes, Hologne-sur-Geer, Seraing-le-Château et Stave. **Pluvier guignard** (*Eudromias morinellus*) : recherchés dès la mi-août dans les plaines de culture, les premiers guignards sont découverts le 19 à Burdinne (4 ex.) et Clermont-Walcourt (2 ex.). Les mentions se succèdent ensuite régulièrement jusqu'à la fin du mois (21 données pour un total de 173 ex.) à Burdinne, Clermont-lez-Walcourt, Boneffe, Angre, Seraing-le-Château, Thisnes (Merdrorp), Estaimpuis, Corroy-Libersart, Sart-Risbart et Malèves-Sainte-Marie. Quelques troupes approchent ou dépassent la vingtaine d'oiseaux : 19 adultes le 20.08 à Burdinne, entre 15 et 20 ex. le 25.08 à Boneffe, 24 ex. le 24.08 à Sart-Risbart. **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : les premiers rassemblements sont signalés en juin mais



Poule d'eau juvénile, Hologne-sur-Geer, 7 août 2007 / Juvenile Moorhen, 7 August 2007 (photo : Jules Fouarge)

ne deviennent importants qu'au mois d'août : 500 ex. le 11 à Éghezée-Longchamps, 700 ex. le 16 à Omal, 800 ex. le 20 à Boneffe. Aucune troupe ne dépasse le millier d'oiseaux.

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*) : 1 ex. en plumage internuptial le 25.08 à Warcoing. **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : 1 ex. le 29.07, 1 juvénile le 21.08 et 1 ex. le 25.08 à Warcoing; 1 adulte les 07 et 11.08 à Éghezée-Longchamps. **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : 1 adulte les 21 et 22.07 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 25.07 à Warcoing, 6 ex. le 29.07 à Éghezée-Longchamps (groupe le plus important pour le site depuis 1992), 1 ex. le 10.08 à Warcoing, 3 adultes et 1 juvénile les 20 et 21.08 à Hologne-sur-Geer. **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : faible passage : 1 en plumage nuptial le 22.07 à Hologne-sur-Geer, 2 le 02.08, 1 le 05.08, 2 le 06.08, 1 adulte les 08 et 11.08, 1 les 23 et 24.08 à Éghezée-Longchamps, 1 le 26.08 à Hologne-sur-Geer. **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : après deux données de juin (1 ex. nuptial le 12 à Éghezée-Longchamps et le 27 à Hologne-sur-Geer) puis 1 ex. les 10-11.07 à Éghezée-Longchamps, le passage post-nuptial est remarqué dès la mi août à Éghezée-Longchamps, Fontenoy, Hologne-sur-Geer et Boneffe mais ne concerne encore que des isolés ou des paires. **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : peu d'observations estivales : 1 mâle le 21.06 à Fontenoy puis 5 données en juillet (3 ex. le 04 à Warcoing, 1 mâle les 12 et 14 à Fontenoy, 1 adulte le 18 à Éghezée-Longchamps et 1 ex. le 22 à Hologne-sur-Geer). Sept mentions en seconde quinzaine d'août concernent peu d'oiseaux (max. 4 ex. le 17 à Fontenoy).

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : entamé fin juillet (2 ex. le 21 à Éghezée-Longchamps), le passage post-nuptial se poursuit en août, les groupes les plus fournis étant relevés fin du mois : 25 ex. le 16 à Hologne-sur-Geer, 18 ex. le 23 à Néchin (Estaimpuis), 15 ex. le 24 à Leuze. **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : les premiers oiseaux en passage post-nuptial sont rencontrés le 22.07 à Hologne-sur-Geer et le 29.07 à Warcoing. En août, outre 1 ex. le 03 à Warcoing, un individu séjourne tout le mois à Hologne-sur-Geer. **Barge rousse** (*Limosa lapponica*) : 1 ex. en migration le 03.08 à Pailhe. **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : 10 données cumulant 25 ex. après le 11.08 en plaine de Thuillies-Clermont, à Roisin, Haneffe, Boneffe, Anserooul, Angre et Corroy-Libersart, avec comme max. 7 ex. le 20 à Roisin et 6 ex. le 23 à Boneffe. **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : 2 ex. le 25.07 à Froidmont et 4 données (6 ex.) à partir du 20.08 à Boneffe, Vis-soul et Braives. **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : seulement 1 ex. le 10.07 à Éghezée-Longchamps, 1

ex. le 22.08 à Hologne-sur-Geer et 1 juvénile du 26 au 29.08 à Éghezée-Longchamps. **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : la migration pré-nuptiale se termine en juin avec des mentions régulières tout le mois à Warcoing (max. 9 ex. le 10.06) et plus occasionnelles à Éghezée-Longchamps, Fontenoy, Gaurain-Ramecroix et aux BEH (Plate-Taille). Le début du passage post-nuptial n'est attesté que par deux données fin août : 1 ex. le 23 à Éghezée-Longchamps et 1 ex. le 26.08 à Houtain-le-Val. **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : le passage post-nuptial, peu fourni, débute le 27.06 (1 ex. à Hologne-sur-Geer), se poursuit en juillet (10 données pour 27 ex. max. : 9 adultes le 14 à Hologne-sur-Geer) et s'étoffe quelque peu en août (23 données pour 52 ex. max. : 6 ex. le 16 à Hologne-sur-Geer). La recherche du Pluvier guignard à partir de la mi-août permet également de rencontrer ce chevalier dans les champs (Angre, Roisin, Leuze-en-Hainaut, Fosses-la-Ville, Chaumont-Gistoux). **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : les premiers migrateurs de retour de leurs sites de nidification apparaissent, classiquement, dès le 01.06 (5 ex. à Warcoing et 1 ex. à Ottignies). Les mentions se succèdent ensuite dans toutes les régions avec un maximum fin juin-début juillet. Les rassemblements les plus importants sont remarqués à Warcoing : 22 ex. le 13.06, 46 ex. le 19.06, 50 ex. le 26.06, 45 ex. le 04.07, 33 ex. le 10.07... **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : le passage post-nuptial est peu important. En juin, un adulte en halte le 19.06 à Éghezée-Longchamps et 2 ex. le 26.06 à Warcoing et Éghezée-Longchamps. A peine 10 données en juillet (33 ex.) et 18 en août (37 ex.). Maxima : 6 ex. le 01.07 à Éghezée-Longchamps, 5 ex. le 10.07 à Warcoing puis 7 ex. le 05.08 et 5 ex. le 26.08 à Hologne-sur-Geer. Occasionnels en Famenne, 2 ex. sont observés en halte le 23.08 dans les prés inondés de la plaine de Focant. **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : deux données début juin (1 ex. le 01 à Warcoing et 1 ex. le 04 à Éghezée-Longchamps) puis passage postnuptial dès la fin du mois (1 ex. le 21 à Fontenoy et 1 ex. le 26 à Warcoing). Les données deviennent plus régulières et les rassemblements plus importants fin juillet-début août (maxima : 66 ex. le 25.07, 58 ex. le 29.07, 64 ex. le 03.08 à Warcoing). **Phalarope à bec étroit** (*Phalaropus lobatus*)* : 1 ex. le 08.06 à Éghezée-Longchamps.

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) : un adulte le 06.06 à Hensies. Des juvéniles apparaissent à partir de fin juillet : 1 les 24 et 29.07 aux BEH, 1 le 08.08 à la décharge de Chapois (Ciney), 1 du 10 au 24.08 à Éghezée-Longchamps, 1 le 20.08 à Burdinne et 2 le 23.08 à Clermont-lez-Walcourt. **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : peu de données sur la nidification qui concerne principalement les colonies de Hensies (max. 25 couples en juin), d'Éghezée-Longchamps

(une douzaine de juv. volants le 17.06) et de Fontenoy (5 couples le 23.06). En août, des regroupements avec 1.500 ex. dont 90 juvéniles le 13.08 en Basse Meuse, 400 ex. le 20.08 à Burdinne et 500 ex. le 31.08 à Soignies. À noter, des passages en Gaume où elle est rare, notamment un groupe de 28 ex. le 29.06 à Montquintin et 35 ex. le 09.07 à Martué (Florenville). **Mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*) : un juvénile le 25.08 sur l'Escaut à Esquelmes. **Goéland cendré** (*Larus canus*) : peu de données. La nidification de cette espèce est relativement mal suivie; les seules informations portent sur 6 couples nicheurs en juin à Hensies et 2 couples (1 nid avec 3 oeufs) le 04.06 à Éghezée-Longchamps. En août, de petits groupes sont notés en Basse Meuse (28 ex. le 13.08) et en Hainaut (8 ex. les 03 et 18.08 à Pommeroeul). **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : en juin, encore de nombreux estivants aux alentours des BEH, dont 1.000 ex. à Erpion le 01.06. En août, des groupes de 30 à 100 ex. sont observés en halte migratoire dans toute la région mais les effectifs les plus importants s'observent encore dans l'Entre-Sambre-et-Meuse : 200 ex. à Clermont-lez-Walcourt le 09.08 et 175 ex. à Stave le 25.08. Le 02.06, découverte d'un **Goéland de la Balti-**

que (*Larus f. fuscus*)* de 2^e année aux BEH (Aves, 44 : 201-214). **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : observations assez clairsemées en début de période, même aux BEH; l'espèce recommence à fréquenter Mont-Saint-Guibert en août avec déjà 400 ex. le 10.08. Ailleurs, 12 ex. dont 5 ad. et 2 ex. à pattes jaunes le 13.08 en Basse Meuse. **Goéland leucophée** (*Larus michahellis*) : présent en petit nombre un peu partout en Meuse et à l'ouest de celle-ci. Quelques rassemblements sont à signaler en juillet : 65 ex. le 27 à Lixhe et 20 ex. le 29 à Gaurain-Ramecroix. En août, les groupes augmentent légèrement avec 27 adultes et 3 juvéniles le 02 à Erpion, 120 ex. le 05 à Gaurain-Ramecroix et 85 ex. dont 52 adultes le 13 d'Argenteau à Petit-Lanaye. **Goéland pontique** (*Larus cachinnans*) : 2 ex. de 1^{re} année le 04.06 aux BEH. Quelques mentions en août : 1 ex. de 2^e année le 03 puis un de 3^e année le 28 aux BEH, 5 ex. dont 2 adultes le 13 d'Argenteau à Petit-Lanaye. Parmi ces derniers, un oiseau bagueé en Pologne, déjà observé en Basse-Meuse l'hiver précédent.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) : fin du passage en juin : 1 ex. le 10 Sombreffe et à Namèche, 3 adultes



Mouette rieuse, Longchamps, 17 juin 2007 / Black-headed Gull, Longchamps, 17 June 2007 (photo : Philippe Vanmeerbeeck)



le 12 et 1 adulte le 30 à Hensies. Un couple, présent depuis la mi-juin mène à bien la première nidification régionale de l'espèce à Virelles (voir article pages 81-92). L'espèce est présente en août à Harchies, avec un maximum de 4 ex. le 11. Les 04 et 07, un juvénile quémande bruyamment auprès d'un adulte; ces oiseaux sont vraisemblablement issus de la petite colonie limitrophe de Condé-sur-Escaut. **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : le passage pré-nuptial se poursuit jusqu'à fin juin avec 1 ex. le 03 à Virelles, 4 le 09 à Plombières, 1 les 12 et 19 à Éghezée-Longchamps et la dernière le 26 au Grand-Large de Nimy. Quelques migrateurs post-nuptiaux en août : 3 ex. le 04 à Virelles, 1 ex. le 06 à Woluwe-Saint-Pierre, 3 adultes et 2 juvéniles le 08 et 1 ex. le 12 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 11, 8 le 23 et 1 le 28 à Harchies.

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : ce nicheur discret est présent un peu partout mais rares sont les mentions de plus de deux chanteurs pour la même localité; au plus, 7 chanteurs le 23.06 au camp militaire de Marche-en-Famenne. Rares groupes peu fournis en août : 15 ex. le 11 au Gerny, 4 ex. le même jour à Doische, 18 ex. dont 12 adultes

sur un épicéa le 14 à Ambly (Nassogne) et 13 ex. le 22 à Givry. **Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : deux petits groupes signalés en août : 35 ex. le 12 à Benonchamps et 10 ex. le 23 à Corbais. **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : les premiers rassemblements post-nuptiaux importants comptent 800 ex. le 24.07 à Romerée, 220 ex. le 28.08 à Bernissart et 350 ex. le 30.08 à Niverlée.

Coucou gris (*Cuculus canorus*) : des chanteurs sont encore bien renseignés en juin, surtout en Hainaut dont 4 ex. ensemble le 17 à Ploegsteert, 4 mâles le 21 à Hensies et 4 ex. dont 1 femelle de phase rousse le 24 aux Prés de Grand Rieu (Hautrage). Les rares mentions d'août concernent surtout des juvéniles en dispersion.

Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) : encore 2 chanteurs le 10.06 à la Croix-Scaille (Gedinne). **Hibou grand-duc** (*Bubo bubo*) : observation peu banale d'un ex. dévorant un Autour à Nassogne le 02.06. Hors vallée de la Meuse et régions voisines, notez une nouvelle reproduction réussie dans le Tournaisis (3 jeunes à l'envol). **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : en août,



Tourterelle des bois, Harzé, août 2007 / Turtle Dove, Harzé, August 2007 (photo : René Dumoulin)



1 ex. le 21 à Verlaine, 2 le 23 à Louveigné et 1 le 26 à Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes.

Engoulevant d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) : seuls trois chanteurs (contre 9 en 2006) sont recensés sur le massif de la Croix-Scaille cette année. Par contre, au camp militaire de Lagland (prospection partielle), 12 chanteurs au minimum fin juin. Ailleurs, un individu chanteur le 03.08 à Brûly-de-Couvin. **Martinet noir** (*Apus apus*) : fin juillet, l'espèce a déjà quasiment déserté ses sites de nidification mais elle reste mentionnée jusqu'à la fin août avec, parfois, des nombres élevés, comme plus de 500 ex. vers le nord le 23 à Roisin, plusieurs dizaines de passage le 24 à Huy et plus de 800 en 6 h 30 le 24 à Floreffe. **Huppe fasciée** (*Upupa epos*) : peu de données malgré l'afflux du printemps; elle est signalée chanteuse le 21.06 dans le sud de la Gaume, mention suivie de deux observations d'isolés dans la même zone, le 16.07 à Couvreu (Virton) et le 21.08 sans précision de lieu. Autrement, 1 ex. le 30.08 à Fontaine-l'Évêque. **Guêpier d'Europe** (*Merops apiaster*) : 1 ex. en vol le 08.06 à Harchies.

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : 3 ex. ensemble le 21.07 à Hockai témoignent probablement d'un succès de la nidification. En août, l'espèce est encore signalée le 11 sur un site de nidification à Mochamps tandis que la migration débute le même jour à Nodebais. Avec 24 ex. bagués pour les stations de Nodebais, de Flône, des Awirs et du groupe de l'Est, le passage est loin d'atteindre l'ampleur de 2006. Des observations de migrateurs en halte à Harzé les 21, 24 et 25, à Éghezée-Longchamps le 25, à Warcoing le même jour et à Esquelmes le 26.

Alouette lulu (*Lulula arborea*) : l'espèce est très discrète à cette période et n'est mentionnée qu'à trois reprises : plusieurs chanteurs le 05.06 à Erezée, 10 ex. le 23.06 au camp militaire de Marche-en-Famenne et 13 ex le 07.07 à Clermont-sous-Huy. **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : en août, de petits groupes sont signalés à la fin du mois, avec un maximum de 30 individus ensemble le 28.08 à Biesme-sous-Thuin.

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : l'espèce est signalée sur une bonne partie des sites classiques de nidification, sans effectifs notables. La migration débute au mois d'août mais n'est presque pas décelée; certaines colonies, comme celle de Warcoing, sont encore actives en fin de mois. **Hirondelle rustique** (*Hirundo rustica*) : en juin, les premiers jeunes volants sont observés dès le début du mois, et par la suite, de nouvelles nidifications sont entamées. Plus de 300 juvéniles sont comptés dans un dortoir à Gedinne le 21.07, époque des rassemblements. La migration débute peu

après, et un pic se marque à la fin du mois d'août, avec notamment 196 ex. en 3 h 45 à Ramecroix le 26.08. **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbicum*) : des rassemblements sont signalés début août, avec notamment 300 ex. le 2 dans les Hauts Pays, ainsi que 400 ex. le 08 à Virelles. Certaines colonies sont encore partiellement actives à la fin de ce mois.

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : 19 observations concernant 34 ex. durant la deuxième quinzaine d'août; premier ex. le 15 à Flémalle et un pic le 24 avec 13 ex. signalés. **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : de nombreux chanteurs sont renseignés durant le mois de juin, certains jusqu'en juillet. La migration débute dès le 07.08 avec 1 ex. bagué aux Awirs, et augmente régulièrement jusqu'en fin de mois, sans effectifs particuliers. **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : nombreuses mentions de nichées durant le mois de juin, ainsi que des chanteurs signalés jusqu'en fin de mois. La migration débute le 15.08 à Flémalle. **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava flava*) : des nourrissages sont observés durant le mois de juin et beaucoup de jeunes volants sont signalés en fin de mois, ainsi qu'au mois de juillet. La migration est décelée à partir de la mi-août, avec un pic dans la dernière semaine du mois. Maximum de 180 ex. en 6 h 30 le 26.08 à Fosses-la-Ville. **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla f. thunbergi*) : en halte migratoire à la fin du mois d'août : 1 baguée le 21 aux Awirs, 2 ex. le 24 à Fosses-la-Ville. **Bergeronnette flavéole** (*Motacilla f. flavissima*) : 1 mâle le 03.06 au village d'Hensies. **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : de nombreux jeunes volants apparaissent durant le mois de juin. Certaines familles se déplacent en juillet vers des sites d'alimentation comme des décanteurs et sablières. Peu signalée en août. **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : de nombreuses familles sont signalées depuis le début du mois de juin et jusqu'à la fin du mois d'août, époque où des rassemblements pré-nocturnes sont notés, comme 50 ex. à Virelles le 28.08. **Bergeronnette de Yarrell** (*Motacilla alba yarrellii*) : 1 mâle apparié à une femelle de sous-espèce inconnue à Froidchapelle du 16 au 26.06 et un hybride *alba x yarrellii* le 12.06 à Pommeroeul.

Rougegorge familier (*Erythacus rubecula*) : des troisièmes nichées sont signalées durant le mois d'août en plusieurs endroits. **Rossignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : l'espèce devient silencieuse et extrêmement discrète dès début juin, entre autres à Harchies où 11 cantons avaient été trouvés. La migration est encore plus discrète et débute dès le 2 août. Durant ce mois, 14 ex. en tout sont bagués aux Awirs, à Nodebais et à Flône; 1 ex. le 17.08 à Roly. **Gorgebleue à miroir** (*Luscinia svecica*) : des chanteurs sont signalés

en juin sur les sites classiques du Hainaut, mais aussi à Virelles pour la seconde année consécutive. Très peu signalée en juillet-août, avec 3 observations de migrateurs en halte : 2 ex. le 21.08 aux décanteurs de Hologne-sur-Geer, 1 femelle à Virelles et 1 mâle à Merdorp le 23.08. **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : à Bruxelles, une nidification est renseignée à Uccle près de la Gare de Calevoet en juillet. La migration débute dès les premiers jours d'août, sans effectifs notables. **Tarier des prés** (*Saxicola rubetra*) : un mâle est signalé en juin à Froidchapelle. La chute des effectifs se confirme dans les cantons de l'Est : un seul couple a niché dans la vallée de la Holzwarche et celle de la Warche. Seules des mentions dans la vallée de l'Emmels et les environs de Rocherath concernent plusieurs couples nicheurs. En Gaume, 2 couples nicheurs à Rossignol en juillet. La migration débute en août et concerne environ 350 ex. notés pour l'essentiel dans la seconde quinzaine du mois. **Tarier pâle** (*Saxicola torquata*) : de nombreuses familles sont observées durant l'été et 68 cantons sont recensés en juin sur le camp militaire de Marche-en-Famenne. Toutefois, les effectifs y sont plus faibles qu'en 2006. En août, l'espèce se déplace et est signalée hors zone de nidification. **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : une seule donnée pour les mois de juin et juillet, un chanteur à Pesche le 24.06. En août, un premier migrateur est signalé le 09.08 à Thuillies; les mentions de l'espèce augmentent ensuite jusqu'à la fin du mois mais sans effectifs notables. **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : la diminution se poursuit dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse où l'espèce n'est plus signalée que dans la vallée de l'Eau Blanche à Dailly.

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)* : le séjour de deux oiseaux se poursuit en juin à Mouscron où la nidification est suspectée mais non prouvée. Un individu du 26.07 au 12.08 au moins à Floriffoux. **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : des chanteurs sont signalés jusqu'au 08.08. La dispersion postnuptiale commence le 15.07 aux Awirs où seulement huit ex. seront bagués en juillet et août, pour 13 à Flône et 84 à Nodebais. **Locustelle fluviatile** (*Locustella fluviatilis*)* : 1 ex. du 01 au 05 juin à Harchies. **Locustelle lusciniôide** (*Locustella luscinioides*) : un troisième chanteur est repéré le 08.06 à Harchies. Elle reste rare dans les stations de baguage avec 1 ex. bagué le 04.08 à Nodebais. **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : dernier chant le 07.07 à Harchies. Ensuite, des migrateurs en halte sont signalés le 18.07 à Waremme, le 21.07 à Éghezée-Longchamps et le 07.08 à Hologne-sur-Geer. Dans les stations de baguage, l'espèce est capturée dès le 10.07 aux Awirs mais le passage est surtout marqué en août. Au total des deux mois, 38 ex. ont été bagués aux Awirs, 27 à Flône et 75 à Nodebais. Même s'il n'atteint pas

le niveau de 2006, ce résultat est honorable. Retenons aussi la reprise à Flône d'un oiseau porteur d'une bague britannique. **Rousserolle effarvatte** (*Acrocephalus scirpaceus*) : la migration débute dès le 10.07 avec un adulte bagué aux Awirs. L'espèce y est ensuite quotidienne mais le passage est, comme d'habitude, surtout marqué en août. Avec 865 ex. bagués aux Awirs et 1.135 à Nodebais en juillet et août, on est loin des records de 2006. À Nodebais, le maximum journalier, atteint le 23.08, n'est que de 116 ex. alors qu'en 2006, de 150 à 200 y étaient bagués quotidiennement fin août. Comme pour la Verderolle, les conditions climatiques en période de reproduction sont probablement à l'origine de ce déficit. **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : capturée dès l'ouverture de la station des Awirs le 10.07. Avec 180 ex. bagués, principalement des adultes, le mois de juillet est excellent. Le passage des jeunes oiseaux de l'année en août ne répond toutefois pas à l'attente et les totaux sont inférieurs à ceux de 2006. Le constat est identique à Nodebais et à Flône; il est imputable à une reproduction médiocre liée aux mauvaises conditions météorologiques de juin. **Rousserolle isabelle** (*Acrocephalus agricola*)* : 1 ex. bagué le 11.08 à Mont-Saint-Guibert. **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*) : deux ex. bagués en août, le 11 à Nodebais et le 29 à Bolland. **Hypolaïs icterine** (*Hippolais icterina*) : la migration est décelée dès le 15.07 aux Awirs où, avec 9 ex. bagués, le passage reste dans la faible moyenne des dernières années. **Hypolaïs polyglotte** (*Hippolais polyglotta*) : signalée sur une trentaine de sites du sud du sillon Sambre-et-Meuse en juin, dont 14 chanteurs, comme en 2006, le 23 dans le camp militaire de Marche-en-Famenne. La capture, aux Awirs, d'un mâle le 14.07 et d'une femelle le 17, tous deux adultes, témoigne cependant d'une présence plus au nord et, probablement, d'un cantonnement à proximité de la



Phragmite des joncs, Hologne-sur-Geer, 3 août 2007 / Sedge Warbler, 3 August 2007 (photo : Jules Fouarge)



station. **Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : le passage débute le 18.08 à Nodebais et le lendemain aux Awirs; il est tout de suite assez important. Au cours de la dernière décade d'août, les deux stations enregistrent plusieurs journées à plus de 100 ex. bagués. Ce passage assez précoce, presque exclusivement de jeunes oiseaux de l'année, est probablement une conséquence d'une très bonne reproduction en début de saison, suite au mois d'avril exceptionnel. **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : la migration devient sensible à partir du 31.07 aux Awirs. Elle se prolonge tout le long du mois d'août. La journée du 23.08 est exceptionnelle avec 112 ex. bagués aux Awirs et 101 à Nodebais. Les totaux du mois y sont respectivement de 600 et 621 ex. **Fauvette épervière** (*Sylvia nisoria*)* : un jeune oiseau bagué le 31.08 à Flône. **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : dans les stations de baguage des Awirs et de Flône, les captures s'effectuent à partir du 01.08 mais ne sont quotidiennes qu'en fin de mois, comme à Nodebais où il a fallu attendre le 12 pour la première. Au total, respectivement, 22, 15 et 12 ex. seront bagués en août dans ces stations. **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : le passage est en cours en août et culmine (21 ex.) le 23 à Nodebais, comme pour la Fauvette des jardins. Dans les deux autres stations, le passage est également assez important le 23.08 (18 ex. aux Awirs, 10 à Flône) mais ne correspond pas aux maxima atteints respectivement le 27.08 avec 21 ex. et le 11.08 avec 16 ex. **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : avec 28 migrateurs bagués en juillet et 45 en août, l'espèce est en dessous de la moyenne aux Awirs. La situation est un peu meilleure à Nodebais où 176 ex. sont bagués en août.

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : très nombreux cette année dans le Tournaisis, par exemple, 6 cantons sur 150 mètres au Parc Reine Astrid à Tournai; présence plus remarquée aussi dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. En août, des oiseaux sont encore signalés sur des sites de nidification avec, entre autres, une seconde nichée le 6 à Taintignies et des jeunes à l'envol le 17 à Roisin; dans la seconde quinzaine du mois, des migrateurs en halte sont mentionnés en plusieurs sites de la région. **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : 38 poussins ont été bagués en nichoir le 03.06 à Nassogne. Le passage débute tôt, le 14.07 aux Awirs, mais il est faible : seulement 5 ex. bagués aux Awirs, 4 à Flône et 2 à Nodebais. Également peu d'observations visuelles.

Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*) : une nidification probable à Ploegsteert où un ex. est signalé le 15.06 et 7 jeunes accompagnant 2 femelles adultes le surlendemain.

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : nouveau record, 172 cantons, le 23.06 au camp militaire de Mar-

che-en-Famenne (Aves 44 : 225-238). L'espèce est en expansion avec 3 couples dans la région hutoise où elle n'était pas présente cinq ans auparavant. L'absence des adultes est constatée le 17.08 à Harzé alors que du nourrissage est encore en cours le 19 à Louveigné, le 21 à Betnay; adultes et jeunes sont encore présents le 25 à Wibrin. En fin de mois, quelques mentions en dehors de la zone de nidification à Nodebais, Houtain-le-Val, Corroy-le-Grand, Bolland et aux Awirs où 3 juvéniles ont été bagués. **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : deux familles le 23.06 dans le camp militaire de Marche-en-Famenne, 3 juvéniles le 02.07 à Nassogne où un ex. est également signalé sur un site d'hivernage; un ex. fréquente, en août, la plaine de Thuillies où l'espèce n'avait plus été observée depuis 15 ans. Elle est aussi signalée sur une dizaine d'autres sites classiques.

Cassenois moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) : nouvelle nidification en Ardenne couvinoise; un ex. est observé le 03.06 à Fleurus, en dehors de la zone de nidification de l'espèce. Comme d'habitude, il se remarque surtout en août avec des navettes habituelles entre noisetiers et pessières, notamment à Jalhay et Nassogne.

Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*) : un mâle les 19 et 23 juin à Beignée est probablement un échappé de captivité. **Verdier d'Europe** (*Carduelis chloris*) : au plus, une centaine ensemble le 10.08 à Corroy-le-Grand. **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : une seule mention en juin à Hestreux. L'espèce chante le 01.07 à Bérinzenne; 2 autres mentions en juillet. En août, un groupe à Heuzy et 14 ex. à Nassogne le 03, 5 ex. le 23 à Petite-Chapelle, 5 ex. le lendemain à Mariembourg où ils sont 10 le 28, une trentaine les 28 et 31 à Treignes. Seulement deux autres mentions d'un ex., le 17 à Xhoris et le 21 à Betnay. **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : il faut attendre août pour rencontrer quelques rassemblements importants : une centaine le 10 à Corroy-le-Grand, 160 le 19 à Fontenaille, 120 le 21 à Roisin, 150 le même jour à Angreau, 200 le 22 à Givry, 120 le 22 à Rouveroy, 180 à 200 le 26 à Hemptinne... **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : 1 ex. le 16.06 à Malchamps. **Bec-croisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : rare cet été : 1 ex. le 07.06 à Vierves-sur-Viroin, 12 le 07.07 à Dailly, 7 à Frasnes-lez-Couvin et 5 à Treignes le 15.07, 2 le 03.08 à Nassogne.

Bruant zizi (*Emberiza cirulus*) : présence jusqu'au 17.06 du mâle trouvé à Treignes le 24.05. **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : encore signalé en petits nombres dans les plaines du Hainaut et de Hesbaye, dont un rassemblement de 80 ex. le 22.08 à Merdorp. Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, 1 ex. le 18.06 à Strée.

REMERCIEMENTS - Nous remercions les très nombreux observateurs qui ont contribué à documenter cette synthèse saisonnière ! Ce sont Adriaens V., Aelvoet W., Antheunis A., Asinari C., Baccaert A., Baron A., Bataille B., Bataille L., Bayot A., Beckers A., Bedoret A., Bergmans B., Biernaux V., Biquet L., Blyth M., Boche J.-M., Bodart P., Boeckx A., Bogaert E., Bouchat A., Bouckenoghe B., Bouhon C., Brihaye J.-F., Bronne L., Brousmiche C., Brousmiche H., Brunin C., Buchet V., Bulteau V., Burnel A., Cabooter G., Calberg C., Carbonnelle S., Carrels C., Cauwe F., Cavez B., Christophe B., Colas J.M., Collas G., Coppée J.-L., Corhay F., Crasson B., Crépin L., Cristofoli S., Croisier P., Cucurnia P., Dambiermont J.L., Damman E., Dandoit T., de Behr M., De Boeck B., De Broyer A., De Bruycker F., de Decker B., de Gottal P., de Guchteneère G., De Knijff G., de Liedekerke R., De Meirman J., De Meirman J., De Paemelaere M., de Schaetzen R., de Wavrin H., Debaere T., Declercq M., Decloux G., Decruynaere E., Deflorenne P., Defourmy H., Dehombreux E., Delacre J., Delarue J., Delneste J.L., Delsalle M., Demaret A., Demonty L., Dengis J., Denys O., Depuydt J., Derouaux A., Derume M., Desaubies P., Detaille R., Devos D., Dewitte N., Dewitte T., Dielen V., Dordolo C., Dormal F., Doyen F., du Bus F., Dubois A., Dubois E., Dubois P., Duchesne P., Dufour V., Dufourmy H., Dujardin R., Dumortier C., Dumoulin H., Dupont T., Dutoit N., Ellis F., Elorriaga J., Etienne F., Eykmans J., Eysermans F., Fagot J., Fanon Y., Farinelle C., Fasol M., Fautsch M., Fays C., Ferette J.P., Fouarge J., Fourez J.F., Fraipont R., Furnelle V., Gailly Da., Gailly Do., Gailly P., Gailly R., Galant A., Gauquie B., Geboes A.L., Geiregat N., George Y., Ghysenberghs B., Gigalkin S., Gillon R., Giot Y., Godding E., Goffette Q., Gonne O., Graulich A., Grégoire D., Gruslin F., Gruwier C., Hammond M., Hanus B., Henderdael M., Hendrick O., Hermand P., Herremans G., Hewitt S., Heymans E., Hittin E., Horney G., Houbart J., Hubaut D., Hupperetz J., Huyghebaert C., Ide J., Imbreckx E., Jacob J.P., Jacques A., Jancloes P., Jardon B., Jobé P., Jortay A., Kaiser A., Kuenhen V., Kunsch A., Labeye C., Lafontaine R.M., Laloux

D., Lambert M., Lambillon J., Landrain R., Landrieu D., Laudelout A., Lebrun R., Leclef J.P., Leers W., Lefebvre C., Lefin J.P., Leirens V., Lejeune J., Lejeune J.P., Léonard M., Leprince P., Lhoest P., Loison M., Loly P., Lombart A., Losseau J.-D., Lucas P., Lucas R., Mahaux Y., Mandy M., Maniquet C., Maniquet T., Marchal B., Marchand N., Mardulyn H., Maréchal J., Mariage T., Matagne J., Mayon N., Meeüs T., Melon P., Mengal J., Michel P., Moncousin M., Morren K., Mossoux P., Neef W., Nef B., Nicolas M., Nihon C., Noiret C., Nolf P., Ory T., Paquay N., Paquet A., Paquet J.Y., Pasau B., Paschal C., Peten S., Pierrard N., Pierre P., Pierret S., Piette Ag., Piette Al., Piette J., Pigneur L.M., Pironnet A., Pochet G., Poncelet J.M., Rapaille J.P., Rappe D., Rasson C., Rasson G., Raty L., Reumont F., Richir F., Roberfroid O., Roca F., Roca M., Romain J.L., Rouck J., Rousseau C., Rousseau-Piot J.S., Ryelandt P., Scaillet J., Schleich E., Schollaert V., Schwes J., Smets A., Smetz J., Smits Q., Smousse P., Sorbi S., Spriet Q., Squeuvin M., Stassin P., Stevens V., Swaen L., Swinnen V., Tancrez T., Taymans J., Testaert D., Thewys A., Thiébaud S., Thunus R., Tombeur S., Van den Abbeele F., Van Hove F., Van Laethem P., Van Marck E., Van Westeinde J., Vanderbiest D., Vanderhaeghe S., Vandewer A., Vanhove F., Vanmeerbeeck P., Vanshepdael M., Van't Westeinde J., Vercruyse A., Verdonck F., Verdonck F., Verhaegen Mr, Verroken D., Verroken L., Veys P., Vicenzi H., Vieuxtemps D., Vilain B., Visée J.M., Vlaeminck M., Werbrouck R., Wielemans L., Windels M., Wuilmart A., Xhardez C... ainsi que les observateurs du Guignard, du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse (chronique dans « La Grièche ») et de sites comme Latour, le Grand Vivier de Longchamps, Virelles, Harchies, les BEH... ou d'autres dont le nom aurait été omis. Merci à tous.

La compilation des données a été effectuée par Alain Baccaert, André Burnel, Paola Cucurnia, Claire Huyghebaert et Philippe Vanmeerbeeck, ainsi que via une partie des encodages de données effectués dans les sections régionales.

SUMMARY - Observations from June to August 2007

After the mild spring, the summer was variable with rainy periods. Among the notable nestings, we can note at least 46 pairs of Black-necked Grebes, successful nesting of Night Herons, Little Egrets, the three species of Harriers, the first Walloon nesting of the Common Tern and undoubtedly of Bearded Tits. Among the rare visitors, we note a River Warbler at the beginning of June at Harchies, a breeding Squacco Heron at Virelles at the end of June, beginning of July, as well as Red-footed Falcon, Stone Curlew, Red-necked Phalarope, Barred Warbler, and Pallid Harrier. The highpoints were the Baltic Gull (*Aves* 44: 201-214), a major invasion of Griffon Vultures between the 16 June and 10 July, as well as the capture of a Paddyfield Warbler in August. The post-breeding movements were limited, with many stop-overs dictated by the weather from 11 to 21 August (Garganey, Golden Plover, Dotterel, Lesser Black-backed Gull) and the passage with the anti-cyclone at the end of the month (among others, Great White Egret, White Stork, Honey Buzzard, Pallid Harrier, Kittiwake, Short-eared Owl, Yellow Wagtail, Tawny Pipit, Wheatears, Warblers...).