

## OBSERVATIONS DE MARS À MAI 2008

Centrale Ornithologique Aves Groupe de travail « Chroniques »\*



C.-H. Born

### Le printemps 2008

Au soleil de février a succédé un temps excessivement couvert et pluvieux en mars : ainsi, 150,5 mm de précipitations en 24 jours constituent un nouveau record à Uccle. Sont en cause un ensemble de zones dépressionnaires et des courants en partie d'origine polaire. La journée du 15 fut un peu plus chaude, avant l'amélioration notée à partir du 26. Le mois d'avril fut dans la norme, assez sec mais sans chaleur en raison de la prédominance de courants maritimes ; seuls les 25-27 avril furent plus chauds et anticycloniques. À partir du 3 mai, des courants continentaux (3-15, 19-24) et maritimes tropicaux (25-31) ont permis d'observer des températures très exceptionnellement supérieures à la normale (moyenne 16,4°C à Uccle contre 12,7°C en moyenne).

Le temps médiocre de mars a contraint des hivernants à s'attarder quelque peu (Plongeon imbrin, Macreuses brunes), des migrateurs à faire des haltes prolongées (Cygne de Bewick, Buses pattues, grues), à passer davantage en début et fin de mois (Pluvier doré, Alouette des champs, Bergeronnette grise, Linotte) ou à revenir en nombre plusieurs semaines après une première hâtive (Hirondelle de cheminée). La fugace amélioration en milieu de mois se signale par l'arrivée précoce d'avant-coueurs (Coucou gris, Hirondelle de fenêtre, Gorgebleue) et l'accentuation de la migration d'autres espèces (Pouillot véloce). À partir de fin mars, on enregistre une rafale de retours normaux et l'amplification rapide des passages. Quelques sédentaires ont niché très tôt, en particulier des mésanges.

En avril, une forte activité migratoire prévaut en début de mois puis les 12-14. À ce moment, la palme des raretés printanières revient à la première mention belge de Goéland d'Audouin le 13 avril en Meuse liégeoise, où cet oiseau a presque croisé une Sterne caspienne en halte le lendemain. Après une période frisquette, le redoux noté du 19 au 22 voit démarrer les passages de grands migrateurs comme la Bondrée, le Motteux, le Rossignol et l'Effarvatte. Ces journées se signalent aussi par le passage d'un Pygargue le 20, d'un Bruant fou le 21 et le début de l'afflux de Kobez qui se prolongera jusqu'à fin mai. Le mois permit aussi d'observer de nombreux Merles à plastron en halte.

Sur la saison, beaucoup de passages furent sans relief particulier (anatidés, rapaces, laro-limicoles, motacillidés, fringilles), entre autres en raison de la météo d'avril-mai assez favorable aux survols migratoires. Contraste le passage de Bondrées du 9 mai. Les retours de Pies-grièches écorcheurs furent en revanche assez lents et tardifs, alors que deux Grives mauvis s'attardaient en fagnes le 11 mai.

Ces mois ont aussi permis d'observer un Fuligule à bec cerclé jusqu'au début mars en Meuse, trois Bruants des neiges à Spa début avril, un Pipit maritime le 8 avril, un Circaète le 24, une Sterne arctique le 29, des Guifettes moustac, des Sternes naines et un second Circaète en mai. Le 31 mai, un Grèbe esclavon en plumage nuptial a clôturé le printemps.

La nidification s'annonce remarquable pour les ardéidés : confirmation des Aigrettes garzettes et des Bihoreaux, surtout première reproduction wallonne du Héron gardeboeufs. La Grande Aigrette estive,

\*Rédacteurs de la présente chronique : T. Baudoux, A. Burnel, A. De Broyer, A. Dirick, P. Duchesne, C. Farinelle, T. Mariage, T. Ory, Ph. Vanmeerbeeck et J.-P. Jacob.



parade un peu mais ne niche toujours pas. D'autres nicheurs rares se portent bien : le Grèbe à cou noir, les trois busards, l'Huïtrier, le Torcol, la Locustelle lusciniôïde cantonnée dans quatre sites. On note aussi le retour de la Sterne pierregarin à Virelles, l'installation de Grands Corbeaux dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, l'expansion du Grimpeur des bois en Condroz, une nouvelle nidification de Pie-grièche écorcheur au nord du sillon Sambre-et-Meuse. De petites séries d'observations printanières de Busards Saint-Martin jusqu'à fin mai, de Mouettes mélanocéphales, de Hiboux des marais. La présence du Nyroca (origine inconnue) se répète à Ploegsteert. Le Beccroisé est très rare et le Cini diminue.

Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par Internet (site Aves et Aves-Lux), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collationnées par le GT Le Guignard (Hainaut occidental) et la cellule de l'Entre-Sambre-et-Meuse (« La Grièche »). Quelques-unes proviennent aussi, pour la première fois, d'observations.be (waarneming.be).

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure. Le complexe marécageux de Harchies-Hensies-Pommeroeul est souvent simplement libellé « Harchies ».

**Plongeon imbrin** (*Gavia immer*)\*: l'hivernant d'Obourg séjourne jusqu'au 07.04. **Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : trop peu de mentions : 20 ex. le 30.03 à Ploegsteert, une dizaine de chanteurs le 16.04 à Hologne-sur-Geer et au moins 11 le 20.04 à Hensies, date à laquelle les 2 premiers poussins sont mentionnés. **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : premiers poussins le 07.04 à Obourg et le 20.04 à Hensies. **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : les retours sur les sites de nidification se multiplient dès début mars avec 5 ex. le 02.03 à Ploegsteert et 3 ex. le 04.03 à Frasnes-lez-Anvaing. En avril, les décanteurs liégeois accueillent au moins 7 couples à Hologne-sur-Geer et 11 ex. à Waremme ; 7 ex. sont présents le 17.04 à Virelles. Le mois suivant, un minimum de 72 ex. est compté le 07.05 à Ploegsteert (nombre équivalent à 2006 mais supérieur à 2007) et jusqu'à 16 ex. les 10 et 18.05 à Frasnes-lez-Buissenal. **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*)\* : un adulte en plumage nuptial le 31.05 aux décanteurs de Waremme.

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : la migration pré-nuptiale bat son plein en mars et se prolonge en avril. Les dortoirs sont encore bien occupés en mars : 82 ex. le 02.03 à Villers-sur-Lesse, 94 ex. le 14.03 dans la carrière à Lessines et minimum 80 ex. le 15.03 à Virelles. La nidification progresse en parallèle : 7 nids sont occupés le 17.03 à Jambes, au moins 40 le 27.03 à Hensies, 95 le 07.04 à

Obourg et 21 le 29.03 à Lessines. En avril, 150 ex. en migration survolent Virelles le 07.04. **Butor étoilé** (*Botaurus stellaris*) : les données du printemps se résument à un chanteur discret et une observation visuelle le 13.04 aux marais d'Harchies. **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : la nidification se poursuit à Petit-Lanaye où 43 nids sont occupés fin mars. En avril, près d'une trentaine de nids occupés à Jambes et 90 le 15.04 à la réserve naturelle de Labuissière. La colonie de Rixensart compte 27 nids occupés le 22.04 dont 6 contiennent au moins 2 jeunes. **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : six migrateurs isolés entre le 04.04 et le 17.05 : 04.04 à Warneton, 15.04 à Ploegsteert, 22.04 à Sart-Dames-Avelines, 23.04 à Pommeroeul, 26.04 à Florennes, 29.04 à Éghezée-Longchamps et 17.05 à Romedenne. **Grande Aigrette** (*Casmerodius albus*) : encore de nombreuses mentions en mars, avec parfois des rassemblements : 12 ex. le 10 à Breuvanne, au moins 12 ex. le 12 à Wiers, 21 ex. le 14.03 au dortoir d'Hensies et à celui de Virelles. Les observations diminuent en avril, mais l'espèce reste mentionnée jusqu'à la fin mai. Au marais d'Hensies, des parades nuptiales sont notées le 18.04 ; aucun indice de nidification n'a pu être obtenu. **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) : hors Harchies, 3 ex. le 12.03 à Wiers, dans le parc naturel des plaines de l'Escaut, et 1 ex. le 02.05 à Lahérie (Neufchâteau). À Harchies, maximum 12 ex. au dortoir du 17.03 au 14.04 ; l'espèce y niche pour la troisième an-

Les espèces dont l'observation est soumise à homologation sont marquées d'un \*.



Héron pourpré, Sart-Dames-Avelines, 22 avril 2008 / Purple Heron, Sart-Dames-Avelines, 22 April 2008 (Photo : Pierre Melon)

née consécutive (2 nids). **Bihoreau gris** (*Nycticorax nycticorax*)\* : retour d'un adulte le 21.04 à la colonie mixte de Hensies où 6 ex. sont présents un mois plus tard. Deux autres observations le 12.05 : 1 ex. à Breuvanne et Warneton. **Héron gardebœufs** (*Bubulcus ibis*)\* : 1 ex. le 22.03 à Ploegsteert et au plus 3 ex. à partir du 23.04 à Harchies.

**Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : en mars, douze données de cigognes solitaires auxquelles s'ajoutent 2 ex. le 07.03 à Visé et 1 couple le 16.03 à Anlier. Deux fois plus d'observations en avril dont 2 ex. le 03.04 à Rance, au moins 3 ex. le 06.04 à Roly, 3 adultes le 22.04 à l'abbaye de Scourmont (Forges) et 4 ex. le 27.04 à Harzé. En mai, plus d'une trentaine de mentions dont 7 ex. le 07.05 à Virelles. **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : le passage peut être qualifié de normal avec quelques groupes en mars (7 ex. le 01.03 à Meslin-l'Évêque, 24 ex. le 06.03 à Auderghem, 19 ex. le 14.03 à Brûly et le 22.03 à Couvin, 11 ex. le 25.03 à Nivelles) et en avril (5 ex. le 01.04 à Hérock-Ciergnon, 6 ex. le 07.04 à Bruxelles, et 7 ex. en vol le 21.04 à Éghezée-Longchamps). En mai, une dizaine de mentions d'isolés ou de paires. Le nid de Horion n'a pas été réoccupé.

**Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) : les premiers jeunes éclosent aux dates habituelles, dès le 02.05 à Hensies, le 09.05 à Virelles et le 18.05 à Frasnes-lez-Buissenal. **Cygne chanteur** (*Cygnus cygnus*) : les deux derniers hivernants d'Erpion sont vus le 02.03. **Cygne de Bewick** (*Cygnus columbianus bewickii*) : assez tard pour cette espèce, un individu stationne du 14 au 31.03 à Lessines. **Oie cendrée** (*Anser anser*) : le passage pré-nuptial se poursuit en mars avec 117 ex. en vol le 01.03 à Taintignies, 36 ex. le même jour à Aublain, une centaine en 3 groupes distincts le 10.03 à Mouscron, 32 ex. en vol le 20.03 à Rochefort, 32 vers le nord le 30.03 à Châtillon et 90 ex. le même jour au-dessus de Bruxelles. **Oie rieuse** (*Anser albifrons*) : 1 ex. probablement d'origine férale du 03 au 09.05 à Éghezée-Longchamps. **Bernache cravant** (*Branta bernicla*)\* : 1 ex. le 14.03 à la sablière de Mont-Saint-Guibert. **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : les bassins de décantation sont fréquentés dans toute la région : Warcoing (48 ex. dont 12 poussins le 29.05), Escanaffles (31 ex. le 22.03), Frasnes-lez-Buissenal (21 ex. dont 10 poussins le 18.05), Fontenoy (13 ex. le 17.05), Éghezée-Longchamps (19 ex. le 29.03), Hollogne-sur-Geer (10 couples le 16.04). Sur le « Grand Courant », de Hérinnes à Léaucourt, au moins 12 couples sont cantonnés en avril.



**Canard siffleur** (*Anas penelope*) : présent tout le mois de mars à Amay avec un maximum de 4 ex. le 22.03. Ailleurs, en mars, 1 ex. le 16 à Virelles, 23 ex. le 07 et 11 ex. le 27 à Harchies. Seulement signalé sur deux sites en avril : Éghezée-Longchamps (un couple le 02) et Harchies (un mâle le 02, 2 mâles et 3 femelles le 04). Quelques mentions en mai : un couple tout le mois à Roly, quelques ex. sporadiquement à Virelles et un couple le 24 à Anderlecht. **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : les nombreux hivernants quittent progressivement la région en mars-avril. En mai, il reste des oiseaux sur plusieurs sites du Hainaut occidental et des décanteurs hesbignons. Un mâle leucique le 17.03 à Harchies. **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : fin d'hivernage et migration se poursuivent en mars avec, entre autres, 47 ex. le 22 à Éghezée-Longchamps, 154 ex. le 27 à Harchies, 32 le 29 à Breuvanne et début avril (121 le 04 à Harchies, 44 le 06 à Hollogne-sur-Geer, une trentaine le 06 à Virelles). Les nombres diminuent fortement par la suite pour ne laisser que quelques individus en mai dont un mâle le 27 aux Marionville et le 28 à Éghezée-Longchamps, deux mâles et une femelle le 29 à Rosières. **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : le passage, entamé précocement fin février, se poursuit timidement début mars avec un couple le 04 à Breuvanne et le 05 à Harchies. Il faut attendre la mi-mars pour que les mentions et les nombres s'étoffent un peu, avec un maximum de 13 ex. (9 mâles) le 18 à Solre-sur-Sambre où ils sont encore 12 le 31. La migration reste perceptible jusqu'à la mi-avril. Par après, les mentions se limitent plutôt à des mâles isolés, parfois un couple. En mai, l'espèce est renseignée sur huit sites (Hainaut occidental, décanteurs hesbignons et Mehogne). **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : la migration se marque par des observations sur de nombreux sites en mars et avril. À l'exception d'Harchies (maximum 287 ex. le 27.03), les nombres dépassent rarement la vingtaine : plus de 65 le 02.03 à Ploegsteert, 26 mâles et 22 femelles le 15.03 au lac de la Gileppe, 29 ex. le 23.03 à Hollogne-sur-Geer, 28 ex. le 29.03 à Waremme, une trentaine le 04.04 à Gastuche, autant le 08.04 à Stockay, 61 ex. le 10.04 à Éghezée-Longchamps. En mai, l'espèce, le plus souvent des mâles, n'est plus mentionnée qu'en Hainaut occidental et à Éghezée-Longchamps. **Canard pilet** (*Anas acuta*) : hormis 42 ex. en migration le 15.03 à Roisin, noté en petit nombre (1 à 4 ex.) en une quinzaine de zones humides du 1<sup>er</sup> mars au 15 avril.

**Nette rousse** (*Netta rufina*) : signalée sur six sites jusqu'à la mi-avril : l'oiseau des étangs Mellaerts (Bruxelles) passe à Val-Duchesse le 03.03, deux mâles et une femelle le 02.03 à Virelles, un mâle à trois reprises à Ploegsteert, un mâle le 24.03 à Jurbise, 2 mâles le 29, 1 ex. les 30 et 31.03 à Amay, le 08.04 à Harchies et le 13.04 à Ploegsteert. **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : encore quelques concentrations en mars : 143 ex. le 01 à Roly, 150 ex. le 08 mais seulement 62 ex. le 27 à Harchies. En avril-mai, l'espèce reste sur des sites de nidification potentiels. Les premiers jeunes apparaissent fin mai : deux nichées le 24 aux Marionville où 22 poussins sont totalisés le 27, une nichée de 7 poussins le 24 à Harchies. **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : comme pour l'espèce précédente, mars enregistre encore quelques belles concentrations : 144 ex. le 02 à Escanaffles, 80 ex. le 27 à Harchies. Des oiseaux s'attardent encore en avril : 96 ex. le 04 au marais d'Hensies, 77 ex. le 18 à Éghezée-Longchamps, 38 ex. le 27 à Hollogne-sur-Geer. L'espèce est signalée sur une vingtaine de sites en mai. **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) : 2 femelles le 02.03, 1 ex. les 15 et 22.03 à Virelles. **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)\* : 1 mâle jusqu'au 05.04 à Escanaffles, 1 mâle le 12.04 à Waremme. À Ploegsteert, 2 ex. le 13.04 puis un seul mâle par la suite, apparemment apparié à une femelle milouin le 07.05. **Fuligule à bec cerclé** (*Aythya collaris*)\* : dernière observation le 08.03 de la femelle hivernant à Lanaye. **Macreuse brune** (*Melanitta fusca*) : 6 ex. sont toujours présents en début mars aux BEH, le dernier le 15.03. **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : 1 ex le 11.03 à Mariembourg. **Garrot à œil d'or** (*Bucephala clangula*) : l'espèce est présente jusqu'au 18.04 (3 couples à Harchies) ; le maximum (30 ex.) de la période a été enregistré le 11.04 à Harchies. **Harle piette** (*Mergus albellus*) : uniquement à Roly, 9 ex. le 1<sup>er</sup> et 10 ex. le 23.03. **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : l'espèce séjourne sur plusieurs sites tout le mois de mars avec un maximum de 18 ex. le 02 à Roly. Les mentions deviennent rares en avril (8 ex. pour 5 sites) avec une dernière femelle le 15.04 à Neuvillers. **Harle huppé** (*Mergus serrator*) : trois mentions en mars de ce harle rare à l'intérieur des terres : 1 ex. le 04 à Harchies, un couple le 05 à Ben-Ahin et 3 ex. le 14 à Virelles.

**Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : premier retour le 20 avril à Taintignies ; les suivantes apparaissent le 27.04 avec, entre autres, 5 ex. à Lustin. La migration bat son plein le 09 mai avec, notamment, 179 ex. en 7 h de suivi à Gimnée, 99 à Feschaux (Beau-



raing), 29 à Éghezée-Longchamps... ; elle se poursuit au moins jusqu'au 18.05 (5 ex. à Steinebrück – Saint-Vith). La première parade est observée le 13.05 à Matagne-la-Grande. **Milan noir** (*Milvus migrans*) : le premier est signalé le 08.03 à Breuvanne mais le retour ne se généralise qu'une semaine plus tard ; le passage se poursuit jusqu'au 11 mai avec de nombreuses mentions de migrateurs en dehors des sites traditionnels d'Ardenne, de Lorraine et de l'Entre-Sambre-et-Meuse. La mention la plus étonnante est celle de 6 ex. posés au sol le 21.05 au Gerny (Marche-en-Famenne). **Milan royal** (*Milvus milvus*) : plus de 250 données tout au long du printemps. Elles concernent aussi bien des oiseaux locaux que des migrateurs ou des individus erratiques. Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, hors zone de nidification, 5 observations d'individus isolés en mai. **Pygargue à queue blanche** (*Haliaeetus albicilla*)\* : 1 ex. le 20.04 en vol au-dessus de Harzé. **Circaète Jean-le-Blanc** (*Circaetus gallicus*)\* : 1 ex. le 24.04 aux Marionville et le 23.05 à Frasnes-lez-Anvaing. **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : la migration est perceptible du début mars aux premiers jours de mai. Plusieurs installations avec parades ou construction de nid, principalement en

Hainaut occidental : Ploegsteert, Harchies (4 couples), réserve des Prélles à Hensies, Hautrage... Fin mai, des oiseaux, souvent isolés, sont signalés çà et là dans les plaines de culture. **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : nombreuses mentions d'oiseaux en fin d'hivernage ou en migration jusque dans les derniers jours de mai. Au niveau des cantonnements, un mâle s'occupe de deux femelles dans la plaine d'Outgaarden-Piétrain avec un des nids dans le même bosquet qu'en 2007 ; parades aussi le 23.04 dans la plaine de Harmignies/Velle-reille-le-Sec où l'espèce a niché en 2002 et 2007. **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : premier le 20.04 à Montignies-sur-Roc puis un couple, non revu par après, le 22.04 à Oleye ; retour le 24.04 des deux couples de Clermont-lez-Walcourt, les mâles étant les mêmes qu'en 2007 ; retour également à Boneffe et dans la région de Hannut. S'y ajoutent quelques observations isolées mais sans preuve de cantonnement. **Buse variable** (*Buteo buteo*) : la migration est notée en mars et avril avec, entre autres, des dizaines dont 18 ensemble le 03.03 et plusieurs dizaines entre le 03 et le 08.03 à Breuvanne, 8 ex. le 08.03, 25 ex. le 15.03 et 18 ex. le 27.03 à Flémalle. Des oiseaux locaux sont parfois mentionnés en nombres élevés, comme une quarantaine le 20.04 à Chevetogne. **Buse pattue** (*Buteo lagopus*)\* : 2 immatures du 09 au 11.03, puis un seul jusqu'au 29.03 à Merdorp.

**Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : premier migrateur le 23.03 à Wierde. Au total, une quinzaine de mentions en mars, une trentaine en avril et neuf en mai, la dernière le 23.05 au marais de Pommeroeul. Plusieurs données à Harchies, Freux et sur les étangs de pisciculture de la région de Malmedy.



Busard des roseaux (mâle de 2<sup>e</sup> année) et Faisan de colchide, Houtain-le-Val, 24 mai 2008 / Marsh Harrier (2nd year male) and Pheasant, Houtain-le-Val, 24 May 2008 (Photo : Pierre Melon)



Buse pattue, Ambresin, 10 mars 2008 / Rough-legged Hawk, Ambresin, 10 March 2008 (Photo : Philippe Vanmeerbeeck)



*Faucon hobereau, Waremme, 9 mai 2008 / Hobby, Waremme, 9 May 2008 (Photo : Bernard Bouckenooghe).*

**Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : un mâle se nourrit d'un lézard vivipare (*Zootoca vivipara*) le 13.04, à la Croix-Scaille. **Faucon kobez** (*Falco vespertinus*)\* : comme dans les régions voisines, afflux exceptionnel ce printemps avec un minimum de 17 observations entre le 22.04 et le 30.05 dont 2 ex. le 22.04 à Fleurus, 1 ex. le 02.05 à Breuvanne, 1 femelle à Ploegsteert, 1 mâle à Virelles et 1 femelle à Remagne le 11.05, 1 mâle le lendemain à Verlaine, 1 femelle à Termes et à Namêche le 14.05, 1 mâle les 21 et 22.05 au Gerny, 1 ex. à Mainvault (Ath), 1 mâle à Forges et 1 femelle à Briquemont-Laloux (Rochefort) le 25.05, 1 mâle le 30.05 à Dave. **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : la migration entamée en février se poursuit en mars (seulement 3 données) et avril (14 données). Encore cinq observations début mai, dernière le 10, une femelle à Burdinne. **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : premier le 06.04 à Dinant ; les observations se succèdent à partir du 14.04 et culminent en mai. Parfois de belles concentrations, notamment à Harchies (une dizaine

le 07.05) et à Virelles (11 individus le 22.05). **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : parades en mars et ponte en avril sur la plupart des sites connus.



*Faucon kobez, Hensies, mai 2008 / Red-footed Falcon, Hensies, May 2008 (Photo : Bernard Hanus)*



**Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : parmi les mentions, retenons un oiseau bagué en milieu sec le 06.03 aux Awirs et une vingtaine de râles entendus le 14.04 à Harchies. **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : 1 ex. le 12.05 aux Marionville. **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : les rassemblements hivernaux se dispersent en mars, par exemple à Amay : 132 ex. le 01, 70 ex. le 09 et 50 ex. le 25. Les premiers poussins le 16.04 à Hollogne-sur-Geer. Un individu leucique en mai à Warcoing.

**Grue cendrée** (*Grus grus*) : le passage prénuptial, entamé dès le 09.02, se poursuit en mars (9.550 ex.) avec comme point d'orgue les journées du 01 (2.773 ex. sur un large front couvrant principalement l'ouest de la région : Dour, Virelles, Seneffe, Dinant, Couthuin...), du 08 (2.955 ex.) plus traditionnellement remarqué à l'est et du 15 (2.669 ex.). Une troupe de taille variable (max. 73 ex.) séjourne tout le mois de mars dans la région de Termes-Breuvanne (Lorraine). Quelques vols sont encore notés pendant la première quinzaine d'avril, 11 ex. posés

le 29.04 à Merdorp et 1 ex. le 04.05 à Dolhain.

**Huîtrier pie** (*Haematopus ostralegus*) : 35 observations réparties régulièrement sur toute la période. Retenons les 7 ex. du 24.03 à Oost-Maarlant et les couples cantonnés à Warcoing, Warneton, Frasnes-lez-Buissenal et Nivelles. **Échasse blanche** (*Himantopus himantopus*) : 1 ex. le 08.04 à Frasnes-lez-Buissenal, 2 ex. le 26.04 à Waremme et 4 ex. le 04.05 à Ploegsteert. **Avocette** (*Recurvirostra avocetta*) : principalement renseignée en avril dans l'ouest de la région ; les seuls groupes sont 8 ex. le 04.04 à Warneton et 13 ex. le 05.04 à Escanaffles. Un couple nicheur probable en mai à Warneton.

**Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*) : les premiers reviennent dès le 15.03 à Éghezée-Longchamps, Virelles (3 ex.) et Moustier. L'espèce est notée sur 22 sites en avril et mai. **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : très peu de données : 1 ex. le 06.04 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. du 15 au 18.05 à Frasnes-lez-Buissenal, 5 ex. le 16.05 à Warcoing, 1 ex. le 18.05 à Virelles et 1 ex. le 19.05 à Bo-



Grues cendrées, Saint-Aubin, 16 mars 2008 / Common Cranes, Saint-Aubin, 16 March 2008 (Photo : Véronique Buchet)



Pluviers dorés et Vanneaux huppés, Burdinne, 7 mars 2008 / Golden Plovers and Lapwings, Burdinne, 7 March 2008  
(Photo : Philippe Vanmeerbeeck)

neffe. **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : le passage pré-nuptial, entamé dès la mi-février, se poursuit en mars. Quelques troupes importantes sont renseignées jusqu'au milieu du mois : 100 ex. le 01.03 au Gerny (Marche-en-Famenne), 150 ex. puis 89 le 01.03 à Wez-Velvain, 263 ex. le 07.03 à Burdinne, 208 ex. le 13.03 à Ambresin. Encore quelques pluviers en avril à Winenne (Beauraing) et à Angre puis un dernier, en plumage nuptial, le 22.04 à Nil-Saint-Martin. **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : les dernières troupes importantes sont notées début mars (500 ex. le 01.03 à Martouzin (Beauraing), 300 ex. le 07.03 à Burdinne), en même temps que les premières parades ; les couvaisons débutent le 26.03 à Hérinnes et Obigies.

**Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : 2 ex. du 26 au 28.04 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 17.05 à Hollogne-sur-Geer. **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : 1 ex. le 27.04 à Warneton, 1 ex. les 01 et 02.05 à Recogne (Libramont), 1 ex. le 02.05 à Lahérie (Neufchâteau), 1 ex. le 04.05 à Boitsfort, 1 ex. le 16.05 à Frasnes-lez-Buissenal. **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : 1 ex. les

15 et 16.05 à Frasnes-lez-Buissenal. **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : 10 observations pour 16 ex. différents, principalement en avril avec comme maximum 6 ex. le 05.04 à Hérinnes (Léaucourt). **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : peu de mentions ce printemps (5 obs. pour 15 ex. en mars – 7 obs. pour 7 ex. en avril et 4 obs. pour 5 ex. en mai). Le groupe le plus important est de 9 ex. en migration le 19.03 à Hollogne-sur-Geer.

**Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : une quinzaine de données parmi lesquelles 4 ex. le 08.03 à Hermalle-sous-Huy, 9 ex. le 31.03 à Dampicourt, 4 ex. le 07.04 à Hermalle-sous-Huy. **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : le passage se poursuit en mars et se termine en avril, avec quelques rassemblements assez fournis : 27 ex. le 02.03 à Éghezée-Longchamps, 44 ex. le 24.03 à Recogne (Libramont), 27 ex. le 31.03 à Dampicourt, 34 ex. le 04.04 à Éghezée-Longchamps. **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : la croule est observée dès le début du mois de mars à Harzé, Pailhe, Couthuin, Nassogne...





**Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : 1 ex. le 05.04 à Ghislenghien, 1 ex. le 12.04 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 02 et 2 ex. le 04.05 à Éghezée-Longchamps. **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : sur le printemps, 7 données concernant 9 ex. à Flobecq, Ragnies, Benonchamps (Bastogne), Éghezée-Longchamps, Breuvanne, Ans et Emines. **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : après 1 ex. en migration nocturne le 14.03 à Breuvanne, le passage prénuptial est remarqué en avril (14 données et 18 ex.) à Roisin, Nil-Saint-Martin (Walhain-Saint-Paul), Breuvanne, Angre, Éghezée-Longchamps, au marais d'Harchies... Un dernier le 08.05 à Éghezée-Longchamps.

**Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : 6 données pour 7 ex. en avril à Escanaffles, Éghezée-Longchamps, Hollogne-sur-Geer, Warneton et Warcoing. Une seule donnée en mai, le 02 à Éghezée-Longchamps. **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : après une dizaine de données éparées en mars, un premier contingent passe en première décade d'avril (max. 11 ex. le 05.04 à Hérinnes (Léaucourt), suivi

d'un second du 15 au 20.05 (max. 6 ex. le 17.05 à Fontenoy). **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : un premier ex. le 29.03 à Hérinnes et quelques données éparées jusqu'au 25.04 ; le faible passage prénuptial se remarque surtout fin avril-début mai (68 ex. pour la période et un max. de 5 ex. le 27.04 à Warcoing). Quelques retardataires sont encore observés fin mai à Éghezée-Longchamps et Mont-Saint-Guibert. **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : les données, plus nombreuses à partir de la mi-mars, indiquent le début du passage prénuptial. Celui-ci s'amplifie en première quinzaine d'avril et se termine en fin de mois ne laissant que quelques attardés en mai (1 ex. le 09.05 à Antoing, 1 ex. le 10.05 à Frasnes-lez-Buissenal). Les observations de fin mai sont probablement à attribuer aux premiers migrateurs postnuptiaux (2 ex. le 28.05 et 1 le 30 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 28.05 à Hensies, 1 ex. le 31.05 à Waremmme). **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : le passage se remarque du 29.04 au 15.05 mais concerne encore une fois peu d'oiseaux (19 données pour 34 ex. – max. 5 ex. le 05.05 à Éghezée-Longchamps). **Chevalier guignette** (*Actitis*



Bécasseau minute, Longchamps, 27 avril 2008 / Little Stint, Longchamps, 27 April 2008 (Photo : Philippe Vanmeerbeeck)



*hypoleucos*) : une dizaine de mentions d'isolés ou de paires en mars et dans la première quinzaine d'avril. Les observations deviennent ensuite plus nombreuses avec un pic de passage entre le 26.04 et le 05.05 (19 ex. le 29.04 aux Marionville, 32 ex. le 05.05 sur les berges du canal Hensies-Pommeroeul). Quelques oiseaux sont notés jusqu'au 28.05 (1 ex. à Bertrix).

**Mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*) : assez bien de mentions : 2 adultes le 26.03, 1 adulte et 1 immature le 31.03 au marais d'Hensies, 2 ex. le 15.04 au marais d'Hensies, 2 immatures le 17.04 au marais d'Harchies et 2 ex. le 20.04 à Pommeroeul (canal), un oiseau de 2<sup>e</sup> année le 30.05 à Éghezée-Longchamps et le lendemain à Waremme. **Mouette rieuse** (*Larus ridibendus*) : à Hensies, les premiers accouplements sont observés dès début mars alors qu'un millier de mouettes occupent encore le dortoir le 05.03 ; ce nombre tombe à 250 le 18.04. À peine 12 nids sont dénombrés le 02.05. Il y en a 41 le 28.05 à Éghezée-Longchamps. **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : peu signalée ce printemps. Un adulte le 15.03 à Virelles précède 12 ex. le 04.04 à Maubray, un adulte interruptif le 06.04 à Roly, 4 ex. le 13.04 aux Marionville, 5 ex. le 13.04 à Virelles, 2 adultes le 23.04 à Éghezée-Longchamps et 32 ex. le 27.04 au marais d'Harchies. En dernier lieu, un individu de 2<sup>e</sup> année fait halte le 08.05 à Éghezée-Longchamps. **Goéland cendré** (*Larus canus*) : l'espèce est encore bien présente notamment en basse Meuse en mars (110 ex. le 17.03 de Wandre à Petit-Lanaye). Ensuite, les observations se concentrent surtout aux alentours des sites de nidification, dont Hensies (3 nids le 02.05), Éghezée-Longchamps (2 nids le 28.05) et Obourg. **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : quelques isolés ou petits groupes (maximum 10 ex.) comprenant une majorité de subadultes traînent çà et là durant tout le printemps ; seules exceptions notables : 400 ex. le 26.03 au dortoir de la Plate-Taille (BEH) et un groupe de 60 ex. le 20.04 à Angreau. **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : même constat que pour l'espèce précédente, avec des maxima de 13 ex. le 08.03 à Ixelles et d'une dizaine en Meuse liégeoise en mars-avril. Les données de mai sont plus rares : un oiseau de 2<sup>e</sup> année le 02.05 au marais d'Hensies, 1 adulte le 04.05 au marais d'Harchies et 1 ex. de 2<sup>e</sup> année le 04.05 aux Marionville. **Goéland leucophée** (*Larus michahellis*) : quelques mentions réparties sur tout le printemps ; elles concernent principalement des oiseaux de 2<sup>e</sup> année : 1 le 05.03 et 3 le 08.03 au marais d'Hen-



*Mouette pygmée, Longchamps, 8 mai 2008 / Little Gull, Longchamps, 8 May 2008* (Photo : Philippe Vanmeerbeeck)

sies, 1 le 08.03 sur le canal Hensies-Pommeroeul, 1 le 17.03 de Wandre à Petit-Lanaye, 2 le 20.04, un les 02 et 03.05 au marais d'Hensies, 2 le 05.05 à Pommeroeul (canal) et 1 le 23.05 à Éghezée-Longchamps. **Goéland pontique** (*Larus cachinnans*) : des oiseaux restent dans notre région jusqu'à la mi-avril : 7 immatures le 07.03 à Falemprise, 2 ex. le lendemain aux BEH, 6 ex. le 17.03 de Wandre à Petit-Lanaye, 1 individu de 3<sup>e</sup> année le 20.03 à Chokier, 2 ex. le 30.03 à Amay, 2 ex. le 14.04 et 6 le 15.04 au barrage de l'île Monsin (Liège), 1 immature le 15.04 aux BEH et 1 le même jour à Visé. **Goéland d'Audouin** (*Larus audouinii*)\* : le 13.04, un adulte, repéré plus tôt dans la journée en Meuse limbourgeoise à Stokkem (Be) puis à Maastricht volant en direction du sud (BECKERS, G. : Nieuw voor België Audouins Meeuw Laurs Audouinii. *Natuur. Oriolus*, 74:52-54), est retrouvé en soirée posé en compagnie d'autres goélands au Pont-Barrage à Liège. Il s'agit d'une première pour la Belgique.

**Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) : les trois premières passent à Awagne (Dinant) le 05.04. Ensuite, 1 ex. le 13.04 aux Marionville, 1 le 13 et 2 le 28.04 à Amay, 1 le 27 à Éghezée-Longchamps, le 28.04 aux BEH et le 28.05 au marais d'Hensies. Dès le 02.05, le couple de Virelles est de retour sur son site de nidification ; 4 ex. y seront observés le 07 et la couvaison commence le 17.05. **Sterne arctique** (*Sterna paradisaea*)\* : un exemplaire le 29.04 à Virelles. **Sterne caspienne** (*Sterna caspia*)\* : un adulte posé le 14.04 au Pont-Barrage à Liège. **Sterne naine** (*Sterna*

*na albigifrons*) : un adulte effectue une brève halte le 15.05 à Éghezée-Longchamps et 3 individus sont observés le 31.05 à Péronnes-lez-Antoing. **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : début du passage le 14.04 à Amay (1 ex.) ; ensuite, 1 ex. le 20 et le 26.04 à Éghezée-Longchamps et 2 ex. le 29.04 aux Marionville. Le passage culmine dans la première décade de mai avec, entre autres, un groupe de 33 ex. le 06 aux BEH et quelques autres vols ne dépassant pas la dizaine d'individus. Les mentions sont plus rares au cours de la seconde quinzaine du mois : 2 ex. le 18 à Roly, 3 le 23 aux BEH, 1 le 24 à Éghezée-Longchamps, 1 le 25 à Hollogne-sur-Geer, 5 le 27 au marais d'Harchies et la dernière le 28 au marais d'Hensies. **Guifette moustac** (*Chlidonias hybridus*)\* : 3 adultes le 13.05 au marais d'Harchies, 1 les 28 et 29.05 au marais d'Hensies.

**Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : premières le 12.04 à Lommersweiler (Saint-Vith) et le 15.04 à Ploegsteert ; le retour s'amplifie dès le 20 avril mais les mentions restent trop peu nombreuses pour une espèce en fort déclin et méritant de ce fait un suivi régulier.

**Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : après un chanteur particulièrement hâtif, le 17.03 à Beuraing, l'espèce revient plus classiquement en avril, surtout dans la deuxième décade. Des mentions de plus de trois chanteurs dans la même localité ne sont enregistrées qu'au sud du sillon Sambre-et-Meuse et dans le Hainaut occidental. À Harchies, 5 chanteurs et une femelle de morphe roux le 27.04, 9 ex. le 28.04, 7 mâles et la femelle rousse rien qu'au marais d'Hensies le 03.05.



Sterne naine, Longchamps, 15 mai 2008 / Little Tern, Longchamps, 15 May 2008 (Photo : Philippe Vanmeerbeeck)



Hibou des marais, Vellereille, 8 avril 2008 / Short-eared Owl, Vellereille, 8 April 2008 (Photo : Philippe Vanmeerbeeck)

**Hibou grand-duc** (*Bubo bubo*) : un chanteur le 19.03 à Heyd (Durbuy) et les 19, 25 et 27.03 à Vielsalm. Naissance dès le 12.04 en Hainaut occidental où l'on recense 2 couples dont une nichée de 5 jeunes. Une vingtaine de couples nicheurs sont recensés en Entre-Sambre-et-Meuse. **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 1 ex. le 06.03 à Viscourt (Walcourt), au moins 2 ex. dans le secteur Havay-Givry-Vellereille-Sec du 31.03 au 10.04, au moins 1 ex. à Angre et Angreau du 11 au 28.04, 1 ex. à Botrange le 20.04, 1 le lendemain à Ploegsteert, 1 ex. le 21 et le 22 à Jehonville, le dernier le 17.05 à Beauvechain. **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : des chanteurs dans les sites ardennais classiques. Une nidification en nichoir est signalée en Thiérache.

**Engoulevent d'Europe** (*Caprimulgus europaeus*) : un chanteur à Emmels (Saint-Vith) le 15.05.

**Martinet noir** (*Apus apus*) : le premier le 12.04 à Éghezée-Longchamps ; les mentions sont ensuite presque quotidiennes mais il faut attendre la fin du mois pour avoir des nombres importants, par exemple, 800 ex. le 30.04 aux BEH. Les retours se généralisent début mai mais du passage est observé en fin de mois (remontée décalée des immatures).

**Huppe fasciée** (*Upupa epos*) : avec seulement 6 observations, l'espèce est moins présente qu'en 2007 (14 mentions). Des isolées sont signalées le 09.04 à Mouscron, le 18.04 à Hemroulle (Bastogne), le 23.04 à la Baraque de Fraiture, le 02.05 à Ben-Ahin, le 09.05 à Bioul (Anhée) et le 13.05 à Burdinne. **Guêpier d'Europe** (*Merops apiaster*) : fin mai, 6 ex. le 30 à Dave et 1 ex. le 31 à Viroinval.



**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) : le premier chanteur est entendu le 16.04 à Nassogne où l'on recense pas moins de 5 cantons le 06.05. Des chanteurs sont également contactés le 27.04 à Villers-la-Loue (Virton), le 02.05 à Breuvanne ; 5 à partir du 04.05 à Lagland, 2 les 12 et 24.05 à Roûmont (Libin). Des migrateurs en halte ou nicheurs potentiels sont également notés en Fagne de Nessello (Botrange) le 20.04, à Hour les 26 et 27.04, à Ponderôme, aux Awirs et à Beaufays le 27.04, à Wihéries le 28.04, à Pisserotte le 03.05, à Wihogne le 05.05. Un ex. est trouvé mort le 10.05 à Rance. **Pic cendré** (*Picus canus*) : un chanteur le 15.03 à Jalhay et à Eupen, 1 ex. le 19.04 à Membach et 2 ex. le 10.05 à Eupen. Ce pic est entendu à Nassogne (Mochamps) les 03 et 25.05 ; une petite population semble peiner à se développer dans cette zone favorable. Trois couples dans le domaine militaire de Lagland.

**Alouette lulu** (*Lulula arborea*) : nombreuses mentions en mars : de petits groupes de migrateurs, mais aussi différents chanteurs sur les sites de reproduction classiques (Marche-en-Famenne, Hermalle-sous-Huy, Harzé, Stockay...). Aucun couple n'est cantonné dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse cette année. **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : le retour se poursuit en mars avec des passages plus importants en fin et en début de mois, probablement liés à la situation météorologique défavorable dans la majeure partie du mois.

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : première le 15.03 à Virelles, suivie par 1 ex. le 16 et 30 ex. le 17.03 à Harchies. Les contacts sont ensuite réguliers en mars mais la météo froide ne favorise pas le retour massif avant le mois d'avril ; les colonies sont de plus en plus fréquentées en fin de mois. La colonie de Frasnes-lez-Couvin est abandonnée après plus de vingt années d'occupation. **Hirondelle rustique** (*Hirundo rustica*) : une hirondelle le 07.03 à Ploegsteert est suivie par d'autres les jours suivants, mais les nombres restent faibles vu la température basse. Deux rassemblements importants : 500 ex. le 17.04 à Harchies et le 29.04 à Virelles. **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbicum*) : première le 17.03 à Latour, mais peu d'oiseaux signalés jusqu'à la mi-avril. Ensuite, les migrateurs deviennent plus nombreux et passent jusqu'à la fin du mois de mai, tandis que les nicheurs s'installent peu à peu.

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : deux données à des dates classiques : 1 ex. en halte dans une éteule à Jamagne le 29.04 et 1 ex. le 02.05 à

Boneffe. **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : l'espèce, souvent en plumage nuptial, est mentionnée régulièrement jusqu'à la mi-avril. Le nombre d'observations chute alors brutalement ; dernier exemplaire le 02.05 à Lahéries. **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : premiers chanteurs le 31.03 à Lagland puis le 01.04 à Bras et Mazée. Les retours se succèdent en avril ; ainsi 8 chanteurs sont déjà signalés le 10.04 à Sclaigneaux. Néanmoins, l'espèce semble encore peu abondante le 29.04 en Famenne, et ce n'est que dans la deuxième décennie de mai que tous les sites de reproduction y semblent occupés. **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : des parades s'observent dès les premiers jours de mars. Côté migrateurs, le passage s'étale sur tout le mois d'avril mais sans effectifs notables. **Pipit maritime** (*Anthus petrosus*)\* : 1 ex. le 08.04 au canal de Pommeroeul. **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava flava*) : 1



*Pipit maritime, Pommeroeul, 9 avril 2008 / Rock Pipit, Pommeroeul, 9 April 2008 (Photo : Luc Verroken)*



*Bergeronnette flavéole, Roisin-Angreau, 22 avril 2008 / Yellow-headed Wagtail, Roisin-Angreau, 22 April 2008 (Photo : Vincent Leirens)*



ex. le 22.03 à Hérinnes puis sept observations les 30 et 31.03. L'espèce est rencontrée régulièrement dès début avril et de nombreux migrateurs passent durant la seconde quinzaine du mois, dont un groupe de 120 ex. le 17.04 à Clermont-lez-Walcourt. En mai, beaucoup d'oiseaux sont cantonnés mais le passage se poursuit jusqu'au 21.05. **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergi*) : une soixantaine d'ex. identifiés entre le 04.05 et le 26.05, avec 10 ex. dans un groupe de *flava* le 09.05 à Gimnée et une quarantaine regagnant un dortoir le 21.05 à Angreau. **Bergeronnette flavéole** (*Motacilla flava flavissima*) : quelques mentions en avril : 1 ex. le 4 à Warneton, 1 mâle le 15 à Havay, 1 ex. le 20 à Blandain (Tournai), 1 ex. les 20 et 24 à Roisin, 2 ex. le 20 à Dion (Beauraing), 1 ex. le 22 aux environs de Louvain-la-Neuve. Des oiseaux cantonnés et probablement hybrides sont signalés en mai à Roisin et Temploux, ainsi qu'un chanteur le 22.05 à Fleurus. **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : signalée un peu partout le long des ruis-

seaux, rivières, mais aussi le long des canaux, comme ces 2 ex. avec becquée le 23.04 entre Saint-Léger (Ht) et Warcoing. **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : le retour se poursuit début mars avec 23 ex. à Nassogne et 70 ex. à Wez-Welvain le 1<sup>er</sup>. La météo défavorable limite les arrivées en mars et les retours se généralisent seulement début avril, y compris en Haute-Ardenne. **Bergeronnette de Yarrell** (*Motacilla alba yarrelli*) : passage du 09.03 au 03.05 repéré notamment dans la plaine de Focant et en Hainaut, surtout le long du canal Hensies-Pommeroeul où une femelle probablement nicheuse est observée les 17 et 21.05.

**Cincle plongeur** (*Cinclus cinclus*) : construction de nid le 15.03 à Bilstain. Des jeunes volants sont signalés le 12.04 à Biesmes-sous-Thuin et le 20.04 à Remouchamps.

**Rosignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : premier chanteur le 02.04 à Villers-sur-Lesse, mais ce n'est qu'à partir du 13.04, date classique, que



Bergeronnette de Yarrell, Malèves-Sainte-Marie-Wastines, 6 avril 2008 / Pied Wagtail, Malèves-Sainte-Marie-Wastines, 6 April 2008 (Photo : Jean-Sébastien Rousseau-Piot)

d'autres reviennent. Un pic est perceptible entre le 25.04 et le 10.05, période où nicheurs locaux et migrateurs en halte se côtoient. Un minimum de 21 chanteurs est signalé à Mariembourg le 05.05. L'activité vocale des nicheurs diminue déjà en fin de ce mois. **Gorgebleue à miroir** (*Luscinia svecica*) : premiers chanteurs à une date classique, le 17.03, à Harchies, Hensies et Ploegsteert ; 11 chanteurs le 31.03 à Harchies. Beaucoup d'oiseaux apparaissent en avril, sur les zones habituelles du Hainaut, le long de la Sambre, ainsi qu'à Amay et Stockay. Un canton à Virelles au mois de mai. **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochrurus*) : l'espèce est signalée régulièrement en mars, essentiellement dans la deuxième moitié du mois, avec un maximum de 12 ex. à Heyd le 19.03. Les retours continuent en avril. **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : un individu précoce le 15.03 à Virelles. En avril, des individus en halte et des chanteurs apparaissent dès les premiers jours du mois ; les retours se généralisent à partir du 20.04 et se poursuivent tout au long du mois de mai. **Tarier des prés** (*Saxicola rubetra*) : les deux premiers individus apparaissent

le 20.04 à Elsenborn, et 5 ex. sont déjà sur leur site de nidification dans la fagne de la Roer le 23.04. De nombreux migrateurs passent ensuite, et de petits groupes en halte sont signalés jusqu'au 16.05, avec un pic dans la première décade de mai. Un dernier migrateur le 25.05 à Molenbeek et une femelle à Forges le 27.05. **Tarier pâtre** (*Saxicola torquata*) : les retours se poursuivent en mars mais sont peu nombreux. Néanmoins, des oiseaux sont signalés en Haute-Ardenne dès le début du mois, avec par exemple 5 ex. en fagne de Kutenhart le 09.03. Une arrivée plus massive est perceptible dès le début du mois d'avril, et de nombreux cantons sont signalés dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Par contre, l'espèce est peu contactée dans les Hauts-Pays et la zone de Montreuil-Hainin au mois de mai. **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : premier oiseau signalé le 31.03 à Martué, suivis par une vingtaine d'individus jusqu'au 20 avril, date à laquelle l'espèce devient plus fréquente. Le pic migratoire a lieu dans la première décade de mai, mais des individus en halte sont signalés jusqu'à la fin du mois.



Rougequeue à front blanc, Filot, mai 2008 / Rougequeue noir, Filot, May 2008 (Photo : René Dumoulin)



Merle à plastron, Harzé, avril 2008 / Ring Ouzel, Harzé, April 2008 (Photo : René Dumoulin)

**Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : 1 femelle hâtive est signalée le 09.03 à Sterpigny mais les suivants n'apparaissent que le 01.04. La majorité des migrateurs passe de manière étalée durant le mois d'avril, avec un pic entre le 15 et le 25.04. Au moins 180 ex. sont dénombrés durant ce mois, avec un maximum de 22 ex. le 18 à Paradis (Harzé) où 2 ex. s'attardent jusqu'au 05.05. Le dernier migrateur est mentionné le 06.05 à Nassogne. Malheureusement, aucune information n'est parvenue au sujet de la population des Hautes-Fagnes. **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : les bandes d'hivernantes sont rejointes par des groupes remontant vers le nord durant tout le mois de mars et une partie d'avril, sans véritable pic. Les plus gros groupes apparaissent à des dates variables : plus de 1.000 ex. à Thommen le 19.03, 800 ex. à Elsenborn le 02.04 et 400 au bord de la fagne de la Roer le 22.04. **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : des migrateurs en halte ou en passage se mêlent aux hivernants et sont régulièrement observés durant le mois de mars, avec un pic marqué dans la dernière décade du mois. Des groupes de plusieurs centaines d'oiseaux sont signalés à Ivoz-Ramet, Ombret, Mariembourg, Roisin, Aywaille, etc... En avril,

les migrateurs disparaissent rapidement et le dernier ex. est signalé le 22 à Ampsin. Enfin, 2 individus très tardifs sont signalés le 11.05 dans les fagnes de la Roer. **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : les retours des nicheurs se poursuivent en mars tandis que de petits groupes de migrateurs font halte un peu partout, avec un pic fin mars-début avril.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : les premières parades sont signalées dès le début de mars à Hensies. L'espèce reste confinée au Hainaut occidental, dont 25 chanteurs le 27.03 à Harchies. **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : premier chanteur le 4 avril aux Marionville ; d'autres suivent en avril, avec des observations progressant d'ouest en est (Hautrage le 13.04, Mariembourg et Beauraing le 19.04, Les Awirs et Marche-en-Famenne le 20.04, Nassogne le 25.04...) ; quelques installations sont encore enregistrées en mai dans l'est. Après le 07.05, plus aucune n'est entendue à Harchies et dans le Tournaisis. **Locustelle lusciniôïde** (*Locustella luscinioides*) : observations un peu plus nombreuses cette année. Un premier chanteur le 10.04 à Stockay

est probablement un migrateur en halte. Des cantons sont défendus à partir du 23 avril à Harchies et du 26 à Virelles. D'autres sont aussi trouvés à Ploegsteert et à la réserve de la Cussignière (Barzanzy). **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : retour dès le 30.03 à La Buissière et le lendemain à Harchies ; il s'amplifie rapidement : 4 ex. dès le 03 à Ploegsteert et 9 le 07 à Harchies. La migration est encore enregistrée fin avril avec 1 ex. bagué le 26 aux Awirs. **Rousserolle effarvatte** (*Acrocephalus scirpaceus*) : 2 ex. le 20.04 à Harchies précèdent des arrivées le 22.04 à Rosières et Virelles, le 23.04 à Ploegsteert. En mai, outre les oiseaux cantonnés en roselières, des migrateurs en halte se font entendre en milieux secs sur plusieurs sites. **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : une première, précoce, est signalée le 20.04 à Romedenne ; les suivantes, plus classiques, le 02.05 à Ampsin et le surlendemain à Hollogne-sur-Geer. Les retours se multiplient à partir du 11 mai. **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*) : un chanteur en halte est entendu le 09.05 à Rochefort, un autre le 24.05 à Harchies. **Hypolaïs icterine** (*Hippolais icterina*) : premier chanteur le 01.05 à Saint-Sauveur. Six autres contacts dans la



*Locustelle tachetée, Harzé, mai 2008 / Grasshopper Warbler, Harzé, May 2008* (Photo : René Dumoulin)

première quinzaine de mai : le 03 à Bruxelles, le 05 à Ploegsteert, le 09 à Antoing, le 12 à Otrange, le 14 à Wonck et Tintignies. Le retour se généralise au cours de la seconde quinzaine avec des chanteurs uniquement au nord du sillon Sambre-et-Meuse. **Hypolaïs polyglotte** (*Hippolais polyglotta*) : premier chanteur le 24.04 à Heer (Hastières), ensuite le



*Locustelle luscinoïde, La Cussignière, 20 mai 2008 / Savi's Warbler, La Cussignière, 20 May 2008* (Photo : Stéphane Bocca)





26.04 à Corenne et le 30.04 à Filot ; les contacts proviennent surtout du sud du sillon Sambre-et-Meuse, dont plus de 50 au sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse mais quelques cantons épars sont également constatés en Moyenne Belgique.

**Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : deux mâles sont notés le 1<sup>er</sup> mars, à Ombret et Forest. Une petite dizaine d'autres mentions suivent jusqu'au 20.03, date à laquelle 3 chanteurs sont entendus à Roisin. Les observations se succèdent ensuite mais elles ne deviennent communes qu'en avril. Aux Awirs, les premières (5 ex.) sont baguées le 31.03 ; les captures sont ensuite quotidiennes avec un pic au cours de la seconde quinzaine d'avril ; 10 ex. sont encore bagués le 04.05, dernier jour d'activité de la station. **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : premiers chants le 15.04 à Hanzinne (5 chanteurs), ensuite le 19.04 à Harchies, le 21.04 à Masseur, le 22.04 à Houyet et Fleurus. Aux Awirs, la première est baguée le 26.04 et le passage est encore en cours le 04.05 (5 ex. bagués ce jour-là). **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : premier chanteur précoce le 26.03 à Salzinnes ; les suivantes n'apparaissent que le 15.04 à Liège, le lendemain à Lesve et à Falemprise (BEH). Les retours se généralisent ensuite, avec pas moins de 76 contacts en avril dont la construction d'un nid le 26 à Harzé. L'espèce est beaucoup plus discrète en mai : une quarantaine de chanteurs renseignés dont 5 le 11 à Botrange et 6 le 23 à Florennes. **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : premiers chanteurs le 03.04 à Wanlin et le lendemain à Wéris ; il faut attendre la seconde moitié d'avril pour que les rentrées soient massives.

**Pouillot siffleur** (*Phylloscopus sibilatrix*) : les premiers chanteurs sont contactés en Entre-Sambre-et-Meuse le 15.04 : 6 à Biesme et 7 à Gougny ; les suivants le 20.04 à Ombret, Mazée et Éghezée-Longchamps. Ils se généralisent à partir du 22.04. **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : les contacts avec les hivernants sont encore quotidiens début mars. Il faut toutefois attendre le 09.03 pour percevoir un retour des migrants avec de nombreux chanteurs en Bajocienne. Les mentions se généralisent à partir du 15.03 sans qu'il soit possible de distinguer les oiseaux cantonnés des migrants en halte. Le passage se poursuit encore en avril, avec un pic du 05 au 09 aux Awirs où les captures se succèdent jusqu'au 20. Un individu de la sous-espèce nordique *abietinus* est observé le 09.03 à Virelles. **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : premier chanteur le 22.03 à Harchies ; ensuite 3 le 26.03 au canal Hensies-Pommeroeul et plus de 10 le lendemain à Harchies ; également 1 ex. le 27.03 à Hollo-

gne-sur-Geer et le 30.03 à Chimay. Dès le 1<sup>er</sup> avril, le retour se généralise : 15 chanteurs le 01 à Rome et au barrage du Ry de Rome à Pétingny, premier chanteur en Hautes Fagnes, nombreux à Saint-Ghislain et 26 à Harchies le 04. Le passage se poursuit tout le mois d'avril avec, entre autres, des captures régulières aux Awirs où le maximum journalier est de 5 ex. le 28. **Roi-letet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : le retour amorcé en février se poursuit sur un rythme mineur début mars (observé le 06 à Etterbeek, le 07 à Ampsin et le 08 à Mariembourg, Luchy et Nassogne) ; il se généralise à partir du 15.03.

**Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : premiers retours début mai : le 02 à Houtain-le-Val, le 03 à Nassogne, le 04 à Frasnes-lez-Buissenal, le 06 à Froidchappelle, le 09 à Aubin-Neufchâteau. Ils se généralisent par la suite. **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : premier migrateur (une femelle) le 14.04 à Nismes ; les suivants le 20.04 au parc du Cinquantenaire (Bruxelles) et le 22.04 aux Isnes (Gembloux). Les nicheurs locaux sont signalés dès le 03 mai au Fourneau-Saint-Michel, en forêt d'Anlier et à Nassogne. Quelques nombres : un chanteur tous les 200 m sur parcours linéaire de 1,5 km le 09.05 en forêt d'Anlier (Wisembach-Fauvillers), 8 ex. le 20.05 à Mellier et 9 le 21 à Léglise. Le 24 mai, deux chanteurs en dehors de la zone à nichoirs de Mochamps.

**Mésange à longue queue** (*Aegithalos caudatus*) : construction d'un nid le 06.03 à Roisin ; les premières familles sont contactées dès le 28.04 à Cul-des-Sarts et le 02.05 à Hensies. **Mésange bleue** (*Parus caeruleus*) : un nid hâtif garni de 2 œufs le 15.03 à Andenne. Des couples sont couramment renseignés en nichoir ou à la mangeoire dès la fin mars, partout dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. **Mésange charbonnière** (*Parus major*) : un premier jeune à l'envol est renseigné le 24.04 à Treignes. Une nidification originale a eu lieu dans le tableau de bord d'un camion de chantier à Florennes en mai.

**Grimpereau des bois** (*Certhia familiaris*) : l'espèce progresse dans l'Entre-Sambre-et-Meuse avec, notamment, un nid découvert le 12.04 à Florennes, première preuve de nidification dans la région. Une progression vers le nord-est de la Wallonie est également probable : 2 contacts le 06.04 à La Calamine et 2 cantons le 21.04 dans la vallée de l'Oxhe. **Rémiz penduline** (*Remiz pendulina*) : entendu le 29.03 à Pommeroeul.

**Loriot d'Europe** (*Oriolus oriolus*) : les premiers se manifestent fin avril : 1 ex. en migration le 26 à



Frasnes-lez-Buissenal, 1 ex. en halte le lendemain à Escanaffles puis 1 ex. le 28 au marais de Pomeroeul. Les mentions se multiplient en mai, mais restent peu nombreuses.

**Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : les premières le 02.05 : un mâle à Breuvanne et une femelle à Neuvillers. Les retours sont lents et tardifs, notamment à Harzé où plusieurs cantons traditionnels restent inoccupés le 25.05. Un couple s'installe à Ghlin, en dehors de l'aire de nidification habituelle.

**Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : l'hivernage se poursuit en mars, l'espèce étant mentionnée sur 26 sites dont Sclaigneaux et Petit-Lanaye, hors zone habituelle. Une observation le 25.03 à Ottignies concerne un oiseau en migration. Début du mois, des couples sont déjà installés dans leurs cantons, comme à Marche-en-Famenne le 08 et à Mochamps le 13. Les observations diminuent nettement en avril, l'espèce n'étant plus mentionnée qu'à neuf reprises. En mai dans les Fagnes, seuls trois cantons sont repérés, de nombreux autres étant manifestement inoccupés.

**Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : des mentions régulières indiquent la bonne santé de l'espèce qui semble même s'installer dans l'Entre-Sambre-et-Meuse où des oiseaux sont encore observés en mai. Non loin de là, le comportement d'un couple indique une éclosion probable le 22.04 à Wiesme (Beuraing).

**Étourneau sansonnet** (*Sturnus vulgaris*) : quelques belles bandes encore début mars, notamment en Famenne (entre autres, 2 fois un millier le 04 dans la région de Houyet et Beuraing), à Martué (nombreux le 03) et Burdinne (un millier le 07). Les dortoirs : 10.000 à 15.000 ex. à Athis en mars et encore 4.000 ex. le 03.04 à Harchies.

**Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) : la migration est continue en mars avec des passages importants entre le 15 et le 18 à Flémalle, à Heusy, aux Awirs, le 16 aux BEH, le 24 en Famenne ainsi que le 30 à Beuraing. Elle se poursuit en avril avec les dernières observations de 27 ex. le 8 à Pesche, un grand groupe le 12 à Elsenborn et une forte densité d'oiseaux en halte le 27 à Mont-Sainte-Marie. **Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : de petits groupes sont mentionnés



Pie-grièches écorcheurs, Harzé, mai 2008 / Red-backed Shrikes, Harzé, May 2008 (Photo : René Dumoulin)



régulièrement en mars et dans la première quinzaine d'avril. Certains sont assez importants : une centaine le 23.03 à Sprimont, plus de 100 le 25.03 à Ombret, un millier le 29.03 à Botrange, plus de 2.000 début avril à Elsenborn. Les derniers, quelques ex., le 20.04 à Freux. **Serin cini** (*Serinus serinus*) : le premier chanteur est entendu le 26.03 à Couvin. Aux Awirs, le passage, assez faible, débute seulement le 31.03 et se poursuit jusqu'au 24.04. Des chanteurs sont signalés dans une douzaine de communes durant le mois d'avril. Ils sont peu nombreux par village, le maximum est de 10 le 06.04 à Mariembourg. **Verdier d'Europe** (*Carduelis chloris*) : peu de mentions dont une seule mérite d'être soulignée : 150 ex. le 11.03 au dortoir à Autreppe. **Chardonneret élégant** (*Carduelis carduelis*) : peu noté mais une migration très faible aux Awirs où seulement 5 ex. ont été bagués. Le premier chanteur le 14.03 à Treignes. Une première famille avec 6 jeunes le 11.05 à Cul-des-Sarts. **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : le passage pré-nuptial se poursuit jusqu'à fin avril. Des groupes d'une cinquantaine sont signalés à la mi-mars à Bonnert, Mochamps, Nassogne, Auderghem, Blaton et à Court-Saint-Étienne. Le 19.04, une centaine d'ex. sont encore observés dans le camp militaire de Marche-en-Famenne. **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : aux Awirs, la migration débute le 07.03 mais ne devient importante qu'à la fin du mois ; elle le restera jusqu'au 20 avril. Un groupe important : 205 ex. le 13.04 à Boneffe. **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : quelques observations en mars et en avril : 3 ex. le 18.03 à Auderghem, 5 ex. le 19.03 à Woluwe-Saint-Lambert, 2 ex. le 30.03 à Trois-Ponts, 6 ex. le 04.04 à Le Mesnil et Olloy-sur-Viroin. L'espèce est aussi observée sans précision de quantités le 06.04 à Aywaille et le 22.04 à Beauraing. Pas de renseignements sur la population nicheuse. **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvisrostra*) : rare ce printemps avec moins de quinze mentions. À l'exception de 40 ex. le 10.03 à Tilff, de 11 ex le 24.05 à Trois-Ponts et de quelques individus régulièrement à Vielsalm, elles ne concernent le plus souvent qu'un ou deux exemplaires.

**Bruant des neiges** (*Plectrophenax nivalis*)\* : 3 ex. le 06.03 à Spa. **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : encore quelques groupes d'hivernants en mars, le plus important comptant plus de 200 ex. dans une éteule d'avoine le 09 à Nassogne. Le plus tardif (40 ex.) est noté le 18.04 à Bébange. Une seule mention intéressante au niveau des nicheurs : un chanteur le 22.04 à Frasnes-lez-Buissenal où il n'avait plus été entendu depuis plus de dix ans. **Bruant des roseaux**

(*Emberiza schoeniclus*) : le passage se prolonge jusqu'aux premiers jours d'avril ; il est relativement discret et les groupes en halte sont de faible taille. On épinglera une présence nombreuse les 13 et 23.03 dans les prés inondés de moyenne Semois, plus de 20 ex. le 13.03 à Mochamps et une trentaine au dortoir le 02.04 à Éghezée-Longchamps. Les nicheurs s'installent début mars et sont en nombre habituel. **Bruant fou** (*Emberiza cia*)\* : 1 ex. le 21.04 à Juslenville. **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : le retour s'amorce début mars mais les oiseaux tardent à se cantonner. Des groupes parfois importants (une centaine dans un champ de phacélie le 10.03 et 40 le 16.03 à Ambresin) mais le plus souvent limités à une dizaine d'ex. sont signalés en mars (11 ex. le 05 à Angre, 13 ex. le 24 à Ragnies, une dizaine le 29 à Thys) mais aussi en avril (une dizaine le 04 à Vellereille-le-Sec, 10 ex. le 06 à Orbais, 22 le 08 à Havré, 32 le 29 à Merdorp) et même début mai (9 ex. le 07 en Hesbaye liégeoise, 8 ex. sur un tas de fumier le 12 à Oleye). L'espèce semble encore assez abondante dans certains secteurs de la Hesbaye liégeoise mais continue à décliner dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Mentionnons aussi un dortoir de 12 ex. dans du colza le 21.05 à Angreau et la présence d'un ex. la veille à Les Bulles, ce bruant étant rare en Lorraine.

REMERCIEMENTS – Nous remercions les 365 observateurs qui ont contribué à documenter cette synthèse saisonnière ! Ce sont Adriaens V., Aelvoet W., Ameels M., Amory B., Asinari C., August B., Baccaert A., Baron A., Bataille B., Bataille L., Baudet L., Baudoux T., Bayot A., Beckers A., Berthe P., Biron F., Biquet L., Bisteau V., Bocca S., Bodart P.Y., Boeckx A., Bogaert E., Boland P., Bonmarchand S., Boon L., Bouckennooghe B., Bougard V., Bouhon C., Brialmont M., Brihaye J.-F., Bronne L., Brunin C., Buchet V., Bultot J., Burnel A., Cabooter A., Calberg C., Camberlein P., Capelle C., Carbonnelle S., Carels C., Caudron O., Cauwe F., Cavez B., Chiwy B., Christophe B., Claerebout S., Clermont D., Clesse B., Coatanea Y., Coelen C., Cogneau G., Colas J.M., Colman L., Corhay F., Cors R., Coyette J., Crohin R., Croisier P., Cucurnia P., Cuvelier B., Cuvelier E., Dagneaux A., Dallemagne, Dambiermont J.L., Damman E., De Boeck B., De Broyer A., de Callatay H., de Closset F., de Gottal P., de Grelle V., de Guchteneère G., de Liedekerke R., De Pamelaere M., De Prince T., De Puydt J.-F., De Schepper C., de Wavrin H., Debacker D., Debiève J., Declercq M., Decruynaere E., Dedonckers A., Deflorenne P., Degrave D., Degrave F., Dehombreux E., Delacre J., Delaet J., Delaitte S., Delarue J., Delneste J.L., Delsalle M., Demaret A., Demeure I., Demeuse V., Demonty L., Derdeyn D., Derouaux A., Derouaux J.P., Derume M., Desaubies P., Detaille R., Devallée P., Devos D., Dewinter N., Dewitte T., Dielen V., Dineur H., Dordolo C., Dormal F., Doyen F., Dubois P., Dubuc Y., Duchamps J.P., Duchenne P., Dufour D., Dufour V., Dufourny H., Dujardin R., Dumortier C., Dumoulin R.,



Dutoit N., Duyck D., Ellis F., Elorriaga J., Ertvelt J.P., Etienne I., Evrard J., Eykmans J., Fagot J., Fanon Y., Farinelle C., Fasol M., Fautsch M., Fays C., Fouarge J., Fourez J.F., Furnelle V., Gailly Da., Gailly Do., Gailly R., Galant A., Galletti G., Gallez J., Gauquie B., Geboes A.L., Gérard M., Germain P., Ghysel P., Ghysenberghs B., Gijts F., Gillon R., Giot Y., Glotz S., Godding E., Godeau J.F., Goffette Q., Gooris R., Goubout-Guillemyn M., Grégoire D., Greindl B., Gruslin F., Gruwier C., Hammond M., Hanus B., Hendrick R., Hermand P., Hidvégi F., Horney G., Houbart J., Hubart D., Humbert C., Hupperetz J., Huyghebaert C., Ickx P., Imbreckx E., Iltelet M., Jacob J.P., Jacob P., Jacques A., Jancloes P., Janssens M., Jardon B., Jobé P., Jortay A., Kaiser A., Kinet T., Kuenhen V., Kunsch A., La Spina S., Labenne D., Labeye C., Lafalize H., Lafontaine R.M., Lambert A., Lambert G., Lambert J., Lambert M., Lambillon J., Lambiotte S., Landrain R., Laudelout A., Laurent G., Lebaillly B., Lebois J.C., Lebrun R., Leclef Ph., Leclercq J., Lecohier D., Ledent V., Ledoux L., Legrand P., Leirens V., Lenain H., Leprince P., Lhoest P., Loly P., Lombart A., Losseau J.-D., Maertens A., Majerus L., Maniquet C., Maniquet T., Marchal B., Mardulyn H., Mari S., Mariage T., Marien C., Matagne J., Matagne M., Mathieu G., Mathieu P., Mauhin F., Mayon N., Mazy B., Meeùs T., Melon P., Mengal J., Meuli G., Michel P., Mignon M., Minet G., Moncousin M., Monnom S., Moreels M., Morren K., Mossoux P., Mottet P., Nef B., Nicolas M., Ory T., Paemelaere M., Paquay M., Paquay N., Pâques H., Paquet A., Paquet C., Paquet J.-Y., Parkinson D., Parmentier E., Pasau B., Paulus F., Perot P., Peten S., Picard O., Pierrard N., Pierre P., Pierret S., Piette Ag., Piette Al., Pigneur L.M., Piron M., Pironet A., Pirotte S., Pirson C., Pochet

G., Poncelet J.M., Ponsen R., Pontégnie M., Pourignaux F., Rabosée D., Rapaille J.P., Rappe D., Rasson G., Raty L., Razée C., Reginster J.P., Reiter A., Renson G., Renson S., Richir F., Rifflet S., Roberfroid O., Roca M., Romain S., Rousseau C., Rousseau-Piot J.S., Ruyschaert F., Sansdrap A., Schaeken P., Schleich E., Schwes J., Schyns J., Selosse N., Senkiw P., Sepulchre J.B., Sevrin D., Simar J., Smeets A., Smets A., Smit S., Sorbi S., Spietz L., Squelin B., Squevin M., Stassin P., Steckx E., Swinnen V., Tallier P., Tancrez T., Taymans J., Teerlynck H., Terorde N., Testaert D., Thirionet B., Thonnard M., Thunus R., Tombeur S., Tombeux P., Tonin B., Van Acker K., Van den Abbeele F., van den Berg S., Van Der Krieken B., Van Dionant M., Van Laethem P., van Zuylen C., Vandevyvre X., Vangeluwe D., Vanhove F., Vanmeerbeeck P., Vanschepdael M., Verbelen B., Vercruysse A., Verdonckt F., Verhegghen E., Verroken D., Verroken L., Verté P., Vicenzi H., Vieuxtemps D., Vilain B., Vlaemynck M., Vrancken W., Wauters M., Wielemans L., Wiertz A., Windels M., Wyckaert P., Wyns E., Xhardez C., Yernaux X. ainsi que les observateurs du Guignard, du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse (chronique dans « La Grièche ») et de sites comme Latour, le Grand Vivier de Champs, Virelles, Harchies, les BEH... ou d'autres dont le nom aurait été omis. Merci à tous.

La compilation des données a été effectuée par Alain Baccaert, André Burnel, Paola Cucurnia, Claire Huyghebaert et Philippe Vanmeerbeeck, ainsi que via une partie des encodages de données effectués dans les sections régionales et via observations.be.

#### SUMMARY – Observations from March to May 2008

April was a normal month because of the predominating ocean currents, relatively dry but not hot; only the 25-27 April were hot and anti-cyclonic. From the 3 May, the continental (3-15, 19-24) and tropical maritime (25-31) currents produced exceptionally warm weather, well above normal (16.4° C mean at Uccle as opposed to 12.7° C on average).

The poor weather in March led to late migration, which really began only at the end of the month and in April. Most of the movement was not noteworthy (ducks, birds of prey, gulls, shorebirds, wagtails, finches...), among other reasons, because April was favourable for high flight migration. The most important rarities were an Audouin's Gull on the 13th April, the first for Belgium, and a Caspian Tern the next day. Another notable event was the arrival of Red-footed Falcons between the end of April and the end of May. Other rarities included the Slavonian Grebe, Ring-necked Duck, White-tailed and Short-toed Eagles, Arctic, Little, and Whiskered Terns, Rock Pipit, and Rock and Snow Buntings.

Nesting was important for herons: confirmation for Little Egrets and Night Herons, as well as the first Cattle Egrets. The Great White Egrets stayed the summer, parading but not nesting. Other rare nesters were successful: Black-necked Grebe, three harriers, Oystercatcher, Wryneck, and Savi's Warbler on four sites; we may also note the return of the Common Tern to Virelles, the installation of Ravens between the Sambre and Meuse, the expansion of the Tree Creeper in the Condroz, and a new nesting of the Red-backed Shrike north of the Sambre-Meuse. The Ferruginous Duck (of unknown origin) reappeared at Ploegsteert. Crossbills were very rare and the number of Serin decreased. Some resident birds nested very earlier, in particular the Tits. (JLn)