


OBSERVATIONS DE JUIN À AOÛT 2008

Centrale Ornithologique Aves Groupe de travail « Chroniques »*



C.-H. Born

L'été 2008

Nettement dominé par l'influence de courants maritimes, l'été 2008 laisse une impression mitigée, notamment en raison d'un ensoleillement modeste (anormalement faible en août : 135h, normale 188h) ainsi que par la fréquence des jours avec pluie (56 sur l'été). La douceur des températures moyennes, légèrement supérieures à la normale, s'explique surtout par celle des nuits ; le nombre de jours d'été (maxima >25 °C) fut néanmoins normal, excédentaire même en juillet (9 jours).

Les fins de migrations furent classiques en première décade de juin (dernier Faucon kobez de l'afflux printanier, limicoles, Rousserolles effarvate et turdoïde) tandis que débutaient les reflux estivaux (Vanneau, Chevalier culblanc). Traîne normale en cours de mois de quelques Guifettes noires et Traquets motteux, encore une Guifette moustac, deux mentions de Sterne naine et l'unique donnée estivale de Guêpier. Dans le même temps, on enregistre des arrivées d'Aigrettes garzettes, un nouvel afflux de Vautours fauves (73 ex. en 6 groupes du 7 au 23), mais aussi des Goélands bruns dont nombre d'adultes et au moins deux Goélands de la Baltique. Fin juin, voit le départ du Grèbe esclavon présent depuis le 31 mai, le bref cantonnement d'une Locustelle fluviatile (28 juin-2 juillet) et d'un Pouillot de Bonelli à Marche-en-Famenne. Le Circaète observé le 7 juillet, la réapparition d'un Goéland pontique le 8, voire la Pie-grièche à poitrine rose du 20 juillet (première mention depuis 1988) sont peut-être aussi parvenus dans nos régions avec les courants tropicaux puis continentaux de fin juin et du 1^{er} juillet.

En juillet, début des migrations postnuptiales de rousserolles au cours d'une longue période de courants maritimes du 2 au 19, devenant froids le 20. Les passages d'autres sylviidés démarrent les 20-23 juillet (locustelles, Phragmite des joncs, Hypolaïs ictérine, Fauvettes grisette et des jardins). En fin de mois, on pointe un Chevalier stagnatile, une Cisticole et l'amorce des mouvements qui iront crescendo en août (Canard souchet, Bécassine des marais, Tarier des prés par exemple) ; une concentration de plus de 500 Fuligules milouins à Harchies dès fin juillet est étonnante.

En août, mois sans chaleur ni beau temps stable, les passages de Cormorans, Héron pourpré, Bondrée, Hirondelle de cheminée ou encore Bergeronnette printanière débutent rapidement. Ils sont suivis en deuxième décade par ceux de Torcol, Hirondelle de fenêtre, Motteux. La persistance des courants maritimes du 8 au 26, avec des pluies parfois copieuses (notamment le 22) réunissait les conditions pour un nouveau bon passage de Pluviers guignards, dont un groupe record de 58 le 22... le lendemain d'une observation de Rollier, d'un précoce petit vol de Grues et de la première régionale du Bécasseau rousset ! Cette date correspond au début normal des arrivées de ce migrateur américain en Europe. Par contre, il y eu assez peu d'autres limicoles sur le mois ; seule une bande de 62 Chevaliers aboyeurs le 18.08 en Hainaut retient l'attention. Fin août, on enregistre des pics migratoires (Grand Cormoran, Cigogne blanche, Bondrée, busards, Goéland leucophée, Pipit rousseline...) et l'amorce du flux de Buses variables, Bergeronnettes grises, Fauvettes à tête noire (assez tardif)... Parmi les migrateurs remarquables alors, des Spatules, deux Cisticoles ou encore l'arrêt insolite d'un Tourneepierre le 31 à Luchy.

*Rédacteurs de la présente chronique : T. Baudoux, A. Burnel, A. De Broyer, A. Dirick, P. Duchesne, C. Farinelle, T. Mariage, T. Ory et J.-P. Jacob.

La nidification des hérons fut remarquable à Harchies : les deux premiers couples de Héron garde-bœufs en Wallonie, 5 couples d'Aigrettes garzettes et 2 de Bihoreaux, sans compter les observations de Butor, de Blongios, de Grande Aigrette et de Spatules. Sur ce site, des nombres record sont enregistrés pour la Bouscarle (118 cantons) et le Phragmite des joncs (82). La Sterne pierregarin s'est à nouveau reproduite à Virelles mais d'autres observations, surtout à Harchies, permettent d'espérer des installations grâce à la pose de petits radeaux. Pour le reste, soulignons les nidifications du Blongios, de la Sarcelle d'été, de l'Huïtrier, de la Bergeronnette flavéole et des trois busards. Parmi eux, un nombre croissant de Busards des roseaux et la reproduction de plus en plus régulière de Busards Saint-Martin. La Locustelle luscinioidé a probablement niché. Ce ne fut pas le cas de la Nette rousse et du Fuligule nyroca. D'autres éléments négatifs de 2008 sont la rareté du Râle des genêts, la poursuite du déclin de la Grive litorne et du Tarier des prés, la faible abondance de la Tourterelle des bois et de la plupart des granivores. Pour terminer, la série d'observations estivales d'oiseaux nordiques est à mentionner : Canards siffleur et pilet, Garrot, Harle bièvre et piette, Balbuzard.

Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par Internet (site Aves et Aves-Lux), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collationnées par le GT Le Guignard (Hainaut occidental), la cellule de l'Entre-Sambre-et-Meuse (« La Grièche ») et le GT ornitho d'Harchies. Quelques-unes proviennent aussi d'observations.be (waarnemingen.be).

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure. Le complexe marécageux de Harchies - Hensies - Pommroeuil est souvent simplement libellé « Harchies ».

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : quelques données de nidification et de présence estivale : les sites de Donstiennes, Genappe, Neuvillers et Libin ont accueilli au moins 5 couples, 12 nichées à Ploegsteert en juin, 18 couples nicheurs à Frasnes-lez-Buissenal en juillet, 37 nichées au total à Harchies où il y avait 78 ex. le 17.08, 47 ex. le 14.08 à Éghezée-Longchamps, 18 ex. le 28.08 à Luchy et 20 ex. le 31.08 à Hologne-sur-Geer. **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : 60 nichées à Harchies. Dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, l'espèce est bien présente avec 38 ex. le 30.06 aux BEH et 27 ex. le 05.07 à Virelles. Par contre, elle est nettement moins abondante à Roly par rapport à l'an dernier avec un maximum de 15 ex. en août. **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*)* : l'adulte découvert le 31.05 séjourne jusqu'au 30.06 aux décanteurs de Waremmé. **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : reproduction à Ploegsteert (au moins 4 nichées le 23.06), Harchies (12 nichées avec un maximum de 19 poussins), Frasnes-lez-Buissenal (16 couples et 30 juvéniles le 21.07), Éghezée-Longchamps (1 couple et un poussin le 13.08), Hologne-sur-Geer (11 adultes et 14 poussins le 24.06) et Waremmé (12 ex. le 29.06). L'espèce a estivé à Roly et Virelles ainsi qu'à Stockay.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : encore au moins deux nids occupés le 27.08 à Harchies où les deux colonies ont totalisé 229 nids soit un recul de 15 % par rapport à 2007. À Lessines, 26 nids avec jeunes en août. Les premiers groupes postnuptiaux sont signalés dès le début août; les plus importants : 43 ex. le 09.08 à Houtain-le-Val, 102 ex. le 15.08 à Éghezée-Longchamps, 50 ex. le même jour à Flobecq, 54 ex. le 23.08 à Grez-Doiceau, 44 ex. le 31.08 à Honnay et un groupe de 163 ex. en vol le 31.08 à Ramecroix. **Pélican blanc** (*Pelecanus onocrotalus*) : un juvénile le 24.08 à Chênée est un échappé d'un zoo néerlandais.

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) : la présence de 2 ex. discrets le 20.06 aux marais d'Harchies suggère une nidification mais aucune preuve n'est apportée. Un individu le 09.08 à Éghezée-Longchamps. **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*) : l'unique canton découvert à Harchies s'est peut-être soldé par une nidification mais aucune preuve n'est à l'appui. Au moins 2 jeunes sont nés en juillet à Ploegsteert. **Bihoreau gris** (*Nycticorax nycticorax*) : à Hensies, deux couples nicheurs ont mené chacun deux jeunes à l'envol. Une seule autre mention d'un juvénile les 23 et 24.08 à Virelles. **Héron garde-bœufs**

Les espèces dont l'observation est soumise à homologation sont marquées d'un *.



Photo 1 - Grèbe à cou noir et Grèbe esclavon en plumage nuptial. Waremme, 30 juin 2008 / Nuptial Black-necked and Slavonian Grebes. Waremme, 30 June 2008 (Photo : Bernard Bouckenooghe).

(*Bubulcus ibis*) : l'espèce s'est reproduite pour la première fois à Hensies. Deux couples, dont un a élevé 3 jeunes, y sont présents tout l'été. **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*) : nidification et présence en nombre croissant. En passage, Breuvanne le 03.06 et Falemprise le 28.06 accueillent chacun un oiseau, mais c'est Gedinne qui attire l'attention avec 12 ex. le 19.06. Quatorze jeunes provenant de 5 nichées verront le jour à Harchies où un maximum de 42 ex. sont dénombrés mi-juillet. À la même époque, une aigrette est présente le 10.07 à Quévy et 5 ex. le 13.07 à Ploegsteert. Notons encore 3 ex. le 31.07 aux Marionville et fin août à Virelles. **Grande Aigrette** (*Casmerodius albus*) : l'estivage est de plus en plus régulier. En juin, un individu le 1^{er} à Waremme, 3 ex. le 10 à Moiricy, 1 ex. le 26 à Philippeville et Viroinval, 1 ex. le 28 à Cerfontaine. En juillet, 2 ex. le 12 à Luchy, 1 ex. le 24 à Roly et 2 ex. le 29 aux Marionville. En août, des isolés à Dénée, Seraing, Hollogne-sur-Geer et Tronquoy. L'espèce est présente tout l'été à Hensies et à Virelles où les dortoirs sont davantage occupés en août avec des pics respectifs de 14 ex. le 01.08 et de 8 ex. à la fin du mois. **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : la colonie

d'Hensies est stable par rapport à 2007 (130 à 140 nids). Parmi les observations postnuptiales d'août, 65 ex. le 31.08 à Virelles. **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : 2 juvéniles se posent le 25.07 dans la héronnière d'Hensies. Quatre observations d'isolés en août : Bambois le 09, Petit-Lanaye le 10, Havinnes les 15 et 31.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : une centaine de mentions au sud du sillon Sambre-et-Meuse cet été. Retenons 5 ex. le 21.06 à Saint-Vith, 6 ex. le 15.07 à Ciergnon, 4 ex. le 20.07 à Ortho, 4 ex. le 25.07 à Namur, 6 ex. le 29.07 à Forge-Philippe, 5 ex. le 04.08 à Freux, 9 ex. le 06.08 à Hompré, 4 ex. le 16.08 à Hotton et 7 ex. le 21.08 à Torgny. **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : quelques données d'un ou deux individus en juin et juillet : le 11.06 à Wavreille, le 20.06 à Zetrud-Lumay, le 04.07 à Monceau-sur-Sambre et le 20.07 à Liège. Le passage est sensible en seconde quinzaine d'août : entre autres, 44 ex. le 19 à Lillois, 52 ex. le 20 à Mont-Saint-Guibert, 50 ex. le 24 à Warzée, 52 ex. le 30 à Naninne, 31 ex. le 31 à Marche et 50 ex. le même jour à Bois-de-Villers. **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) : une observation le 01.08 à

talea leucorodia) : un juvénile est présent du 24.07 au 17.08 au dortoir d'Hensies. Un adulte est également signalé le 12 et le 27.08 à Harchies. Enfin, observation peu banale de 11 ex. dont 6-7 juvéniles le 28.08 à Maubray.

Oie cendrée (*Anser anser*) : comme chaque année, un groupe (maximum 41 ex. cet été) séjourne en août aux décanteurs d'Éghezée-Longchamps. **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : en juin, l'espèce est présente dans tous les décanteurs de la région et dans la vallée de l'Escaut mais la reproduction n'est constatée qu'à Warcoing et Frasnes-lez-Buissenal. Comme d'habitude, les nombres chutent en juillet et il ne reste que des juvéniles en août, dont 7 le 04 à Warcoing et 6 le 25 à Éghezée-Longchamps. **Canard siffleur** (*Anas penelope*) : une dizaine au cours de l'été à Harchies : 2 mâles et une femelle le 25.06, 5 mâles le 06.07 puis un seul jusqu'au 16.07 et 1 mâle en éclipse à quatre reprises du 11 au 31.08. Un seul autre site est visité fin août : 2 ex. le 23, 1 ex. les 26 et 29 à Freux. **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : l'espèce se reproduit surtout en Hainaut occidental : Douvrain (1 nichée, 8 canetons), Marionville (3 nichées, 17 poussins), Frasnes-lez-Buissenal (3 nichées) et surtout Harchies (26 nichées, 200 canetons). Ailleurs, la reproduction n'a été signalée qu'à Éghezée-Longchamps (11 poussins le 19.06). **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : 16 ex. sont notés en juin (Harchies, Marionville, Éghezée-Longchamps, Luchy, Freux et Virelles) mais aucune nidification n'est rapportée. Les nombres augmentent dès la fin juillet avec, comme maxima locaux, 47 ex. le 05.08 aux Marionville, 56 le 25.08 à Éghezée-Longchamps, 70 le 27.08 à Harchies et 22 le 29.08 à Hollogne-sur-Geer. **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : quelques rassemblements en août dont 2.030 ex. le 17 à Harchies et 1.244 le 25 à Éghezée-Longchamps. **Canard pilet** (*Anas acuta*) : une série d'observations estivales dont la plus étonnante est 8 mâles en éclipse le 29.06 à Genappe où un oiseau était encore présent le 03.07 ; les autres concernent 1 ex. du 23 au 31.07 aux Marionville, 1 mâle en éclipse le 17.08 et le 27.08 à Harchies, 1 ex. du 02.08 au 23.08 à Virelles. **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : nidification rapportée à Harchies (3 couples dont 1 femelle avec 9 poussins le 20.06) et Ploegsteert (une famille le 13.06). L'espèce est aussi mentionnée en juin aux Marionville, à Virelles, Éghezée-Longchamps et Waremmes. Les mentions d'oiseaux en halte lors de la migration postnuptiale sont assez peu nombreuses. Retenons une pré-

sence régulière tout le mois d'août à Harchies où le maximum est de 29 ex. le 01, ainsi que quelques groupes : 8 ex. le 05.08 aux Marionville, 10 ex. le 22.08 à Hollogne-sur-Geer, 3 ex. le 17.08 à Freux. **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : une seule nidification rapportée : une famille le 04.07 à Harchies. En juin, l'espèce est pourtant présente à Ploegsteert, Douvrain, Marionville, Genappe et Éghezée-Longchamps. La présence augmente dès la fin juillet avec, notamment, 200 ex. le 29.07 à Harchies ; en août, 28 ex. le 25 à Éghezée-Longchamps et 38 ex. le 30 à Virelles.

Nette rousse (*Netta rufina*) : 1 mâle séjourne de mai jusqu'au 17.08 à Harchies. Une seule autre mention : un mâle le 13.07 à Ploegsteert. **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : la nidification est signalée sur une partie des sites occupés par l'espèce : Ploegsteert (4 nichées, 18 poussins, Douvrain (6 nichées, 18 poussins), Marionville (8 nichées, 32 poussins), Harchies (plus de 20 nichées pour 60 poussins), Virelles (une femelle avec un seul jeune le 31.07) et Gembloux (2 juvéniles le 21.06). D'autres sont possibles mais les informations n'ont pas été transmises. Quelques rassemblements sont notés fin juillet et en août, dont 510 ex le 24.07 et 502 le 17.08 à Harchies. **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)* : un mâle séjourne au moins jusqu'au 23.06 à Ploegsteert ; un mâle aussi du 11.07 au 31.08 et un second oiseau le 13.08 à Harchies. **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : nidification rapportée à Ploegsteert, Harchies, Marionville, Douvrain, Louvain-la-Neuve, Genappe, Gembloux, Éghezée-Longchamps, Virelles, BEH, Remau, Neuville, Luchy et Thommen. **Garrot à œil d'or** (*Bucephala clangula*) : une femelle est présente à partir du 25 juin à Harchies. **Harle piette** (*Mergus albellus*) : 1 femelle du 03.07 au 17.08 à Harchies. **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : présence exceptionnelle de ce harle en été : 1 mâle le 03.06 à Poulseur, 5 femelles du 05.07 au 28.07 à Méry et 1 femelle le 27.07 à Visé. **Érismature rousse** (*Oxyura jamaicensis*) : 2 ex. le 17.07 à Harchies et 1 femelle le 21.07 à Frasnes-lez-Buissenal.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : première migratrice le 04.08 à Ramecroix (Verviers) mais le passage ne devient réellement important qu'à partir du 22.08. Les maxima : 46 ex. en 7h le 22, 44 en 5h le lendemain à Torgny, 132 ex. en 4h le 24 à Honnay. **Milan royal** (*Milvus milvus*) : nombreuses mentions en provenance surtout d'Ardenne et de Gaume. Par exemple, 44 ex. dont un tiers de ju-



Photo 2 - Harles bièvres. Méry, 7 juillet 2008 / Goosanders. Méry, 7 July 2008 (Photo: Christophe Bouhon).

véniles le 31.08, sur un parcours de 80 km entre Libramont et Bertrix. **Vautour fauve** (*Gyps fulvus*)* : à nouveau quelques mentions en juin : 7 ex. le 07 à Beyne-Heusay, 8 ex. le 21 à Trooz, une quinzaine le 21 à Thuin, une vingtaine le 22 à Dour, 11 ex. le 22 à Havinne, autant le 23 à Boirs et un dernier le 24 à Solwaster. **Circaète Jean-le-Blanc** (*Circaetus gallicus*)* : un immature stationne quelques minutes le 06.07 à Saint-Aubin. **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : au moins huit couples nicheurs, dont 7 ont conduit des jeunes à l'envol, dénombrés cet été, la plupart dans les marais du Hainaut occidental (4 à Harchies). Une tentative d'installation dans une luzernière a échoué au sud de Tournai ; un succès en culture à Genappe. L'estivage ainsi que celui des autres busards fait l'objet d'un article séparé (pp. 49-56). En août, comme d'habitude, des oiseaux en dispersion ou en migration sont notés un peu partout, entre autres 12 ex. au dortoir le 26.08 à Angre. **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : ce busard semble bien devenir un nicheur annuel en wallonie. Nidification réussie (2 jeunes à l'envol) après deux échecs dans la région de Jodoigne ; succès également à Givry (au moins

un jeune à l'envol). Ailleurs, une petite dizaine de mentions d'oiseaux en dispersion en août. **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : année peu favorable avec une seule nidification réussie dans l'Entre-Sambre-et-Meuse ; une autre dans le même champ a été victime d'une corneille tandis que dans la région de Hannut, une nichée a été découverte trop tard et n'a pu être sauvée lors de la moisson. Une douzaine de mentions dès le 21.08 concernent des oiseaux en migration. **Buse variable** (*Buteo buteo*) : la migration débute fin août : 38 ex. en passage sur 3 jours à Flobecq.

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*) : présence estivale remarquée, avec des observations sur huit sites : le 02.06 à Hompré, le 20.06 à Freux, le 22.06 à Nassogne, le 26.06 Harchies, le 07.07 à Macquenoise, le 14.07 à Fontaine-Valmont, le 31.07 à Noisieux, le 29.07 et le 06.08 à Rièzes. Le passage débute le 12 août ; ensuite, plus de 50 mentions jusqu'en fin de mois.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : peu d'observations mentionnent des densités : 25 ex. sur 50

km le 21.08 en Hesbaye liégeoise, 67 ex. sur 80 km le 31.08 entre Libramont et Bertrix. **Faucon kobez** (*Falco vespertinus*)* : l'afflux printanier se termine avec un dernier migrateur le 03.06 à Cul-des-Sarts. **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : premier migrateur le 23.08 à Ramecroix (Verviers) et quatre autres mentions en août. **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : régulièrement signalé tout le long de l'été dont une concentration de onze le 25.06 à Harchies. **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : plusieurs données de nidification réussie dont de plus en plus d'occupations de sites naturels.



Photo 3 - Caille des blés. Donceel, juin 2008 / Quail. Donceel, June 2008 (Photo : Charly Farinelle).

Rôle d'eau (*Rallus aquaticus*) : quelques cantonnements signalés en juin dont Ploegsteert, Harchies et Roly. Le passage est localement décelé en août : ainsi, 22 ex. sont bagués du 16 au 31 à Nodebais. **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : 1 ex. bagué le 15.08 à Nodebais et 1 ex. le 24.08 à Virelles. **Rôle des genêts** (*Crex crex*) : seulement un chanteur le 27.06 dans la vallée de l'Eau Blanche et le 01.07 à Wanlin. **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : au total, 170 nichées sur le site d'Harchies où 1.127 ex. sont présents à la mi-juillet.

Grue cendrée (*Grus grus*) : 4 ex. particulièrement hâtifs en passage le 21.08 à Torgny.

Huïtrier pie (*Haematopus ostralegus*) : 10 données dont 3 ex. le 10.06 à Warneton, 5 le 17.06 à Pecq et 1 à 3 ex. régulièrement en juillet à Hérinnes. Le couple de Nivelles a produit un jeune. **Avocette** (*Recurvirostra avosetta*) : seulement observée en juin : 2 ex. du 1^{er} au 09 et 1 le 13 à Éghezée-Longchamps, 5 ex. le 05 à Fontenoy. **Échasse blanche** (*Himantopus himantopus*) : 1 ex. le 04.06 à Warcoing.

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*) : nicheur au moins possible sur au moins 8 sites en juin avec éclosion le 10 à Éghezée-Longchamps. Le passage est peu quantifiable en juillet-août du fait que la plupart des oiseaux sont observés sur des sites de nidification. Les observations d'août concernent à 90 % des juvéniles. **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : encore 2 migrants pré-nuptiaux le 01.06 à Fontenoy puis une donnée insolite d'un ex. le 12.07 à Virelles. Le passage postnuptial débute le 30.08 avec 1 ex. à Floreffe ; un juvénile le lendemain à Hollogne-sur-Geer. **Pluvier guignard** (*Eudromias morinellus*) : premier le 15.08 à Castillon. Pic de passage entre le 18 et le 23.08 avec 24 données en divers sites de l'Entre-Sambre-et-Meuse, du Hainaut occidental, du Brabant et de Hesbaye, dont un groupe record de 58 ex. dont seulement 3 juvéniles le 23 à Burdinne. Dans cette localité, il y eut de 16 à 58 ex. du 22 au 28.08. **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : 1 adulte le 30.07 à Oleye ensuite une douzaine de données de 1 à 2 ex. en août. **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : rassemblements postnuptiaux en juillet avec 6 mentions dont 400 ex. le 23 à Luttrebois, 300 le 29 aux Marionville et 250 le 29 à Éghezée. Mouvements signalés un peu partout en août, dont les concentrations classiques en Ardenne à cette époque de l'année : 800 ex. le 04 à Vaux-sur-Sûre, 600 ex. le 11 à Éghezée-Longchamps, 850 le 27 à Chevetogne.

Bécasseau minute (*Calidris minuta*) : 2 ex. le 24.08 à Hollogne-sur-Geer. **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : 1 adulte le 29.07 et 1 juvénile le 23.08 à Éghezée-Longchamps. **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : un adulte le 23.07 à Éghezée-Longchamps puis un faible passage en août d'individus la plupart isolés (Luchy, Virelles, Saint-Denis-Bovesse, Gaurain-Ramecroix, Harchies et Éghezée-Longchamps). Un seul groupe : 4 ex. le 31.08 à Hollogne-sur-Geer. **Bécasseau rousset** (*Tryngites subruficollis*)* : 1 ex. le 21.08 à Clermont-lez-Walcourt constitue la première donnée wallonne (pp. 94-96). **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : 3 données en juillet (4 ex. le 06 et 7 le 14 à Fontenoy, 2 ex. le 23 aux Marionville) et une seule en août (4 ex. le 31 à Petit-Lanaye).

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : en dehors d'un ex. le 14.07 à Horion-Hozémont, le passage est noté à partir de fin juillet (3 données) et se poursuit en août avec 22 données concernant des groupes plus étoffés surtout fin de mois (6 ex. le 23 à Angreau, 15 ex. le 27 à Warneton, 9 le 31 à Hol-



logne-sur-Geer et 12 le 31 au plateau des Tailles). **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : signalé sur 10 sites en août totalisant 23 ex. dont 9 ex. le 26 à Burdinne. **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : après un premier le 13.08 à Éghezée-Longchamps, noté sur 9 sites pour un total de 40 ex. (max. 17 le 19 à Angreau, 5 le 20 à Ramecroix et 5 le 27 à Torgny). **Chevalier stagnatile** (*Tringa stagnatilis*)* : 1 ex. le 26.07 à Éghezée-Longchamps. **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : 1 ex. le 26.07 à Neerpede et 4 isolés en août : le 15 à Éghezée-Longchamps, du 15 au 23 à Neerpede, le 29 au Gerny et le 31 à Hologne-sur-Geer. **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : encore quelques données en juin dont la dernière : 3 ex. le 26 à Warcoing. Seulement 5 ex. isolés signalés en juillet-août. **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : trois données pour la première quinzaine de juin (Fontenoy, Warcoing), quatre en juillet et un passage un peu plus fourni en août : 18 données de 1 à 3 ex. et un groupe exceptionnel de 62 ex. en migration le 18.08 à Mouscron. **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : passage postnuptial à partir de début juin (21 sites) et se poursuivant in-

tensivement jusqu'à la première décade d'août. Les maxima : 18 ex. le 23.07 aux Marionville, 25 le 11.07 et 26 le 26.08 à Warcoing. **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : 1 ex. blessé le 26.06 à Warcoing. Passage postnuptial relativement faible à partir du début juillet (maxima de 14 ex. le 12 à Éghezée-Longchamps et 5 ex. le 06 sur une mare à Theux). En août, observé seulement à Warcoing, Éghezée-Longchamps (maximum 21 ex. le 17) et Hologne-sur-Geer (maximum 5 ex. le 31). **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : après six données d'isolés en juin, le passage débute le 06.07 et s'intensifie à partir de la deuxième décade de juillet (13 ex. le 11 à Warcoing, 36 le 12 à Éghezée-Longchamps, 5 le 23 à Latour) et prend toute son ampleur en août avec, comme concentrations principales : 37 ex. le 01 et 21 le 23 à Éghezée-Longchamps, 58 ex. le 04 et 32 le 14 à Warcoing, 17 ex. le 21 et 18 le 29 à Hologne-sur-Geer. **Tournepierre à collier** (*Arenaria interpres*) : 1 ex. le 31.08 à Luchy.

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) : en juin, l'espèce est présente à Éghezée-Longchamps (1 ex. de 2^e année le 1^{er} et 2 deux de 3^e



Photo 4 - Possible Goéland de la Baltique, en compagnie de Mouettes rieuses et de Goélants leucophées. Argenteau, 7 juillet 2008 / Possible Baltic Gull, with Black-headed and Yellow-legged Gulls. Argenteau, 7 July 2008 (Photo: Charly Farinelle).

année le 15) et à Hologne-sur-Geer (1 adulte et 1 2^e année le 02). Deux mentions en juillet : un juvénile le 14 à Anseremme et 1 ex. le 17 à Liège. Classiquement, seuls des oiseaux juvéniles sont observés fin août : 1 le 19.08 à Angreau et 1 les 23 et 26.08 à Éghezée-Longchamps. **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*): seuls deux colonies sont suivies. À Hensies, 93 nids occupés le 11.06 et encore minimum 33 couples nicheurs le 04.07. À Éghezée-Longchamps, les premiers jeunes volants sont signalés dès le 15.06. Le 20.07, deux oiseaux bagués respectivement en Pologne et en Tchéquie sont observés à Petit-Lanaye. Des groupes en dispersion sont notés en fin d'été : 50 ex. le 02.08 à Verlaine, 94 le 05.08 le long du canal Hensies-Pommeroeul et 32 le 07.08 à Luchy. **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : un juvénile les 26 et 27.08 aux marais d'Harchies. **Goéland cendré** (*Larus canus*) : l'information sur les nicheurs est fragmentaire : 2 couples le 08.06 et un nid contenant 2 oeufs le 19.06 à Éghezée-Longchamps ; une petite dizaine de nids fin juin au marais d'Hensies où la présence s'accroît. Les oiseaux ont déserté les colonies en fin d'été et de petites bandes s'observent alors sur des sites comme Petit-Lanaye (20 ex. le 23.08 et 13 le 31.08) sans qu'il s'agisse forcément d'oiseaux régionaux. **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : une arrivée massive est constatée en seconde décade de juin ; le 14, les maxima sont 600 dont au moins un tiers d'adultes à Mont-Saint-Guibert et 300 à Monceau-sur-Sambre. Ailleurs, 45 le 20.06 à Saint-Sauveur et 350 le 24.06 à Roisin. Un dortoir de 500 ex. est signalé le 25.07 à Obourg mais les chiffres explosent en août, des groupes de plus d'une centaine d'oiseaux sont signalés en plaine et certains regroupements sont impressionnants : 1.000 ex. le 14.08 à Mont-Saint-Guibert, 700 ex. le 22.08 à Angreau, 1.000 ex. au dortoir le 28.08 à Gaurain-Ramecroix et pas moins de 2.200 ex. au dortoir de la Plate-Taille (BEH) le 22.08. **Goéland de la Baltique** (*Larus fuscus fuscus*)* : 2 ex. les 13 et 25.06 à la décharge de Mont-Saint-Guibert ; il s'agissait d'oiseaux de 2^e et 3^e année bagués en Finlande. Un goéland présentant les caractères de cette sous-espèce est également observé le 07.07 à Argenteau. **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : comme d'habitude, moins présent que l'espèce précédente en été ; on dénombre néanmoins 400 ex. le 14.06 à Mont-Saint-Guibert et 50 ex. le même jour à Monceau-sur-Sambre. Alors que l'espèce se compte à l'unité partout ailleurs fin août, Mont-Saint-Guibert accueille la seule réelle

concentration régionale (un millier le 14.08). **Goéland leucophée** (*Larus michahellis*) : l'espèce est bien représentée en Basse-Meuse en juillet avec 28 ex. le 08 de Wandre à Visé, 20 le 20 à Petit-Lanaye, 11 le 20 à Wandre, 40 le 20 à Argenteau. Ailleurs, 63 ex. le 15.07 aux BEH et 50 ex. au dortoir le 25.07 à Obourg. Les groupes s'étoffent légèrement en fin d'été avec 150 ex. le 28.08 à Gaurain-Ramecroix, 50 ex. le 31.08 à Wandre et 65 ex. le 31.08 à Lixhe. Mentionnons cinq lectures de bagues suisses en juillet en Meuse. **Goéland pontique** (*Larus cachinnans*) : signalé en Basse-Meuse uniquement à partir de juillet : trois immatures le 08 de Wandre à Visé, 1 adulte le 20 à Petit-Lanaye. En août, rien que des adultes : 2 le 03, 4 le 10, 1 les 23 et 31 à Petit-Lanaye, 1 le 23 à Argenteau et 1 les 23 et 31 à Lixhe. **Goéland marin** (*Larus marinus*) : un juvénile le 02.08 à Gaurain-Ramecroix.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) : nouvelle nidification réussie à Virelles : 2 pulli le 08.06 sur la plate-forme. Ailleurs, en juin, un couple parade le 09, 9 ex. le 20, 1 ex. le 24, 1 adulte le 25 et 3 adultes le 26 à Harchies ; 4 ex. le 13 à Ploegsteert. L'espèce est encore présente en juillet à Harchies : 2 ex. le 06, 1 le 17 et 3 le 18. Également 1 adulte le 20.07 à Petit-Lanaye. En août, 3 adultes le 05 à Harchies et un le 26 à Hensies. **Sterne naine** (*Sterna albifrons*) : après les mentions de mai, encore deux observations en juin qui clôturent le meilleur printemps depuis longtemps pour cette espèce : 2 ex. le 14.06 à Ploegsteert et 1 le 19.06 au marais d'Harchies. **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : en juin, 1 ex. le 07 à Éghezée-Longchamps, 4 le 11 à Oost-Maerland, 3 le 18 à Pommeroeul (canal) et 1 adulte le 21 à Stockay. Une seule mention en juillet : un adulte le 06 à Harchies. En août, 2 ex. le 1^{er} à Harchies, 1 le 12 à Éghezée-Longchamps, 2 le 27 à Ploegsteert, 2 adultes et 2 juvéniles puis 8 adultes et 1 juvénile le 28 au Grand Large de Péronnes-lez-Antoing, 1 adulte le 29 à Hologne-sur-Geer. **Guifette moustac** (*Chlidonias hybridus*)* : 1 ex. le 07.06 à Éghezée-Longchamps, un adulte les 05-06.07 à Harchies.

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : présente dans l'ensemble de la région mais très peu d'observateurs renseignent des densités. Quelques petits groupes sont notés en fin d'été dans les plaines agricoles : 9 ex. le 31.07 à Niverlée, 11 le 20.08 et 14 le 27.08 à Angreau. **Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : quelques très petits groupes sont également notés en fin d'été : 14 ex. le 23.08 à Hérissonnes



et 34 le même jour à Molenbaix, 9 le 27 à Nollevaux, un groupe de 11 le 31.08 à Jamagne... **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : premiers mouvements notés en fin de période, 120 le 21.08 à Angre et 60 le même jour à Angreau, 150 le 29.08 à Morhet (Bastogne).

Coucou gris (*Cuculus canorus*) : après le 21.07, seulement un adulte à Seloigne le 27.08.

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) : en juin, le groupe Noctua signale 62 % d'occupation pour les 68 nichoirs contrôlés le 04.06 en Hainaut oriental. Six territoires ont été recensés à Treignes. Début août, on signale encore des familles le 03 à Neu-pré et le 06.08 à Houssonloge (Harzé). **Chouette de Tengmalm** (*Aegolius funereus*) : 1 mâle adulte et 2 jeunes bagués le 14.07, 2 jeunes au nid dont un mort et un mourant le 26.07 dans les Hautes-Fagnes ; vraisemblablement encore une mauvaise année pour l'espèce. **Hibou moyen-duc** (*Asio otus*) :

en juin, les bruyantes familles se manifestent un peu partout.

Huppe fasciée (*Upupa epos*) : une nidification s'est déroulée juste à la frontière française dans le sud de l'ESM, la famille venant régulièrement se nourrir sur le territoire wallon. Ailleurs, 1 ex. le 21.08 à Ampsin.

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 1 ex. en vol le 13.06 en Famenne. **Rollier d'Europe** (*Coracias garrulus*)* : 1 ex. en migration le 21.08 à Torgny.

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : des chanteurs sont encore entendus le 16.06 à Saint-Hubert, le 21.06 à Roûmont (Libin), le 22.06 au Plateau des Tailles et le 25.06 à Malchamps (Spa). En juillet, 1 ex. le 18.07 à Mochamps. À partir de la seconde décade d'août, des données de baguage documentent surtout le discret passage : 8 bagués au total du mois à Nodebais, 11 aux Awirs et 3 bagués le 30 à Pommeroeul. Quelques individus en halte sont aussi mentionnés : 5 ex. du 21 au 31 à Harzé, 1



Photo 5 - Martinet noir. Liège, 21 juin 2008 / Common Swift. Liège, 21 June 2008 (Photo : Gabriel Rasson).

ex. le 21 à Hologne-sur-Geer, le 25 à Saint-Aubin et le 29 à Nassogne. **Pic épeichette** (*Dendrocopos minor*) : quelques familles signalées, notamment à Pailhe le 23.06, à Mariembourg le 16.06 et à Virelles le 24.06.



Photo 6 - Pics épeiches juvénile et mâle adulte. Ombret, 14 juin 2008 / Juvenile and adult male Great Spotted Woodpeckers. Ombret, 14 June 2008 (Photo: Jules Fouarge).

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : une nouvelle colonie de 30 couples est découverte le 23.06 à Marrenne ; une autre, disparue depuis 2003, s'est reconstituée à Lixhe et compte 50 nids le 29.06. Par contre, celles de Frasnes-lez-Couvin et Ploegsteert semblent abandonnées. En août, de petits groupes de migrateurs sont observés avec maximum 150 ex. à Virelles et 100 ex. à Orval le 20.08. **Hirondelle rustique** (*Hirundo rustica*) : premier jeune volant le 10.06 à Latour ; la plupart des premières nichées prennent leur envol à la fin du mois. Autour d'Houffalize, de nombreux nids sont construits dans des garages privés et des hangars, avec jusqu'à 7 nids dans un seul garage ; des nids dans des box à chevaux sont aussi renseignés. En juillet, les premiers rassemblements sont observés, par exemple 200 ex. le 19.07 à Virelles. Des migrateurs passent dès le début du mois d'août mais le passage devient surtout important en fin de mois : entre autres, 485 le 30 à Escanaffles et plus de 700 ex. en 7h de suivi à Honnay le 31. **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbicum*) : la migration est notée à partir du 10.08, avec des fluctuations journalières comme à Virelles où 250, 500 et 325 ex. sont notés respectivement les 10, 13, et 20.08, ou encore 300 ex. notés en 5h de suivi le 30.08 à Honnay.

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : 69 ex. renseignés entre le 20 et le 31.08, dont une donnée ex-

ceptionnelle de 26 ex. en 3h45 de suivi migratoire le 31.08 à Milliomont. **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : migration remarquable dès le 06.08, culminant en fin de mois avec 126 ex. en 3h45 à Milliomont le 31. **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava flava*) : en juin, beaucoup d'oiseaux nourrissent des jeunes dès la deuxième décennie. Le premier migrateur passe le 01.08, mais le passage s'intensifie en fin de mois, avec maximum 273 ex. en 4h le 27 à Ramecroix. **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergii*) : hormis 1 ex. le 19.08 à Boneffe, cette sous-espèce est classiquement trouvée dans les derniers jours du mois d'août avec 1 ex. le 29 à Harzé, 2 ex. le 30 à Donceel, 2 ex. le 31 à Yves-Gomezée et 6 ex. ce même jour à Saint-Aubin. **Bergeronnette flavéole** (*Motacilla flava flavissima*) : deux cas de nidification en 2008 d'une sous-espèce dont la reproduction semble devenir annuelle en Wallonie : 1 couple construit son nid à Temploux en juin et 1 couple mixte flavéole x flava avec 3 jeunes le 09.07 à Roisin. **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : quelques mouvements en août sont probablement de l'erraticisme local. **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : dès la fin juillet des rassemblements locaux sont observés, spécialement sur les décanteurs et autour des zones humides. Le passage ne devient réel qu'à la fin du mois d'août (maximum de 11 ex. en migration le 28 à Hussignies).

Rougegorge (*Erythacus rubecula*) : des mouvements en très petit nombre sont perceptibles dès la mi-août aux stations de baguage de Stockay, des Awirs et de Nodebais. **Rossignol philomèle** (*Luscinia megarhynchos*) : des migrateurs sont bagués dès le 25.07 à Stockay, le 09.08 aux Awirs et le 16.08 à Nodebais. **Gorgebleue à miroir** (*Luscinia*



Photo 7 - Rougegorge juvénile. Ombret, 31 juillet 2008 / Juvenile Robin. Ombret, 31 July 2008 (Photo : Jules Fouarge).



Photo 8 - Rougequeue noir juvénile. Seraing, 6 juin 2008 / Juvenile Black Redstart. Seraing, 6 June 2008 (Photo : Charly Farinelle).

svecica): l'espèce poursuit son installation dans l'Entre-Sambre-et-Meuse : 2 cantons à Virelles, 2 chanteurs à Morialmé début mai et une nichée à Castillon début juillet. Ailleurs, en dehors du bassin de l'Escaut, l'espèce est présente à Hologne-sur-Geer, à Stockay et Bassilly où 1 jeune volant est observé le 01.07. **Tarier des prés** (*Saxicola rubetra*): en dehors du dernier bastion dans les cantons de l'Est, quelques couples nichent encore dans le sud de l'Ardenne (Louftémont) et en Lorraine (Turpange et le bassin de la Semois); 1 ex. le 09.06 à Merlemont. Premier migrateur en halte le 29.07 à Harzé, suivi par plus de 250 ex., en majorité durant la seconde quinzaine du mois d'août, en petits groupes comptant maximum 18 ex. **Tarier pâtre** (*Saxicola torquata*): des jeunes volants sont aperçus principalement entre la mi-juin et la mi-août. 60 cantons sur les communes de Libramont, Bertrix, Libin, Paliseul et Vaux-sur-Sûre ; 5 cantons le 01.07 à Fagnolle... **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : 1 mâle le 12.06 à Behême et 1 femelle le 27.06 à Xhendremael. Premier migrateur en halte le 11.08 à Blicquy ; plus de 266 ex. sont ensuite signalés

jusqu'à la fin du mois d'août, au plus 31 ex. à Bonneffe le 31.08.

Grive litorne (*Turdus pilaris*): l'espèce est au bord de l'extinction à l'ouest de la Meuse : les mentions se limitent à 1 ex. alarmant le 09.06 à Douvrain et 4 cantons probables dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse.



Photo 9 - Grive musicienne juvénile. Ombret, 3 août 2008 / Song Thrush. Ombret, 3 August 2008 (Photo : Jules Fouarge).



Photo 10 - *Locustelle luscinioides*. Marche-en-Famenne, 30 juin 2008 / Savi's Warbler. Marche-en-Famenne, 30 June 2008 (Photo : Marc Ameels).

Bouscarle de Cetti (*Cettia Cetti*) : bien présente en tous ses sites du Hainaut occidental, en particulier un minimum de 118 cantons à Harchies. **Cisticole des joncs** (*Cisticola juncidis*)* : trois mentions d'un oiseau mais aucune preuve de nidification : le 22.07 à Ochamps, le 23.08 à Éghezée-Longchamps et le 27.08 à Maubray. **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : signalée jusque fin juillet sur des sites de nidification. Quelques densités : 14 cantons à Harchies, 8 chanteurs sur 40 ha à Jamoigne, 12 sur 30 ha à Breuvanne, 6 sur 10 ha à Tintigny. La migration postnuptiale commence le 23.07 à Stockay et se poursuit sur un mode mineur en août. **Locustelle fluviatile** (*Locustella fluviatilis*)* : 1 chanteur du 28 juin au 2 juillet à Marche-en-Famenne. **Locustelle luscinioides** (*Locustella luscinioides*) : toujours un chanteur en juin à Ploegsteert et Harchies ; un juvénile bagué le 09.07 à Roly, avant les dates habituelles du passage postnuptial, permet de considérer la reproduction comme probable dans la phragmitaie vieillissante locale ; quelques oiseaux bagués à partir du 20 juillet et en août, dont le premier depuis

1987 aux Awirs. **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : l'espèce se porte bien à Harchies où 82 cantons sont repérés ; ailleurs, présence de nicheurs possibles aux Marionville et en Semois gaumaise. La migration débute le 20.07 aux Awirs (54 ex. bagués jusque fin août), à Nodebais (94 ex.) et à Stockay (146 ex., record local). **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*) : la migration pré-nuptiale prend fin durant la première décade de juin, avec des oiseaux en halte en milieux secs. Le succès de la reproduction est moyen en Hainaut occidental, à Roly ou à Virelles, mais bon en province de Liège. Le passage postnuptial débute le 14.07 aux Awirs où le record de captures est déjà battu fin août (1.861 ex. bagués à cette date). Les captures sont également nombreuses à Stockay (2.053 ex. bagués). Dans ces deux stations, le pic est assez tardif, ne se produisant que la dernière semaine d'août. À Nodebais, par contre, les nombres et le pic sont habituels (1.113 ex. en août, pic le 15.08). **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : les chants résonnent partout en juin ; une



seule donnée d'une concentration importante : 40 chanteurs aux anciens décanteurs de Genappe. Avec 406 ex. bagués sans pic particulier du 13.07 au 31.08, l'année est bonne aux Awirs; de même à Stockay où 350 ex. ont été bagués du 20.07 au 31.08. À Nodebais, un total de 236 ex. bagués du 14.07 au 31.08 mais l'effort n'y est continu qu'en fin de période. **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*) : début juin, un chanteur pendant une semaine à Harchies. Également, 1 ex. le 08.06 à Ciergnon et le 30.06 à Charleroi. En passage postnuptial, un adulte bagué le 27.07 à Stockay. **Hypolaïs ictérine** (*Hippolais icterina*) : la migration postnuptiale débute le 23.07 aux Awirs. Le nombre de captures est faible : 6 ex. aux Awirs, 4 à Stockay, 6 à Nodebais.

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : la migration postnuptiale débute le 22.08 aux Awirs, soit une semaine plus tard qu'en 2007. **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : les captures ne deviennent quotidiennes qu'à partir du 23.07 aux Awirs ; elles s'étalent de cette date à la fin août sans pic particulier. **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : quelques chanteurs sont encore signalés en juin. La migration postnuptiale débute le 31.07 aux Awirs où 30 ex. au total ont été bagués à la fin août, soit un nombre assez élevé et le 02.08 à Stockay (18 ex. bagués). **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : si quelques individus sont capturés dès l'ouverture de la station le 13.07 aux Awirs, l'espèce n'y est quotidienne qu'à partir du 22.07. Le pic du passage s'y décèle fin août avec respectivement 16 et 19 ex. bagués les 28 et 29. **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : les captures sont peu nombreuses aux Awirs (83 ex. du 13.07 au 31.08), à

l'image des dernières années. **Pouillot de Bonelli** (*Phylloscopus bonelli*)* : un chanteur le 28.06 à Marche-en-Famenne.

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : l'espèce est assez bien signalée en juin et juillet mais sans abondance particulière ou densité significative. Les observations, souvent d'individus isolés en halte migratoire mais parfois de groupes se multiplient au cours de la seconde quinzaine d'août. À souligner, 8 ex. le 30.08 au Gerny et autant le lendemain à Sterpigny (Gouvy). **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : en dehors de 8 nichoirs occupés sur 10 le 10.06 à Nassogne, pas de renseignements sur la nidification. Les mentions de migrateurs postnuptiaux sont également peu nombreuses ; à souligner toutefois, 10 ex. le 22.08 à Flémalle.

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : le record au camp militaire de Marche-en-Famenne est à nouveau battu : 180 cantons. La nidification a réussi à Ghlin. À Somme-Leuze, un couple niche dans la même haie pour la 11^e année consécutive. Tardivement, un couple nourrit encore deux jeunes le 30.08 au Gerny. **Pie-grièche à poitrine rose** (*Lanius minor*)* : un ex. le 20.07 à la limite d'Oleye et Opheers. C'est la 8^e mention en Belgique depuis 1949, la précédente datant de 1988. **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : cinq cantons dans le camp militaire de Marche-en-Famenne. Des jeunes sortis du nid sont signalés à la mi-juin à Chevroumont, Marche-en-Famenne, Libin et à la mi-juillet à Louftémont où deux cantons sont séparés à peine d'un km. Dès le 01.08, les oiseaux réoccupent les postes de chasse habituels en maintes localités.



Photo 11 - Pie-grièche à poitrine rose. Oleye, 20 juillet 2008 / Lesser Grey Shrike. Oleye, 20 July 2008 (Photo : Charly Farinelle).



Photo 12 - Pie-grièche écorcheur. Tintigny, août 2008 / Red-backed Shrike. Tintigny, August 2008 (Photo : Charly Farinelle).

Choucas des tours (*Corvus monedula*) : un rassemblement d'été important : 500 ex. le 28.07 à Mont-Saint-Guibert. Ils étaient accompagnés de 300 **Corneilles noires** (*Corvus corone*).

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : un mâle bagué dans sa deuxième année le 09.09.1997 à Spixhe y est contrôlé le 07.07, soit dans sa 12^e année. Des rassemblements en petites bandes sont signalés à partir de la mi-août, dont un total de plus de 300 ex. le 17.08 à Gouvy. **Chardonneret élégant** (*Carduelis carduelis*) : un premier groupe postnuptial de 11 ex. est vu le 08.06 à Aublain. D'autres groupes de dix à quinze oiseaux ne sont ensuite mentionnés qu'à partir du 10.08. Des nichées sont encore observées fin août à Pailhe et Gérouville. **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : une seule mention : un petit groupe de juvéniles le 11.06 à Ombret. **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : un premier rassemblement d'une trentaine d'oiseaux le 02.06 au Gerny. Plus tard, quelques groupes dépassent la centaine d'individus, comme le 27.07 à Nandrin, le 13.08 à Othée, le 20.08 à Verlaine et le 25.08 à Hemptinne. **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : un chanteur le 29.07 au centre de Malmedy. L'espèce est trop peu signalée. **Bec-croisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : présence assez limitée cet été avec seulement une trentaine de mentions et de rares groupes : 30 ex. le 04.06 à Ivoz-Ramet, 11 ex. le 15.06 à Saint-Hubert, 15 ex. vers le sud-ouest le 13.08 à Mouscron.

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) : 1 ex. en migration le 26.08 à Torgny. **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : la présence dans les plaines du Hainaut et de Hesbaye est peu chiffrée : 22 chanteurs à Oleye en juillet. Un rassemblement de 40 ex. le 30.08 à Boneffe.

REMERCIEMENTS – Nous remercions les 328 observateurs qui ont contribué à documenter cette synthèse saisonnière. Ce sont Asinari C., August B., Baccaert A., Baeyens J., Barbier F., Baron A., Bastin J., Bataille B., Baudet L., Baudoux T., Bayot A., Beckers A., Bedoret F., Berthe P., Binon F., Biquet L., Bisteau V., Blyth M., Bodart P.Y., Boeckx A., Boland P., Bonmarchand S., Boon L., Bouckenoghe B., Boudart P., Bouhon C., Bouillon A., Brihaye J.-F., Bronne L., Brunin C., Buchet V., Bulteau V., Bultot J., Burnel A., Cabooter A., Calberg C., Cao P., Carbonnelle S., Carels C., Carpentier A., Caudron O., Cauwe F., Christophe B., Claerebout S., Clesse B., Coatanea Y., Colman L., Corhay F., Cornet P., Cors R., Crohin R., Croisier P., Crusiaux A., Cucurnia P., Cuvelier E., Dagneaux A., Dambiermont J.L., Damman E., De Boeck B., De Broyer A., de Callatay H., de Gottal P., De Greille



Photo 13 - Grosbec casse-noyaux. Ombret, 10 juillet 2008 / Hawfinch. Ombret, 10 July 2008 (Photo : Jules Fouarge)

V., De Guchteneere G., de Harenne C., de Liedekerke R., De Meirsmann J., De Prince T., De Puydt J.-F., de Ville C., de Wavrin H., Debacker D., Debiève J., Declercq M., Decruynaere E., Dedonckers A., Deflorenne P., Defourny H., Degernier H., Degrave D., Dehombreux E., Delacre J., Delaet J., Delbove J., Deloyer P., Delsalle M., Demaret A., Demeure I., Demeure V., Demonty L., Denison J.L., Derdeyn D., Derouaux A., Derume E., Desaubies P., Descamps C., Desmet W., Detaille R., Devallée P., Devos D., Dewinter N., Dewitte T., Dielen V., Dineur H., Doemer A., Dordolo C., Doutrewé J.L., Doyen F., Dubois P., Duchenne P., Dufour D., Dufour V., Dufourny H., Dujardin R., Dumoulin R., Dutoit N., Ellis F., Ertvelt J.P., Etienne I., Evrard J., Fagot J., Fanon Y., Farinelle C., Fasol M., Fautsch M., Faveyts W., Fays C., Féry N., Finck S., Fouarge J., Fourez J.F., Faigneux A., Franchimont J., Furnelle V., Gailly Da., Gailly Do., Gailly R., Gallez J., Gauquie B., Geboes A.L., George Y., Germain P., Ghilain-Dervaux C., Ghymers C., Ghysel P., Ghysenberghs B., Gillon R., Giot Y., Godding E., Goetghebeur N., Gooris R., Grégoire D., Gridlet T., Gruslin F., Gruwier C., Hanus B., Hendrick O., Hermand P., Heymans B., Heymans E., Horney G., Houbart J., Hubaut D., Hulet M., Hupperetz J., Huyghebaert C., Huyghebaert C., Ide J., Imbreckx E., Ingenbleek C., Ittelet M., Jacob P., Jancloes P., Jardon B., Jenard P., Jobé P., Jortay A., Joyeux J., Kaiser A., Kinet T., Krickx S., Kunsch A., Labeye C., Lafalize H., Lafontaine R.M., Lamarche L., Lambert A., Lambert J., Lambert M., Lambillon J., Laudelout A., Laurent G., Lavis G., Lebrun R., Leclef Ph., Leclercq J.A., Lecohier D., Leeman F., Leirens V., Lejeune B., Lejeune J.P., Léonard J.M., Lereins V., Loly P., Lombart A., Losseau J.-D., Lucas R., Maertens A., Maes J., Maniquet C., Maniquet T., Marchal B., Mardulyn H., Maréchal J., Mariage T., Matagne J., Matagne M., Mathieu G., Mazy B., Meeùs T., Melon P., Mélotte S., Mengal J., Migeotte F., Minet G., Moncousin M., Monnom S., Moreels L., Morren K., Mossoux P., Mottet P., Naets A., Nef B., Nicolas M., Noël B., Noël P., Ory T., Paemelaere M., Paquay M., Paquay N., Paquet A. Paquet C., Paquet J.Y.,



Pasau B., Perot P., Peten S., Petit M., Pety C., Philippe C., Pierrard N., Pierre P., Pierret S., Piette Ag., Piette Al., Pigneur L.M., Pirson C., Poncelet J.M., Poncin O., Ponsart M., Pourignaux F., Princen Y., Rapaille J.P., Rasson G., Reiter A., Reniers B., Renson G., Renson S., Richir F., Rifflet S., Roberfroid O., Romain S., Roth R., Rousseau C., Rousseau-Piot J.S., Sansdrap A., Scaillet J., Schaecken P., Schleich E., Schwes J., Segaert B., Selosse N., S pulchre J.B., Sevrin D., Simar J., Smets A., Smit S., Sonveaux P., Sorbi S., Squevin M., Stassin P., Stoffel A., Tallier P., Tancrez T., Taymans J., Testaert D., Th wis A., Thirionet B., Thunus R., Tombeur S., Vaillant M., Van Acker K., Van Damme P., Van den Abbeele F., Van Der Krieken B., Van Laethem P., Vanderhulst E., Vangeluwe D., Vanhove F., Vanmeerbeeck P., Veireman R., Vercruysse A., Verdonck F., Verroken D., Verroken L., Vert  P., Veys P., Vicenzi H., Vieuxtemps D., Vilain B., Vlaemyneck M., Von che M.A., Vrancken W., Weyland F., Wielemans L., Wiertz A., Windels M., Xhardez C. et Yernaux X. ainsi que les observateurs du Guignard, du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse (chronique dans « La Gri che ») et de sites comme Latour, le Grand Vivier de Champs, Virelles, Harchies, les BEH ...ou d'autres dont le

nom aurait  t  omis. Merci   tous.

La compilation des donn es a  t  effectu e par Alain Baccaert, Andr  Burnel, Paola Cucurnia, Pierre Duchesne, Claire Huyghebaert et Philippe Vanmeerbeeck, ainsi que via une partie des encodages de donn es effectu s dans les sections r gionales ainsi que via observations.be.

SUMMARY – Nesting of Herons was noticeable in the Harchies Marches: the two first pairs of Cattle Egret, five pairs of Little Egret and two pairs of Night-heron.

On this site record numbers are reached for Cetti's Warbler (118 territories) and Sedge Warbler (82 territories).

Other outstanding nestings are noticed for Little Bittern, Garganey, Oystercatcher, Yellow Wagtail and the three Harriers. Among the latter an increasing number of Northern Harriers and the more and more frequent nesting of Marsh Harriers. On the other hand, the scarceness of the Corn Crake, the continuous decrease of the Fieldfare and the Whinchat, the low numbers of Turtle Doves and of most seed-eating birds must be pointed out.

Concerning migration the most striking events are successively the stay of a Horned Grebe from 31 May to 30 June, a new rush of Eurasian Griffons in June (73 birds spread over 6 groups from 7th to 23th), numerous Lesser Black-backed Gulls from mid-June and among them at least two Baltic Gulls, the short stay in Marche-en-Famenne of a River Warbler (28 June - 2 July) and of a Bonelli's Warbler (28 June), a Lesser Grey Shrike on 20 July (first mention since 1988), a migratory Roller on 21 Augustus, and numerous Dotterels passing in Augustus (record number of 58 the 22th).

First regional mention of a Buff-breasted Sandpiper.