

Première observation du Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*) en Wallonie*

Bernard Hanus



Photo 1 - Bécasseau rousset adulte. Clermont, 21 août 2008 / Adult Buff-breasted Sandpiper. Clermont, 21 August 2008 (Photo : Bernard Hanus).

Observation

Le jeudi 21 août 2008, je suis en poste fixe sur le Mont de Viscourt, à Clermont (Walcourt), dans la province de Namur, à 200 m de la province du Hainaut (50.16 N, 04.19 E). Mon but est le suivi des migrateurs automnaux dans cette grande plaine cultivée du nord de l'Entre-Sambre-et-Meuse, principalement du Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*), connu pour y faire étape quasi chaque année.

Comme depuis le début du mois, le temps est couvert avec un fort vent de sud-sud-ouest. Le passage de passereaux est nul, par contre quelques rapaces (3 espèces de busards *Circus pygargus*, *C. cyaneus* et *C. aeruginosus*, Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*, Faucons pèlerins *Falco peregrinus* et hobeaux *Falco subbuteo*) daignent se montrer.

À 9h45 deux Pluviers guignards passent en migration active. Vers 11h je quitte mon poste fixe pour chercher les Guignards au sol. Mon premier arrêt

* mention acceptée par la Commission d'Homologation

sera payant : 5 ex. adultes dans un champ hersé non loin de là, à Mertennes.

Vers 14h je reprends ma quête sur le plateau de Viscourt ; un champ de colza grossièrement labouré y étant particulièrement favorable aux Guignards. J'entreprends une fouille systématique des 15 hectares aux jumelles et aperçois directement à 200 mètres un petit oiseau à l'aspect écaillé assoupi au pied d'une motte de terre. De si loin, je pense un instant à une jeune Alouette des champs, puis au Bécasseau minute : il est temps d'utiliser la longue-vue.

Je m'approche résolument ; l'oiseau est toujours assoupi. Une observation minutieuse à 25 mètres lève le voile : il s'agit d'un Bécasseau rousset, une première pour moi et sur mon site fétiche en plus !

À noter la présence simultanée d'un groupe remarquable de 15 Pluviers guignards dans le champ voisin, du même faciès.

Le Rousset, toujours solitaire, sera observé jusqu'à la nuit noire. Il est d'abord somnolent avant de se nourrir activement tout en fin de journée. Il ne sera pas retrouvé les jours suivants malgré une prospection intense de l'endroit jusqu'au début septembre.

Description

Il s'agit d'un limicole assez petit, de la taille du Bécasseau variable (*Calidris alpina*) mais plus haut sur ses pattes jaunâtres. De loin l'aspect écaillé (ou réticulé comme l'écrit JONSSON, 2008) est frappant.

La teinte et l'aspect général sont proches du Combattant varié (*Philomachus pugnax*) femelle juvénile, mais le bec noir est notablement plus court, plus fin et tout à fait droit chez le Rousset. Il est amusant de noter que le 28 septembre de la même année j'ai observé un mâle et une femelle juvéniles de Combattant varié sur ce même champ.

Une observation plus minutieuse révèle les joues légèrement roussâtres uniformes avec l'œil bien dessiné ; le Combattant lui a des petits traits sur les joues qui font moins ressortir l'œil. La calotte est finement et densément striée alors que la gorge, la poitrine et le ventre sont immaculés, d'une belle couleur chamois rosé. Un critère important est le bord du haut de la poitrine (à hauteur du coude de l'aile pliée) qui est parcouru de petites taches noires chez le Rousset.

Le liseré chamois des plumes à centre noir du manteau et des couvertures sont typiques de l'adulte. On remarque en outre sur les photos de cet oiseau, le mélange de plumes neuves et d'autres au liseré très usé, qui seront bientôt muées. Un oiseau en plumage juvénile aurait un aspect plus écaillé dû aux liserés blanchâtres et le plumage serait intégralement frais.

Discussion

Le Bécasseau rousset est un limicole principalement néarctique : il niche en Alaska et possède une petite population à l'extrême nord-est de la Sibérie. Il effectue une migration longue distance de la toundra arctique vers les plateaux herbeux d'Argentine où il hiverne. S'il était très commun dans les années 1800, une chasse excessive a drastiquement réduit sa population, estimée actuellement à un maximum de 25.000 individus. En migration, cette espèce est connue pour être observée régulièrement en milieux herbeux ras comme les terrains de golf et les aéroports. On la trouve aussi sur les berges sablonneuses des grands fleuves et en bord de mer (HAYMAN *et al.*, 1995 ; BEAMAN & MADGE, 1998).

C'est le limicole nord-américain le plus souvent observé en Europe après le Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*). En France, par exemple 170 données ont été homologuées (jusqu'en 2007) pour un total de 208 individus avec un maximum de 15 ex. en 2000 (FRÉMONT *et al.*, 2008).

La présente observation s'inscrit dans un afflux marqué de limicoles américains en Europe de l'Ouest et notamment en France : Bécasseau de Baird (*Calidris bairdii*), Bécasseau rousset et surtout de nombreuses observations de Bécasseaux tachetés (liste de discussion Coches-fr, http://champagne-ardenne.lpo.fr/cocheurs/coches_fr.htm).

En Belgique, les Commissions d'Homologation ont accepté 7 données jusqu'en 2006. Toutes concernent la Flandre, surtout la côte :

- 27 août-11 septembre 1984, Zeebrugge (W), Ramskapelle : 1 ex. (VAN DER ELST & LAFONTAINE, 1985) ;
- 4 juillet 1986, Kallo (O) (VAN DEN STEEN & BAHC, 1989) ;
- 12 juin 1988, Zeebrugge (W), avant-port ouest : 1 ad. (VAN SANDEN *et al.*, 1991) ;

- 9-11 septembre 1993, Zeebrugge (W), avant-port ouest : 1 juv. (DUFOURNY, 1996) ;
- 15-17 août 1996, Zeebrugge (W), Avant-port : 1 ad. (SELOSSE & LA CH, 2002) ;
- 23-26 mai 1999, Oudenburg (W), Zilte Weiden : 1 ex. (RATY & LA CH, 2005) ;
- 27 avril-1^{er} mai 2006, Stuivekenskerke (W), Vicinia kleiputten : 1 ad. (Vandegheuchte & BAHC, 2008).

Bibliographie

DUFOURNY, H. (1996) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 1993. *Aves* 33 (3) : 169 - 188

VAN DER ELST, D. & LAFONTAINE, R.M. (1985) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 1984. *Aves*, 22 (3) : 179 - 197.

HAYMAN, P., MARCHANT, J. & PRATER, T. (1995) : *Shorebirds*. Helm. 410 pp.

JONSSON, L. (2008) : *Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient*. Nathan. 558 pp.

BEAMAN, M. & MADGE, S. (1998) : *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique occidental*. Nathan. 872 pp.

FRÉMONT, J.-Y., REEBER, S. & LE COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL (2008) : Les oiseaux rares en France en 2006 et 2007. 25^e apport du Comité d'homologation national. *Ornithos*, 15-5.

RATY, L. & LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2005) : Rapport

de la Commission d'Homologation. Années 1998 à 2003, seconde partie : Espèces soumises à homologation nationale. *Aves*, 41 : 165 - 208.

SELOSSE, N. & LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2002) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 1996 et 1997. *Aves*, 38 (3) : 127 - 157.

VAN DEN STEEN, J. & BAHC (1989) : Zeldzame vogels in Vlaanderen in 1986. *Oriolus*, 55: 49-59.

VANDEGEHUCHTE, M. & BAHC (2008) : Zeldzame vogels in België in 2006. Vierendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.Oriolus*, 74 : 45-51.

VAN SANDEN, P., VAN DEN STEEN, J. & BAHC (1991) : Zeldzame vogels in Vlaanderen in 1988. *Oriolus*, 57 : 90-97.

BERNARD HANUS
Rue A Dettes, 20
6150 Anderlues
Tél : 071/52 43 44
bernard.h@skynet.be

SUMMARY - First mention of Buff-breasted Sandpiper for Wallonia

An adult Buff-breasted Sandpiper was found on 21st August 2008 in a roughly ploughed colza field in an area where Dotterels are frequently observed during postnuptial migration.