

OBSERVATIONS DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2008

Centrale Ornithologique Aves Groupe de travail « Chroniques » ⁽¹⁾



C.-H. Born

L'automne 2008

Septembre fut dominé par des courants maritimes, hormis la période allant du 15 au 27 lorsqu'un anti-cyclone centré sur la Scandinavie a envoyé des vents plus froids d'origine polaire. Après un épisode assez frais et pluvieux, temps doux du 4 au 8 octobre puis anticyclonique continental les 9-10 ; les courants d'ouest associés à des anticyclones continentaux ont marqué les jours suivants, notamment les 17-20. Des courants maritimes ont influencé le reste de la saison, devenant froids du 18 au 25 novembre (averses de neige à partir du 21, plus fortes le 24).

Les migrations estivales se terminent plus ou moins vite en septembre : pour le 15 chez le Busard cendré, le Pluvier guignard, le Petit Gravelot, la Tourterelle des bois, le Torcol, l'Hirondelle de rivage, la Bergeronnette printanière nordique ou le rare Bruant ortolan. Parfois avec de forts passages en première semaine (Cigogne blanche, Bondrée). Sinon avec quelques prolongations jusqu'à fin septembre (Grèbe à cou noir, Sarcelle d'été, Pipit rousseline, Phragmite des joncs, Gobemouche noir), voire octobre (Cigogne noire, Hirondelles de cheminée et fenêtre, Pipit des arbres, Fauvette grisette, Pouillot fitis, de très tardives Rousserolles verderolles le 7 octobre et Locustelle tachetée le lendemain).

Des Pipits farlouses et des Grives musiciennes commencent à migrer début septembre. Le changement de temps au mitan du mois voit un pic de migration du Balbuzard ainsi que les premiers passages de Cormorans, de Grues, d'Alouettes des champs, de Bergeronnettes grises. Les premiers Pinsons du Nord arrivent quelques jours plus tard. Le 26 septembre, début du flux d'Alouettes lulu, Grives mauvis, Rougorgorges et Linottes mélodieuses, augmentation des Alouettes des champs et Grives draines migratrices. Début octobre apparaissent les Pipits spioncelles et Merles à plastron migrants.

Courant octobre, les pics de migration se succèdent. Par exemple, ceux du Pigeon colombin, de la Grive mauvis et de l'Alouette lulu les 18-20, ceux des Grues, de l'Épervier, du Pigeon ramier, de l'Alouette des champs, des Grives litorne et draine une décade plus tard. Quelques inévitables migrants tardifs retiennent l'attention : ainsi, les 26-29 octobre, un Héron pourpré en migration, des Tariers des prés et 23 Serins cinis de passage sur une journée. Ces mêmes jours voient le retour, normal, des premiers Cygnes de Bewick, Garrots et Harles bièvres ; d'autres oiseaux d'eau hivernants augmentent, un petit groupe de jeunes Milouinans s'installe et les Goélands pontiques se font tout doucement plus nombreux. Après la mi-novembre, un passage de Grues, quelques Grèbes à cou noir, une vague de Sizerins flammés boréaux, l'apparition de bandes de Tarins et un unique Jaseur marquent la fin de l'automne.

Dans l'ensemble, la saison a permis d'observer une migration importante de Cormorans, Bondrées, Milans royaux, Pigeons ramiers, Alouettes lulu, Bergeronnettes printanières, Rousserolles effarvates, Fauvettes à tête noire, un afflux de Mésanges noires et un autre, plus mineur, de Geais. En revanche, assez peu de limicoles et de migrants transeuropéens (Faucon crécerelle, Bergeronnette grise, Accenteur, Grive musicienne, Mésanges bleue et charbonnière, Corbeau freux, Choucas...). Les granivores furent à nouveau peu abondants hormis les pinsons, la vague de Sizerins flammés boréaux

⁽¹⁾Rédacteurs de la présente chronique : T. Baudoux, A. Burnel, A. De Broyer, P. Duchesne, C. Farinelle, P. Loly, T. Mariage, T. Ory, et J.-P. Jacob.



et un passage de Grosbecs sensible dans le nord de la région. On retient aussi que la fréquence de l'Aigrette garzette s'accroît, le Héron garde-boeufs séjourne pour la première fois en automne, les Goélands bruns restent anormalement nombreux, les observations de Grand Corbeaux se multiplient dans l'Entre-Sambre-et-Meuse (dont un groupe de 11) et une quinzaine de Panures séjournent à partir du 31 octobre à Hollogne-sur-Geer.

Parmi les raretés, un jeune Fou de Bassan, deux jeunes Phalaropes à bec étroit le 22 septembre, une étonnante Mouette tridactyle en migration en Famenne le 18 octobre, au moins deux Pipits à gorge rousse en migration le 4 octobre ainsi que les uniques Bruants lapon et des neiges de l'automne. Les mentions de Pouillot à grand sourcils (27 septembre-20 octobre) se multiplient ; cet oiseau est sans nul doute un migrateur automnal régulier dans nos régions. Des oiseaux d'identification délicate sont aussi renseignés en septembre : Busard pâle (un visiteur devenant annuel ?), Buse de Russie et Pipits maritimes.

Les données utilisées pour cette chronique sont celles communiquées par Internet (site Aves et Aves-Lux), ainsi que les observations communiquées via les sections, par exemple celles collationnées par le GT Le Guignard (Hainaut occidental), celui de l'Entre-Sambre-et-Meuse (« La Grièche ») et la cellule ornitho d'Harchies. Un nombre croissant de données proviennent aussi de « observations.be » (waarneming.be).

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure. Le complexe marécageux de Harchies-Hensies-Pommeroeul est souvent simplement libellé « Harchies ».

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : toujours présent sur les sites de nidification en septembre avec notamment 31 ex. le 06.09 à Genappe, 47 ex. le 17.09 à Éghezée-Longchamps et 29 ex. le 18.09 à Hollogne-sur-Geer. Nombreuses mentions les mois suivants mais sans abondance remarquable ; les maxima rapportés sont au moins 50 ex. le 02.11 à Oost-Maarland, 48 ex. le 15.11 aux BEH et 75 ex. le 16.11 sur la Semois entre Tintigny et Chassepierre. **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : parents et jeunes totalisent 79 ex. le 23.09 à Harchies, maximum pour l'automne sur ce site. Sur les principaux sites d'hivernage, les nombres croissent au fil des mois et atteignent 108 ex. le 16.11 à Oost-Maarland et 185 ex. le 28.11 aux BEH. **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : 1 ex. à partir du 15.11 à Oost-Maarland. **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : encore quelques données en septembre : 15 ex. le 02 à Hollogne-sur-Geer, 5 ex. le 02 et le 11 à Éghezée-Longchamps, 7 ex. le 17 et le 22 à Harchies. Ce grèbe réapparaît brièvement à la mi-novembre : 3 ex. du 13 au 17.11 aux BEH et le 19.11 à Harchies.

Fou de Bassan (*Morus bassanus*)* : un juvénile épuisé est recueilli le 15.10 dans un champ à Spy et conduit au centre de revalidation de La Hulpe avant d'être relâché à la côte. Le Fou de Bassan reste un oiseau

dérivé accidentellement par des tempêtes au-dessus de la Wallonie ; presque toutes les mentions, réparties de fin août à début mars, sont concentrées au nord du sillon Sambre-et-Meuse.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : il n'aura pas fallu attendre début octobre comme l'an passé pour observer une migration postnuptiale soutenue. Le passage est déjà important le 14.09 : 161 ex. à Roisin, 650 ex. à Warcoing, 939 ex. à Havinnes, 969 ex. à Moucron, 680 ex. à Lamain. Il le restera jusqu'en novembre avec des totaux journaliers atteignant 204 ex. le 02 à Flémalle, 422 ex. le 12 à Harchies et 190 ex. le 19 à Tourpes.

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) : 1 ex. les 08.10 et 02.11 à Harchies, 3 ex. les 18.10, 18.11, et 19.11 à Virelles, 1 ex. le 23.11 à Amay, 1 ex. le 28.11 à Ploegsteert et 1 ex. le 30.11 à Genval. **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : les observations rapportées concernent le plus souvent des isolés ou de petits groupes un peu partout. Parmi les rassemblements plus importants, en septembre, 60 ex. à Virelles et 31 ex. le 13 à Mouscron. Le mois suivant, 20 ex. le 04.10 à Saint-Aubin. En novembre, des maxima de 13 ex. le 02.11 à Thommen, 15 ex. le 29.11 à Oost-Maarland, et 13 ex. le même jour à Freux. **Héron pourpré** (*Ardea*

Les espèces dont l'observation est soumise à homologation sont marquées d'un *.



purpurea) : un juvénile les 16 et 20.09 à Harchies ainsi qu'un ex. en migration le 29.10 à 9h à Flémalle.

Grande Aigrette (*Casmerodius albus*) : au minimum 57 ex. le 26.09 au dortoir de Virelles, soit 21 ex. de plus par rapport à 2007. Le maximum de 33 ex. est atteint dès le 29.09 pour celui d'Harchies (43 ex. en 2007). Notons aussi 15 ex. à partir du 07.10 en Semois gaumaise et 10 ex. le 02.11 à Thommen. Des concentrations de 43 et 21 ex. sont présentes le 11.11 respectivement à Roly et le 21.11 à Freux.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : fréquentation relativement stable du dortoir d'Hensies où 33 ex. sont présents le 15.09 (28 ex. en 2007). À Virelles, où l'espèce était déjà présente en été, on relève un maximum de 4 ex. en septembre et la dernière observation le 03.10. En dehors du Hainaut, deux données au Luxembourg (8 ex. en vol le 14.09 à Maissin et 1 ex. le 02.11 à Lahérie) et un oiseau le 01.11 à Wasseiges. **Bihoreau gris** (*Nycticorax nycticorax*)* : 1 ex. le 20.10 à Jodoigne. **Héron garde-bœufs** (*Bubulcus ibis*)* : outre les marais d'Harchies où 2 ex. sont régulièrement mentionnés tout l'automne au dortoir, l'espèce est observée sur trois sites : 1 ex. du 22.08 au 08.11 à Gaurain-Ramecroix, 1 ex. du 04.09 au 16.10 à Havinnes et 2 ex. du 13 au 23 novembre aux BEH. Des séjours automnaux sont une nouveauté.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : le passage se poursuit en septembre et se termine le 21.10 avec l'observation d'un oiseau à Couvin. Parmi la vingtaine de mentions rapportées : 5 ex. le 01.09 à Benonchamps, 17 ex. le même jour à Torgny, 4 ex. le 07.09 à Laval, 6 ex. le 08.09 à Sberchamps. **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : la migration se poursuit jusqu'à la mi-septembre avec un pic le 11. Mentionnons quelques groupes imposants : 44 ex. le 1^{er} à Merbes-le-Château, 20 ex. le 04 à Faulx-les-Tombes, deux groupes de 35 et 23 ex. le 11 à Haut-Ittre, 72 ex. le 11 à Schaerbeek, 50 ex. le 11 à Bury (Péruwelz), 21 ex. le 12 à Mouscron, 52 ex. le 13 entre Élouges et Audregnies, une cinquantaine le 14 à Mouscron et Roisin. Des bagues allemandes ont pu être lues sur des oiseaux observés à Mouscron et près d'Élouges. Après le 15.09, seulement cinq mentions de 1-2 cigognes (2 ex. le 26.09 à Hollogne-sur-Geer, peut-être les mêmes vues les 28 et 29 à Braives, 1 ex. le 04.10 à Torgny, 2 ex. le 14.10 à Andenne, 2 ex. du 16 au 22.11 à Spy) et un groupe de 15 ex. en vol le 07.11 à Blanmont. Ces dernières peuvent être issues des populations introduites. **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) : un nouveau séjour estival en Wallonie : 1 adulte du 12.08 au 04.09 à Harchies.

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*) : retenons quelques concentrations de cet oiseau assez fréquent : 31 ex. le 19.10 à Freux, plus de 50 le 28.10 à Oost-Maerland, plus de 60 le 11.11 à Thieu, 24 le 16.11 sur la Semois entre Tintigny et Chassepierre. **Cygne de Bewick** (*Cygnus colombanius bewickii*) : un jour plus tôt qu'en 2007, le premier arrive le 26.10 à Harchies où, en novembre, ils sont 2 le 02, 3 le 12, 4 le 16 puis 22 dont 13 adultes et 9 juvéniles le 19 ; le total se stabilise à 10 ex. en fin de mois. **Oie cendrée** (*Anser anser*) : le groupe régional de 41 ex. poursuit son séjour en septembre aux décancteurs d'Éghezée-Longchamps. Au cours de ce mois, retenons aussi 9 ex. le 12 à Chièvres et 39 en vol le 13 à Sinsin. La migration débute le 18.10 et est détectée sur tous les sites de suivi (maximum 43 ex. à Angreau et 21 ex. à Fosses-la-Ville). Des vols plus importants s'observent à partir du 23.10 : 120 à 130 ex. le 23.10 à Hérinnes, 232 ex. répartis en 3 vols dont un de 155 ex. le 28.10 à Ormeignies, plus d'une centaine le 17.11 aux BEH, 130 ex. le 19.11 à Frasnes-lez-Buissenal et 165 ex. le 21.11 à Roisin. L'hivernage de plus de 200 ex., principalement formé d'oies férales, est décelé dès le 28.10 sur le site frontalier d'Oost-Maerland.

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : les mentions sont rares jusqu'à la mi-novembre : de 1 à 5 ex. régulièrement aux Marionville, 1 ex. séjournant à Éghezée-Longchamps. Elles deviennent ensuite plus nombreuses mais, le plus souvent, ce ne sont que des oiseaux de passage ; entre autres, 16 ex. le 15 aux Marionville, 8 le 16 à Warcoing, 20 le 23 à Oost-Maerland. **Canard carolin** (*Aix sponsa*) : un couple séjourne depuis le 07.11 à Angleur, avec un mâle supplémentaire le 24. Autres mentions de cette espèce introduite : 1 ex. le



Photo 1 - Cigogne blanche, Hollogne, 14 septembre 2008 / White Stork, Hollogne, 14 September 2008 (Photo : Jules Fouarge).



Photo 2 - Canard pilelet, Chênée, 6 novembre 2008 / Pintail, Chênée, 6 November 2008 (Photo : Christophe Bouhon).

21.09 à Virelles, une femelle le 15.11 à Frasnes-lez-Buissenal et 1 ex. le lendemain à Montigny-le-Tilleul.

Canard siffleur (*Anas penelope*) : l'espèce est rare et localisée jusqu'au début de novembre puis les sites occupés deviennent plus nombreux (une quinzaine) et les nombres augmentent. Les maxima sont 12 ex. le 23 à Amay, 21 ex. le 25 à Oost-Maarland, 10 ex. le 28 aux BEH et 11 ex. le 30 à Freux. Retenons aussi 5 ex. sur la Semois entre Tintigny et Chassepierre le 16.

Canard chipeau (*Anas strepera*) : en septembre, l'espèce n'est mentionnée que sur les sites de nidification ou d'estivage, principalement à Harchies où le maximum est atteint le 22 avec 332 ex. Les sites d'hivernage classiques sont occupés dès octobre. Les maxima y sont comptés en novembre. En dehors du comptage des oiseaux d'eau, 153 ex. le 23 à Harchies et 82 ex. le 28 aux BEH. **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : les nombres s'accroissent sur la plupart des sites occupés dès la fin de l'été. On relève, entre autres, 241 ex. le 28.09 à Harchies, 127 ex. le 29.09 à Éghezée-Longchamps et 205 ex. le 01.10 aux Marionville. À partir de la mi-octobre, l'espèce devient commune mais sans abondance particulière. Par exemple, 115 ex. le 18.10 à Éghezée-Longchamps, 140 ex. le 18.10 à Hollogne-sur-Geer, 153 ex. le 15.11 aux Marionville, 182 ex. le 16.11 à Latour

et 310 ex. le 27.11 à Harchies **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : retenons quelques concentrations : 600 ex. le 22.09 à Harchies, 1.500 ex. le 18.10 à Éghezée-Longchamps et 700 ex. le 23.11 à Warcoing.

Canard pilelet (*Anas acuta*) : présence tout au long de l'automne à Harchies avec, comme maxima, 5 ex. le 14.09 et 6 ex. le 27.11. En octobre et novembre, des mentions, le plus souvent d'isolés ou de paires, également à Warcoing, aux BEH, à Virelles, à Lahérie, à Éghezée-Longchamps (dont 8 ex. le 19.11), à Hollogne-sur-Geer et à Chênée où un couple séjourne du 30.10 au 07.11. **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : une quinzaine de mentions en septembre ne dépassant jamais les 3 ex. ; en dernier lieu, 1 ex. à Warcoing le 29.09, 1 ex. à Harchies et 2 aux Marionville le 30.09. **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : la présence de l'espèce culmine en septembre et octobre avant de décroître en novembre. Parmi les maxima locaux recensés, 700 ex. le 12.09 à Harchies, 103 ex. le 30.09 aux Marionville, 109 ex. le 01.10 aux BEH et 131 ex. le 18.10 à Éghezée-Longchamps.

Nette rousse (*Netta rufina*) : 3 mâles le 17.09 et 1 ex. du 14 au 23.11 à Harchies, 1 femelle du 20 au 29.09 à Éghezée-Longchamps. À Oost-Maarland, une femelle repérée le 21.09 est rejointe par deux congénères



le 20.10 ; 2 ex. y restent jusqu'à la fin novembre. **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : l'espèce reste présente tout l'automne sur plusieurs sites de nidification et d'estivage. À Virelles, la population passe progressivement de 314 ex. le 06.09 à 691 ex. le 16.11. D'autres sites classiques d'hivernage sont occupés dès la fin octobre. Parmi les maxima relevés, retenons, outre Virelles, plus de 200 ex. le 11.11 à Oost-Maarland et 299 ex. le 29.11 à Harchies. **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : comme l'espèce précédente, ce fuligule est présent tout l'automne sur de nombreux plans d'eau avec une progression continue de l'effectif. En novembre, les maxima locaux atteignent plus de 100 ex. le 14 aux Marionville, 240 ex. le 16 à Oost-Maarland, 433 ex. le 28 aux BEH. **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) : un groupe de 8 jeunes s'installe le 25.10 à Virelles où ils sont encore 4 le 19.11. Ailleurs, une femelle le 13.11 aux BEH, 3 ex. le 16.11 puis 1 mâle le 23.11 à Oost-Maarland. **Fuligule à bec cerclé** (*Aythya collaris*)* : une observation le 28.11 à Oost-Maarland. **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)* : 1 ex. le 09.09 à Harchies et le 25.10 à Virelles. **Fuligule nyroca x Fuligule morillon** (*Aythya nyroca x fuligula*) : 1 ex. le 25.10 à Virelles. **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : 1 mâle le 18.09 aux BEH et 2 ex. le 23.11 à Co. **Macreuse brune** (*Melanitta fusca*) : 3 ex. les 24-25.11 aux BEH. **Garrot à œil d'or** (*Bucephala clangula*) : une

femelle d'origine inconnue aura au moins séjourné à Harchies de fin juin à octobre. Les arrivées d'hivernants s'amorcent fin octobre (une femelle le 26.10 à Virelles) - début novembre. À Harchies, on passe de 4 ex. le 04.11 à 26 ex. en fin de mois. Les retours sont légèrement plus tardifs aux BEH (premier le 13.11) et à Oost-Maarland (22.11). **Harle couronné** (*Mergus cucullatus*) : un mâle hiverne pour le troisième hiver consécutif au barrage de la Vierre où il est repéré lors du recensement du 16.11. **Harle huppé** (*Mergus serrator*) : 3 femelles le 24 et 2 le 28 à Nimy. **Harle bièvre** (*Mergus merganser*) : les 5 ex. signalés le 05.09 à Comblain-au-Pont sont probablement les oiseaux observés en juillet sur l'Ourthe. Il faut attendre, comme d'habitude, la fin octobre pour d'autres observations : 4 ex. le 26 à Sainte-Cécile le 26 et 1 mâle le 28 à Oost-Maarland. Les retours sur les sites traditionnels d'hivernage s'étalent sur le mois de novembre et atteignent 24 ex. le 26 à Harchies, 8 ex. le 28 aux BEH et 16 le 29 aux Épioux (Florenville). **Érismature rousse** (*Oxyura jamaicensis*) : 1 ex. le 18.09 à Roux (site d'hivernage fréquenté depuis des années, sans doute par le même oiseau).

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : le passage est encore intense le 01.09, avec 112 ex. en 5 h à Ramecroix (Verviers), 60 ex. en 3 h 30 à Benonchamps et 89 ex. en 7 h à Torgny. Les mentions restent nombreuses



Photo 3 - Bondrée apivore, Xhoris, octobre 2008 / Honey Buzzard, Xhoris, October 2008 (Photo : René Dumoulin).



jusqu'à la mi-septembre puis se raréfient ; la dernière est vue le 04.10 à Xhoris. **Milan noir** (*Milvus migrans*) : encore cinq mentions en septembre, chaque fois d'un individu (le 10 à Vaux-sur-Sûre, le 11 à Bougnimont et Cherain, le 16 à Villers-le-Gambon et le 20 à La Roche). Après un mois, les derniers sont pointés le 19.10 à La Roche et le lendemain à Halleux. **Milan royal** (*Milvus milvus*) : les observations sont nombreuses tout l'automne, y compris encore une douzaine en novembre. La migration s'étale de manière perceptible sur tout le mois d'octobre avec, entre autres, 26 ex. dont 9 ensemble le 04 à Torgny, 6 ex. en 1 h le 12 à Ramecroix, 7 ex. en 3 h le 26 et 6 ensemble le 29 à Benonchamps et encore 6 ensemble le 29 à Ramecroix. Quelques oiseaux passent encore plus tard, dont 2 ex. le 16.11 à Benonchamps. **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : le stationnement et le passage sont importants en septembre. Les mentions se raréfient en octobre. En novembre, 4 mentions le 08 en province de Luxembourg ainsi qu'un ex. le 11 et le 16 à Harchies. **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : présent tout l'automne avec des mentions plus nombreuses en novembre. **Busard pâle** (*Circus macrourus*)* : une femelle de 2^e année séjourne du 02.09 au 08.09 sur une jachère à Ambresin où, le 8, elle est en compagnie de busards des trois autres espèces ! **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : dernières observations le 14.09 à Havinnes et à Faimés. **Épervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : passage noté sur tous les sites de suivi migratoire avec un pic fin octobre - début novembre : par exemple, 11 ex. en 6 h le 28.10 à Flémalle, 21 ex. en 7 h le 29.10 à Sart-Saint-Laurent (Fosses-la-Ville), 17 ex. le 02.11 à Honnay. **Autour des palombes** (*Accipiter gentilis*) : plusieurs mentions de migrateurs tout au long de l'automne, notamment à



Photo 4 à 6 - Faucon hobereau et faucons crécerelles, Moxhe, 3 septembre 2008 / Hobby and Kestrels, Moxhe, 3 September 2008 (Photos : Philippe Vanmeerbeeck).

Torgny, Ramecroix, Flémalle, Sart-Saint-Laurent... **Buse variable** (*Buteo buteo*) : passage et stationnement tout au long de l'automne avec, parfois, des groupes assez importants dont 17 ex. dans le même champ le 04.09 à Moinet ou 16 de passage le 23.10 à Flémalle. **Buse de Russie** (*Buteo buteo vulpinus*)* : une buse présentant les caractères de cette sous-espèce le 19.09 à Saint-Aubin.

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*) : plus de 40 mentions en septembre, la plupart au cours de la première quinzaine. On retiendra 4 ex. ensemble en migration le 14 à Havinnes et 9 ex. les 18 et 21.09 à Virelles. Les deux derniers passent le 04.10 à Torgny.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : l'espèce est jugée plutôt rare sauf en Centre Ardenne. La reproduction semble avoir été mauvaise car sur 27 ex. capturés (dont 7 étaient porteurs d'une bague belge) en Hesbaye la seconde quinzaine de novembre, 23



Photo 7 - Busard pâle, Ambresin, 6 septembre 2008 / Pallid Harrier, Ambresin, 6 September 2008 (Photo : Alain De Broyer).



étaient des adultes. **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : une vingtaine d'observations en septembre dont un exemplaire « s'attaquant » à une Corneille noire le 22 à Harzé ; une vingtaine également en octobre et seulement cinq en novembre. **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : bien présent en septembre, notamment 7 ex. ensemble le 02 à Ploegsteert et 12 ex. le 11 à Harchies. Seulement quatre observations en octobre, 2 ex. le 12 à Havinnes, 1 ex. le 13 et le 16 au parc de la Foresterie à Bruxelles et le dernier le 19.10 à Branchon. Vision exceptionnelle d'un hobereau complètement blanc le 09.09 à Spixhe.

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : signalé sur 12 sites au cours de l'automne avec pour maxima : 4 ex. le 01.09 à Virelles, 8 le 17.10 à Harchies, 4 le 10.10 à Pommeroeul et 5 le 04.11 à Hensies. **Foulque macroule** (*Fulica atra*) : certains rassemblements se renforcent en septembre : 530 ex. le 15 à Hensies, 360 le 11 aux BEH et 280 le 08 à La Hulpe. Octobre et novembre voient les effectifs augmenter suite à l'arrivée d'hivernants. On relève 570 ex. le 02.10 aux BEH, 338 le 09.10 à Hensies, 280 du 01.10 au 30.11 à Amay et 200 à 270 en novembre sur le canal Hensies-Pommeroeul. **Gallinule poule-d'eau** (*Gallinula chloropus*) : seules de petites concentrations, de 35-50 ex. au plus, sont relevées.



Photo 8 - Faucon émerillon, Rêves, 1^{er} septembre 2008 / Merlin, Rêves, 1st September 2008 (Photo : Pierre Melon).

Grue cendrée (*Grus grus*) : deux vols précoces en septembre : 60 ex. le 14 à Paliseul et 17 le 26 à Torgny. Entre le 23 et le 31.10, de petits groupes sont signalés sur 35 sites. Ils précèdent un passage important les 01 et 02.11 : près de 10.000 ex. notés sans compter les nombreux vols nocturnes. Une seconde vague de migratrices totalise près de 7.000 ex. dont 5.000 au dessus de la Gaume le 17.11.

Huïtrier pie (*Haematopus ostralegus*) : 1 ex. le 09.09 le long du canal Hensies-Pommeroeul.

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*) : signalé à Éghezée-Lonchamps, Hollogne-sur-Geer et Rêves dans la première décade de septembre (max. 7 ex. le 10 à Éghezée-Lonchamps). **Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : 1 juvénile les 02 et 04.09 à Hollogne-sur-Geer, 1 adulte le 18.09 aux BEH. **Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : signalé sur 8 sites en septembre, 4 en octobre et 9 en novembre toujours en petits nombres hormis 133 ex. en trois groupes le 14.11 à Givry. **Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : 1 ex. entendu de nuit le 09.09 à Forest (Bruxelles). **Pluvier guignard** (*Charadrius morinellus*) : le passage, entamé le 15.08, se termine rapidement en septembre : 1-4 ex. jusqu'au 08 à Boneffe, 3-4 jusqu'au 04 à Clermont-Viscourt, 1 ex. en vol le 05 à Angre et 1 dernier juvénile le 16 à Moulbaix. **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : les observations et les groupes prennent de l'ampleur courant septembre : 500 ex. le 11 à Éghezée-Lonchamps, 1.000 le même jour à Clermont-Viscourt, 800 le 18 à Virelles. Légère diminution courant octobre, malgré une migration en assez petit nombre, puis passage remarqué essentiellement le 02.11 lors des suivis de migration : 519 ex. en 4 h à Benonchamps, 1.192 en 3 h à Ramecroix, 1.503 en 4 h à Havinnes et 1.429 en 26 vols en 5h à Honnay. Courant novembre, épingleons encore 300 ex. le 07 à Éghezée-Lonchamps, 400 le 13 à Wiers, 300 le 15 à Latour et 750 le 19 le long du canal Hensies-Pommeroeul.

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*) : 1 ex. le 07.09 à Moxhe et les 10-11.09 à Waremmé. **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : passage faible en septembre : 9 données de 1-3 ex. sur 5 sites), surtout des juvéniles. Un dernier le 10.10 aux Marionville. **Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : en septembre, 2 juv. le 18 aux BEH et 1 juv. du 19 au 21 à Éghezée-Lonchamps. **Bécasseau cocorli** (*Calidris feruginea*) : signalé seulement en septembre : 2 ex. le 1^{er} à Rêves, 2 ex. le 14 et 1 ex. le 25 à Éghezée-Lonchamps. **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : passage en petit nombre signalé sur 10 sites jusqu'au 15.11 ; pour la plupart des isolés



hormis 5 ex. le 02.10 à Latour, 3 en vol bas, vers le sud, le 18.10 à Sart-Saint-Laurent et 4 ex. le 16.10 à Éghezée-Longchamps. **Combattant varié** (*Philomachus pugnax*) : 22 mentions en septembre, principalement des juvéniles et toujours en faible nombre. La plupart des données proviennent d'Éghezée-Longchamps et des Marionville où 4 et 1 ex. sont encore notés en octobre, respectivement les 04 et 07.

Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*) : la première le 12.10 à Neuvillers. Elle est ensuite signalée sur 12 sites ; maxima notés fin novembre : 4 ex. le 21 à Amay, 3 le 30 à Neuvillers et 3 le 30 à Acremont.

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : l'espèce est signalée sur pas moins de 40 sites en automne. Les groupes dépassant la quinzaine de bécassines sont rares ; ils atteignent 42 ex. le 10.10 à Marchen-Famenne, 24 le 26.10 à Lavaselle, 33 le 16.11 à Recogne et 35 le 29.11 à Tronquoy-Respelt.

Barge rousse (*Limosa lapponica*) : 1 ex. le 29.09 à Éghezée-Longchamps. **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : 9 données d'automne : sept de 1-3 ex. en septembre suivies d'isolés le 13.10 à Milliomont et le 12.11 à Hensies. **Courlis corlieu** (*Numenius phaeopus*) : 1 ex. le 02.09 à Hologne-sur-Geer et le 11.09 à Vilers-Saint-Amand. **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : 1 juvénile du 01 au 10.09 à Hologne-sur-Geer.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : observé sur quatre sites début septembre dont 2 ex. le 04 à Warcoing et le 05 à Éghezée-Longchamps. **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : le passage se poursuit en septembre-octobre avec comme groupes principaux :

8 ex. le 02.09 à Hologne-sur-Geer, 16 le même jour à Éghezée-Longchamps, 14 le 10.09 à Warcoing et 5 le 01.10 aux Marionville. En novembre, mentionné sur huit sites dont 5 ex. le 13 le long du canal Hensies-Pommeroeul et 5 le 15 à Genappe. **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : fin du passage en septembre avec huit mentions d'isolés hormis 2 juvéniles les 10 et 13 à Hologne-sur-Geer ; le dernier est observé le 20 à Éghezée-Longchamps.

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : en septembre, l'espèce se fait plus rare : peu de bandes atteignent encore la dizaine en début de mois (13 ex. le 09 à Hologne-sur-Geer, 9 le 04 à Warcoing, 6 le 15 à Éghezée-Longchamps). Elle est encore bien présente la seconde quinzaine de septembre avant de diminuer nettement en octobre (5 mentions).

En novembre, la guignette fréquente encore cinq sites (Éghezée-Longchamps, les BEH, Warcoing, Thieu et surtout le canal Hensies-Pommeroeul où 4 ex. observés régulièrement jusqu'à la fin du mois sont probablement des candidats à l'hivernage).

Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)* : 2 juvéniles le 22.09 à Harchies. Cet oiseau est un migrateur irrégulier en Wallonie, surtout des isolés notés en août-septembre lors du passage postnuptial.

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) : des juvéniles isolés sont signalés uniquement en septembre : le 04 à Clermont-Viscourt, le 09 à Havay, le 11 aux BEH, le 14 à Ploegsteert, les 14, 19 et 29 à Éghezée-Longchamps. **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : quelques données de regroupements postnuptiaux : 1.500 ex. le 18.09 en plaine agricole à Hemptinne (Florennes), 1.000 le 22.09 au dortoir de la carrière d'Obourg, 1.350 le 08.10 à Mont-Saint-Guibert, 1.400 le 25.10 à Éghezée-Longchamps, 3.500 au dortoir le 25.10 à Amay, 700 le 04.11 le long du canal Hensies-Pommeroeul.

Mouette pygmée (*Larus minutus*) : 1 juvénile le 22.09 à Harchies. **Mouette tridactyle** (*Rissa tridactyla*) : 1 juvénile passe le 18.10 à Honnay. **Goéland cendré** (*Larus canus*) : l'espèce est seulement signalée sur six sites avant la mi-novembre (maximum 7 ex. le 22.09 au dortoir de la carrière d'Obourg). Quelques petites bandes s'observent ensuite : 20 ex. le 15.11 le long du canal Hensies-Pommeroeul et 29 adultes le 19.11 aux BEH.

Goéland brun (*Larus fuscus*) : la présence en nombres inusités se prolonge en automne. Ainsi, des groupes importants sont encore vus en septembre : 280 ex. le 11.09 à Saint-Aubin, 430 le 18.09 à Hemptinne (Florennes), 2.500 le 25.09 aux BEH, 1.000 le 26.09 au dortoir de la carrière d'Obourg. En octobre, le dortoir d'Éghezée-Longchamps connaît une augmentation progressive : 67 ex. le 10, 234 le 16 et enfin 724 le 25.10. Ailleurs, 2.200 ex. le 11.10 aux BEH, 210 le 25.10 à Amay et 850 le 26.10 à Gaurain-Ramecroix. En novembre, l'espèce est toujours bien présente dans les dortoirs hennuyers et de l'ESM : ainsi, il y a 800 ex. le 08.11 à Gaurain-Ramecroix et 1.100 le 11.11 aux BEH.

Goéland argenté (*Larus argentatus*) : toujours très nombreux à la décharge de Mont-Saint-Guibert (par exemple, 1.350 ex. le 08.10). Ailleurs, les nombres sont, comme d'habitude, nettement plus faibles : 95 ex. le 22.10 à Lixhe, 30 le 08.11 à Gaurain-Ramecroix et 73 le 28.11 aux BEH.

Goéland leucopée (*Larus michahellis*) : l'espèce est présente tout l'automne. Quelques comptages aux dortoirs donnent 115 ex. le 22.10 à Lixhe, 130 le 08.11 à Gaurain-Ramecroix et 46 le 14.11 aux BEH. **Goéland pontique** (*Larus cachinnans*) : peu de données en septembre : un immature le 04.09 à Clermont-Viscourt, 3 oiseaux de première année et un adulte le 20.09 à Wandre. Déjà plus présente en octobre (10 ex. le 22.10 à Lixhe), cette espèce se rencontre également en dehors de la



Basse-Meuse en novembre : 1 adulte le 07.11 à Angleur, 1 ex. le 08.11 à Gaurain-Ramecroix, 2 ex. le 13, 6 ex. le 14 et 5 ex. le 28.11 aux BEH, 1 subadulte le 16.11 à Jamagne, 1 adulte les 26 et 27.11 au marais d'Hensies.

Guifette noire (*Chlidonias niger*) : le passage se termine au début de septembre : 1 juvénile le 1^{er} à Virelles et le 04 le long du canal Hensies-Pommeroeul, 12 adultes le 12.09 à Éghezée-Longchamps.

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : au terme d'un passage minime, les dernières de l'année sont signalées début septembre à Angreau (2 le 05) et aux BEH (1 le 10). **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : la migration est concentrée dans les deux dernières décades d'octobre avec un pic marqué à la fin du mois. Sur les divers postes de suivi migratoire, environ 150.000 oiseaux ont transité par notre région dans ce laps de temps. On note des maxima assez remarquables de 17.000 en 4h40 le 23.10 et de 23.000 en 6h le 28.10 à Flémalle ainsi que de 19.500 en 7h le 29.10 à Sart-Saint-Laurent (Fosses-la-Ville). La migration reste soutenue début novembre comme l'indique le comptage de 11.000 ex. en 5h le 02.11 et 7.000 en 30 minutes le 04.11 à Flémalle, 6.000 en 5h le 02.11

à Honnay. Il se poursuit ensuite au moins jusqu'au 15.11. **Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : quelques groupes sont signalés en septembre dont 28 ex. le 07 à Houmont (Bastogne) et 31 le 21 à Jamagne. Un peu plus précoce que celui du Ramier, le passage se déroule surtout durant les deux premières décades d'octobre avec un pic en fin de seconde décade. Les maxima : 17 en 30 minutes le 18 à Éghezée-Longchamps, 31 en 2h30 le 19 à Sart-Saint-Laurent, 49 en 7h le 19 à Honnay.

Hibou des marais (*Asio flammeus*) : 1 ex. trouvé pendu dans des barbelés le 07.09 entre Philippeville et Villers-le-Gambon. Plus tard, des isolés le 23.10 à Hensies, le 25.10 à Jette et le 19.11 à Angre.

Martinet noir (*Apus apus*) : les derniers migrants sont notés le 13.09 (2 à Hollogne-sur-Geer et 8 à Mouscron). **Huppe fasciée** (*Upupa epos*) : 2 ex. le 07.10 à Izier (Durbuy).

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : 12 ex. sont encore bagués durant la première quinzaine de septembre aux Awirs, le dernier le 15 ; le total lors du passage postnuptial y est de 25 ex., soit plus de 5 fois le nombre d'oiseaux capturés d'habitude. Ailleurs,



Photo 9 - Torcol fourmilier, Ombret, 9 septembre 2008 / Wryneck, Ombret, 9 September 2008 (Photo : Jules Fouarge).



quelques isolés début septembre : le 1^{er} à Chaumont-Gistoux, le 02 à Angreau, le 03 à Ploegsteert, le 09 à Ombret (Amay) et le 11 à Thuillies.

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : les premiers migrants sont renseignés en plusieurs localités le 26.09, dont 33 ex. à Torgny. Le passage est très intense durant tout le mois d'octobre, particulièrement en deuxième décennie, avec un maximum de 104 ex. à Honnay le 10. Les nombres chutent rapidement après le début de novembre ; plus aucun oiseau n'est renseigné après le 13.11 (7 ex. à Flémalle), hormis un migrateur tardif le 25.11 à Boitsfort. **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : les premiers mouvements migratoires sont signalés dès la mi-septembre mais restent faibles jusqu'au 26.09, date à laquelle ils deviennent réguliers pour culminer fin octobre et dans les premiers jours de novembre, avec notamment 2.530 ex. en 4h40 le 23.10 à Flémalle, 4.198 ex. en 3h le 24.10 à Xhoris et 3.252 ex. en 3h le 02.11 à Ramecroix. Après la mi-novembre, seules de petites bandes ne dépassant pas quelques dizaines d'individus sont candidates à l'hivernage dans les zones agricoles.

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : quelques migrants, le plus souvent en halte autour des plans d'eau, sont signalés jusqu'à la mi-septembre ; les cinq dernières le 18.09 à Hollogne-sur-Geer. **Hirondelle rustique** (*Hirundo rustica*) : le passage est très remarqué durant la première quinzaine de septembre, avec notamment des milliers le 02 à Pailhe, le 10 à Ramecroix, le 13 à Mouscron et le 14 à Sart-Saint-Laurent. Deux jeunes sont toutefois encore au nid le 12.09. Le passage faiblit ensuite mais se maintient jusqu'au début du mois d'octobre, les observations devenant rares après le 15.10 ; la dernière hirondelle est vue le 27.10 à Brunehaut. **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbicum*) : migration concentrée sur la première quinzaine de septembre, mais beaucoup moins remarquée que chez l'Hirondelle rustique : au maximum 432 ex. en 3 heures à Ramecroix le 10.09. Des poussins sont encore au nid en plusieurs endroits à la mi-septembre et même jusqu'au 04.10 à Namur. Les derniers migrants sont notés le 07.10 en divers endroits, dont 1 ex. albinos à Vierves-sur-Viroin

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : passage régulier jusqu'à la mi-septembre, avec une cinquantaine d'ex. dispersés dans les zones agricoles, et un dernier migrateur le 28.09 au plateau de la Foresterie à Boitsfort. **Pipit spioncelle** (*Anthus spion-*

noletta) : après une première spioncelle à Virelles le 04.10, les arrivées sur les zones d'hivernage se poursuivent tout au long du mois d'octobre et surtout en novembre. Pas d'abondance particulière, les dortoirs rassemblant au plus une quarantaine d'oiseaux fin novembre (Harchies, Prés Grand-Rieu...). **Pipit maritime** (*Anthus petrosus*)* : 2 ex. rapportés à cette espèce accidentelle en Wallonie sont notés aux Marionville, le long de la Haine canalisée, le 30.09. **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : passage concentré sur la première quinzaine de septembre, puis diminuant rapidement pour se terminer dans la première décennie d'octobre, hormis 1 ex. tardif le 18.10 à Dourbes et le 31.10 à Nassogne. **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : premiers mouvements migratoires observés dès début septembre et culminant dans la seconde quinzaine d'octobre, sans nombres particuliers. Elle prend fin vers la mi-novembre. Les petits groupes encore présents plus tard sont en partie des hivernants dont les nombres sont régulièrement sous-estimés, en particulier au nord du sillon Sambre-et-Meuse. **Pipit à gorge rousse** (*Anthus cervinus*)* : le 04.10, 1 ex. est signalé en passage à Torgny et 1 à 2 ex. à Hemptinne (Florennes). **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava flava*) : passage concentré sur la première quinzaine de septembre, avec notamment 357 ex. en passage le 01.09 à Ramecroix et 205 ex. le 09 à Libramont, puis diminuant rapidement pour se terminer dans la première décennie d'octobre. Les dernières migratrices sont signalées le 18.10 à Dourbes et Sart-Saint-Laurent. **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergi*) : 9 exemplaires sont signalés durant la première quinzaine de septembre, le dernier le 14.09 à Benonchamps. **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*) : des mouvements sont notés dès le début du mois de septembre ; ils culminent dans la seconde quinzaine d'octobre pour se terminer au début du mois de novembre, sans chiffres ou pics particuliers. **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : passage surtout remarqué entre la mi-septembre et la fin octobre, avec un pic marqué autour du 20.10. Peu signalée après début novembre, sans doute à cause des petites vagues de froid, mais tout de même 20 ex. le 02.11 à Éghezée-Longchamps et 12 ex. le 16.11 à Latour. **Bergeronnette de Yarrell** (*Motacilla alba yarrellii*) : seul ex. renseigné durant la période, 1 mâle le 03.10 au plateau du Gerny à Marche-en-Famenne.

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : le baguage régulier d'oiseaux en septembre et octo-



Photo 10 - *Tarier des prés*, Harzé, 7 septembre 2008 / *Whinchat*, Harzé, 7 September 2008 (Photo : Christophe Bouhon).

bre aux Awirs illustre les déplacements discrets de l'espèce. **Accenteur mouchet** (*Prunella modularis*) : le baguage montre un pic net entre le 20.09 et le 10.10, avec notamment 99 ex. le 26.09 à Ampsin, mais le passage n'atteint pas l'ampleur de l'année précédente. Des individus sont aussi observés en migration depuis les postes de suivi migratoires, notamment à Milliomont où 43 ex. sont comptés le 13.10. **Jaseur boréal** (*Bombycilla garrulus*) : 1 ex. le 26.11 à Cherain.

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) : la migration se poursuit et s'amplifie en septembre, particulièrement à partir du 14, avec un pic les 25 et 26.09 (respectivement 188 et 146 ex. bagués aux Awirs). Elle se prolonge jusqu'au début du mois de novembre. **Gorgebleue à miroir** (*Luscinia svecica*) : deux oiseaux bagués en septembre, le 09 aux Awirs et le 20 à Stockay. **Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : passage de début septembre à début novembre, surtout fin septembre et courant octobre avec un maximum de 58 ex. en halte le 11.10 à Érezée. **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : encore des migrants en septembre, surtout dans les vingt premiers jours du mois puis l'espèce se raréfie. Les derniers sont notés le 10.10 à Breuvanne, et le 22.10 à Vodecée (une femelle). **Tarier des prés** (*Saxicola rubetra*) : de nombreux petits groupes de migrants sont notés en septembre, essentiellement durant la première quinzaine, avec notamment un groupe de 25 ex. le 1^{er} à Boneffe. Les tariers en halte diminuent rapidement en fin de mois et seulement six oiseaux

sont signalés début octobre. En fin de mois, deux oiseaux assez tardifs s'observent le 27 à Awagne et le 29 à Mont-Saint-Guibert. **Tarier pâle** (*Saxicola torquata*) : début septembre, certaines familles sont encore rassemblées. Des individus sont signalés en halte migratoire sur plusieurs sites entre le 16.09 et le 16.11, avec une légère augmentation fin septembre-début octobre. Aucune mention après le 16.11. **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : souvent renseigné début septembre, avec notamment des groupes de 40 ex. le 05 à Clermont-Viscours, 34 ex. le 05 à Ambresin et 36 ex. le 08 à Angre. La diminution est très nette après le 15.09, mais des oiseaux sont régulièrement renseignés jusqu'au 14.10. Plus tard, 1 ex. aux BEH le 23.10 et un attardé les 01-02.11 à Harzé.

Merle à plastron (*Turdus torquatus*) : quelques individus isolés font halte entre le 04.10 et le 02.11. **Merle noir** (*Turdus merula*) : des migrants sont capturés du 10.09 à début novembre à la station de baguage des Awirs, sans affluence particulière mais avec une augmentation à la fin du mois d'octobre. Ailleurs, quelques merles passent en migration à Flémalle, Ramecroix et Sart-Saint-Laurent en octobre. **Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : les rassemblements observés au mois de septembre, notamment des groupes de 100 ex. le 04 à Warempage et le 17 à Neffe concernent des nicheurs locaux. La migration débute timidement le 04.10 et reste faible jusqu'au 02.11, jour où des centaines d'individus s'observent lors des différents suivis. Par après les mentions redeviennent peu nombreuses et une



Photo 11 - Grive mauvis, Harzé, octobre 2008 / Redwing, Harzé, October 2008 (Photo : René Dumoulin).

seule dépasse la centaine : 500 ex. le 19 à Saint-Hubert. **Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : les premières arrivent le 26.09 à Torgny, Harzé, Floreffe, et Jmagne. Le passage est surtout intense en octobre, avec un pic marqué au milieu de mois, notamment les 18-19 où de nombreux mauvis sont observés un peu partout (entre autres 980 ex. en passage le 18 à Sart-Saint-Laurent et plus de 2.600 ex. le 19 à Mouscron). L'espèce reste abondante début novembre puis se raréfie dès le milieu du mois. **Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : passage décelé dès le 07.09, avec une nette augmentation dans les derniers jours du mois de septembre. En octobre, le passage est surtout concentré dans la deuxième décennie, notamment 200 ex. le 11 à Mande-Saint-Étienne et le 19 à Sart-Saint-Laurent, puis diminue pour se terminer dans les premiers jours de novembre ou un peu plus tard (3 en migration le 13 à Flémalle). Peu de données dans les derniers jours du mois, les hivernants étant peu nombreux suite aux coups de froid. **Grive draine** (*Turdus viscivo-*

rus) : les premiers migrateurs sont notés le 11.09 à Sberchamps, mais la migration ne se généralise qu'à partir du 25.09. Elle se poursuit de manière étalée en octobre, avec un léger pic en milieu de mois, mais les nombres sont surtout importants le 02.11 (notamment 46 ex. à Ramecroix et 30 ex. à Molenbeek le 02). Les mentions sont rares par après.

Bouscarle de Cetti (*Cettia Cetti*) : de nombreux chanteurs sont signalés régulièrement jusqu'à la mi-novembre dans les sites habituels du Hainaut occidental. **Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : la migration postnuptiale se poursuit en septembre mais reste faiblement détectée : dans les stations de baguage, 9 ex. aux Awirs du 07 au 25, 5 à Bolland (3 le 1^{er} et 2 le 02). Ailleurs, 1 ex. le 16.09 à Hemptinne (Florennes) et le 17.09 à Vielsalm. Une dernière, tardive, est baguée le 08.10 aux Awirs. **Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : encore 7 ex. bagués en septembre aux



Awirs, le dernier le 28.09. Avec 61 oiseaux au total du passage postnuptial, c'est le meilleur résultat depuis plus de 20 ans dans cette station. **Phragmite aquatique** (*Acrocephalus paludicola*)* : 1 ex. bagué le 28.09 à Aldingen (Burg-Reuland). **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*) : la migration se poursuit mais décline progressivement en septembre-octobre. À la station des Awirs, 505 ex. ont encore été bagués en automne, le dernier le 20.10. Le total de 2.368 ex. bagués lors du passage postnuptial dépasse d'un tiers le précédent record réalisé en 2006. Comme d'habitude, les contacts visuels sont peu nombreux, le dernier le 18.10 à Harchies. **Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : encore 8 ex. bagués le 01.09 aux Awirs puis seulement 6 isolées, la dernière, très tardive, le 07.10, comme en 2007 !

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : la migration est très intense durant tout le mois de septembre ; elle se poursuit en octobre en s'atténuant fortement dans la dernière décade et prend fin dans la première semaine de novembre. Aux Awirs, les journées les plus fournies sont le 09.09 (330 ex. bagués), le 10.09 (245 ex.) et le 19.09 (206 ex.). Le total cumulé (6.134 ex. bagués) de juillet à novembre constitue un nouveau record pour la station et fait suite à trois années déjà exceptionnelles. Moins quantifiable lors d'observations visuelles, le passage est néanmoins perceptible avec des haltes de nombreux oiseaux un peu partout. Les dernières, peut-être futures hivernantes, sont vues le 12.11 à Roisin et le lendemain à Ombret. **Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : la migration se poursuit en septembre avec, aux Awirs, un petit pic en début de deuxième décade (38 ex. bagués le 09 et 35 le surlendemain). Par après, les nombres ne dépassent plus la dizaine et l'espèce devient rare en octobre : 6 ex. dont le dernier le 28.10. Le total cumulé de juillet à octobre est de 860 individus ; ce résultat montre une stabilité de l'espèce ces dernières années. **Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : quelques rares observations dans la première quinzaine de septembre : au Gerny le 10, à Nassogne le 12, à Hemptinne (Florennes) le 15 et à Jamagne le 18. Aux Awirs, les 12 ex. bagués en septembre, dont 4 ex. le 05, témoignent d'un passage faible, comme de coutume ; la dernière, baguée le 08.10 porte le total du passage postnuptial à 44 ex., soit le meilleur résultat des dix dernières années. **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : des observations ont lieu dans la première quinzaine de septembre à Dinez, Ramecroix, Nassogne, Benonchamps et

Jamagne. Aux Awirs, les 93 ex. bagués en septembre, le dernier le 23, portent le total du passage postnuptial à un total de 265 oiseaux bagués, soit un résultat proche du maximum atteint en 2006. **Pouillot siffleur** (*Phylloscopus sibilatrix*) : 2 ex. sont encore signalés le 10.09 à Jamagne. **Pouillot à grands sourcils** (*Phylloscopus inornatus*)* : 5 ex. sont bagués ou observés cet automne : le 27.09 à Sourbrodt, le 09.10 à Breuvanne, le lendemain à Èthe, les 18 et 20.10 à Boitsfort. Ce pouillot dont le passage postnuptial se renforce de plus en plus en Europe occidentale, devient un visiteur annuel dans nos régions. **Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*) : la migration postnuptiale est faible aux Awirs où elle est surtout perçue dans la seconde quinzaine de septembre et la première d'octobre ; les derniers y sont bagués le 04 et le 07.11 et font partie d'une vingtaine d'observations de novembre. Un ex. de la sous-espèce *abietinus** est bagué le 18.09 à Stockay. **Pouillot de Sibérie** (*Phylloscopus collybita tristis*)* : une observation visuelle et auditive d'un oiseau le 25.10 à Harchies. **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : aux Awirs, le total des oiseaux bagués (114 ex.) lors de la migration postnuptiale est dans la moyenne des cinq dernières années mais reste faible par rapport aux résultats des années 1990. Les captures sont presque quotidiennes au cours de la première quinzaine de septembre avant de s'espacer ; le dernier est bagué le 10.10. **Roitelet huppé** (*Regulus regulus*) : aucun mouvement migratoire significatif n'est signalé cet automne. **Roitelet triple-bandeau** (*Regulus ignicapillus*) : également une espèce peu signalée. Encore quelques contacts en novembre : le 14 au Fourneau-Saint-Michel, le 17 à Thieu et le 22 à Molenbeek.



Photo 12 - Fauvette des jardins, Ombret, 21 septembre 2008 / Garden Warbler, Ombret, 21 September 2008 (Photo : Jules Fouarge).



Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : une quinzaine de mentions en septembre dont 4 ex. le 28 à Huy. Le dernier le 02.10 à Woluwe-Saint-Lambert. **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : 18 contacts en septembre, les derniers le 26 à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le lendemain à Awagne et à Woluwe-Saint-Lambert.

Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*) : l'espèce est signalée presque quotidiennement depuis le 11.10 dans la roselière de Hollogne-sur-Geer avec un maximum de 15 ex. le 31.10. Ailleurs, quatre mentions de 1 à 2 ex. depuis le 17.10 à Harchies et 3 à 5 contacts dès le 16.11 à Virelles.

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) : nombreux groupes un peu partout. Retenons la vingtaine le 28.09 à Herstal, le 04.10 à Torgny, le 26.10 à Chevetogne, le 09.11 à Virelles, 25 ex. le 19.10 à Boneffe, et des mentions régulières au complexe d'Harchies avec un maximum de 44 ex. le 12.11. **Mésange noire** (*Parus ater*) : un passage plus important que de coutume est partiellement décelé en septembre et au début d'octobre lors des

suis migratoires : 20 ex. le 06.09 et 145 le 14.09 à Honnay, nombreux groupes le 14.09 et le 04.10 à Torgny, plus de 20 ex. les 15, 16, 20 et le 29.09 à Ramecroix. Plus de 20 ex. sont également observés le 10.10 à Harchies. **Mésange bleue** (*Parus caeruleus*) : plus faible qu'en 2007, la migration se limite au mois d'octobre et est décelée sur tous les sites de suivi : nombreux groupes dès le 04.10 à Torgny, 40 individus à Flémalle, 45 à Ramecroix et 168 à Mouscron le 11.10, 74 ex. le 19.10 à Milliomont, 20 en migration rampante le 27 à Awagne. **Mésange charbonnière** (*Parus major*) : un passage très important au nord du pays ne semble avoir eu qu'une ampleur limitée en Wallonie. Les 115 ex. bagués en octobre aux Awirs dépassent quand même sensiblement la moyenne habituelle de cette station. **Rémiz penduline** (*Remiz pendulina*) : seulement quatre mentions totalisant 9 ex. cet automne : 2 ex. le 13.10 à Amay, 2 ex. le 03.11 à Stockay, 1 ex. le lendemain à Hollogne-sur-Geer et 3 ex. le 29.11 à Ploegsteert.

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : encore sept observations d'isolées en septembre, la der-



Photo 13 - Panure à moustaches, Hollogne, 17 novembre 2008 / Bearded Tit, Hollogne, 17 November 2008 (Photo : Jules Fouarge).



Photo 14 - *Mésange nonnette*, Fraipont, 23 octobre 2008 / *Marsh Tit*, Fraipont, 23 October 2008 (Photo : Christophe Bouhon).



nière le 20 à Rochefort. **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : mentionnée sur quelques sites d'hivernage habituels dès octobre. Une seule mention au nord du sillon Sambre-et-Meuse : 1 ex. le 05.11 à Gembloux.

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) : un passage assez important est noté au cours de la seconde quinzaine de septembre : 111 ex. le 15 et 102 le 18 à Ramecroix (Verviers), 193 le 17 à Sberchamps, nombreux mais non comptés le 26 à Torgny. Une seule mention d'un groupe important en octobre : plus de 50 ex. à Lavaselle le 12. Ces mouvements semblent n'avoir concerné que les régions situées à l'est de la Meuse. **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : la migration, assez faible et irrégulière, se déroule de la deuxième semaine d'octobre à la première de novembre avec un pic tout au début de cette période. **Corbeau freux** (*Corvus frugilegus*) : passage faible, entamé en deuxième décennie d'octobre mais concentré fin octobre - début novembre. Retenons 264 ex. en 6 h le 28.10 à Flémalle, 374 ex. en 7 h le lendemain et plus de 250 ex. le 02.11 à Sart-Saint-Laurent (Fosses-la-Ville). **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : l'espèce devient de plus en plus présente en Fagne ; elle est notamment mentionnée à huit reprises à Roly, dont 3 ex. le 13.10. En Ardenne toute proche, un groupe remarquable de 11 ex. survole Oignies-en-Thiérache le 12.11.

Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : la migration semble débiter en deuxième semaine d'octo-

bre ; elle culmine à la fin du mois et dans les premiers jours de novembre. Parmi les nombres journaliers les plus élevés, retenons 1.775 ex. en 5h30 le 22.10 à Flémalle, plus de 2.000 ex. le 29.10 à Sart-Saint-Laurent et 1.651 le 02.11 à Ramecroix (Verviers). Des dortoirs sont signalés principalement en octobre et novembre : 10.000 ex. le 23.10 à Hensies, 12.000 ex. le même jour à Houffalize, plus de 10.000 ex. le lendemain à Bois-et-Borsu, plus de 25.000 ex. le 02.11, plus de 34.000 ex. les 05 et 07.11 à Cedrogne (Baraque de Fraiture) ; également, plus de 10.000 ex. le 30.11 au pré-dortoir du Gerny à Marche-en-Famenne.

Moineau friquet (*Passer montanus*) : le passage est extrêmement faible : moins de 100 ex. au total à Flémalle, moins de 200 ex. à Ramecroix et 69 ex. seulement bagués aux Awirs. Quelques rassemblements assez modestes sont observés en novembre : 50 ex. le 18 au nourrissage à Breuvanne, 30 ex. le 25 à Battincourt et 75 le 29 à Benonchamps.

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : la migration débute dès le 10.09 avec 91 ex. comptés à Ramecroix. Le passage, très remarqué cette année, culmine entre le 7 et le 18 octobre : par exemple, plus de 2.000 ex. passent le 07 à Watermael-Boitsfort, le 11 à Mouscron, le 10 et le 13 à Milliomont. L'importance décroît ensuite mais le passage se poursuit jusqu'à la troisième décennie de novembre.

Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*) : le premier est signalé le 21.09 à Ampsin. Le flux est plus im-



portant cet automne que lors des dernières années ; il culmine la quatrième semaine d'octobre et se poursuit jusqu'à la mi-novembre. Quelques données lors des suivis : 300 ex. le 10.10 à Milliomont, 323 le 20.10 à Ramecroix, 300 le 26.10 à Awagne, 148 ex. le 02.11 à Harzé et 227 ex. le même jour à Honnay. **Serin cini** (*Serinus serinus*) : toujours peu noté en automne. De 1 à 3 ex. sont régulièrement renseignés entre le 17.09 et le 07.11. Une mention remarquable : 23 ex. le 29.10 à Ramecroix. **Verdier d'Europe** (*Carduelis chloris*) : des petits groupes de 2 à 20 ex. sont observés durant tout l'automne. Deux groupes de 200 ex. font figure d'exceptions : le 06.10 à Havay et le 27.11 à Roisin. **Chardonneret élégant** (*Carduelis carduelis*) : le passage est particulièrement marqué le 26.09 à Torgny. Ailleurs, il culmine au cours des troisième et quatrième semaines d'octobre mais est faible : moins de 40 ex. à Flémalle et moins de 100 à Ramecroix où le suivi est journalier. Les bandes en halte sont peu fréquentes et peu importantes. Au plus, un groupe d'une quarantaine d'oiseaux est signalé les 29.09 et 18.10 à Éghezée-Longchamps ; les autres mentions ne dépassent pas la vingtaine d'individus. **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : premières mentions sur cinq sites les 14 et 15.09. La migration est faible ; les maxima journaliers atteignent seulement 159 ex. le 13.10 à Milliomont, 120 ex. le 17.10 à Nassogne, 111 le 20.10 à Ramecroix. En Ardenne, quelques volées assez importantes sont signalées à partir de la mi-novembre : 200 ex. le 14 au Fourneau-Saint-Michel, 100 ex. le 19 à Saint-Hubert et plus de 100 ex. le 23 à Harzé. **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : septembre voit encore quelques rassemblements : 150 ex. le 09 à Velle-reille (Givry), 100 ex. le 15 à Jamagne, 200 ex. le 15 à Hemptinne (Florennes), 400 ex. le 20 à Nandrin. Le passage se remarque déjà le 26.09 à Torgny et culmine les 08-09.10 : 119 ex. en 2 h. le 08.10 à Milliomont, 120 ex. le 08.10 à Ramecroix et 250 ex. le 09.10 à Mont-Saint-Guibert. Aucune mention après la mi-novembre. **Sizerin flammé** (*Carduelis flamma*) : de rares exemplaires sont signalés en octobre et dans les deux premières décades de novembre. Un passage important se déroule au cours de la troisième décade de novembre. Quand les observateurs peuvent le préciser, il concerne principalement des oiseaux de la sous-espèce nominale : des groupes de 50 à 60 ex. passent le 24.11 à Andrimont, une cinquantaine séjourne du 23 au 26 à Petit-Lanaye, 20 ex. sur un groupe d'une trentaine sont bagués le 28 à Liège, 50 sont signalés le 28 à

Oneux, 62 le 29 à Benonchamps, une cinquantaine le 29 à Wibrin. Une seule mention certaine de la sous-espèce *cabaret* : 16 ex. le 25.11 à Dinez. **Bec-croisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : peu présent cet automne. Il n'y a qu'une vingtaine de mentions, dont aucune ne dépasse la dizaine d'oiseaux. **Bouvreuil pivoine** (*Pyrrhula pyrrhula*) : les migrateurs détectés lors des suivis ne dépassent pas la dizaine au total. Aucun individu de la sous-espèce nominale n'est renseigné. **Grosbec casse-noyaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : le passage en petit nombre, culminant à la mi-octobre, n'a été remarqué que lors des suivis migratoires. Parmi les maxima journaliers, 15 ex. le 04.10 à Ramecroix, 11 ex. le 13.10 à Milliomont, 17 ex. le 22 à Flémalle. Par contre, une migration plus sensible que de coutume s'observe dans le nord de la Wallonie et à Bruxelles cet automne.

Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*)* : 1 ex. le 11.11 à Montegnée. **Bruant des neiges** (*Plectrophenax nivalis*)* : 1 ex. le 28.11 à Rossignol. **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : la migration est très faible : moins de 200 ex. au total à Flémalle, aucun migrateur bagué aux Awirs. De rares rassemblements sont seulement notés fin novembre en Haute-Belgique : 40 ex. le 23 à Battincourt, 50 ex. le 30 au Gerny, une centaine le 30 à Yves-Gomezée. **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : en septembre, 1 ex. les 01, 04 et 14 à Torgny ainsi que le 12 à Houtain-le-Val. **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : passage assez normal s'étalant de la fin septembre à la mi-novembre avec un pic à le mi-octobre. Parmi les plus grands nombres observés en suivi de migration : 94 ex. le 18.10 à Milliomont, plus de 65 ex. le 28.11 à Sart-Saint-Laurent. **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : une quinzaine de mentions tout au long de l'automne, toutes sauf une (1 ex. le 25.10 à Arlon) au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Au plus 18 ex. le 08.11 à Malèves-Sainte-Marie-Wastines.

REMERCIEMENTS – Nous remercions les 304 observateurs qui ont contribué à documenter cette synthèse saisonnière ! Ce sont Adriaens V., Annoye N., Appels D., Asinari C., Baccaert A., Baeten S., Barbusca F., Baron A., Bastille F., Bataille B., Baudoux T., Bayot A., Beaumaikers A., Beckers A., Bedoret H., Berckmans C., Berwaer M., Bia G., Binon F., Biquet L., Blomme P., Boche J.M., Bodart P.Y., Boeckx A., Bogaert E., Boland P., Bonmarchand S., Boon L., Borremans Y., Bouckenoghe B., Bouhon C., Boux K., Braem A., Brihaye J.-F., Bronne L., Brousmiche C., Buchet V., Bulteau V., Bultot J., Burnel A., Carbonnelle S., Carels C., Cauwe F., Chapelle G., Christophe B., Clae-



rebout S., Claes J.C., Coatanea Y., Collaerts P., Corhay F., Coster J. Crabbé D., Cremelie M., Crépin L., Croisier P., Crusiaux A., Cucurnia P., Cuvelier E., Dambiermont J.L., Damman E., De Boeck B., De Broeyer A., de Callatay H., de Gottal P., De Guchteneere G., de Liedekerke R., de Liedekerke Y., De Moor W., De Paemelaere M., de Wavrin H., Debiève J., Debusschere K., Declercq M., Decruynaere E., Deflorenne P., Defourny H., Degrave D., Degrave F., Dehombreux E., Delaite S., Delarue J., Deloyer P., Delsalle M., Demeuse V., Demey J., Demonty L., Denison J.L., Depotte J.L., Deprez R., Derouaux A., Derume M., Deschepper C., Detaille R., Devos D., Dewitte T., Dielen V., Dineur H., Domken D., Dordolo C., Dubois P., Duchamps J.P., Duchenne P., Duchesne P., Dufour V., Dufourny H., Dujardin R., Dumonceaux M., Dumortier C., Dumoulin R., Dupriez Q., Dutoit N., Ellis F., Engelen P., Ertvelt J.P., Evrard J., Fanon Y., Farinelle C., Fasol M., Fautsch M., Faveyts W., Fays C., Finck S., Foidart A., Fouarge J., Fourez J.F., Franchimont J., Furnelle V., Gailly P., Gailly R., Galant A., Galletti G., Gallez J., Garnier A.M., Gauquie B., Geiregat N., George Y., Gérard M., Ghysel P., Gijfs F., Gilles B., Gillon R., Giot Y., Godding E., Goedertier W., Goffette Q., Grégoire D., Gridlet T., Gruslin F., Gruwier C., Guyard G., Hanouille S., Hanus B., Hardy J.C., Hendrick R., Hermand P., Heymans E., Hubert M., Humbert C., Hupperetz J., Huyghebaert C., Iltelet M., Jacob J.P., Jacques A., Jancloes P., Jardon B., Jobé P., Jortay A., Kaiser A., Kinet N., Kunsch A., Labenne D., Labeye C., Laloux D., Lambert M., Lambillon J., Landrain R., Laudelout A., Laurent G., Laurent J.-M., Lebrun R., Leclef Ph., Leclercq J., Lecohier D., Leirens V., Lemercier A.M., Lepoutre G., Leprince P., Lewylle I., Lhoest P., Loly P., Lossy K., Lucas R., Maes F., Malbert, Maniquet C., Maniquet T., Marchal B., Marchi M., Marchi M., Marchoul B., Mardulyn H., Mariage T., Matagne J., Matagne M., Mathieu G., Mayon N., Meeüs T., Melon P., Mengal J., Meuli G., Michel P., Miltner H., Minet G., Morren K., Mossoux P., Mottet P., Mouzon D., Nef B., Nicolas M., Nolf P., Orbant D., Ory T., Paquay M., Paquay N., Paques H., Paquet A. Paquet J.-Y., Périkel A., Peten S., Philippe C., Picard O., Pierrard N., Pierre P., Pierret S., Piette Ag., Piette Al., Piette L., Pigneur L.M.,

Pironet A., Platteau D., Poncelet J.M., Ponsen R., Pourignaux F., Poussart P., Puvrez A., Quertinmont L., Rabosée D., Rapaille J.P., Rasson G., Reiter A., Renson S., Reynaert D., Richir F., Roberfroid O., Roca M., Rommes J., Rossignon P., Rousseau C., Sansdrap A., Schaus C., Schenkel D., Schleich E., Schwes J., Selcuk Y., Sellose N., Sépulchre J.B., Sevrin D., Simonart G., Simonart J., Smeets A., Sorbi S., Stassin P., Swaen L., Swinnen V., Tancrez T., Testaert D., Thunus R., Titriaux M., Tombeux P., van Bokhoven J., Van den Abbeele F., Van Geen A., Van Ginderdeuren K., Van Laethem P., Vandewiele T., Vanhove F., Vanmeerbeeck P., Vercruysee A., Verdonck F., Verroken D., Verroken L., Veys P., Vicenzi H., Vieuxtemps D., Vilain B., Vlaemynck M., Walravens E., Wauters M., Werner M., Wiertz A., Windels M., Xhardez C., Xheneumont A., Zaprudnik C., ainsi que les observateurs du Guignard, du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse (chronique dans « La Grièche ») et de sites comme Latour, le Grand Vivier de Champs, Virelles, Harchies, les BEH...ou d'autres dont le nom aurait été omis. Merci à tous.

La compilation des données a été effectuée par André Burnel, Paola Cucurnia, Alain Dirick, Pierre Duchesne, Charly Farinelle, Claire Huyghebaert et Philippe Vanmeerbeeck, ainsi que via une partie des encodages de données effectués dans les sections régionales.

Erratum

L'oiseau de la Photo 10 de la précédente chronique (*Aves*, 46 : 90) était une Locustelle fluviatile, et non une Locustelle lusciniôïde, comme indiqué par distraction. / In previous chronicle (*Aves*, 46 : 90) bird on Photo 10 was a River Warbler, and not Savi's as indicated.

SUMMARY - Observations from September to November 2008

On the whole, autumn allowed to observe a significant migration of Great Cormorants, Honey Buzzards, Red Kites, Wood Pigeons, Wood Larks, Yellow Wagtails, Reed-Warblers, Blackcaps, and an influx of Coal Tits, Jays and Mealy Redpolls. Yet there were relatively few shorebirds and Trans-European migratory birds (Kestrel, Grey Wagtail, Accentor, Song Thrush, Blue and Great Tits, Rook, Jackdaw). The seed-eating species were scarce again except finches. The frequency of the Little Egret is increasing, the Cattle Egret is staying for the first time in autumn, Lesser Black-backed Gulls remain abnormally numerous, sightings of Raven increase in the Entre-Sambre-et-Meuse and 15 Bearded Tits stay on and after 31 October in Hologne-sur-Geer. Among the rarities, observations of Gannet, Pallid Harrier, Steppe Buzzard, Red-necked Phalarope, Kittiwake, Red-throated and Rock Pipits, Yellow-browed Warbler, Lapland Longspur and Snow Bunting.