Observations de septembre à novembre 2009

Centrale Ornithologique Aves
Groupe de travail « Chroniques » [1]

C.-H. Born

L'automne 2009

Le mois de septembre fut assez chaud, très peu pluvieux mais aussi peu ensoleillé, en raison de la forte nébulosité des deux premières décades. Une prédominance anormale des vents de nord-est, dans un contexte de hautes pressions atmosphériques, a également marqué le mois. Octobre fut peu ensoleillé, sinon globalement normal, avant un mois de novembre « chaud » pour la saison (moyenne 9,7 °C à Uccle pour une moyenne de 6,1), mais venteux (moyenne 5,5 m/sec, 82 % de vents du secteurs sud-ouest).

Début septembre, un nid de Grand Cormoran abrite encore des poussins à Harchies et quelques Spatules poursuivent leur séjour estival dans la vallée de la Haine. Pour l'essentiel toutefois, de manière très normale, le passage de la plupart des migrateurs transsahariens se poursuit et prend fin au cours des trois premières semaines de septembre. Quelques inévitables attardés sont aperçus par la suite : par exemple, un Pluvier guignard stationne jusqu'au 6 octobre, des Faucons hobereaux sont notés le 12 octobre, une Caille le 19 octobre, un Traquet motteux le 24 octobre, une Rousserolle effarvatte le 2 novembre et une Hirondelle rustique le 18 de ce mois. Peu de Torcols sont enregistrés cet automne.

D'autres migrations se prolongent sur une grande partie de l'automne : il en est ainsi du Busard des roseaux, du Balbuzard, du Vanneau, des Chevaliers culblanc et guignette ou encore du Goéland brun. Parmi les nicheurs régionaux, les départs s'échelonnent aussi sur la saison, entre autres chez les Grèbes à cou noir et castagneux.

Alors que le Faucon émerillon passe depuis août, d'autres oiseaux d'origine nordique arrivent à partir de septembre : Merle à plastron 11 septembre, Harle bièvre 22 septembre, Pinson du Nord 27 septembre, Grive mauvis 1er octobre, Bécassine sourde 13 octobre, Garrot 19 octobre, etc. Dans l'ensemble, l'automne n'est toutefois pas marqué par des passages exceptionnels. Au contraire même chez plusieurs limicoles dont le Pluvier doré, chez le Roitelet huppé, les mésanges, le Choucas, le Corbeau freux, l'Étourneau, le Moineau friquet, les fringilles dans leur ensemble et sans doute le Bruant jaune. La migration semble nulle dans le cas du Geai. À l'inverse, elle est importante chez de rares passereaux, tels que l'Alouette lulu et la Fauvette à tête noire. La présence des oiseaux d'eau se renforce très progressivement, principalement en octobre–novembre mais sans atteindre des effectifs élevés. Par exemple, dès début octobre, les Fuligules milouin et morillon réoccupent en petit nombre

[1] Les rédacteurs de la présente chronique sont T. Baudoux, A. Burnel, M. Derume, A. De Broyer, A. Dirick, P. Duchesne, C. Huyghebaert, P. Loly, T. Mariage, T. Ory et J.-P. Jacob.

leurs sites d'hivernage et le passage visible de la Grue, qui débute, est modeste. D'année en année, la progression des aigrettes reste néanmoins un fait marquant : en particulier, l'abondance de la Grande Aigrette devient localement supérieure à celle des Hérons cendrés.

Parmi les oiseaux peu fréquents, on retient le séjour depuis le printemps du Hibou des marais à Angreau, les Fuligules nyrocas de Ploegsteert, une Bouscarle à Pécrot, un petit nombre de Panures, un faible passage normal de Rémiz, trois données de Pies-grièches grises migratrices dans le nord de la Wallonie, la venue d'une Grèbe esclavon et celle de Plongeons catmarin et imbrin en novembre.

La palme automnale des raretés revient sans conteste à la première Glaréole à ailes noires observée en Wallonie, les 25-26 septembre dans les plaines de la région d'Éghezée. D'autres visiteurs rares à pointer sont une Fauvette épervière baguée le 12 septembre, un Busard pâle et un Faucon kobez en migration le 17 septembre à Torgny, une Linotte à bec jaune en Gaume fin octobre (loin des régions qu'elle fréquente encore à cette saison), une curieuse mention de Bernache à cou roux en migration apparente fin octobre en Hainaut, un Pygargue à queue blanche le 2 novembre, un Phalarope à bec large du 27.11 au 03.12 à Hollogne-sur-Geer ainsi que trois observations de Bruants des neiges, dont une, étonnante, de 8 ex. en vol le 21.10 à Sommethonne, en Gaume.

Données

La présente chronique saisonnière se base sur un ensemble de 50.901 données, pour l'essentiel provenant de l'interface d'encodage en ligne observations.be (43.300) ; leur répartition géographique est similaire à celle donnée dans la chronique précédente (voir *Aves* 47 : 99).

Le portail observations.be est géré par Aves-Natagora en collaboration avec la fondation néerlandaise Natuurinformatie (conceptrice du portail) et Natuurpunt. Pour davantage de précisions, voir www.aves.be/coa, observations.be/info.php et biodiversite.wallonie.be/outils/encodage. Les données transmises à « trektellen » sont également utilisées.

Systématique

Quelques nouvelles modifications taxonomiques seront désormais suivies, la plupart des comités spécialisés les ayant adoptées. Suite à des études poussées sur la morphologie et l'étude des séquences d'ADN mitochondrial, les changements portent sur les noms scientifiques génériques de laridés précédemment rassemblés au sein du genre *Larus* et de mésanges qui l'étaient au sein du genre *Parus* (voir entre autres les travaux de l'AERC TAC, le comité consultatif taxonomique européen www.aerc.eu, et Jiguet, F. *et al*, 2009 *in* Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française en 2008-2009. *Ornithos*, 16 : 382-393). Les modifications relatives aux mésanges sont notamment reprises dans le volume 12 (2007) du « Hanbook of the Birds of the World ».

Concrètement, la Mouette rieuse devient *Chroicocephalus ridibundus* et la Mouette pygmée *Hydrocoleus minutus*, les autres espèces de Wallonie restant inchangées. Chez les mésanges les espèces du genre *Parus* sont réparties en six clades principaux. Dès lors, nos espèces sont renommées *Cyanistes caeruleus* pour la Mésange bleue, *Lophophanes cristatus* pour la Mésange huppée, *Periparus ater* pour la Mésange noire, *Poecile montanus* pour la Mésange boréale et *Poecile palustris* pour la Mésange nonnette ; seule la Mésange charbonnière garde le nom générique *Parus*.

Détail des observations

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure ; ESM = Entre-Sambre-et-Meuse. Le complexe marécageux de Harchies-Hensies-Pommeroeul est souvent simplement libellé « Harchies ».

Les espèces dont les données sont soumises à homologation sont marquées d'un astérisque. Pour soumettre une observation à la Commission d'Homologation, il suffit d'envoyer une description de l'oiseau au secrétaire (bonmarchand@skynet.be), si possible complétée par des photos, dessins ou tout élément qui vous semble pertinent pour la documenter. Une fiche « type », ainsi que d'autres documents et informations, sont disponibles sur le site de la CH : users.skynet.be/ch-web/.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* : parmi les petites concentrations de ce cygne assez commun, on note plus de 50 ex. en vol le 30.09 à Auderghem, 21 le 10.10 à Freux, 23 le 15.11 à Herstal et 40 le 22.11 à Oost-Maarland (Nl). **Cygne de Bewick** *Cygnus columbianus bewickii* : les premiers retours sont mentionnés le 31.10 : 3 ex. à Virelles, où ils ne sont plus signalés par après, et 4 ex. à Harchies. Le lendemain, 18 ex. sont observés en vol à Walcourt. À Harchies, le groupe se renforce progressivement pour atteindre 10 ex., dont deux immatures, à partir du 20.11. On relève aussi la présence de 2 ex. le 25.11 à Amay et le 30.11 à Gozée. **Cygne chanteur** *Cygnus cygnus* : 2 ex. le 24.11 à Thommen.

Oie des moissons *Anser fabalis* : 6 ex. se reposent à Nechin le 15.11. **Oie rieuse** *Anser albifrons* : plusieurs vols de 1 à 5 ex. sont observés en dernière quinzaine d'octobre en Hainaut. Un ex. séjourne du 19.11 au 30.11 aux BEH. **Oie cendrée** *Anser anser* : le groupe d'une trentaine d'oiseaux observé en été à Éghezée-Longchamps s'étoffe dès le début de septembre pour atteindre une quarantaine qui y restent jusqu'à la fin octobre. Le passage débute le 07.10 à Autelbas (80 ex.) et s'amplifie rapidement : 237 ex. en 7 groupes le 12.10 à Roisin et 775 en 7 groupes également le lendemain à Frasnes-lez-Buissenal ; le 15 octobre, 2.500 oies sont dénombrées en plusieurs vols, principalement dans le Hainaut occidental. Un deuxième pic migratoire se situe du 06 au 09.11, notamment, avec des vols de 679 ex. le 08 à Mouscron et de 560 le 09 à Frasnes-lez-Buissenal. En novembre, une dizaine d'oies se cantonnent aux marais d'Harchies et, le 22.11, 211 ex. sont observés à Oost-Maarland (Nl). **Bernache du Canada** *Branta canadensis* : des rassemblements de plus de 200 ex. relevés en été

Photo 1 - *Bernaches du Canada. Ombret, novembre 2009 / Canada Gooses. Ombret, November 2009* (Photo : Charly Farinelle).

Photo 2 - *Canards souchets. Hollogne, 19 octobre 2009 / Northern Shoveler. Hollogne, 19 October 2009* (Photo : Jules Fouarge).

se prolongent en automne. Parmi ces groupes très mobiles, on dénombre 350 ex. à Fosses-la-Ville le 13.09 et à Roly le 01.11. Plus de 200 ex. sont aussi notés à Freux le 22.10 ainsi qu'à Amay le 14. **Bernache nonnette** *Branta leucopsis* : des isolées ou des paires sont mentionnées en divers sites tout au long de l'automne ; quelques bandes sont également signalées : 10 ex. le 02.10 à Hollogne-sur-Geer, 21 le 14.10 à Cambron-Casteau et une douzaine dès le 16.11 à Amay. **Bernache à cou roux** *Branta ruficollis** : le 31.10 à Havinnes, 1 ex. en migration dans un groupe de 25 Oies cendrées, l'oiseau est suivi pendant 5 km avant de quitter le vol d'oies pour faire demi-tour et repartir vers le Nord !

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* : un regroupement de 60 à 115 ex. est observé du début septembre à la fin octobre à Éghezée-Longchamps ; d'autres groupes importants sont 110 ex. à Gastuche le 15.09 et 70 à Roly le 08.11. **Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna* : l'espèce est signalée sur dix sites dont la moitié en Hainaut occidental. Une légère augmentation des effectifs est remarquée à partir de novembre mais, excepté les Marionville qui accueillent un groupe comptant jusqu'à 20 ex. le 16.11, les autres sites sont fréquentés par maximum 6 oiseaux. **Canard mandarin** *Aix galericulata* : l'espèce est signalée sur une bonne vingtaine de sites, parfois proches. La majorité des données provient d'Anderlecht (étang de Neerpede) et surtout d'Auderghem (Rouge-Cloître). Sur ce dernier site, l'effectif culmine à 13 ex. le 09.11, mais le maximum provient de Boitsfort : 18 ex. le 28.11. Tous les autres étangs accueillent au maximum trois oiseaux. **Canard siffleur** *Anas penelope* : en septembre, l'espèce est signalée à huit endroits, avec un maximum de 7 ex. le 19 à Virelles. La présence s'accentue légèrement en octobre (12 sites occupés, maximum 9 ex. le 19.10 à Harchies) puis augmente sensiblement en novembre avec des maxima de 12 ex. le 13.11 à Thieu, 13 ex. le 15.11 à Obourg et le 18.11 à Quévy ainsi que de 24 ex. le 26.11 à Harchies. **Canard chipeau** *Anas strepera* : le chipeau apparaît en septembre sur des étangs où il ne niche pas, comme à Auderghem (max. 30 ex. le 21). Le maximum de ce mois est 156 ex. le 16 à Harchies. Le nombre de sites fréquentés et les effectifs restent stables en octobre avant d'augmenter surtout à partir de la mi-novembre. À cette période, les maxima sont de 42 ex. le 14.11 à Frasnes-lez-Buissenal, 358 le 18.11 à Harchies, 40 le 20.11 à Auderghem, 100 le 22.11 à Oost-Marland (NI) et 51 le 25.11 aux BEH. **Sarcelle d'hiver** *Anas crecca* : seuls deux sites hébergent plus d'une centaine d'oiseaux en septembre : les décanteurs de Hollogne-sur-Geer (115 le 19) et les Marionville (158 le 29). En octobre, l'espèce est renseignée sur près de 40 zones humides

et le nombre maximum (218) est obtenu à Harchies le 28. Le nombre de sites fréquentés augmente sensiblement en novembre et les concentrations les plus importantes sont alors repérées à Virelles le 07 (360 ex.) et aux Marionville le 28 (221 ex.). **Canard colvert** *Anas platyrhynchos* : classiquement, quelques rassemblements importants sont observés en septembre : 940 ex. le 06 à Éghezée-Longchamps, 420 le même jour à Gaurain-Ramecroix et 850 le 16 à Harchies. Ils se prolongent en octobre mais les effectifs sont moindres : maximum 801 ex. sur l'Escaut entre Tournai et Pottes le 11 et 931 le 13 à Éghezée-Longchamps. En novembre, on renseigne des maxima de 510 ex. le 09 à Gaurain-Ramecroix, 1.179 le 14 à Éghezée-Longchamps et 1.091 le 17 sur l'Escaut entre Tournai et Pottes. **Canard pilet** *Anas acuta* : l'espèce est signalée sur 14 sites entre septembre et fin novembre. Seuls deux accueillent plus de 5 individus simultanément : Virelles max. 22 ex. le 07.11 et Amay 11 ex. le 22.11. **Sarcelle d'été** *Anas querquedula* : la présence de cette espèce est notée sur sept sites. Hormis 4 et 5 ex. signalés respectivement les 01 et 04.09 à Éghezée-Longchamps, toutes les données concernent au maximum 2 individus. Un dernier oiseau est renseigné le 21.09 à Harchies. **Canard souchet** *Anas clypeata* : les plus grandes concentrations sont observées en septembre-octobre, dans la vallée de la Haine, avec notamment 132 ex. le 23.09 aux Marionville et 690 ex. le 09.10 à Harchies. Ailleurs, à la même période, signalons 187 ex. le 16.10 à Virelles. Les effectifs chutent en novembre et les maxima sont alors de 191 ex. le 06 à Harchies et de 113 le 20 à La Hulpe.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : présent tout l'automne sur ses sites de reproduction et d'estivage, notamment à Harchies où séjournent, en moyenne, 320 ex. avec un maximum de 420 le 10.09. Les sites d'hivernage habituels sont occupés dès les premiers jours d'octobre mais les nombres restent faibles. Notons 96 ex. le 19.10 aux étangs Mellaerts (Woluwe), 350 le 30.10 à Virelles, 150 le 15.11 à Herstal et 61 le 18.11 à Roly. **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca** : de 1 à 4 ex. séjournent à Ploegsteert du 14 au 28.09 et du 02 au 06.11. **Fuligule morillon** *Aythya fuligula* : les groupes se renforcent au fil de l'automne, tout en restant assez modestes : plus de 110 ex. tout le mois de septembre à Obourg, 109 le 23.10 à Virelles, 145 le 15.11 à Oost-Maarland (Nl) et 150 le 23.11 aux BEH. **Macreuse brune** *Melanita fusca* : 2 ex. le 29.11 aux BEH. **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* : la femelle estivante de Harchies est toujours présente en septembre où elle est rejointe par deux autres individus le 19.10. D'autres garrots arrivent le 31.10 à Virelles (2 ex.), le 09.11 à Obourg (1ex.) et le 13.11 aux BEH (7 ex.). La plupart de ces oiseaux sont des femelles ou des jeunes de l'année. **Harle huppé** *Mergus serrator* : 3 mentions d'une femelle, le 18.10 à Fosses-la-Ville, le 06.11 à Oost-Maarland (Nl) et du 18 au 21.11 aux BEH. **Harle bièvre** *Mergus merganser* : 1 ex. est observé dès le 22.09 à Angleur et un groupe de 10 ex. sur l'Ourthe près de Hamoir du 11.10 au 27.10. Si la plupart des sites d'hivernage sont occupés dès la mi-novembre, les nombres restent minimes, au plus 8 femelles le 20.11 sur la Vesdre, 4 femelles le 22.11 à Sainte-Cécile et 8 ex. dont deux mâles le 29.11 à Oost-Maarland (Nl). É**rismature rousse**

Photo 3 - *Fuligules morillon et milouin. Ombret, novembre 2009 / Tufted Duck & Common Pochard. Ombret, November 2009* (Photo : Charly Farinelle).

Oxyura jamaicensis : la femelle régulièrement observée à Frasnes-lez-Anvaing y est encore mentionnée les 24.10 et 14.11. Également une femelle le 02.09 à Hollogne-sur-Geer.

Tétras lyre *Tetrao tetrix* : parmi les quelques mentions, 3 mâles et 1 femelle le 31.10 sur le plateau des Hautes-Fagnes. **Caille des blés** *Coturnix coturnix* : la dernière le 19.10 à Honnelles.

Plongeon catmarin *Gavia stellata* : un ex. de premier hiver séjourne du 04 au 24.11 au Grand Large de Nimy. **Plongeon imbrin** *Gavia immer** : trois mentions de juvéniles en novembre : les 16 et 17 à Harchies, le 18 aux carrières d'Obourg et du 27 au 29 aux BEH.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* : adultes et jeunes sont encore bien présents à la mi-septembre sur les sites de reproduction, mais les effectifs diminuent par la suite. La Fig. 1 compare le nombre maximal d'oiseaux par décades sur deux sites de reproduction importants, les décanteurs de Genappe et d'Éghezée-Longchamps. Peu d'oiseaux y séjournent dès la fin octobre. La même évolution est perceptible sur d'autres sites comme les carrières d'Obourg où de 42 ex. le 22.09 on tombe à 4 ex. le 19.11. **Grèbe huppé** *Podiceps cristatus* : les effectifs diminuent encore en septembre. Adultes et juvéniles ne représentent plus que 20 ex. le 2 à Roly, 112 ex. le 18 à Harchies et 20 ex. le 27 sur le lac de Bambois à Fosses-la-Ville. Le mois suivant, 29 ex. sont dénombrés le 13 aux carrières d'Obourg, 73 ex. le 23 à Virelles et 18 ex. le 25 à Amay. À la mi-novembre, l'arrivée d'hivernants est manifeste (123 ex. aux BEH par exemple). **Grèbe esclavon** *Podiceps auritus** : un individu du 13 au 15.11 aux BEH. **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* : en début d'automne, il reste au moins 25 ex. le 01.09 à Hollogne-Sur-Geer, 6 ex. le 08.09 à Éghezée-Longchamps et 3 ex. le même jour à Harchies. Sur ces sites, la présence se poursuit jusqu'en novembre ; les dernières données sont respectivement 2 juvéniles le 02 à Hollogne, 1 ex. le 18 à Harchies et 3 ex. le 29 à Éghezée-Longchamps. Ailleurs, 1-2 ex. entre le 08.09 et le 06.10 à Ploegsteert, Frasnes-lez-Anvaing, aux Marionville, à Obourg et Genappe.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* : très tardivement, un nid est encore occupé par 3 jeunes le 07.09 à Harchies. Comme d'habitude, octobre est le mois charnière de la migration postnuptiale avec près de 18.000 oiseaux dénombrés, soit plus de trois fois l'effectif de septembre et le double par rapport au mois de novembre. Les observations se multiplient surtout à partir du 08.10 et les groupes ainsi que les totaux journaliers deviennent plus importants : entre autres, 685 ex. sur la journée le 08 à Hérinnes-lez-Pecq, 736 ex. posés le 09 à Harchies, 500 ex. remontant la Meuse en plusieurs groupes compacts le 11 à Liège, 710 ex. en 4h le 12 à Roisin et 322 ex. posés le 16 à Virelles.

Butor étoilé *Botaurus stellaris* : 1 ex. du 10.09 au 25.11 au moins à Harchies, le 05.09 à Hautrage et le 08.11 à Ploegsteert. **Blongios nain** *Ixobrychus minutus* : 2 ex. le 21.09 à Ploegsteert. **Héron cendré** *Ardea cinerea* : plus de 900 données dans toute



Fig. 1 - *Phénologie automnale du Grèbe castagneux : nombre maximal d'oiseaux par décades sur deux sites à décanteurs, Genappe et Éghezée-Longchamps / Little Grebe : maximum number of birds per decade at two main nesting sites; the sewage ponds of Genappes and of Éghezée-Longchamps.*

Photo 4 - *Milan royal. Ardenne, 18 septembre 2009 / Red Kite. Ardenne, 18 September 2009* (Photo : Jules Fouarge).

la Wallonie et à Bruxelles, le plus souvent à proximité des plans d'eau et rivières. Parmi les maxima rapportés en septembre, 15 ex. le 08 à Evere et 16 ex. le 26 à Harchies. En octobre, notons 34 ex. le 14.10 à l'étang de Latour (Virton), 17 ex. le 15 aux Marionville et 20 ex. le 31 à Virelles en début de vidange. **Héron pourpré** *Ardea purpurea* : un juvénile du 12 au 24.09 à Ploegsteert. **Grande Aigrette** *Casmerodius albus* : les observations proviennent principalement de l'ouest de la Wallonie avec des concentrations importantes à Virelles, Roly et Harchies où les maxima relevés sont respectivement de 78 ex. le 12.10, 68 ex. le 31.10 et 105 ex. le 14.10. Retenons aussi le passage de 15 ex. en deux groupes (3 et 12 ex.) le 10.10 à Xhoris, de 10 ex. le lendemain à Ramecroix (Verviers) et de 10 ex. le 31.10 à Roisin. **Aigrette garzette** *Egretta garzetta* : par rapport à 2008, le nombre augmente au dortoir d'Harchies où le maximum est de 48 ex. le 07.09 (33 ex. en 2008). Si l'espèce essaime quelque peu dans la vallée de la Haine avec, notamment, 6 ex. le 26.09 aux Marionville, elle est rare ailleurs : 2 ex. le 03.09 à Virelles et 3 ex. le 21.11 aux BEH. **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax** : quatre juvéniles sont signalés le 07.09 à Harchies. Le 08.11, un adulte s'alimente dans une mare de jardin à Antheit ; le comportement peu farouche et le lieu insolite rendent l'origine sauvage de l'oiseau incertaine.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* : cet oiseau exotique donne lieu à deux mentions d'isolés, le 10.09 à Torgny et le 11.11 à Manhay. **Spatule blanche** *Platalea leucorodia* : dans la vallée de la Haine, de nouveaux séjours estivaux retiennent l'attention. Aux Marionville, l'exemplaire déjà présent en août y est observé jusqu'au 06.09. À Harchies, plusieurs oiseaux séjournent depuis début août ; la dernière part le 27.09. **Cigogne noire** *Ciconia nigra* : une quarantaine de mentions jusqu'à la mi-octobre concernent tout au plus 3 oiseaux simultanément comme le 06.09 à Freux et le 11.09 au Fort de Flémalle. **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* : passage encore soutenu au cours des premiers jours de septembre, notamment le 05, avec 92 et 100 ex. respectivement à Somme-Leuze et Nassogne. Deux jours plus tard, 65 ex. survolent Liège. Cinq mentions en octobre dont la dernière concerne 2 ex. le 24 à Mettet.

Bondrée apivore *Pernis apivorus* : des oiseaux migrent jusqu'en fin de première quinzaine de septembre (maxima 9 ex. le 08.09 à Fauvillers, 21 le 05.09 et 17 le 11.09 à Torgny). Les deux dernières sont observées le 03.10 à La Roche. **Milan noir** *Milvus migrans* : en septembre, 8 données totalisant 10 exemplaires témoignent de la fin de la migration de ce milan ; le dernier est observé le 26 à Ciney. **Milan royal** *Milvus milvus* : les données sont abondantes pour ce milan qui est renseigné isolément ou par petits groupes durant tout l'automne. Les deux premières décades d'octobre semblent voir le passage s'accélérer sensiblement. Quelques groupes ou totaux journaliers plus importants sont à signaler : 14 ex. le 07.10 à Bastogne, 17 le même jour à Autelbas, 17 le 11.10 à Xhoris et 38 le 17.10 à Arlon. **Pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla** : un oiseau de premier hiver est observé brièvement à

Bléharies le 02.11. **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* : on note encore des dortoirs dans les plaines agricoles début septembre, notamment 16 ex. à Angre le 01.09 et 11 ex. à Walhain-Saint-Paul le 03.09. Les nombres diminuent ensuite mais l'espèce est encore régulièrement signalée en octobre. Plus que 6 données en novembre totalisant 10 oiseaux, le dernier de l'automne étant observé le 22.11 à Harzé. **Busard Saint-Martin** *Circus cyaneus* : la majorité des observations renseignent 1-2 ex. en plaines agricoles ; le nombre de mentions augmente logiquement en novembre, témoignant de l'arrivée d'hivernants (septembre : 105 mentions, octobre : 101, novembre : 152). Les seules données de 3 ex. proviennent d'Angre le 01.09 et de Harzé le 02.11. **Busard pâle** *Circus macrourus** : un juvénile le 17.09 à Torgny. **Busard cendré** *Circus pygargus* : une trentaine de données pour ce busard qui quitte nos régions avant la première quinzaine du mois de septembre ; cet automne n'échappe pas à la règle, les deux derniers étant observés le 10.09 à Thisnes et à Torgny. **Autour des palombes** *Accipiter gentilis* : les juvéniles de cette espèce sont en dispersion à cette époque de l'année. Un fait marquant est le nombre de migrateurs renseignés durant les deux premières décades de septembre depuis le poste de suivi de Torgny : 10 ex. passent du 02.09 au 18 avec un maximum de 3 ex. le 05.09. **Épervier d'Europe** *Accipiter nisus* : après des observations assez étalées en septembre, la migration s'amorce en fin de première décade d'octobre avec, notamment 49 ex. sur la journée du 09.10 à Flémalle. **Buse variable** *Buteo buteo* : comme pour l'espèce précédente, le passage, diffus en septembre, s'intensifie pour culminer en deuxième décade d'octobre avec des maxima de 41 ex. le 09.10 à Flémalle, 12 le 10.10 à Morhet, 14 le 11.10 à Boitsfort, 18 le 12.10 à Flobecq et 38 le même jour à Ramecroix (Verviers). Au niveau des oiseaux en halte, le rassemblement de 42 ex. sur un terrain fauché le 26.09 à Freux est assez remarquable.

Photo 5 - *Épervier d'Europe. Xhoris, 9 octobre 2009 / Eurasian Sparrowhawk. Xhoris, 9 October 2009* (Photo : Jules Fouarge).

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* : le passage, commencé en août, culmine au cours des deux

Photo 6 - *Balbuzard pêcheur. Xhoris, 30 octobre 2009 / Osprey. Xhoris, 30 October 2009* (Photo : Christophe Bouhon).

premières décades de septembre avec, entre autres, 6 ex. le 02.09, 7 le 05.09 et encore 5 le 10.09 à Torgny. À Virelles, 9 ex. stationnent du 17 au 19.09 ; ils sont encore 6 les 23 et 24.09. Les données diminuent rapidement en octobre (19 au total du mois) et le dernier individu est observé le 01.11 à Wavreille.

Faucon kobez *Falco vespertinus** : un juvénile en migration le 17.09 à Torgny. **Faucon émerillon** *Falco columbarius* : le passage culmine clairement en octobre (37 données en septembre, 77 en octobre et 18 en novembre). **Faucon hobereau** *Falco subbuteo* : quelques familles avec des juvéniles quémandant sont encore observées çà et là jusqu'à la mi-septembre ; cette espèce nous quitte ensuite rapidement et les données deviennent rares dès la première décade d'octobre ; les derniers sont mentionnés le 12 à Clavier et aux BEH. **Faucon pèlerin** *Falco peregrinus* : l'espèce, en dispersion, est observée en petits nombres tout l'automne ; quelques migrateurs sont signalés isolément sur les sites de suivi.

Râle d'eau *Rallus aquaticus* : contacté sur 31 sites pour l'ensemble de l'automne, d'habitude 1-2 ex. par mention ; au plus, 6 ex. le 04.09 aux Marionville et 7 le 30.09 à Harchies. **Marouette ponctuée** *Porzana porzana* : en septembre, 1-2 ex. à Virelles les 03-04 et 23-24, maximum 3 ex. le 04 aux Marionville et 1 ex. les 07 et 08 à Harchies. **Foulque macroule** *Fulica atra* : rassemblements postnuptiaux à partir de début septembre : 340 ex. le 02 aux BEH, 227 le 07 à Harchies, 240 le 05 et 410 le 26 sur le canal Hensies-Pommeroeul. Les groupes s'étoffent à partir de la mi-octobre avec entre autres 350 ex. le 18.10 à Amay, 400 le 22.10 aux BEH et 474 le 17.11 sur l'Escaut de Tournai à Pottes. **Gallinule poule-d'eau** *Gallinula chloropus* : les groupes d'automne atteignent 39 ex. le 13.09 à Genappe, 30 le 24.09 à Saint-Ghislain, 30 le 06.11 à Angleur, 72 le 14.11 sur le canal Ath-Blaton et 121 le 17.11 sur l'Escaut entre Tournai et Pottes.

Grue cendrée *Grus grus* : après quelques vols totalisant une bonne centaine d'individus du 1er au 09.10, la migration postnuptiale prend son essor à partir du 10.10 avec 42 vols totalisant 1.642 ex. jusqu'au 28.10. Après cette date, deux petits pics de passage : le premier du 30.10 au 02.11 (3.325 ex. en 80 vols) et le second du 08.11 au 10.11 (3.696 ex. en 32 vols). Encore 15 ex. le 30.11 à Verviers.

Glaréole à ailes noires *Glareol+a nordmanni** : 1 ex. à Éghezée-Longchamps puis à Mehaigne les 25 et 26.09. Il s'agit de la première donnée wallonne de cette espèce dont les lieux de nidification les plus proches se situent en Ukraine. **Huîtrier pie** *Haematopus ostralegus* : 1 ex. le 03.11 à Beauvechain.

Photo 7 - *Glaréole à ailes noires et Vanneaux huppés. Éghezée-Longchamps, 25 septembre 2009 / Black-winged Pratincole & Northern Lapwings. Éghezée-Longchamps, 25 September 2009* (Photo : Philippe Vanmeerbeeck).

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : en septembre, 2 ex. les 04 et 05 et 1 le 25 à Éghezée-Longchamps, 2 juvéniles les 07 et 08 à Longlier et 1 ex. le 08.10 Harchies. **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* : 2 ex. en vol le 06.09 à Angre, un adulte le 11.10 à Hensies et un juvénile le 14.10 à Warcoing. **Pluvier guignard** *Charadrius morinellus* : le passage postnuptial se poursuit jusqu'au 19.09 avec les 4 derniers ex. à Angreau où l'un d'eux s'attarde même jusqu'au 06.10. Noté en septembre sur 11 sites avec pour la plupart des groupes inférieurs à 7 ex. hormis, en fonction du moment de la journée, entre 18 et 33 ex. le 05 à Boneffe. **Pluvier doré** *Pluvialis apricaria* : passage faible dans l'ensemble avec pour groupes les plus étoffés : 17 ex. le 17.09 à Angreau, 15 le 09.10 à Angre, 15 le 04.11 à Saint-Jean-Geest, 36 le 06.11 à Sart-Saint-Laurent et 35 le 13.11 à Moircy. **Pluvier argenté** *Pluvialis squatarola* : 1 juvénile du 02 au 04.11 à Thisnes. **Vanneau huppé** *Vanellus vanellus* : les rassemblements automnaux s'étoffent de plus en plus courant septembre avec, entre autres, 650 ex. le 08 à Éghezée-Longchamps et 350 le même jour à Gaurain-Ramecroix, 500 le 13 à Hennuyères et 750 le 15 à Stave (Mettet). La migration devient perceptible à partir de la deuxième décade d'octobre ; elle se manifeste par de nombreux

Photo 8 - *Phalarope à bec large. Hollogne, 30 novembre 2009 / Red Phalarope. Hollogne, 30 November 2009* (Photo : Philippe Vanmeerbeeck).

vols et des totaux journaliers élevés, dont 970 ex. le 10 à Couthuin, 2.020 le 11 à Jamagne, 1.200 le 11 à Éghezée-Longchamps, 1.100 le 12 à Roisin et 2.500 le 24 à Thisnes. Le passage se poursuit début novembre avec notamment 1.051 ex. le 8 à Sart-Saint-Laurent. Par la suite, des stationnements sont enregistrés, parfois de groupes de taille importante (830 ex. le 11 à Gaurain-Ramecroix, 1.200 le 13 au Gerny et 700 le 29 à Sainte-Marie-Chevigny).

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 1 adulte le 07.10 à Thorembais-Saint-Trond. Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : 2 juvéniles le 18.09 à Genappe. Bécasseau variable *Calidris alpina* : isolé ou par petits groupes jusqu'au 25.10 avec pour maxima 4 ex. le 17.09 à Virelles, 6 le 19.09 à Gaurain-Ramecroix et 6 le 09.10 à Harchies. Un dernier le 09.11 à Gaurain-Ramecroix. Combattant varié *Philomachus pugnax* : en septembre 1 ex. noté régulièrement du 05 au 22 à Éghezée-Longchamps. Ailleurs 1 ex. le 05 à Harchies, le 17 à Tavigny et le 29 à Lens-Saint-Servais. Une donnée en octobre (2 ex. le 14 à Herseaux) et une en novembre (1 ex. le 07 à Focant).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* : présence signalée sur 43 sites pour l'ensemble de l'automne. **Bécassine sourde** *Lymnocryptes minimus* : première le 13.10 à Grandmenil. Notée sur 20 sites à partir de cette date le plus souvent 1-2 ex. à la fois hormis 7 ex. le 18.10 et 10 le 15.11 à Tavigny et 5 le 13.11 à Libin. **Bécassine des marais** *Gallinago gallinago* : deux pics de passage sont marqués. Une première vague du 21.09 au 02.10 avec pour maxima : 26 ex. le 24.09 et 33 le 02.10 aux Marionville et 42 le 25.09 et 46 le 30.09 à Harchies. Seconde vague du 15 au 20.11 avec au plus 19 ex. à Dampicourt et 42 à Tavigny le 15, 87 le 17 à Virelles et 19 le 20 à Breuvanne. Signalée sur près de 90 sites cet automne. **Barge rousse** *Limosa lapponica* : 1 ex. le 19.09 aux BEH. Présence régulière de 1 à 4 ex. à Harchies du 15.09 au 05.10 puis 1 ex. du 15.10 au 22.11. **Courlis corlieu** *Numenius phaeopus* : 1 ex. en vol le 05.09 à Couthuin. **Courlis cendré** *Numenius arquata* : après 6 données jusqu'à mi-octobre dont 4 ex. en vol le 19.09 à Roisin, l'espèce est notée sur 10 sites en novembre avec au plus 3 ex. à Virelles et 2 à Gozée le 14. **Chevalier arlequin** *Tringa erythro-*

pus : séjour de 1-2 ex. du 07 au 30.09 à Harchies où un dernier est noté le 11.10. Ailleurs, des isolés à Lixhe le 24.09, à Oost-Maarland les 25-26.09 et à Virelles le 02.10. **Chevalier gambette** *Tringa totanus* : 1 ex. les 07 et 08.09 à Harchies, 2 ex. le 02.10 et 3 ex. le 10.10 à Virelles. **Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* : le passage estival se poursuit avec une intensité moindre jusqu'au 04.11 (1-

3 ex. sur 7 sites). **Chevalier culblanc** *Tringa ochropus* : diminution graduelle des observations jusqu'à la fin octobre, avec des maxima de 10 ex. aux Marionville le 04.09, 10 à Genappe le 06.09, 7 à Harchies le 07.09 et 7 à Saint-Ghislain le 06.10. De 1 à 3 ex. sont notés sur 18 sites en novembre, hormis 4 ex. le 19 à Libin. **Chevalier sylvain** *Tringa glareola* : 7 ex. au total en septembre sur 5 sites dont 2 du 01 au 05 à Éghezée-Longchamps. Un dernier le 01.10 à Virelles. **Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* : poursuite du passage en petits groupes jusqu'au 12.10. Les maxima relevés le sont essentiellement jusqu'au 15.09 : 10 ex. les 02, 07 et 11 à Éghezée-Longchamps, 8 le 05 à Hollogne-sur-Geer et 9 le 06 à Warcoing. Deux données en novembre : 1 ex. le 08 à Latour et 2 le 19 aux BEH. **Phalarope à bec large** *Phalaropus fulicaria** : séjour d'un exemplaire du 27.11 au 03.12 à Hollogne-sur-Geer.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : quatre mentions sur l'ensemble de l'automne : un juvénile le 07.09 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. de 1re année le 30.09 à Gaurain-Ramecroix, un oiseau de 1er hiver le 24.10 aux Marionville et un adulte le 16.11 à Amay. **Mouette rieuse** *Chroicocephalus ridibundus* : l'espèce est présente partout à l'ouest de la Meuse, dans les campagnes, les villes et sur les cours d'eau. Les plus grands nombres se rencontrent aux divers dortoirs, par exemple, 1.700 ex. le 11.09 à Gaurain-Ramecroix, 3.000 le 04.11 à Amay, 3.500 le 27.11 au Grand Large de Nimy, 1.200 le 30.11 à Herstal. Des isolées ou de petits groupes fréquentent aussi, plus rarement, l'est de la Meuse, comme l'Ourthe et l'Amblève en région liégeoise ou quelques sites de la province du Luxembourg (13 mentions, maximum 8 ex. le 10.11 à Recogne). Un individu leucique est à nouveau signalé les 27 et 28.11 à Liège. **Mouette pygmée** *Hydrocoleus minutus* : un individu de 1er hiver le 27.09 à Virelles et 1 ex. le 14.10 à Maubray. **Goéland cendré** *Larus canus* : à l'exception d'un oiseau le 02.09 à Éghezée-Longchamps, les mentions de septembre et octobre proviennent principalement du Hainaut et de la Basse-Meuse. Les nombres sont faibles : maxima 16 ex. le 17.09 à Petit-Lanaye et 31 ex. le 28.10 aux marais d'Harchies. Les sites fréquentés se diversifient dès le début de novembre mais les effectifs restent peu importants ; seules quatre mentions dépassent la dizaine : 11 ex. le 08 à Mouscron, 21 le 15 puis 16 le 17 au canal Hensies-Pommeroeul et 74 le 16 à Amay. **Goéland brun** *Larus fuscus* : des groupes de plusieurs centaines sont encore réguliers dans toutes les régions à l'ouest de la Meuse jusqu'à la fin de la deuxième décade de septembre, par exemple 600 ex. à Angre et 500 à Braives le 1er,

Photo 9 - *Goéland cendré. Hermalle-sous-Argenteau, novembre 2009 / Common Gulls and Black-headed Gull. Hermalle-sous-Argenteau, November 2009* (Photo : Charly Farinelle).

850 ex. à Gaurain-Ramecroix et 450 à Boneffe le 11, 380 à Stave et 500 à Donstiennes le 18. Ensuite, l'espèce reste bien présente tout en diminuant progressivement dans les campagnes jusqu'à la fin novembre ; elle est surtout abondante à l'ouest de la Wallonie, plus particulièrement dans l'ESM et le Hainaut occidental. En Basse-Meuse, comme d'habitude, ce goéland se compte sur les doigts d'une main à la fin de l'automne. Il est un peu moins rare en Moyenne Meuse (50 ex. le 21.11 à Amay) et dans la Hesbaye environnante (28 ex. le 29.11 à Limont). **Goéland argenté** *Larus argentatus* : les deux groupes les plus importants s'observent aux environs de la décharge de Mont-Saint-Guibert : 350 ex le 28.03 à Corbais et des groupes en vol totalisant 638 ex. le 29.10 à Louvain-la-Neuve. Trois autres bandes atteignent ou dépassent la centaine : 100 ex. le 03.10 à Somzée, 120 en vol le 14.10 à Évere et 102 le 23.10 à Virelles. Contrairement à l'espèce précédente, les oiseaux posés dans les campagnes sont rares : 80 ex. dans un champ fraîchement travaillé le 26.09 à Malèves-Sainte-Marie-Wastines. L'espèce est plus courante dans les villes et les milieux aquatiques même de faible taille mais limités à l'ouest de la Meuse. Par rapport à d'autres années, les nombres sont assez faibles avec, comme maxima, en se limitant aux sites classiques, 42 ex. le 18.09 à Gaurain-Ramecroix, 40 ex. le 04.11 à Amay, 80 le 09.11 aux BEH et 46 le 27.11 en Basse-Meuse. Moins habituel, 61 ex. le 20.09 à la réserve de l'Escaille à Gembloux. **Goéland leucophée** *Larus michahellis* : en septembre, seule la Basse-Meuse compte plusieurs dizaines d'exemplaires (90 dont 36 adultes le 07, 83 le 17) ; ce goéland y diminue au fil des mois (50 ex. le 22.10 à Lixhe et 34 le 21.11 au total de la Basse-Meuse) mais reste bien présent à l'ouest de la Meuse. Quelques concentrations de la fin de l'automne : 44 ex. le 28.10 à Harchies et environs, 40 ex. le 18.11 aux BEH et 30 ex. le 28.11 dans les campagnes à Limont. **Goéland pontique** *Larus cachinnans* : en septembre et octobre, à l'exception d'un adulte le 08.09 aux BEH, cette espèce n'est signalée qu'en Basse-Meuse (maximum 6 ex. le 22.10) et à Amay (4 ex. le 25.10). En novembre, des mentions proviennent aussi des BEH (maximum 4 ex. le 09) et les nombres croissent en Basse-Meuse (16 ex. le 21). **Goéland marin** *Larus marinus* : toujours rare à l'intérieur des terres : 2 adultes le 02.10 à Virelles et 1 adulte le 16.10 à Gaurain-Ramecroix.

Guifette noire *Chlidonias niger* : début septembre, encore 1 ex. les 06-08 et 12 à Harchies ainsi que 4 ex. le 11.09 à Namêche. **Sterne pierregarin** *Sterna hirundo* : 1 adulte le 05.09 et 2 ex. le 19.09 à Harchies, 1 juvénile le 18.09 aux BEH.

Pigeon colombin *Columba oenas*: des rassemblements ont lieu en septembre mais restent limités (au plus 25 ex. à Opprebais le 10.09), et la migration ne semble manifeste qu'à partir du début du mois d'octobre, avec un pic en troisième décade. Les maxima sont notés à cette époque : 119 ex. le 20.10 à Sart-Saint-Laurent et 107 ex. à Virelles le 25.10, en migration parmi les groupes de ramiers. On note encore des passages durant la première quinzaine de novembre. **Pigeon ramier** *Columba palumbus* : début de passage un peu plus tardif cette année ; très peu de mentions de groupes en septembre. En octobre, la migration ne débute vraiment qu'à partir du 10 et se prolonge jusqu'au milieu du mois de novembre, de manière plutôt étalée. Maxima de 11.500 ex. à Ramecroix (Verviers) le 14.10 et à Sart-Saint-Laurent le 28.10. Côté nichées tardives, des jeunes en duvet sont encore signalés le 03.10 à Uccle. **Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* : les premiers jours de septembre voient encore de petits groupes de migrateurs faire halte, notamment 9 ex. à Baisieux le 01.09 et 15 ex. à Neuville le 02.09, mais cela s'estompe rapidement ; la dernière le 18.09 à Saint-Aubin.

Perruche à collier *Psittacula krameri* : en dehors de la grande population bruxelloise et brabançonne, des individus sont observés dans plusieurs autres régions, notamment 12 ex. à Grivegnée (Liège) le 28.09, 1 ex. à Wanze le 04.10, 5 ex. à Manage le 11.10, ainsi qu'un dortoir de 40 ex. à la Louvière le 14.11. **Perruche alexandre** *Psittacula eupatria* : très peu de données, toutes en Région bruxelloise, notamment sur des communes habituellement moins fréquentées par l'espèce : Forest, Watermael-Boitsfort, Anderlecht. **Coucou gris** *Cuculus canorus* : quatre données dans la première quinzaine de septembre, ce qui est classique pour cette espèce qui nous quitte déjà durant l'été. Dernier ex. noté le 16.09 à Ploegsteert.

Hibou des marais *Asio flammeus* : les observations se poursuivent à Angreau où un oiseau, reconnaissable aux grandes taches blanches sur les ailes, est signalé du 15.05 au 07.11 ; en outre, 1 ex. supplémentaire le 17.09 et 2 ex., apparemment différents de celui de l'été, le 09.11. Ailleurs, quatre mentions d'isolés le 25.10 à Bastogne, le 02.11 à Eupen, le 04.11 à Dour et, plus surprenant, un migrateur en plein jour le 09.10 à Flémalle.

Martinet noir *Apus apus* : la majorité nous ayant déjà quitté durant l'été, on note seulement une vingtaine d'observations durant la première quinzaine de septembre, la dernière le 15.09 à Florennes. **Martin-pêcheur d'Europe** *Alcedo atthis* : 430 données automnales dans toute la Wallonie, sauf dans les cantons de l'Est où l'espèce semble quasi absente. **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* : 2 ex. en vol à Ixelles le 02.09. **Huppe fasciée** *Upupa epops* : 1 ex. à Roly le 03.09 et à Dion-le-Val le 12.09.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : très peu observé cet automne, probablement du fait des conditions anticycloniques, seulement 8 ex. signalés le 01 et le 11.09.

Alouette des champs *Alauda arvensis* : le passage commence timidement le 21.09 avec 12 ex. à Florennes et 4 ex. à Flémalle. Il reste ensuite très discret avec des nombres inférieurs à 20 ex. par jour sur les sites de suivi et ne s'intensifie qu'à partir du 09.10 avec par exemple, 307 ex. en 10h50 à Xhoris le 09, 710 ex. en 5h40 à Ramecroix le 11, 645 ex. en 2h à Basècles le 14 et 647 ex. en 4h à Flémalle le 19. Un pic est manifeste du 20 au 23.10 avec, le 20, 7.235 ex. en 5h à Sart-Saint-Laurent, 2.200 ex. en 1h30 à Strée-lez-Huy, 1.685 ex. en 4h à Flémalle, 5.000 ex. en 2h15 à Xhoris, 3.233 ex. en 2h30 à Ramecroix et, les jours suivants, des nombres compris entre 1.500 et 2.500 ex. en ces mêmes sites ; également 2.700 ex. le 23 à Angreau. Par la suite, les nombres ne dépassent plus quelques centaines par jour avec, toutefois, un passage un peu plus intense le 31.10 : 782 ex. en 4h à Havinnes, 2.000 ex. en 3h30 à Xhoris et 740 ex. en 3h à Ramecroix. À partir du début novembre, le passage se calme et les bandes de plus de 100 ex. deviennent l'exception. **Alouette lulu** *Lullula arborea* : le premier migrateur est signalé le 26.09 à Flémalle mais le passage reste très discret jusqu'au 03.10 lorsque le premier groupe important est observé à Nassogne (50 ex. en halte). Ensuite, les nombres augmentent petit à petit jusqu'à un maximum entre le 09 et le 11.10, pour redescendre assez vite dans les jours suivants. Le cas de Xhoris est significatif à cet égard : 41 ex. en 4h30 le 7, 497 ex. en 10h50 le 09, 602 ex. en 3h30 le 10, 200 ex. en 3h30 le 11, 54 ex. en 2h45 le 13 et 35 ex. en 1h50 le 15. Un dernier petit pic a encore lieu le 20.10 avec 163 ex. à Ramecroix et 125 ex. à Eupen. Fin octobre, on note encore quelques journées avec plus de 20 ex. notés : 62 ex. à Mouscron et 36 ex. en 5h à Flémalle le 23, 37 ex. le 25 à Moustier et 53 ex. en 3h30 à Xhoris le 31. Le passage s'éteint en novembre.

Photo 10 - *Alouette des champs. Xhoris, 19 octobre 2009 / Eurasian Skylark. Xhoris, 19 October 2009* (Photo : Jules Fouarge).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : encore quelques observations au cours de la première quinzaine de septembre. Par exemple, 11 ex. en migration à Ramecroix (Verviers) et 21 ex. aux BEH le 02.09, 25 ex. le 6.09 à Éghezée-Longchamps, 15 ex. de passage le 09.09 à Jamagne, 20 ex. le 13.09 à Harchies où la dernière est vue le 16.09. **Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* : des rassemblements de 100 à 200 ex. ont lieu jusqu'au 07.09 alors que du nourrissage est encore observé le 07.09 à Saint-Aubin. Le passage, assez calme en début de mois, s'intensifie le 08.09 avec 357 ex. à Bruxelles, 100 ex. à Éghezée-Longchamps et à Couthuin, 323 ex. en 2h à Ramecroix (Verviers) et 138 ex. en 3h35 à Benonchamps pour culminer le 09.09 avec 2.200 ex. en 1h à Jamagne, 500 ex. à Jamiolle, 770 ex. en 1h15 à Flémalle et 956 ex. à Ramecroix. Un deuxième pic, moins important, a lieu du 18 au 22.09 avec 192 ex. en 3h20 à Milliomont le 18, 250 ex. en 3h30 à Honnay le 19, 350 ex. à Jamiolle le 20, 102 ex. en 2h45 à Flémalle et 195 ex. en 5h10 à Honnay le 22. La migration se poursuit jusqu'au 25.10 avec des retardataires isolés le 1.11 à Harzé et le 18.11 à Escanaffles. **Hirondelle de fenêtre** *Delichon urbicum* : commencée fin août, la migration se poursuit en septembre. Du 01 au 07, les nombres, par site de suivi, ne dépassent la centaine que le 02 : 214 ex. le 02 à Ghlin. Un passage important s'amorce le 08 avec de nombreuses migratrices aux décanteurs d'Éghezée-Longchamps et 200 ex. en halte à Roly. Le lendemain, on note 200 ex. à Durbuy, 1.025 ex. en 1h à Flémalle, 120 ex. à Herstal et 400 ex. à Tintigny. Ensuite, le passage se calme même si, jusqu'au 22, on note jusqu'à 155 ex. en 2h45 le 11 à Flémalle, 300 ex. le 13 à Wibrin

Photo 11 - *Bergeronnette printanière. Harzé, 8 septembre 2009 / Yellow Wagtail. Harzé, 8 September 2009* (Photo : René Dumoulin).

et 212 ex. le 22 à Honnay. Les derniers migrateurs sont observés le 11.10 : 1 ex. à Xhoris et 2 ex. à Ramecroix (Verviers). Du côté des nichées, des jeunes sont encore nourris au nid le 06.09 à Florennes et le 15.09 à Serinchamps ; des nids sont occupés au moins jusqu'au 10.09 à Waha.

Pipit rousseline *Anthus campestris* : 62 données pour un total de 111 ex. témoignent d'un excellent passage automnal pour cette espèce. Déjà bien commencée en août, la migration se termine le 20.09 (2 ex. à Ghlin). **Pipit des arbres** *Anthus trivialis* : le passage, entamé en août, est surtout remarqué durant les deux premières décades de septembre. Les maxima enregistrés sont 34 ex. le 06.09 à Aldringen, 37 à Wardin et à Benonchamps le 08.09, 48 le 11.09 à Ramecroix (Verviers). Les nombres diminuent ensuite rapidement et le dernier est observé le 15.10 à Ghlin. **Pipit farlouse** *Anthus pratensis* : débuté timidement dès le 06.09 (7 ex. à Ghlin), le passage prend de l'ampleur fin septembre pour culminer en première décade d'octobre : 345 ex. le 01.10 à Angreau, 378 le 02.10 à Pecq, 407 le même jour à Boitsfort. Le 07.10 semble correspondre au pic de passage avec 3.447 oiseaux comptés depuis les différents postes de suivi. L'intensité de la migration diminue ensuite (605 oiseaux le 31.10) pour devenir moins perceptible en novembre. **Pipit spioncelle** *Anthus spinoletta* : les premiers individus sont contactés en octobre et début novembre : 8 ex. le 09.10 à Recogne, 2 ex. le 30.10 à Spa et 3 ex. le 02.11 à Quiévrain. **Bergeronnette printanière** *Motacilla flava* : le passage culmine au cours des deux premières décades de septembre : 62 ex. le 02.09 à Boitsfort, 58 le 05.09 à Branchon, 72 le 07.09 à Ramecroix (Verviers), 272 le 08.09 à Wardin. Les dernières le 17.10 à Clermont-sous-Huy et le 25.10 à Beaufays. **Bergeronnette flavéole** *Motacilla flava flavissima* : 1 ex. à Saint-Aubin, Harzé et Roly le 08.09 ainsi que le 20.09 à Florennes. **Bergeronnette printanière nordique** *Motacilla flava thunbergi* : 1 ex. à Branchon le 05.09, deux mâles le même jour à Chaumont-Gistoux, 8 ex. le 08.09 à Saint-Aubin et 1 mâle le même jour à Harzé clôturent le passage de cette espèce. **Bergeronnette des ruisseaux** *Motacilla cinerea* : la première migratrice est signalée le 02.09 à Torgny. Le passage, discret, se poursuit jusqu'au 28.10 (2 ex. à Sart-Saint-

Laurent) avant de nombreuses mentions d'hivernants en novembre. **Bergeronnette grise** *Motacilla alba* : le passage, étalé du début septembre à la mi-novembre, culmine la première quinzaine d'octobre. Fin novembre, quelques hivernants sont mentionnés dont 10 ex. le 29 à Éghezée-Longchamps et 6 le 30 à Hollogne-sur-Geer. **Bergeronnette de Yarrell** *Motacilla alba yarrelli* : 1 ex. le 09.09 à Pommeroeul et deux données de baguage les 06 et 09.10 à Beaufays.

Accenteur mouchet *Prunella modularis* : le passage, du début septembre à la fin octobre, est dans la moyenne des dernières années selon les résultats de stations de baguage spécialisées (Ampsin et Marchin). On retiendra 224 ex. bagués le 09.10 à Marchin.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* : la migration s'intensifie à partir du 10.09 et se poursuit jusqu'aux premiers jours de novembre. Deux pics se dégagent : les 17 et 18.09 avec, respectivement 98 et 41 ex. bagués aux Awirs et un second, moins prononcé, le 09.10 avec 22 ex. aux Awirs et 47 à Chevron. **Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* : seulement deux captures début septembre, le 08 à Beaufays et le 10 aux Awirs. **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* : l'essentiel des observations et des données de baguage concerne des juvéniles le plus souvent isolés au cours de la première quinzaine de septembre ; le dernier est vu le 25.09 à Harchies. **Rougequeue noir** *Phoenicurus ochruros* : le passage est décelé de septembre à fin novembre avec des individus en halte, parfois en groupes lâches (maximum 15 ex. le 13.09 à Fauvillers). La dernière mention automnale date du 22.11 : 1 ex. à Flamierge. **Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* : des migrateurs isolés font halte pendant tout le mois de septembre, un léger pic vers la moitié du mois : 6 ex. le 12.09 à Bolland et 4 ex. le 18.09 à Nassogne ; le dernier est noté le 04.10 à Mazée. **Tarier des prés** *Saxicola rubetra* : le passage est toujours intense dans la première quinzaine de septembre avec, entre autres, 15 ex. le 02.09 à Angre, 29 le 05.09 à Huissignies, 26 le 08.09 à Harzé et 20 le 26.09 à Ambly ; les quatre derniers individus sont notés le 07.10 à Tillet. **Tarier pâtre** *Saxicola torquatus* : la migration, essen-

Photo 12 - *Tarier pâtre. Harzé, 15 octobre 2009 / European Stonechat. Harzé, 15 October* (Photo : Christophe Bouhon).

tiellement composée d'individus isolés ou de petits groupes de moins de 5 pâtres culmine au cours de la seconde quinzaine de septembre. Le dernier le 31.10 à Harzé. **Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe* : le passage se poursuit en septembre. Quelques groupes lâches atteignent 15 ex. le 02.09 à Boneffe, 20 le 10.09 à Mehaigne et 18 le 14.09 à Obaix. Les observations sont plus rares au cours de la première quinzaine d'octobre et un dernier est noté le 24.10 au Fort de Flémalle.

Merle à plastron *Turdus torquatus* : 8 mentions totalisant 10 ex. entre le 11.09 et 17.10. **Merle noir** *Turdus merula* : le passage tant diurne que nocturne mais assez discret débute timidement à la mi-septembre et culmine durant les trois dernières semaines d'octobre et la première de novembre. Surtout décelable dans les stations de baguage, il se confirme par les suivis migratoires. Aux Awirs, le maximum de captures (11 ex. bagués) a lieu le 31.10. Des groupes de merles s'observent principalement en novembre, le plus important étant de 50 ex. le 30 à Strée-lez-Huy. **Grive litorne** *Turdus pilaris* : des rassemblements généralement inférieurs à la centaine d'individus se notent dans la zone de nidification, au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Hormis une troupe de 113 ex. le 18.10 à Mouscron, la migration débute fin octobre et se prolonge en novembre avec, parfois, des groupes de 150 à 450 grives, parfois en compagnie de mauvis : 150 ex. le 27.10 à Roisin, 230 le 31.10 à Honnay, 400 le 01.11 à Buissonville, le 12.11 à Tintigny et le 16.11 à Forge-Philippe, 450 le 25.11 à Breuvanne, 300 le 29.11 à Buissonville. **Grive mauvis** *Turdus iliacus* : dix premières sont signalées le 01.10 à Nassogne, mais les passages les plus importants sont notés entre le 11.10 (318 ex. à Harzé) et le 19.11 (250 ex. à Froidchapelle), dont deux observations dépassant le millier : 1.200 ex. en 5h30 le 31.10 à Harzé et 2.500 ex. sur l'ensemble de la journée le 02.11 à Bertrix. À partir du 20.11, l'espèce se raréfie progressivement en toutes régions. **Grive musicienne** *Turdus philomelos* : des petits groupes ne dépassant guère 15 ex. sont observés en septembre un peu partout en Wallonie ; un important mouvement est enregistré du 10.10 au 13.10 : 537 ex. en 3h00 le 10.10 et 349 en 4h00 le 11.10 à Harzé, 345 en 3h00 le 11.10 à Jamagne et 200 le 13.10 à Froidfontaine. Dès la mi-octobre, le passage diminue rapidement ; fin du mois et au cours de la première décade de novembre, il ne reste que de rares isolés. **Grive draine** *Turdus viscivorus* : des rassemblements de quelques dizaines d'individus sont signalés jusqu'à la fin octobre, par exemple, à Angreau (40 ex. le 01.09), à Flobecq où le maximum (29 ex.) est atteint le 08.09, à Bihain (50 ex. le 04.10), à Harzé (30 ex. le 01.09 et le 24.10). Le premier migrateur est repéré le 06.09 à Flémalle où le passage culmine avec 24 ex. le 11.10 ; ce passage se prolonge jusqu'au 10.11. Par la suite, seules quelques draines sont encore mentionnées, parmi lesquelles un chanteur le 17.11 à Maillen et le 25.11 à Izel.

Bouscarle de Cetti *Cettia Cetti* : un chanteur le 18.10 à Pécrot, seule mention en dehors du Hainaut occidental. **Locustelle tachetée** *Locustella naevia* : la migration postnuptiale se poursuit jusqu'au 29.09 dans les stations de baguage avec notamment 5 captures à Bolland et Beaufays ainsi que 3 aux Awirs le 12.09. **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* : le passage se poursuit en septembre avec encore des nombres relativement élevés le 06 à Harchies (9 ex. bagués) et Stockay (13 ex. bagués). Le dernier est noté le 27.09 à Bolland. **Rousserolle effarvatte** *Acrocephalus scirpaceus* : la migration est encore très active au cours des trois premières semaines de septembre avec des captures atteignant 40-50 individus par jour dans diverses stations de baguage, avant de diminuer. Les dernières sont repérées le 29.10 aux Awirs et le 02.11 à Hollogne-sur-Geer. **Rousserolle verderolle** *Acrocephalus palustris* : encore une vingtaine de juvéniles bagués en septembre, le dernier le 20 à Stockay. **Hypolaïs ictérine** *Hippolais icterina* : deux captures en septembre, les 08 et 17 aux Awirs.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : la migration, surtout repérée au baguage, est très intense durant tout le mois de septembre et les cinq premiers jours d'octobre ; elle se poursuit jusqu'aux premiers jours de novembre. Aux Awirs, le record est à nouveau battu avec 6.781 ex. bagués de juillet à novembre. Trois mentions de candidats à l'hivernage la dernière décade de novembre : un mâle le 21 à Ombret, 1 ex. le 22 à Obourg et une femelle le 29 à Rhisnes. **Fauvette des jardins** *Sylvia borin* : la migration se poursuit en septembre avec, aux Awirs, une journée particulière le 10 (61 ex. bagués). Les dernières le 01.10 à Beaufays (1 ex.) et aux Awirs (2 ex.). **Fauvette épervière** *Sylvia nisoria** : un jeune est bagué le 12.09 à Nodebais. **Fauvette babillarde** *Sylvia curruca* : des mentions

Photo 13 - *Gobemouche noir. Ivoz-Ramet, septembre 2009 / European Pied Flycatcher. Ivoz-Ramet, September 2009* (Photo : Charly Farinelle).

Photo 14 - *Gobemouche gris. Ivoz-Ramet, septembre 2009 / Spotted Flycatcher. Ivoz-Ramet, September 2009* (Photo : Charly Farinelle).

tant de captures que d'observations visuelles se poursuivent régulièrement en septembre et durant la première décade d'octobre ; les dernières sont vues le 09.10 à Flémalle et le lendemain à Hemptinne-lez-Florennes. Aux Awirs, le total du passage postnuptial est de 47 ex., soit, à nouveau, le meilleur résultat des dix dernières années. **Fauvette grisette** *Sylvia communis* : les observations se prolongent tout au long du mois de septembre. Aux Awirs, la journée du 10 est exceptionnelle : 66 ex. bagués. Le total du passage postnuptial s'y élève à 397 individus bagués, soit près de 50 % en plus que le maximum précédent atteint en 2006. Les dernières mentions datent du 05.10 aux Awirs, du 06 à Bolland et du 08 à Jamagne. **Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* : des rassemblements lâches de 20-30 pouillots sont signalés tout le mois de septembre, avec un maximum d'une cinquantaine le 13 à Fauvillers. Dans les stations de baguage, le passage est important de la mi-septembre à la fin de la première décade d'octobre mais les nombres par station ne dépassent guère la vingtaine par jour, à l'exception de 74 ex. le 26.09 et 62 le lendemain à Bolland. Aux Awirs, le nombre de captures de l'automne (232 ex.) est dans la moyenne des dernières années. Encore 13 mentions d'isolés au cours de la dernière décade de novembre. **Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* : aux Awirs, le total des oiseaux bagués (126 ex.) lors de la migration postnuptiale est supérieur à ceux des deux années précédentes mais reste faible par rapport aux résultats des années 1990. Dans toutes les stations de baguage, les captures ne dépassent pas la dizaine par jour au cours de la première quinzaine de septembre avant de s'espacer. Les dernières observations datent de début octobre : 1 ex. le 1er à Bossut-Gottechain, 2 captures le 02 aux Awirs, 1 ex. le 04 à Seraing et le 11 à Bossut-Gottechain.

Roitelet huppé *Regulus regulus* : comme en 2008, aucun mouvement migratoire significatif n'est signalé cet automne. **Roitelet à triple-bandeau** *Regulus ignicapilla* : quelques captures au baguage (6 ex. le 23.10 à Beaufays) et quelques observations visuelles ne permettent pas de déceler une période de passage particulière. Des contacts persistent jusqu'à la fin novembre.

Gobemouche gris *Muscicapa striata* : l'espèce reste mentionnée jusqu'au 22.09. Retenons 4 ex. le 06.09 à Ivoz-Ramet, 3 ex. le lendemain à Angre et 3 encore le 15.09 à Buissonville. **Gobemouche noir** *Ficedula hypoleuca* : 25 mentions de 1-2 ex. en septembre, le dernier le 24 à Soignies.

Photo 15 - *Panure à moustache. Hesbaye, 19 octobre 2009 / Bearded Reedling. Hesbaye, 19 October 2009* (Photo : Jules Fouarge).

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* : l'espèce est rencontrée sur cinq sites cet automne : Ploegsteert (1 ex. le 06.11, 3 ex. le 08.11), Harchies (du 09.10 au 17.11, maximum 14 ex. le 15.10), Hollogne-sur-Geer (2 ex. le 19.10, 1 le 30.11), Fosses-la-Ville (1 mâle le 31.10) et Virelles (un mâle et une femelle le 02.10). **Mésange bleue** *Cyanistes caeruleus* : le passage est faible cet automne avec seulement 36 ex. bagués en octobre et novembre aux Awirs. **Mésange charbonnière** *Parus major* : passage faible également avec 29 ex. bagués pendant la période de migration aux Awirs. **Rémiz penduline** *Remiz pendulinus* : observée sur cinq sites : 1 ex le 15.10 à Harchies, 3 ex. le 16.10 aux Marionville, 2 ex. du 09.10 au 12.10 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. le 02.11 à Hollogne-sur-Geer, ainsi que 2 adultes et 3 juvéniles le 10.10 à Lahérie.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : observation régulière de juvéniles au cours des trois premières semaines de septembre ; les deux dernières le 04.10 à Sart-en-Fagne et Roly. **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* : mentionnée sur une soixantaine de sites au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Au nord de celui-ci, des isolées le 28.09 à Beauvechain, le 27.10 à Éghezée-Longchamps et le 11.11 à Mont-Saint-Guibert.

Geai des chênes *Garrulus glandarius* : pas de migration manifeste décelée. **Cassenoix moucheté** *Nucifraga caryocatactes* : toutes les mentions proviennent de l'aire de nidification ; elles concernent fréquemment des cassenoix faisant provision de noisettes. **Choucas des tours** *Corvus monedula* : passage en assez petit nombre de fin septembre à début novembre ; au plus 265 ex. passent en 2h le 14.10 à Angreau et 120 le 01.11 à Basècles. **Corbeau freux** *Corvus frugilegus* : passage peu important concentré du 18.10 au 08.11 ; maximum 176 migrateurs le 01.11 à Polleur et 144 le 31.10 à Honnay. **Grand Corbeau** *Corvus corax* : fréquentes mentions de 1-3, parfois 4-6 ex. ensemble dans l'aire de nidification et ses abords. Dans l'ESM, des oiseaux sont vus jusqu'à Virelles le 16.10 et aux BEH le lendemain. En Ardenne, un rassemblement important pour nos régions compte 24 ex. le 15.09 et 14 au moins le 02.10 à Ambly ; toujours dans la commune de Nassogne, un dortoir de 26 corbeaux est signalé le 10.10 à Masbourg. Les mentions de dortoirs restent rares en Wallonie.

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* : entre vols locaux et réels migrateurs, le début des passages est difficile à déceler. La migration est faible en octobre avant le passage principal débutant le 19.10 ; les flux restent le plus souvent modestes, atteignant au plus 3.160 ex. le 20.10 à Sart-Saint-Laurent et 2.925 ex. en 4h le 27.10 à Flémalle. En fin de migration, encore 3.750 étourneaux passent le 12.11 à Cielle (La Roche).

Moineau friquet *Passer montanus* : quelques rassemblements dépassent la trentaine en septem-

Photo 16 - *Pinson des arbres. 26 octobre 2009 / Common Chaffinch. 26 October 2009* (Photo : Jules Fouarge).

bre : 60 ex. le 06 à Remagne, 50 le 12 à Bastogne, 40 les 17 et 18 à Witry, 30 le 21 à Jodoigne, 35 le 22 à Maillen et 50 le 26 à Saint-Aubin. La migration débute timidement le 27.09 avec 3 ex. à Aldringen. Les nombres de migrateurs sont faibles avec des maxima journaliers une seule fois au-delà de la centaine (116 le 13.10 à Xhoris). Avec 190 ex. bagués, l'année est un peu meilleure qu'en 2008 aux Awirs. Quelques rassemblements assez modestes sont observés en novembre : 50 ex. les 21 et 27 à Flobecq, 46 le 22 à Escanaffles.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : les premiers migrateurs sont signalés le 18.09 à Flémalle. Le passage est faible avec, comme maxima, 2.400 ex. en 3 h à Angreau et 2.200 ex. à Mouscron le 23.10. **Pinson du Nord** *Fringilla montifringilla* : le premier apparaît le 27.09 à Harzé. Comme pour le Pinson des arbres et la plupart des granivores, la migration est faible. Les maxima journaliers par site ne dépassent pas 50 ex. et se situent le plus souvent sous la dizaine d'oiseaux. **Serin cini** *Serinus serinus* : tardivement, 2 mâles le 26.11 à Gembloux. **Verdier d'Europe** *Carduelis chloris* : le passage est faible avec, comme maximum, 23 ex. le 19.10 à Flémalle. Quelques rassemblements importants sont mentionnés à partir de la fin octobre : par exemple, 550 individus le 29.10 à Saint Aubin, 400 le 07.11 à Roux-Miroir et 600-700 du 10 au 17.11 entre Thulin et Pommeroeul, chaque fois dans des champs de tournesol. **Chardonneret élégant** *Carduelis carduelis* : les migrateurs sont rares ; retenons toutefois 47 ex. le 11.10 à Havinnes et 27 ex. le 20.10 à Ramecroix (Verviers). À la station d'Èthe, seulement 248 ex. ont été bagués en automne, contre 663 en 2008. À partir de la fin octobre, quelques bandes en halte, dont 90 ex. le 25.10 à Yvoir et 50 ex. le 08.11 à Strée-lez-Huy. **Tarin des aulnes** *Carduelis spinus* : sans être important, le passage débute au cours de la troisième décade de septembre et se poursuit jusqu'à la fin de novembre. Les volées les plus importantes comptent 200 ex. le 10.10 à Buissonville et 300 ex. en halte le 11.11 à Harzé. **Linotte mélodieuse** *Carduelis cannabina* : quelques groupes importants sont encore signalés en septembre : 250 ex. le 04 à Latour et 300 ex. le 06 à Nadrin. La migration est observée dès le début de ce mois et devient importante à la fin de la première décade d'octobre : 200 ex. à Milliomont et 204 ex. à Ramecroix le 07.10, 580 ex. à Angre et 280 ex. à Xhoris le 09.10. Notons aussi un passage de 300 ex. le 23.10 à Xhoris et un groupe posé de 200 ex. le 29.11 à Villers-le-Temple. **Linotte à bec jaune** *Carduelis flavirostris** : un mâle capturé le 27.10 à Sommethonne. **Sizerin flammé** *Carduelis flammea* : quelques groupes de moins d'une dizaine sont mentionnés à partir du 13.10 ; 31 en vol le 08.11 à Benonchamps. **Bec-croisé des sapins** *Loxia curvirostra* : présent tout l'automne. Les groupes, en général de taille inférieure à une trentaine, sont signalés surtout au cours de la première quinzaine

Photo 17 - *Sizerin flammé cabaret. Ombret, 25 novembre 2009 / Lesser Redpoll. Ombret, 25 November 2009* (Photo : Jules Fouarge).

de novembre ; au plus 100 ex. le 17.10 à Suxy. **Bouvreuil pivoine** *Pyrrhula pyrrhula* : la migration est très faible cet automne. **Grosbec casse-noyaux** *Coccothraustes coccothraustes* : passage faible également avec, comme maxima, 19 ex. à Honnay et 10 ex. à Pesche le 25.10. Fin novembre, des rassemblements de 80 ex. le 28.11 à Houffalize et 50 ex. le 29.11 à Villers-le-Temple.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis** : une mention étonnante de 8 ex. en vol le 21.10 à Sommethonne ; également, 2 ex. le 11.11 à Aische-en-Refail et une femelle le 18.11 à Voroux-Goreux. **Bruant jaune** *Emberiza citrinella* : le passage culmine durant la dernière décade d'octobre mais il ne dépasse pas 15 ex. par jour pour l'ensemble des stations de suivi. Novembre voit, comme d'habitude, des rassemblements de plusieurs dizaines dont le plus important totalise 150 ex. le 29.11 à Saint-Rémy-Geest. **Bruant ortolan** *Emberiza hortulana* : 3 ex. le 02 à Ghlin et 5 mentions d'isolés durant la première quinzaine de septembre : le 08 à Heyd, le 10 à Rouvroy et Torgny, le 11 à Flémalle et le 12 à Bonsin. **Bruant des roseaux** *Emberiza schoeniclus* : le premier migrateur est repéré le 13.09 à Havinnes. La migration se poursuit jusqu'aux derniers jours de novembre avec un pic au cours de la deuxième décade d'octobre. Retenons particulièrement, 72 ex. le 13.10 à Aldringen. **Bruant proyer** *Miliaria calandra* : des rassemblements généralement de 10 à 40 individus sont notés tout l'automne dans le Brabant wallon et la région de Boneffe, avec, en exergue, 115 ex. le 26.09 à Orbais. Les cultures fréquentées sont les betteraves puis, après leur arrachage, les champs de moutarde, plus rarement le colza. Retenons également une capture le 14.10 à Bolland, 2 ex. accompagnant friquets et bruants jaunes à une mangeoire pour perdrix le 27.10 à Angreau, 1-4 ex. le 28.10 à Jamagne, 30 ex. le 15.11 à Oleye et 11 ex. le 21.11 à Voroux-Goreux.

Remerciements – Avec le développement de l'encodage en ligne, le nombre de contributeurs a explosé, comme celui des données. De ce fait, il devient impossible de remercier ici nommément tout le monde. Nous sommes donc redevables aux quelque 900 observateurs qui ont contribué à documenter cette synthèse saisonnière. Nous remercions aussi le Centre Belge de baguage, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (SPP Politique scientifique) et tous les bagueurs bénévoles qui collectent les données et participent au financement du système. Merci à tous.

Summary – **Observations September to November 2009**

Overall, the migration was much as usual, with no exceptional passage.There were fewer than usual sightings of Cranes *Grus grus*, and of several waders – in particular there were fewer Golden Plovers *Pluvialis apricaria*, Wrynecks *Jynx torquill*, Goldcrests *Regulus regulus*, tits, Jackdaws *Corvus monedula*, Rooks *Corvus frugilegus*, Starlings *Sturnus vulgaris*,Tree Sparrows *Passer montanus*, fewer finches and also probably fewer Yellowhammers *Emberiza citrinella*. On the other hand, various rare Passerines were unusually common, including Wood Larks *Lullula arborea* and Blackcaps *Sylvia atricapilla*. The year-on-year increase in the number of egrets is particularly striking; in some locations there were even more Great Egrets *Ardea alba* than there were herons *Ardea cinerea*.

The greatest rarity to have been reported this season was a Black-winged Pratincole *Glareola nordmanni* seen in Wallonia on September 25 and 26. Other notable visitors include Barred Warbler *Sylvia nisoria*, Pallid Harrier *Circus macrourus*, Red-footed Falcon *Falco vespertinus*, White-tailed Eagle *Haliaeetus albicilla*, Red Phalarope *Phalaropus fulicarius*, Twite *Carduelis flavirostris* and Snow Bunting *Plectrophenax nivalis* (three sightings).