


OBSERVATIONS DE JUIN À AOÛT 2010

Centrale Ornithologique Aves
Groupe de travail « Chroniques » ⁽¹⁾




C.-H. Born

L'été 2010

Sous l'influence prédominante des courants maritimes et tropicaux, le mois de juin fut assez chaud, très ensoleillé et sec. À la suite, juillet fut particulièrement ensoleillé et chaud, surtout durant les deux premières décades. En fin de mois, le passage de plusieurs dépressions a marqué la transition vers un net changement de temps en août qui fut dans l'ensemble très couvert et pluvieux, mais avec des températures strictement normales. Certaines dépressions furent fort pluvieuses, comme celles des 15-17, et un rafraîchissement sensible intervint en toute fin de mois, sous l'influence de courants polaires.

En juin, les queues de migration furent classiques, avec encore quelques limicoles, Guifettes noires, Tariers des prés, Traquets motteux ou encore Rousserolles effarvattes. Certaines réinstallations de nicheurs ont alors été notées, comme chez les hirondelles ; parmi elles, les Hirondelles de rivage ont eu une reproduction nettement plus échelonnée que d'habitude. Tout aussi normale fut l'amorce des migrations estivales de limicoles dès la seconde quinzaine de juin, suivies par celles des rousserolles et du Phragmite des joncs dès début juillet. Après un premier Gobemouche noir de passage le 20, la fin du mois a vu s'amorcer la migration d'un nombre croissant d'espèces regagnant l'Afrique tropicale (Martinet noir, Tourterelle des bois, Balbuzard, Rossignol, Locustelle tachetée, Fauvettes des jardins, grissette et babillarde, Pouillot fitis...). D'autres passages s'initient dès début août : par exemple, le Busard des roseaux, les Pipits des arbres et rousseline, le Motteux et le Tardif des prés dès les premiers jours du mois, la Gorgebleue et la Fauvette à tête noire au mitan de celui-ci et le Faucon émerillon le 28. La plupart des mouvements se renforcent ou culminent en cours de mois. Dans l'ensemble, le passage estival visible fut toutefois assez souvent sans abondance particulière, comme chez la Cigogne blanche, la Bondrée, la Marouette ponctuée ou les laro-limicoles, hormis le Pluvier guignard. L'été voit le Goéland brun rester abondant.

⁽¹⁾ Les rédacteurs de la présente chronique sont T. Baudoux, A. Burnel, M. Derume, A. De Broyer, A. Dirick, P. Duchesne, C. Huyghebaert, P. Loly, T. Mariage, T. Ory et J.-P. Jacob.



Au niveau des nicheurs, l'installation de la Sterne pierregarin et de plusieurs hérons (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-bœufs) se confirme. Si l'apparente bonne santé de quelques oiseaux d'eau (Tadorne de Belon, Canard chipeau, Grèbe à cou noir) et du Torcol est à souligner, des recensements partiels indiquent un niveau de population assez moyen chez l'Hirondelle de rivage (plus de 2.000 comptés) et un effectif régional bien maigre chez l'Engoulevent (une quarantaine de cantons, pour moitié dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse). Cet été permet aussi d'enregistrer une nouvelle reproduction de Nette rousse (origine inconnue), celle de plusieurs couples de Blongios et d'un couple de Locustelle lusciniöide en Hainaut, l'installation de couples de Milans noirs dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, des tentatives de reproduction de Guêpiers et de Huppes, peut-être de Rousserolles turdoïdes et de Bergeronnettes flavéoles. Côté busards, l'année est maigre pour le Cendré, mais plus positive pour ses congénères ; en particulier, le Busard Saint-Martin confirme son statut de nicheur devenu annuel. Par contre, la rareté des Râles des genêts est indubitable et certains oiseaux n'ont pas confirmé leurs nidifications de 2009 (Grande Aigrette, Locustelle fluviatile), tandis que la Grive litorne et le Serin cini poursuivent leurs reculs. La faiblesse des effectifs de quelques espèces sensibles aux froids hivernaux, comme le Martin-pêcheur, se remarque aussi, tout comme la fréquence des Becs-croisés des sapins en Haute-Belgique en début d'été. Pour d'autres espèces, une attention insuffisante ne permet pas de se forger une idée précise quant à leur situation en 2010.

Les quelques visiteurs rares de cet été sont tous des oiseaux dont la venue est devenue annuelle ou presque : Circaète Jean-le-Blanc (3), Vautour fauve (1), Élanion blanc (1), Oedicnème criard (3), Chevalier stagnatile (1), Phalarope à bec large (1), Sterne arctique (1), Fauvette épervière (2), Pie-grièche à tête rousse (1).

Données

La présente chronique se base sur 52.717 données qui proviennent pour l'essentiel de l'interface d'encodage en ligne « observations.be ». Les données transmises à « trektellen » sont également utilisées. Au total, 842 observateurs ont fourni des données, mais seule la moitié d'entre eux ont contribué pour plus de dix données.

Détail des observations

Abréviation dans le texte : BEH = barrages de l'Eau d'Heure ; ESM = Entre-Sambre-et-Meuse. Le complexe marécageux de Harchies-Hensies-Pomme-roeuil est souvent simplement libellé « Harchies ».

Les espèces dont les données sont soumises à homologation en raison de leur rareté et des risques de confusions avec d'autres oiseaux sont marquées d'un astérisque. Pour ces espèces, cette chronique ne reprend que les mentions effectivement docu-

mentées. Pour soumettre une observation ou capture de ces oiseaux à la Commission d'Homologation, il suffit d'envoyer une description de l'oiseau au secrétaire (bonmarchand@skynet.be), si possible complétée par des photos, dessins ou tout élément probant. Une fiche « type », ainsi que d'autres documents et informations, sont disponibles sur le site de la CH : <http://users.skynet.be/ch-web/>.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* : des naissances sont mentionnées tant en Wallonie qu'à Bruxelles jusqu'à la fin juillet. Des groupes de plus de 15 ex. sont observés à Bruxelles, Freux et Virelles où un maximum de 36 ex. est enregistré le 06.07. **Oie cendrée** *Anser anser* : les 7 jeunes nés le 27.04 sont présents tout l'été à Harchies. À Éghezée-Longchamps, 3 ex. sont notés à la mi-juin et un groupe d'une vingtaine d'oiseaux se constitue le 13.07 ; leur nombre fluctue ensuite entre 20 et 35 ex. jusqu'au 20.08 puis atteint un maximum de 52 ex. le 28.08. Ailleurs, en dehors d'isolés d'origine incertaine, 10 individus le 16.06 sur l'Ourthe à Esneux, 3 ex. en vol le 19.07 à Sourbrodt, 3 ex. le 06.08 à Obourg, 3 ex. le 08.08 à Bailleul et Pont-à-Celles ainsi que 10 ex. le 13.08 aux décanteurs de Hologne-sur Geer. **Oie à tête barrée** *Anser indicus* : en juin, 3 ex. sont signalés le 02 à Visé, et 1 le



Photo 1 – *Cygne tuberculé*.
Freux, 5 juin 2010 / Mute
Swan. Freux, 5 June 2010
(Photo : Jules Fouarge)

24.06 à Thuin. En août, 1 ex. le 04 à Lanaye et le 14 à Chastre. **Bernache du Canada** *Branta canadensis* : comme d'habitude, les sites de mue accueillent plusieurs dizaines d'oiseaux en juin, parfois plus de cent : 110 ex. le 15.06 à Freux, 150 ex. le 20.06 à Jambes, 132 le 29 à Vervoz... Des concentrations plus importantes se rencontrent en juillet-août, atteignant 250 ex. le 30.07 à Freux, 250 le 14.08 et 420 le 28.08 à Éghezée-Longchamps. **Bernache nonnette** *Branta leucopsis* : une famille avec trois jeunes le 24.07 à Bléharies, première nidification prouvée depuis 2004. Ailleurs, 1-2 ex. pâturant aux abords d'étangs ou de décanteurs wallons. **Ouette d'Égypte** *Alopochen aegyptiaca* : les rassemblements estivaux semblent moins importants que l'été précédent avec 65 ex. le 03.08 à Lixhe et 60 ex. le 10.08 à Bierges, alors que les nombres de 2009 avoisinaient le double.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : en plus des couvées écloses en mai, on signale 1 nichée à Froyennes, 2 aux Marionville, à Héringnes et à Holognes-sur-Geer ainsi que 3 nichées supplémentaires aux décanteurs de Warcoing, ce qui porte à 5 le nombre total pour ce dernier site. **Canard mandarin** *Aix galericulata* : mentionné dans dix localités au cours de l'été mais une seule nidification est ren-



Photo 2 – *Ochette d'Égypte*. Liège, juin 2010 / Egyptian
Goose. Liège, June 2010 (Photo : Charly Farinelle)



seignée : 7 jeunes le 22.06 au Rouge-Cloître, à Auderghem. **Canard siffleur** *Anas penelope* : signalé sur 5 sites : Baudour (1 ex. le 11.06), Virelles (2 ex. le 26.06), Malèves-Sainte-Marie-Wastines (1 ex. le 27.06), Éghezée-Longchamps (1 ex. le 09.07) et Harchies (3 ex. le 09.08, 2 ex. les 20 et 21.08). **Canard chipeau** *Anas strepera* : avec au moins 15 couples nicheurs à Harchies-Hensies-Pomme-roeuil et 4 aux Marionville, le bassin de la Haine reste une valeur sûre pour cette espèce. Des nidifications sont aussi notées ailleurs : 1 nichée aux décanseurs de Frasnes-lez-Anvaing, de Hollogne-sur-Geer et de Genappe ainsi qu'à Ploegsteert. En fin d'été, 105 ex. à Hensies le 28.08. **Sarcelle d'hiver** *Anas crecca* : de 1 à 4 ex. sont signalés en juin sur 9 sites sans qu'aucune preuve de nidification puisse être apportée. L'augmentation des effectifs et du nombre de sites fréquentés est sensible jusqu'à la mi-août. Après cette date, les maxima sont de 49 ex. le 21.08 à Harchies, 40 ex. le 26.08 à Genappe, 40 ex. le 31.08 à Hollogne-sur-Geer et surtout de 175 ex. le 29.08 aux Marionville où l'effectif a doublé en une semaine, peut-être suite à la baisse du niveau des eaux. **Canard colvert** *Anas platyrhynchos* : dans la masse de données, pointons quelques densités de nicheurs sur des décanseurs : minimum 12 nichées le 05.07 à Brugelette, 11 nichées le 06.07 à Warcoing et 14 nichées sur la saison à Genappe. En août, en dehors de sites de lâchers cynégétiques, parfois en nombre, on note par exemple un maximum de 370 ex. le 30 à Gaurain-Ramecroix. **Canard pilet** *Anas acuta* : observé sur 5 sites au cours de l'été : 1 ex. le 01.06 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. le 16.06 à Ploegsteert, 1 à 2 ex. régulièrement à Harchies à partir du 25.06, 1 ex. en vol le 17.08 à Autelbas et 1 autre le 28.08 à Havinnes. **Sarcelle d'été** *Anas querquedula* : en juin, l'espèce est signalée sur 3 sites : Ploegsteert (1 mâle le 04), Baudour (1 mâle le 15) et Harchies (max. 3 ex. le 17) mais aucune preuve de nidification n'est apportée. En juillet et août, l'espèce est renseignée sur 11 sites avec des maxima de 7 ex. le 13.08 à Hollogne-sur-Geer, 13 ex. le 14.08 à Harchies et 5 ex. le 21.08 à Virelles. **Canard souchet** *Anas clypeata* : malgré la présence de l'espèce sur une douzaine de sites en juin, aucune nidification certaine n'est signalée. Les mouvements perceptibles dès début juillet prennent surtout de l'ampleur à partir de la mi-août ; on note à cette période des maxima de 280 ex. le 20.08 à Harchies, 68 ex. le 23.08 aux Marionville et 52 ex. le 28.08 à Virelles.

Nette rousse *Netta rufina* : une femelle avec 3 pulli le 27.06 à Malèves-Sainte-Marie (Brabant wallon) ; il ne reste que 2 poussins le 08.07. Il s'agit de la première reproduction depuis celles observées de 2001 à 2006 à Harchies ; ici, 1 mâle séjourne en juin-juillet. Ailleurs, 2 femelles le 20.06 à Roisin et des observations d'un mâle, parfois aussi d'une femelle en juillet-août au Rouge-Cloître (Auderghem). **Fuligule milouin** *Aythya ferina* : alors que l'Atlas mentionne une trentaine de sites de reproduction, les nichées rapportées ne concernent qu'un tiers des sites. La moitié de ceux-ci sont situés en Hainaut, les autres se répartissant entre les bassins de décansement de la région limoneuse. Six jeunes sont aussi observés à Virelles le 06.07. Les premiers rassemblements sont notés dès le 15.06 à Harchies où un maximum de 230 individus est atteint le 01.07. Ce fuligule fréquente les étangs de Freux, Étalle et Latour mais sans s'y reproduire. **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca* : 2 sites, Ploegsteert et Harchies, accueillent de 1 à 2 ex. entre le 02.06 et 10.07. Aucune nichée n'y est rapportée. **Fuligule morillon** *Aythya fuligula* : comme pour le Fuligule milouin, le nombre de sites de reproduction rapportés est très inférieur à celui de l'Atlas, y compris en Ardenne. De nouvelles familles sont encore repérées fin août, le 30 à Séviscourt et le 31 à Brugelette. Dès début août, des regroupements de plus de 100 ex. sont notés au nord du sillon sambro-mosan avec un maximum de 186 ex. le 10.08 à Obourg ; sur les étangs ardennais, les groupes sont moins importants, tout au plus une petite cinquantaine d'oiseaux. **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* : une femelle porteuse d'une bague d'élevage est à nouveau revue en juin et juillet à Harchies. **Harle bièvre** *Mergus merganser* : une femelle, blessée, est signalée jusqu'au 16.07 à Harchies. Sur l'Ourthe liégeoise, un mâle handicapé, probablement celui faisant l'objet de l'article paru dans *Aves* 47/4 pp 201-212, est parfois accompagné d'une femelle. Ailleurs, 1 ex. en vol le 18.07 à Butgenbach.

Caille des blés *Coturnix coturnix* : des chanteurs sont relevés dans près de deux cents localités sur l'ensemble de l'été. La seule densité locale très élevée est de 14 chanteurs entendus sur environ 5 hectares le 15.07 à Angre.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* : 8 sites avec au moins 25 ex. (adultes et pulli) en août. L'étang du Grand Vivier à Gozée et les Marionville accueillent jusqu'à 32 oiseaux. Les décanseurs de Hollogne-sur-Geer, d'Éghezée-Longchamps, de Genappe et de Frasnes-lez-Anvaing comptent des maxima res-



Photo 3 – Cigogne noire. Nassogne, juillet 2010 / Black Stork (Photo : Charly Farinelle)

pectifs de 31, 27, 25 (9 nichées) et 38 ex. Virelles et Harchies abritent quant à eux des minima de 37 et 75 ex. **Grèbe huppé** *Podiceps cristatus* : renseigné nicheur sur à peine une vingtaine de plans d'eau, toujours en petits nombres hormis Harchies qui en compte minimum 20 le 03.06. Ce site accueille au plus 113 ex. (adultes et pulli) le 11.07. Citons encore 38 ex. le 28.06 aux carrières d'Obourg et 65 ex. le 29.08 à Roly. **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* : une première reproduction (2 couples) cet été à Virelles. Ce grèbe est aussi signalé nicheur sur les sites classiques de Ploegsteert, Harchies, Frasnes-lez-Anvaing, Genappe et Hologne-sur-Geer. Des parades ont eu lieu à Éghezée-Longchamps mais la nidification n'a pas été constatée. Des oiseaux de passage sont aussi mentionnés aux Marionville, à Brugelette, Gozée et Amay. Au vu des données, il est difficile de se faire une idée du nombre exact de couples nicheurs sur les différents sites.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* : un groupe de 37 ex. passe le 03.08 au-dessus de Mouscron. La migration ne devient cependant régulière qu'à la fin du mois d'août : une bande de 25 ex. le 28 au Gerny, 69 ex. en plusieurs groupes dont un de 25 individus le 28 à Havinnes, 33 ex. en 3 volées le 29 à Montignies-sur-Roc et 50 ex. le 31.08 à Strée-lez-Huy.

Blongios nain *Ixobrychus minutus* : en juin, 1 chanteur le 07 aux décanteurs de Stockay, 1 mâle le 09 aux Marionville et un couple le 20 à Ploegsteert mais sans preuve de nidification malgré l'observation des deux oiseaux les mois suivants. Par contre, en août, 3 couples nourrissent leurs jeunes le 20 à Harchies. Ce même jour, un Blongios se repose aux décanteurs d'Hologne-sur-Geer. **Héron pourpré** *Ardea purpurea* : un estivant possible est observé les 06.06, 11.06, 07.07 et 08.08 à Harchies. Un ex. en vol le 22.07 à Roisin et deux mentions en août : 1 ex. le 12 sur la Semois entre Tintigny et Chassepierre et 2 ex. en migration le 21 à Havinnes. **Grande Aigrette** *Casmerodius albus* : outre des mentions ponctuelles de 1-2 ex. sur près d'une vingtaine de sites, des maxima de 12 ex. sont signalés le 20.08 à Harchies et de 4 ex. le 31.08 à Virelles. **Aigrette garzette** *Egretta garzetta* : totalisant un nombre jamais atteint auparavant, Harchies accueille 67 ex. au dortoir et à la colonie, dont au moins 22 juvéniles le 14.07. Ailleurs, des isolés à Ploegsteert, Baudour, Angre, Hautrage, aux Marionville, à Breuvanne et sur la Semois entre Tintigny et Chassepierre. Également 2 ex. le 16.08 sur l'Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur. **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax** : 3 nids sont dénombrés le 03.06 à Harchies où 6 adultes, 1 subadulte et au moins 5 juvéniles sont recensés le 28.08 en soirée. Deux observations supplémentaires concernent 1 ex. le 16.06 à Hologne-sur-Geer et 2 ex. le 19.07 à Seneffe. **Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis** : comme l'an passé, 2 voire 3 couples nicheurs à Harchies où les premiers pulli sont visibles dans un des nids à partir du 03.06. **Spatule blanche** *Platalea leucorodia* : présence d'au moins 1 ex. à partir du 17.06 à Harchies avec maximum 4 ex. (3 adultes et 1 immature) entre le 24.07 et le 07.08.

Cigogne noire *Ciconia nigra* : seulement quelques mentions de nids et familles. Parmi les petits groupes visibles après la nidification, citons 7 ex. le 20.07 à Olloy-Sur-Viroin, 11 ex. le 01.08 à Sainte-Marie-Chevigny et 6 ex. le 20.08 à Thommen. **Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* : de 1 à 3 ex. sur



Photo 4 – Milan noir. France, 21 juillet 2010 / Black Kite, 21 July 2010 (Photo : J. Fouarge)

16 sites en juin dont 2 estivants à Sainte-Marie-sur-Semois. Quelques mentions en juillet (notamment 6 ex. en vol le 04 à Liège), se multipliant en fin de mois (e.a. un vol de 12 ex. le 25.07 à Thulin). Le passage s'amplifie à la mi-août : 30 ex. le 14 à Rhisnes et le 15 à Pesche, 20 ex. le 17 à Beuzet, 23 ex. le 28 à Courrière et 62 ex. le 31 à Corroy-le-Grand où les oiseaux passent la nuit sur les lampadaires de l'autoroute E411 Namur-Bruxelles.

Bondrée apivore *Pernis apivorus* : la migration débute à la fin de la seconde décennie d'août : 22 ex. le 19 et 18 le 20 à Torgny. **Milan noir** *Milvus migrans* : mentionné régulièrement tout l'été. Début juin, 6 ex. le 1^{er} au dépotoir de Habay-la-Neuve semblent être des oiseaux locaux mais 7 ex. en vol vers le nord le 13 à Breuvanne sont interpellants. Hors Lorraine, la nidification est signalée à Couvin ainsi qu'à Forge-Philippe et du transport de branches est observé à Virelles. Dès la mi-juillet, des regroupements de 10 à 20 ex. sont renseignés sur les prés de fauche, principalement en Lorraine où des rassemblements imposants s'observent en fin de mois à Habay-la-Neuve : 44 ex. le 24, une cinquantaine le 30. Le nombre d'observations diminue fortement en août. **Milan royal** *Milvus milvus* : plus de 600 données mais peu de nidifications réussies sont signalées. Des regroupements sont observés dès la fin juillet : 10 ex. le 30.07 à Aldringen, 16 ex. le 06.08 à Beho, 22 ex. le 10.08 à Lierneux, 15 ex. le 20.08 à Freux et 15 ex. le 25.08 à Millomont.

Vautour fauve *Gyps fulvus** : 1 ex. vers le sud-est aux Isnes (Gembloux) le 29.06. **Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus** : 1 ex. à Elsenborn les 03.07 et 14.08

ainsi qu'à Graux (Mettet) le 28.08. **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* : l'estivage est signalé principalement en Hainaut (8 ex. le 28.06 dans la plaine de Givry/Havay) et en Hesbaye. En dehors d'Harchies, ce busard a niché à Ploegsteert, aux Préalles (5 jeunes) et peut-être en milieu agricole à Haneffe (3 jeunes). Le premier juvénile en halte est signalé le 27.07 à Boneffe. Les regroupements dans les plaines agricoles s'opèrent à partir de la première quinzaine d'août : 4 ex. à Clermont-lez-Walcourt le 15, 6 ex. à Boneffe le 16, 7 ex. à Branchon le 19, 11 ex. pour l'ensemble de la plaine de Boneffe le 23, 10 ex. à Haneffe le 24.08. Les postes de suivi migratoire voient passer l'espèce en nombre à partir de la dernière décennie d'août avec des maxima de 7 ex. le 30 à Saint-Gérard et le 31 à Benonchamps. **Busard Saint-Martin** *Circus cyaneus* : des reproductions sont trouvées à Rouveroy, Havay et Jodoigne, ce qui confirme le statut de nicheur maintenant régulier de ce busard en Wallonie. Fin août, de nombreux juvéniles en dispersion se joignent aux adultes dans les plaines agricoles. **Busard cendré** *Circus pygargus* : année décevante au niveau de la nidification, l'espèce désertant ses bastions de Clermont-lez-Walcourt et de Boneffe. Elle reste présente en Hainaut avec une nidification à Chièvres et une autre, juste de l'autre côté de la frontière française, à Peissant (à côté de Givry). À signaler, l'estivage d'une femelle mélanique en ESM, d'abord à Bourlers puis à Clermont-lez-Walcourt jusqu'à la fin août. **Élanion blanc** *Elanus caerulescens** : après avoir été observé la veille en Région flamande, un Élanion est revu le 29.06 à Rosoux-Crenwick. **Épervier d'Europe** *Accipiter nisus* : fait insolite, à Houtain-le-Val, un couple niche dans un mélèze qui abrite aussi un nid de Faucon crécerelle. **Buse variable** *Buteo buteo* : contrairement à 2009, la reproduction semble bonne. À l'exception de 5 pulli aux Préalles, les nichées se limitent en général à 2-3 jeunes.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* : plusieurs observations de non-nicheurs, peut-être estivants en juin et début juillet : le 05.06 à Nassogne, les 11.06 et 18.07 dans la vallée de la Houille, les 19 et 23.06 à Virelles ainsi que le 20.06 à Miroir. La migration (90 données) est déjà faiblement perceptible fin juillet mais débute véritablement en fin de seconde décennie d'août ; elle culmine en dernière décennie avec un pic le 31 (16 ex. rien que pour cette journée).

Faucon émerillon *Falco columbarius* : le premier migrateur postnuptial est signalé à Boneffe le 28.08.

Faucon hobereau *Falco subbuteo* : curieusement,



des regroupements sont encore signalés durant le mois de juin, notamment à Harchies (8 ex. le 23). Par la suite, plus de 600 données d'oiseaux isolés ou de couples, avec des jeunes, à partir d'août.

Râle d'eau *Rallus aquaticus* : peu signalé dans l'ensemble (13 sites), de 1 à 6 ex. par donnée. Râle des genêts *Crex crex* : l'individu repéré le 24.05 à Nismes est entendu jusqu'au début de juillet. Deux autres chanteurs isolés se manifestent en juin : le 12 à Villers-la-Loue et le 21 à Frasnes-lez-Couvin. Marouette ponctuée *Porzana porzana* : seulement notée sur deux sites en août : 1 ex. les 08-09 ainsi que le 29 et le 31 à Virelles, 1 ex. du 22 au 27 à Éghezée-Longchamps. Foulque macroule *Fulica atra* : les rassemblements postnuptiaux sont notés à partir du 19.06, notamment 400 ex. à Harchies. Par après, les groupes les plus importants sont mentionnés à Ploegsteert (220 ex. le 27.06 et 550 le 22.08), Virelles (317 le 06.07), Harchies (486 le 11.07), aux BEH (220 le 12.08), à Gozée (186 le 01.08) et Amay (250 le 27.08). Grue cendrée *Grus grus* : 1 ex. le 14.06 à Rossignol.

Huïtrier pie *Haematopus ostralegus* : signalé sur 16 sites de début juin au 23.07 avec un maximum de

5 oiseaux le 09.06 à Warcoing. Trois données en août : 1 ex. les 14 et 20 à Escanaffles et 1 le 30 à Dave. Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : seulement des données en juin : 1 à 3 ex. du 01 au 14 à Éghezée-Longchamps, 1 ex. à Ploegsteert et à Warneton le 16. Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus** : 1 ex. le 07.06 à Cipllet, le 29.07 à Clavier et le 20.08 à Boneffe.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* : nidification prouvée en juin-début juillet à Gaurain-Ramecroix, Harmignies, Lives-sur-Meuse, Hermalle-sous-Huy, Flémalle-Haute et Mornimont. Le passage postnuptial débute à la mi-juillet par petits groupes dépassant rarement les 5 exemplaires. Au plus 12 ex. le 22.07 à Éghezée-Longchamps. Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : après un migrateur pré-nuptial tardif le 05.06 à Hollogne-sur-Geer et 2 ex. en passage postnuptial précoce le 12.07 à Virelles, l'espèce est notée sur 10 sites en août avec pour la plupart 1-2 ex. hormis 4 le 20 à Boneffe et 8 le 27 à Seraing-le-Château. Pluvier guignard *Charadrius morinellus* : le passage débute le 17.08 par la présence de 49 ex. sur 6 sites dont 20 au plateau du Gerny. Signalé ensuite sur 20 sites jusqu'au 31. Des suivis réguliers sur trois plaines donnent 11 ex. le 18, 21 le



Photo 5 – Faucon hobereau.
Horion, août 2010 / Eurasian Hobby, August 2010
(Photo : Charly Farinelle)



21, 16 le 24 et 31 le 25 à Boneffe, 10 ex. le 21, 8 le 26 et 11 le 27 à Beauvechain, 30 le 18 et 50 le 24 au plateau du Gerny. Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : noté en faible nombre à partir du 06.08 (25 données pour la plupart de 1-3 ex.) hormis 40 ex. en vol le 12 à Pommeroeul et 12 le 30 à Montignies-sur-Roc. Vanneau huppé *Vanellus vanellus* : les rassemblements postnuptiaux se marquent à partir de début juillet (170 ex. le 08 à Gaurain-Ramecroix et 125 le 17 à Éghezée-Longchamps) pour s'étoffer courant août : 250 le 09 à Éghezée-Longchamps, 245 le 11 et 380 le 17 à Angreau, 400 le 14 à Hérinnes-lez-Pecq, 450 le 19 et 800 le 29 à Tavigny et 1.150 le 31 à Virelles.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : des isolés le 01.06 et le 30.07 à Virelles ainsi que le 29.08 à Lens-sur-Geer. **Bécasseau minute** *Calidris minuta* : 1 ex. le 25.07 à Éghezée-Longchamps, 6 le 26.07 puis 1 le 30.07 à Hologne-sur-Geer et 1 le 31.08 à Warcoing. **Bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii* : 1 ex. du 26 au 28.08 à Éghezée-Longchamps et le 30.08 à Warcoing. **Bécasseau cocorli** *Calidris ferruginea* : des isolés les 02.06 et 22.07 à Éghezée-Longchamps, le 26.06 à Gaurain-Ramecroix, le 30.08 à Warcoing et du 26 au 30.08 aux Marionville. **Bécasseau variable** *Calidris alpina* : signalé en solitaire sur 4 sites : les 29.07 et 31.08 aux Marionville, les 03 et 20.08 à Warcoing, le 29.08 à Virelles et le 30.08 à Montignies-sur-Roc. **Combat-tant varié** *Philomachus pugnax* : noté sur 7 sites à partir du 24.07, la plupart du temps des isolés hormis 2 ex. le 11.08 et 4 le 20.08 à Warcoing.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : en juin 1 ex. le 12 à Genappe. Ensuite migration faible notée par petits groupes à partir du 13.07 et renseignée sur 23 sites. Maxima de 8 ex. le 21.07 à Éghezée-Longchamps, 17 le 05.08 à Hologne-sur-Geer et 8 le 29.08 à Virelles. **Barge à queue noire** *Limosa limosa* : un vol de 30 ex. le 16.07 à Herseaux. **Barge rousse** *Limosa lapponica* : 1 ex. séjourne du 30.07 au 06.08 à Hologne-sur-Geer. Ailleurs, 1 ex. le 20.08 à Warcoing et le 29.08 à Havinnes. **Courlis corlieu** *Numenius phaeopus* : noté sur 16 sites de fin juin à fin août avec un total de près de 80 ex. dont des vols en août de 14 ex. le 05 à Ixelles, 20 le 19 à Soye et 15 le 26 à Boneffe. **Courlis cendré** *Numenius arquata* : 4 données pour fin juin-début juillet dont 11 en vol le 01.07 au Scheutbos (Molenbeek). Passage faible à partir de début août concernant le plus souvent 1-3 ex. hormis 4 ex. le 25 à Montignies-le-Roc et 5 le 27 à Atthis. **Chevalier arlequin** *Tringa erythro-*

pus : en juin, 1 ex. les 12 et 21 à Éghezée-Longchamps. Des isolés sont notés à partir du 12.08 à Saint-Ghislain, Hologne-sur-Geer et Warcoing ; 2 ex. le 16.08 à Éghezée-Longchamps. **Chevalier gambette** *Tringa totanus* : 3 isolés en juin (Ligney, Hologne-sur-Geer et Warcoing). Passage très faible en juillet-août : seulement 16 ex. renseignés dont un groupe de 9 le 21.07 à Éghezée-Longchamps. **Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* : après quelques observations en juin- début juillet, le passage se précise à partir du 15.07 mais reste faible avec des groupes de maximum 5 exemplaires. Font exception en août 7 ex. le 23 à Tourinnes-Saint-Lambert, 32 le 26 aux Marionville et 10 le 27 à Virelles. **Chevalier stagnatile** *Tringa stagnatilis** : 1 ex. le 17.07 à Éghezée-Longchamps. **Chevalier culblanc** *Tringa ochropus* : le passage postnuptial s'amorce dès les premiers jours de juin et s'intensifie au cours de la deuxième quinzaine du mois : 17 ex. le 16 à Hologne-sur-Geer, 10 le 17 à Éghezée-Longchamps et 14 le 18 à Genappe. Il se poursuit de manière régulière durant tout l'été, avec un pic entre le 11.07 et le 20.08. Les groupes les plus étoffés comptent 22 ex. le 13.07 et 18 le 12.08 à Genappe, 50 ex. le 17.07, 21 le 26.07 et 19 le 05.08 à Éghezée-Longchamps, 15 ex. le 30.07 et 20 le 07.08 à Hologne-sur-Geer. **Chevalier sylvain** *Tringa glareola* : 3 données en juin dont 13 ex. le 17 à Hologne-sur-Geer. Signalé sans discontinuité mais en faible nombre jusque fin août. Les seuls groupes assez importants sont notés à Éghezée-Longchamps (12 ex. le 09.07 et 10 le 24.07), à Warcoing (11 ex. le 13.08) et Hologne-sur-Geer (8 ex. le 16.08). **Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* : après quelques données de 1-3 ex. en juin-début juillet, le passage s'amorce à partir de la mi-juillet et se poursuit de manière régulière jusqu'à la fin de l'été. Selon une importance habituelle en



Photo 6 – Chevalier guignette. Seraing, août 2010 / Common Sandpiper. Seraing, August 2010 (Photo : Charly Farinelle)



été, on note jusque 32 ex. le 21.07, 37 le 01.08 et 48 le 05.08 à Éghezée-Longchamps, 25 ex. le 30.07 à Hollogne-sur-Geer, 44 ex. le 01.08 et 46 le 13.08 à Warcoing. **Tourne-pierre à collier** *Arenaria interpres* : 1 ex. le 28.07 à Éghezée-Longchamps et le 19.08 à Jemeppe-sur-Meuse. **Phalarope à bec large** *Phalaropus fulicarius** : une femelle le 09.06 à Warcoing.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* : une dizaine de mentions tout au long de l'été, la plupart des isolées, sauf au moins 6 individus le 27.06 à Bruxelles. Des adultes du 02 au 05 et le 27.06 à Hollogne-sur-Geer, le 10.06 à Harchies, le 09.07 à Gaurain-Ramecroix, le 28.07 à Éghezée-Longchamps ainsi que le 09.08 à Gembloux ; 1 ex. de 1^{er} été le 31.07 à Lixhe, des juvéniles le 23.08 à Lens-Saint-Servais (en compagnie de Goélands bruns) et le 24.08 à Nothomb. Cette observation est exceptionnelle pour la Lorraine belge. **Mouette rieuse** *Chroicocephalus ridibundus* : des poussins sont signalés en juin à Fontenoy, Harchies, Genappe et Hollogne-sur-Geer. Si des estivants s'observent la saison durant, principalement à l'ouest de la Meuse, les rassemblements ne deviennent importants qu'à partir de la fin juin. Retenons, au bord des eaux, 2.600 ex. au total le 06.07 en Meuse liégeoise d'Ivoz-Ramet à Lixhe, 400 le 10.07 à Bruxelles, 500 le 13.08 aux décanteurs de Warcoing, 300 le 28.08 aux BEH, 1.200 le 30.08 à Gaurain-Ramecroix et, dans les campagnes, 300 ex. le 08.08 à Freloux (Fexhe-le-Haut-Clocher). En province de Luxembourg, 7 mentions totalisant 22 individus sont rapportées tout au long de l'été.

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* : 1 juvénile le 21.08 à Virelles. **Goéland cendré** *Larus canus* : pas de relevé détaillé des colonies cet été mais présence notée en juin sur quelques sites de nidification potentiels : Gaurain-Ramecroix, Harchies, Obourg, Élouges, Éghezée-Longchamps et Fleurus. Également peu d'observations d'oiseaux en dispersion postnuptiale. Il s'agit la plupart du temps de 1-2 ex., hormis 5 ex. en Basse-Meuse (3 à Lixhe, 2 à Petit-Lanaye) le 25.08 et 2 à Verlainne le 18.08.

Goéland brun *Larus fuscus* : ce goéland est le plus abondant du genre en été. Faisant suite à une présence abondante au printemps, des groupes atteignant ou dépassant la centaine sont encore mentionnés début juin (100 ex. le 03 à Mont-Saint-Guibert, 200 le 04 à Moulbaix, 100 le 06 à Neufville). Les bandes s'étoffent dès la seconde quinzaine du mois de juin, tant au voisinage des décharges que dans les campagnes. Retenons 200 ex. le 15.06, 712 le 06.07 et 800 le 03.08 à Lixhe, 500 ex. le

22.06, 400 le 16.07 et un millier le 17.08 à Havay, 550 ex. le 03.08 à Wauthier-Braine, 400 ex. le 06.08 à Angre et le 16.08 à Cipllet. **Goéland argenté** *Larus argentatus* : présent tout l'été uniquement à l'ouest de la Meuse, à l'exception d'un oiseau en vol le 01.06 à Thommen. Les groupes sont parfois assez importants : 200 ex. le 03.08 à Wauthier-Braine, 100 ex. le 03.06 à Mont-Saint-Guibert d'où les informations sont trop rares, 62 ex. le 30.06 et 66 le 02.08 sur le canal à Anderlecht... Retenons aussi la présence dans les campagnes, par exemple, 32 ex. sur un champ labouré le 03.06 à Mainvault et une visite de poulailler par des immatures début juillet à Heure-le-Romain où une cinquantaine d'individus fréquentent les toits. **Goéland pontique** *Larus cachinnans* : 12 mentions tout au long de l'été, uniquement en province de Liège et principalement en Basse-Meuse. À l'exception d'un adulte le 03.08 sur la Meuse au centre de Liège, il s'agit d'oiseaux de 1^{er} ou de 2^e été, le plus souvent isolés sauf 3 ex. les 30.07 et 03.08 à Argenteau ainsi que 2 ex. le 25.08 à Lixhe. **Goéland leucopnée** *Larus michahellis* : 7 mentions de 1-2 immatures du 1^{er} au 10 juin. Le premier adulte apparaît le 11.06 sur le canal à Pommeroeul et le premier groupe (10 ex.) le 15.06 à Lixhe. À partir du 23.07 (48 ex. au pré-dortoir des BEH), des observations de plusieurs dizaines sont rapportées, dont 70 ex. le 27.07 aux BEH, 60 ex. le 30.07 à Argenteau et 45 ex. le 25.08 à Lixhe. Si cette espèce est le plus souvent observée au bord de l'eau, elle fréquente aussi les campagnes en compagnie des Goélands bruns. Par exemple, 12 ex. le 16.08 à Cipllet et 15 ex. le lendemain à Limont (Donceel). En dehors de la Meuse, des campagnes hesbignones et des BEH, aucune autre mention ne dépasse la dizaine et ce goéland n'est pas signalé à Bruxelles.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : un couple niche à nouveau à Virelles (2 jeunes à l'envol le 09.07) et à Harchies où la reproduction est plus tardive (3 jeunes à l'envol le 14.08). Sur ces sites, quelques autres oiseaux s'observent sporadiquement en été, signe de déplacements d'individus dans l'aire de reproduction. Quelques autres plans d'eau voient aussi des apparitions fugaces à cette époque (Vierves-sur-Viroin, Gaurain-Ramecroix, Obourg, Lixhe, BEH), sans indication manifeste du passage de migrants. **Sterne arctique** *Sterna paradisaea** : 1 ex. le 30.08 à Harchies. **Guifette noire** *Chlidonias niger* : des contacts sporadiques en juin-juillet (6 observations de 1-3 ex.) puis le faible passage classique en août, noté à Éghezée-Longchamps, Harchies et Virelles (maximum 8 ex. le 29 à Harchies).



Photo 7 – Pigeon colombin. Visé, 20 juillet 2010 / Stock Dove, 20 July 2010 (Photo : Gabriel Rasson)

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* : encore 3 données de chanteurs fin juin : 2 en province de Liège, dans la zone de nidification habituelle de l'espèce, et 1 à Willerzie.

Pigeon colombin *Columba oenas* : quelques rassemblements s'observent dès la première quinzaine de juillet, notamment 40 ex. le 11.07 à Molenbaix, 40 ex. le 25.07 à Pottes et 33 ex. à Vielsalm le 11.08.

Pigeon ramier *Columba palumbus* : les premières bandes sont notées en août, surtout en fin de mois : 250 ex. le 02.08 à Fexhe-Slins (Juprelle), 130 ex. le 25.08 et 200 ex. le 30.08 à Angre et 320 ex. le 30.08 au Plateau du Gerny. **Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* : fait devenu rare, un rassemblement d'au moins 50 ex. est noté le 30.07 à Ébly (Léglise). De petits groupes sont observés en août durant la migration, par exemple, 8 ex. le 25.08 à Villers-Deux-Eglises et 11 ex. le 30.08 à Angre.

Perruche à collier *Psittacula krameri* : maximum 3.400 ex. sont comptés au dortoir du Parc Élisabeth (Bruxelles) le 29.07. **Coucou gris** *Cuculus*

canorus : bien contacté en juin avec, notamment, 5 chanteurs à Harchies et plusieurs auditions de chant nocturne. Le nombre d'observations décroît fortement à partir du 25.06 et l'espèce est peu observée en juillet. Les 18 données d'août concernent essentiellement des juvéniles.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* : la population recensée en 2010 dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse est estimée de 15 à 20 cantons. Deux chanteurs sont renseignés pour le massif de la Croix-Scaille, 1 à Vencimont, outre la présence classique notée à Lagland et Malchamps. **Martinet noir** *Apus apus* : des migrants sont signalés dès la mi-juillet mais les nombres ne sont importants qu'à la fin du mois : 940 ex. le 25.07 à Verviers, un millier à Breuvanne et près de 700 ex. à Flémalle le 31.07. La diminution est sensible dès les premiers jours d'août et s'accroît après le 18.08. **Martin-pêcheur d'Europe** *Alcedo atthis* : conséquence des deux hivers rigoureux, l'espèce reste peu renseignée en Ardenne, particulièrement dans les cantons de l'Est. **Guêpier d'Europe** *Merops apiaster* : 2



couples nicheurs signalés en province de Luxembourg ; malheureusement la nidification n'a pas abouti. Excepté 2 ex. à Horion-Hozémont le 03.06 et 1 ex. à Hologne-sur-Geer le 05.08, les quelques autres données concernent toutes la Gaume avec un maximum de 12 oiseaux en vol à Chiny le 02.06.

Huppe fasciée *Upupa epops* : 2 oiseaux le 04.07 à Vencimont, près de Gedinne, ainsi qu'1 ex. à Loyers le 30.06. Dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, la nidification est soupçonnée sur deux sites mais aucune preuve n'a été trouvée.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : des chanteurs sont encore entendus en juin-juillet : 2 à Montleban le 02.06, 1 le 03.06 à Elsenborn, 1 le 05.06 à Orgeo (Bertrix), 1 aux environs de Tenneville le 04.06 et le 01.07 et 1 le 17.07 à Ruelle (Virton). Vingt-cinq migrants sont bagués ou observés en halte à partir du 13.08. **Pic cendré** *Picus canus* : 1 chanteur le 09.08 à Torgny. **Pic épeichette** *Dendrocopos minor* : on note une « reprise » du chant dans le courant des mois de juin et juillet. Comme pour les autres pics, l'espèce est très discrète et peu renseignée au mois d'août.

Alouette des champs *Alauda arvensis* : des données proviennent de l'ensemble des régions, plus particulièrement de Moyenne Belgique mais peu

permettent de se forger une opinion sur le statut de l'espèce. On retiendra 27 chanteurs sur un parcours d'une douzaine de km le 03.06 à Roloux.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : mentionnée sur au moins 45 sites en juin-juillet. Hors Lorraine où nichent plus d'un millier de couples, les colonies les plus importantes se situent à Harmignies (125 terriers), Mont-Saint-Guibert et Chaumont-Gistoux (maximum 90 terriers chacune). Un maximum de 130 ex. est observé aux Marionville mais la colonie n'a pas été repérée. La migration débute discrètement le 14.08 avec 2 ex. en vol vers le sud-ouest à Nismes. Mention du passage est aussi faite à Ramecroix (1 ex. le 20.08) et Benonchamps (4 ex. le 22.08, 1 le 31). **Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* : suite probable des conditions difficiles de mai, des couples s'installent encore début juin. Une même étable à La Reid voit la réussite de 46 nichées rien qu'au cours du mois de juin. De petits rassemblements sur les fils électriques sont observés à partir du 21.07 et, le 30.07, une concentration de 400 ex. est signalée à l'étang de Virelles. Dès début août, les rassemblements deviennent plus nombreux mais leur taille reste inférieure à 100 ex. au cours des trois premières semaines du mois. La migration commence timidement le 02.08 avec 5 ex. à Thommen mais elle ne s'intensifie qu'à



Photo 8 – Cocou gris. Velroux, août 2010 / Common Cuckoo. Velroux, August 2010 (Photo : Charly Farinelle)



Photo 9 – Martinet noir. Remouchamps, 10 juillet 2010 / Common Swift. Remouchamps, 10 July 2010
(Photo : René Dumoulin)

partir de la mi-août (maxima de 183 ex. à Ramecroix le 25.08 et 186 ex. le 31.08 à Benonchamps). Les regroupements s'étoffent au cours de la dernière décade du mois : 150 ex. le 23 à Gouvy, 250 ex. le 25 à Tintigny, 400 ex. à Harchies et 220 ex. à Stockay le 29, 250 ex. à Somzée le 31. **Hironnelle de fenêtre** *Delichon urbicum* : la construction et la restauration de nids se poursuivent en juin ; des nichées sont encore observées fin août. Des nombreuses données sur la nidification, retenons 102 nids entiers dont 60 occupés à Amay et 50-60 couples à Bruxelles-Haren, les autres colonies ne dépassant pas les 40 nids. Plus négativement, la diminution continue à Obourg où il ne reste que 29 nids. Des rassemblements assez importants débutent fin juillet (100 ex. le 26 à Saint-Aubin et 80 ex. le 27 à Folx-les-Caves). Les premiers migrants sont vus le 31.07 à Flémalle et la taille des bandes augmente début août pour atteindre à la fin du mois 250 ex. le 25 à Bertrix, 200 ex. le 28 à Hollogne-sur-Geer, 300 ex. le 29 à Harchies et La Hulpe.

Pipit rousseline *Anthus campestris* : le premier migrateur postnuptial est signalé le 05.08 à Maubray. Au total, une soixantaine d'individus, la plupart en vol, sont observés en août, essentiellement à partir de la seconde décade. Le maximum est de 6 ex. le 20.08 à Graux. **Pipit des arbres** *Anthus trivialis* : les premiers migrants apparaissent, comme d'habitude, en première décade d'août mais le passage ne s'intensifie que fin du mois. On notera des maxima journaliers assez faibles : 14 ex. le 19.08 à Benonchamps, 20 ex. le 28.08 au Gerry et 49 le même jour à Ramecroix (Verviers). **Bergeronnette flavéole** *Motacilla flava flavissima* : quelques mentions en juin : le 02 à Donceel, le 13 à Horrués où une nidification mixte est probable, le 14 à Basècles. Le passage de cette sous-espèce semble s'intensifier ces dernières années en Wallonie ; outre les données du groupe de baguage verviétois qui montrent un accroissement régulier, observation de 2 ex. le 22.08 à Lahérie et deux captures les 28 et 31.08 aux Awirs où cette bergeronnette n'avait été baguée qu'une seule fois au cours des



24 années antérieures. **Bergeronnette nordique** *Motacilla flava thunbergi* : des isolés à Thisnes le 17.08 et à Harzé le 31.08 et 3 ex. à Strée le 31.08 témoignent d'un passage certain mais sous-détecté à cause de la difficulté d'identification des jeunes et des femelles de cette sous-espèce. **Bergeronnette de Yarrell** *Motacilla alba yarrelli* : un couple mixte (femelle Yarrell) est irrégulièrement observé à Andenne, notamment le 23.06.

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* : dans les stations de baguage, les captures ne deviennent quotidiennes qu'à partir du 19.08, une date habituelle pour le début du passage postnuptial. **Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* : en dehors de la Haute Belgique et du Hainaut occidental où le maximum de 7 chanteurs est enregistré le 01.06 aux Marionville, une mention d'un nicheur possible les 01 et 05.06 à Jette. Aux Awirs, la première capture le 25.07 marque le début de la migration qui s'étale ensuite sur tout le mois d'août. **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* : l'espèce se reproduit principalement dans le Hainaut occidental mais des nicheurs sont aussi signalés à Éghezée-Longchamps, Hollogne-sur-Geer, Stockay et Virelles. Les captures dans les stations de baguage en milieu sec des Awirs et de Bolland, qui concernent donc des migrateurs, débutent le 14.08. **Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* : à l'exception d'un chanteur le 05.06 à Bossut-Gottechain, toutes les données de juin-juillet proviennent du sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le passage débute par une première capture le 02.08 aux Awirs. **Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe* : encore 5 données d'oiseaux des deux sexes en juin, dont la dernière le 27 à Hamme-Mille. Le premier migrateur postnuptial est signalé le 06.08 à Aywaille ; les mentions deviennent quotidiennes à partir du 11 et les nombres sont déjà importants au début de la seconde quinzaine du mois : 12 ex. le 17 à Noville (Fexhe-le-Haut-Clocher), 20 le 19 à Boneffe, 15 le 20 à Tavieres... **Tarier des prés** *Saxicola rubetra* : 1 mâle le 05.06 à Grand-Manil clôt le passage prénuptial. Les données de nidification proviennent principalement de Haute-Ardenne mais on note 3 couples avec des jeunes le 28.06 à Turpange (Lorraine). Le premier migrateur postnuptial apparaît le 31.07 à Saint-Aubin puis les données deviennent quasi quotidiennes à partir du 07.08. La taille des groupes en halte ne dépasse les 10 individus qu'à deux reprises : 11 ex. le 23.08 à Lavaselle et le lendemain à Longvilly. **Tarier pâtre** *Saxicola torquatus* : des familles sont mentionnées jusqu'à la fin août. La rareté des observations en région limoneuse est

à souligner. **Merle noir** *Turdus merula* : l'individu albinos de Floreffe est contacté pratiquement tout l'été. **Grive litorne** *Turdus pilaris* : 2 mentions proviennent de la région limoneuse : 2 ex. le 13.06 à Gembloux et 1 ex. le 25.08 à Braine-l'Alleud. Dans la zone de reproduction de l'est de la Wallonie, seulement 6 rassemblements postnuptiaux dépassent à peine la trentaine (Freux, Bihain, Harzé, Bovigny, Tintigny et Torgny où le maximum de 65 ex. est observé le 08.08). **Grive draine** *Turdus viscivorus* : l'espèce est renseignée dans la majorité des régions avec des rassemblements estivaux atteignant 30 ex. à Harzé le 30.07, 75 ex. à La Reid et 65 ex. à Angre le 13.08, 32 ex. le 17.08 à Treignes, 40 ex. le 20.08 à Aubange...



Photo 10 – Rousserolle effarvatte. Hollogne, 12 août 2010 / Eurasian Reed Warbler . Hollogne, 12 August 2010 (Photo : Jules Fouarge)

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : aucune mention hors Hainaut occidental (Ploegsteert, Harchies, les Marionville et Hautrage). **Locustelle tachetée** *Locustella naevia* : signalée jusqu'au 30.07 sur divers sites de nidification où les densités sont peu relevées. Retenons 4 chanteurs à Tenneville le 18.06, 7 à Stamburges et 5 à la fagne de Malchamps le 02.07 ainsi que le déclin de la population nicheuse à Roly. La migration postnuptiale commence le 25.07 à Stockay, une date habituelle. Les captures journalières sont peu abondantes : maximum 10 ex. le 13.08 à Beaufays et 9 ex. le 22.08 à Bolland. **Locustelle lusciniôïde** *Locustella luscinioides* : la preuve de la nidification est obtenue à Virelles avec un couple nourrissant le 02.07 et 1 jeune volant le 05.07. En août, capture d'un oiseau le 13 à Harchies et le 19 à Stockay. **Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* : la migration postnuptiale débute tôt, le 10.07 aux Awirs (2 ex. bagués). Les captures dans les stations de baguage sont assez abondantes : 133 individus



bagués en trois séances du 31.07 au 13.08 à Harchies, 238 à Stockay et 64 aux Awirs pour le total des mois de juillet et août. **Rousserolle effarvate** *Acrocephalus scirpaceus* : encore un migrateur pré-nuptial en halte le 01.06 au centre de Bruxelles. Peu d'estimations chiffrées sur la nidification. Le passage postnuptial débute le 10.07 aux Awirs et est surtout important au cours des deux dernières décades d'août. L'espèce est bien capturée dans toutes les stations de baguage ; celle de Stockay établit un nouveau record : 2.423 ex. bagués avec, en particulier, 279 ex. le 22.08. **Rousserolle verderolle** *Acrocephalus palustris* : si des chanteurs sont mentionnés dans toutes les régions en juin, peu de concentrations sont importantes : maximum 7 chanteurs à Hautrage, aux Marionville et à Hologne-sur-Geer. Comme d'habitude, les adultes commencent leur migration dès début juillet (8 ex. bagués le 10 aux Awirs) et passent principalement dans le courant de ce mois, les jeunes de l'année

migrant surtout en août. Au total, tant à Stockay qu'aux Awirs, les captures sont moins nombreuses qu'en 2009, la différence se marquant uniquement au niveau des jeunes, ce qui tend à démontrer une moins bonne réussite des nidifications en 2010. **Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* : les chanteurs de mai ne sont plus entendus que sur 2 sites. Plus aucune mention n'est effectuée à Latour après le 01.06 tandis qu'un couple reste aux Marionville. Le mâle y chante jusqu'au 23.06 mais aucune preuve de nidification n'est apportée. L'espèce est rare au passage postnuptial : une seule capture le 31.07 à Harchies. **Hypolaïs ictérine** *Hippolais icterina* : si des nicheurs potentiels sont signalés jusqu'au 18.07 en région limoneuse et au Pays de Herve, on retiendra surtout un chanteur le 30.06 à Saint-Aubin où un couple s'était cantonné en 2009. Une autre mention provient de l'ESM : 1 chanteur les 24-25.06 à Olloy-sur-Viroin. La migration postnuptiale débute le 20.07 aux Awirs où 13



Photo 11 – Fauvette à tête noire. Ombret, 10 juillet 2010 / Eurasian Blackcap. Ombret, 10 July 2010 (Photo : Jules Fouarge)



ex. sont capturés, soit un bon niveau bien qu'inférieur à celui de 2009. **Hypolaïs polyglotte** *Hippolaïs polyglotta* : alors que cette espèce est bien présente au sud du sillon Sambre-et-Meuse, à l'exception du Pays de Herve, les mentions en région limoneuse sont nettement plus rares qu'en 2009 : un chanteur le 01.06 à Flénu (Mons) et le 04.06 à Cibly (Mons), chaque fois sur des terrils.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : les nombreuses données provenant de toutes les régions témoignent de l'abondance et de l'omniprésence de cette fauvette mais peu permettent de déterminer la densité des nicheurs. Le baguage fournit des indications précises non seulement sur la migration postnuptiale mais aussi sur les résultats de la nidification par les captures avant le début du passage. Aux Awirs, ce dernier débute à la mi-août, soit à une date habituelle, et la centaine de captures journalières est déjà dépassée à la fin du mois. Les captures antérieures à la migration sont du même ordre de grandeur que les années précédentes. **Fauvette des jardins** *Sylvia borin* : également bien répandue mais moins abondante. Aux Awirs, le nombre de captures est constant (quelques unités) du début de la session, le 10.07, au 28.07 avant de s'élever et de rester du même ordre de grandeur, la trentaine, jusqu'à la fin août. **Fauvette babillarde** *Sylvia curruca* : des chanteurs sont signalés en toutes régions, la plupart du temps isolés. Aux Awirs, où l'espèce n'a pas niché cette année, les captures sont peu nombreuses et irrégulières de la fin juillet à la fin août. **Fauvette grisette** *Sylvia communis* : les mentions sont nombreuses et l'espèce semble localement plus abondante en 2010. Au niveau des stations de baguage, les résultats sont assez mitigés : particulièrement abondante chez certains, captures limitées dans d'autres. La dispersion et le passage des jeunes s'observe en juillet-août tandis que les adultes ne débutent discrètement leur migration qu'à la mi-août. **Fauvette épervière** *Sylvia nisoria** : 2 captures fin août, le 28 à Nassogne et le 29 à Mont-Saint-Guibert.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* : quelques données précisent le nombre de chanteurs rencontrés, en juin, sur un site déterminé : 7 en fagne de Kutenhart, 4 en fagne de Steinley et 11 à Érezée le 03, 5 à Forêt (Trooz) et 8 à Olloy-sur-Viroin le 05. Une seule observation au nord du sillon Sambre-et-Meuse : un chanteur le 04.06

en forêt de Soignes où, jadis, l'espèce abondait. **Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* : comme pour de nombreuses espèces, les données sont abondantes mais ne permettent guère de déterminer le statut de ce pouillot. On retiendra 15 chanteurs le 05.06 aux Marionville et 5 le lendemain à la Tienne Breumont à Nismes. La migration postnuptiale culmine de la fin juillet à la fin août suivant les données des stations de baguage de Stockay et des Awirs. **Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* : l'abondance de cette espèce se traduit par plus d'un millier de données mais, à nouveau, sans précision utile de densité. Un ex. de la sous-espèce scandinave *abietinus* est bagué le 31.08 à Stockay.

Gobemouche gris *Muscicapa striata* : assez bien signalé dans toutes les régions, soit isolé, soit en famille. On retiendra surtout une halte de 15 ex. le 21.08 à Xhoris, un nombre estimé prudent par l'observateur. **Gobemouche noir** *Ficedula hypoleuca* : à nouveau trop peu de données sur la population nicheuse. Les premiers migrants sont signalés en juillet, le 20 et le 23 aux Awirs, le 22 à Flobecq. Les mentions deviennent quotidiennes à partir de ces dates. La plupart concernent tout au plus 3 oiseaux mais le 21.08, un groupe lâche de 15 ex. est observé à Xhoris et 5 ex. à Sclaigneaux ; le lendemain, 5 ex. aussi à Chevetogne.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* : quelques bandes de belle taille regroupent probablement 2-3 familles : 30 ex. le 05.06 à Frasnes-lez-Buissenal, 25 ex. à Flobecq, et 21 ex. à Anderlecht le 06.08... **Mésange huppée** *Lophophanes cristatus* : 3 captures en juillet-août aux Awirs où le site est impropre à la nidification de cette mésange. **Mésange noire** *Periparus ater* : en prélude du passage, 2 migrants le 28.08 à Ramecroix. **Mésange bleue** *Cyanistes caeruleus* : dès le 20 juin mais surtout en juillet et août, quelques groupes de taille importante sont signalés : 30 ex. le 20.06 à la Citadelle de Namur, 50 ex. le 31.07 à la réserve de la Grande Honnelle, 72 ex. le 31.08 à Watermael-Boitsfort... **Mésange charbonnière** *Parus major* : tout l'été, des bandes d'une à deux dizaines se rencontrent un peu partout. Une seule est plus importante : 50 ex. le 15.08 à Acoz.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* : une seule donnée d'abondance : 12 chanteurs le 06.06, 9 la semaine suivante à la Citadelle de Namur.



Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* : les données, peu nombreuses, proviennent des zones habituelles. Les nombres sur un même site sont limités : maximum 6 ex. le 25.07 à Hollogne-sur-Geer et 4 ex. le lendemain à Harchies.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : plus de 900 données, souvent répétitives, de couples nicheurs au sud du sillon Sambre-et-Meuse témoignent de la bonne santé actuelle de l'espèce. Le nourrissage est constaté dès le 26.06 à Les Bulles et les premiers jeunes volants sont observés le 07.07 à Hollange (Fauvillers) et Meix-devant-Virton. La dispersion des familles débute le 23.07 à Harzé et Martouzin-Neuville. La migration proprement dite est attestée dès le 05.08 par 3 individus en halte à Ramecroix ; elle perdure tout le mois d'août avec e.a. 4 captures étalées du 07 au 19 aux Awirs alors que des jeunes sont encore nourris le 18 à Wibrin.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator** : 1 mâle le 02.06 à Maubray. **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* : la comparaison des données avec celles de 2009 montre une raréfaction et une rétraction de l'aire de répartition ; la reproduction semble également moindre. Les premiers jeunes volants sont observés début juin ; ils sont souvent uniques sauf 3 pulli le 05 à Saint-Médard, 4 le 22.06 à Fays-les-

Veneurs et 2 le 01.07 à Montleban. Dès la dernière décade de juillet, les divers cantons habituellement occupés par des couples sont réinvestis par des individus solitaires.

Moineau domestique *Passer domesticus* : quelques rassemblements estivaux atteignent au maximum 100-200 individus ; celui de 500 ex. sur des céréales non récoltées le 16.08 à Awagne mérite d'être épinglé. **Moineau friquet** *Passer montanus* : les observations sont les moins rares en Hainaut, dont une vingtaine de couples dans les ruines de la ferme du château de la Royère. Les bandes estivales sont d'importance modeste, au plus 50 ex. le 06 à Harzé, 40 ex. le 31 à Aubechies, 38 ex. le 23 à Tillet, 30 ex. le 24 à Couvin. **Moineau friquet x domestique** *Passer montanus x P. domesticus* : à Cud-sarts (Couvin), un nichoir est occupé par un couple mixte (mâle Friquet, femelle Domestique) ; un jeune piaïlle à la sortie de ce nichoir le 27.06.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : un seul rassemblement important en fin d'été : plus d'une centaine le 17.08 à Harzé. **Pinson du Nord** *Fringilla montifringilla* : totalement hors saison, 1 ex. le 01.06 à Gaurain-Ramecroix. **Serin cini** *Serinus serinus* : la rareté des chanteurs en juin et



Photo 12 – Mésange charbonnière. Profondeville, 5 juillet 2010 / Great Tit. Profondeville, 5 July 2010
(Photo : Rachel Delmelle)



Photo 13 – Bruant proyer. Horion, juillet 2010 / Corn Bunting. Horion, July 2010 (Photo : Charly Farinelle)

en juillet dans le sud de la Wallonie et l'absence de données au nord du sillon Sambre-et-Meuse confirment le déclin régional. **Verdier d'Europe** *Carduelis chloris* : en août, peu de groupes et leur taille ne dépasse pas la cinquantaine. **Char-donneret élégant** *Carduelis carduelis* : les données proviennent de l'ensemble de la Wallonie et de Bruxelles, à l'exception de l'est de la Hesbaye et du Pays de Herve, ce qui confirme les lacunes repérées au cours de l'Atlas. Un rassemblement vespéral de 27 ex. dans un bouleau le 29.06 à Frasnes-lez-Buissenal pourrait être un dortoir. Le 29.07, une cinquantaine d'individus fréquentent un « champ » de chardons à Anderlecht. **Tarin des aulnes** *Carduelis spinus* : en juin et juillet, de petits groupes sont mentionnés en divers sites de Haute-Belgique ; au plus, 10 ex. le 27.06 dans la vallée de la Hozwarche et 20 ex. le 09.07 à Willerzie. Hors zone de nidification potentielle, une bande de 12 ex. est observée le 12.07 à Couthuin. En août, ces bandes s'étoffent quelque peu : 11 ex. le 03 à Samrée, 16 le 07 à Harzé, 32 le 14 à Willerzie et 13 en vol vers le sud-ouest le 28 à Ramecroix. **Linotte mélodieuse** *Carduelis can-*

nabina : des rassemblements de quelque importance s'observent début juillet : 250 ex. le 04 à Vaulx-lez-Chimay et 80 ex. le 06 à Saint-Remy (Chimay). Par la suite, les groupes dépassant la centaine ne sont plus signalés avant la mi-août ; maximum 400 ex. le 22.08 au Plateau du Gerny. **Sizerin flammé** *Carduelis flammea* : une vingtaine de mentions, la plupart d'isolés, témoignent de la présence comme nicheur en Haute-Ardenne. Soulignons 10 ex. le 14.07 à Chifontaine et 9 ex. le 22.07 dans la fagne de la Poleur, probablement des regroupements de familles. **Bec-croisé des sapins** *Loxia curvirostra* : de nombreux mouvements en groupes ne dépassant guère la cinquantaine sont mentionnés fin juin et en juillet, principalement en Haute-Belgique mais aussi de manière plus occasionnelle à Couthuin et dans le Hainaut occidental. Ces mouvements se tassent en août. **Grosbec casse-noyaux** *Coccothraustes coccothraustes* : nombreuses mentions dans la zone de nidification de l'espèce. Retenons la formation de petits groupes en août : 40 ex. le 04.08 à Roly, 21 ex. le 06.08 à Watermael-Boitsfort et 25 ex. le 14.08 à Dourbes.



Bruant jaune *Emberiza citrinella* : quelques groupes se forment au cours de la seconde quinzaine d'août, par exemple 25 ex. le 16.08 à Harzé et 30 ex. le 26.08 à Nobressart. **Bruant ortolan** *Emberiza hortulana* : 1 ex. en halte le 20.08 à Harzé. **Bruant proyer** *Emberiza calandra* : la plupart des mentions proviennent de la Hesbaye et de l'est du Brabant wallon, quelques-unes du Hainaut (Chièvres, Moulbaix, Molenbaix). Également un chanteur le 24.06 à Castillon, le 04.07 à Clermont-lez-Walcourt, le 28.07 à Surice et les 18-19.06 en province de Luxembourg. Quelques bandes sont signalées fin août : 30 ex. le 16 à Ciplet et le lendemain à Villen-Hesbaye, 30 ex. du 20 au 28 à Folx-les-Caves, 25 le 24 à Boneffe...



Photo 14 – Bruant jaune. Harzé, 19 juillet 2010 / Yellowhammer. Harzé, 19 July 2010 (Photo : René Dumoulin)

REMERCIEMENTS – Avec le développement de l'encodage en ligne, le nombre de contributeurs a explosé, comme celui des données. De ce fait, il devient impossible de remercier ici nommément tout le monde. Nous sommes donc redevables à près d'un millier d'observateurs ainsi qu'aux bagueurs et au Centre belge du baguage qui ont contribué à documenter cette synthèse saisonnière. Merci à tous.

SUMMARY – Observations from June to August 2010

This nesting season has confirmed the residence status of the Common Tern *Sterna hirundo* and of several members of the heron family (Little Egrets *Egretta garzetta*, Black-crowned Night Heron *Nycticorax nycticorax*, and Cattle Egret *Bubulcus ibis*). On the other hand, some species which nested in 2009 were not seen this year (Great Egret *Casmerodius albus*, and River Warbler *Locustella fluviatilis*). The Corncrake *Crex crex* was very rare, and the numbers of Fieldfares *Turdus pilaris* and of the European Serin *Serinus serinus* have continued to decline. But the Northern Harrier *Circus cyaneus* has confirmed its status as a regular nesting species. The dataset also suggests that species such as the Eurasian Wryneck *Jynx torquilla* are in good health, it shows that there is a small population of European Nightjar *Caprimulgus europaeus* (present in some forty cantons, half of which are in the south of the Entre-Sambre-et-Meuse). There was a new record of the nesting of the Redcrested Pochard *Netta rufina*, there were several nesting couples of the Little Bittern *Ixobrychus minutus* and one couple of Savi's Warblers *Locustella luscinioides* in Hainaut, as well as some attempts at nesting by European Bee-eaters *Merops apiaster*, and by Hoopoes *Upupa epops*.