

RAPPORT DE LA COMMISSION D'HOMOLOGATION* ANNÉES 2007 À 2009

Laurent Raty et la Commission d'Homologation



Mathieu Gillet

Ce rapport traite les données d'oiseaux rares en Belgique examinées par la Commission d'Homologation (CH) et le Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC), pour les années 2007 à 2009. Quelques données antérieures, dont le traitement n'avait pas encore été publié, sont également incluses. La première partie du rapport concerne les espèces soumises à homologation sur tout le territoire belge, et reprend des données traitées par la CH et par le BAHC ; en termes de contenu, cette partie est normalement équivalente aux 35^e à 37^e rapports du BAHC (VANDEGEHUCHTE et al., 2009 ; ELST et al., 2010 ; FAVEYTS et al., 2011). La seconde partie traite des espèces soumises à homologation uniquement dans les Régions wallonne et bruxelloise ; toutes les données rassemblées dans cette seconde partie ont été traitées par la CH.

Au niveau national, la période couverte par ce rapport a apporté la première mention belge de Grèbe à bec bigarré (*Podilymbus podiceps*), de Pluvier bronzé (*Pluvialis dominica*), de Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*), de Goéland de Kumlien (*Larus glaucooides kumlienii*) et d'Iranie à gorge blanche (*Irania gutturalis*), les trois premières mentions de Goéland de la Baltique (*Larus fuscus fuscus*), la seconde mention de Fuligule à tête noire (*Aythya affinis*), d'Aigle des steppes (*Aquila nipalensis*) et d'Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*), la troisième mention de Bernache du Pacifique (*Branta bernicla nigricans*), de Mouette de Franklin (*Larus pipixcan*), de Mouette de Bonaparte (*Larus philadelphia*), de Goéland railleur (*Larus genei*) et de Harfang des neiges (*Bubo scandiacus*), la quatrième mention de Glaréole à ailes noires (*Glaucopis nordmanni*), de Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*) et de Pie-grièche isabelle (*Lanius isabellinus*), les quatrième et cinquième mentions

d'Élanion blanc (*Elanus caeruleus*) et de Robin à flancs roux (*Tarsiger cyanurus*), les quatrième à sixième mentions de Glaréole à collier (*Glaucopis pratensis*), la cinquième mention de Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*) et de Grive à ailes rousses (*Turdus eunomus*), et les cinquième et sixième mentions de Pluvier fauve (*Pluvialis fulva*). En outre, 2007 a donné lieu à des afflux exceptionnels de Vautours fauves (*Gyps fulvus*) et de Guifettes leucoptères (*Chlidonias leucopterus*), qui sont également décrits ci-dessous.

Les données des années 2007 à 2009 traitées par la CH l'ont été en tout ou en partie par les membres suivants : Alain De Broyer, André Burnel, Christophe Gruwier, René-Marie Lafontaine, Raphaël Lebrun, Jacques-André Leclercq, Pierre Loly, Thibault Mariage, Laurent Raty et Frédéric Vanhove. Le secrétariat de la CH a été assuré par Suzanne Bonmarchand. Pendant la durée de ce traitement,

* La Commission d'Homologation est placée sous les auspices de la Société d'Etudes Ornithologiques Aves et de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) et est membre de l'Association of European Rarities Committees (AERC ; <http://www.aerc.eu>).



Alain De Broyer et Jacques-André Leclercq ont quitté la CH ; les membres actuels les remercient de tout coeur pour le travail accompli durant leur collaboration avec la Commission. Ils ont été remplacés par Pierre Loly et Raphaël Lebrun.

Comme dans nos précédents rapports, la taxonomie et l'ordre systématique adoptés ici sont ceux de Voous (1973, 1977a et 1977b), modifiés par les décisions adoptées par le « Taxonomic Advisory Committee » de l'AERC (Association des commissions d'homologation européennes) (AERC TAC, 2003 ; CROCHET *et al.*, 2010, 2011). La nomenclature vernaculaire française est celle établie par la Commission de l'Avifaune Française, telle qu'appliquée dans l'Inventaire des Oiseaux de France (DUBOIS *et al.*, 2000). Les noms de localités belges situées en Régions wallonne et bruxelloise sont donnés en français ; ceux de localités situées en Région flamande sont donnés en néerlandais.

Le nom de la plupart des espèces traitées ci-dessous est accompagné de chiffres placés entre parenthèses. Dans le cas des espèces soumises à homologation nationale, ces chiffres correspondent à une comptabilisation du nombre d'individus ayant été observés en Belgique, respectivement jusqu'à 1950, de 1951 à 2006, et durant les trois années couvertes par le présent rapport. Les comptes sont basés sur la Liste préliminaire des oiseaux de Belgique (DE SMET, non publié). Dans le cas des espèces soumises à homologation uniquement dans les Régions wallonne et bruxelloise, ces chiffres correspondent aux nombres d'individus dont la présence dans ces deux régions a été homologuée par la CH, respectivement depuis la création de la Commission, et durant les trois années couvertes par ce rapport.

Une liste des espèces et sous-espèces soumises à homologation a été publiée en annexe d'un rapport récent de la Commission (RATY & LA CH, 2005a), et une liste tenue à jour est accessible sur le site Internet de la CH, qui a déménagé et a été remis à neuf en 2011 (nouvelle adresse : <http://www.la-ch.be/>). La seule modification qu'avait subie cette liste jusqu'à présent était le retrait, à partir de 2006, de deux espèces soumises à homologation en Wallonie et à Bruxelles : le Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*) et le Goéland pontique (*Larus cachinnans*) (RATY & LA CH, 2006). Cette liste est ici modifiée de la façon suivante :

- La Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*) est ajoutée aux espèces et sous-espèces soumises à homologation nationale ;

- La Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*) et le Grand Cormoran atlantique (*Phalacrocorax carbo carbo*) sont retirés de l'homologation nationale, mais demeurent soumis à homologation en Wallonie et à Bruxelles ;

- Le Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*), le Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) et le Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*), qui nichent maintenant en Wallonie, sont retirés de l'homologation régionale.

Ces modifications prennent effet rétroactivement à partir du 1^{er} janvier 2011.

Avec le développement d'Internet (et chez nous, en particulier, la mise en place du site d'encodage en ligne <http://www.observations.be> et de son équivalent flamand), de plus en plus d'observations d'oiseaux rares sont rendues publiques sans être soumises aux comités d'homologation. Certaines données sont régulièrement accompagnées de documents (photographies, vidéos, enregistrements, ou simplement descriptions suffisamment détaillées) permettant de juger de leur exactitude. Afin de ne pas perdre la totalité de ces mentions, la CH et le BAHC ont tous deux décidé de les rechercher activement, comme cela se pratique déjà dans de nombreux autres pays européens. Dès lors, la CH recherchera les observations effectuées dans la partie francophone du pays, le BAHC fera de même pour la partie néerlandophone. Cependant, une majorité de données n'est pas assez détaillée pour permettre une évaluation correcte et un archivage par la CH. Celle-ci cherchera alors à contacter l'auteur de l'observation afin de récolter les détails nécessaires pour permettre l'évaluation de la donnée bien qu'une demande d'homologation en bonne et due forme reste toujours préférable. Si l'observateur ne réagit pas, la mention sera examinée sur base des seuls documents trouvés en ligne. En cas d'examen positif, cette mention sera alors publiée comme homologuée ; cependant, la source citée dans les rapports des comités, en lieu et place du nom de l'observateur, sera alors le site Internet sur lequel se trouvent les documents utilisés lors de l'examen. Si le résultat de l'examen n'est pas positif, la mention n'apparaîtra pas du tout dans les rapports des comités. Des mentions ayant été examinées de cette façon sont déjà incluses dans le présent rapport.



Abréviations utilisées :

Provinces et Région :

A : Anvers	N : Namur
BW : Brabant Wallon	O : Flandre Orientale
H : Hainaut	RBC : Région Bruxelles-Capitale
L : Limbourg	VB : Brabant Flamand
Lg : Liège	W : Flandre Occidentale
Lx : Luxembourg	

Âge et plumage

juv. : juvénile	fem. : femelle
imm. : immature	ex. : exemplaire
ad. : adulte	

Divers

arch. : document déposé dans les archives de la CH ou du BAHC

– 27 au 29 décembre 2008, Rotem (L) : 1 imm. de 1^{er} hiver (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

– 22 janvier au 1 février 2009, Doel (O), Doelpolderweiden : 1 ad. (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 21 au 27 décembre 2009, Doel (O), Nieuw Arenbergpolder : 1 ad. (rapports Walter Van den Bussche et Dieter Van den Heuvel ; BAHC).

Le traitement des mentions de cette espèce est toujours complexe. La Bernache à cou roux est un oiseau d'ornement très courant, et les observations concernant des oiseaux échappés de captivité sont probablement plus fréquentes que celles d'oiseaux réellement sauvages. Certains échappés sont facilement reconnaissables comme tels, apparaissant à des périodes de l'année anormales, en dehors des zones fréquentées par d'autres oies sauvages avec lesquelles un oiseau pourrait avoir voyagé, et présentant un comportement trop familier. Pour d'autres individus, les choses peuvent cependant être beaucoup plus compliquées. Il est déjà arrivé qu'une bague, prouvant une origine captive, ne soit détectée sur un oiseau observé dans des conditions qui semblaient parfaites pour un oiseau sauvage que plusieurs jours après sa découverte.

1. Espèces soumises à homologation nationale

1.1. Données homologuées

Bernache cravant à ventre pâle (1, 26, 0-1-0)
(*Branta bernicla hrota*)

– 31 décembre 2008, Middelkerke (W) : 2 ad. (rapport David De Grave ; BAHC).

Bernache du Pacifique (0, 2, 0-0-1)
(*Branta bernicla nigricans*)

– 29 décembre 2009, Knokke (W), en mer : 1 ex. (rapport Michaël Abts ; BAHC).

Bernache à cou roux (1, 47, 1-2-2)
(*Branta ruficollis*)

– 26 au 29 décembre 2007, Dilsen-Stokkem (L) : 1 imm. de 1^{er} hiver (rapport Steven Vangompel ; BAHC).

– 1 février 2008, Merkem (W), IJzerbroeken : 1 imm. de 1^{er} hiver (rapport Koen Devos ; BAHC).

Oie naine (1, 77, 0-1-2)
(*Anser erythropus*)

– 15 décembre 2008, Dudzele (W) : 1 ad. (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 27 janvier au 8 mars 2009, Woumen (W), IJzerbroeken : 1 ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 29 décembre 2009 au 13 janvier 2010, Oudenburg / Stalhille (W) : 1 ad. (rapport Johan BUCKENS ; BAHC).

Comme pour la Bernache à cou roux, la situation est obscurcie par la présence assez fréquente d'oiseaux échappés.

Canard à front blanc (0, 16, 0-0-1)
(*Anas americana*)

– 5 au 20 avril 2009, Verrebroek (O), Verrebroekdok : 1 mâle (rapport Mathias D'Haen ; BAHC).



Sarcelle à ailes vertes (0, 20, 2-0-0)
(*Anas carolinensis*)

- 22 janvier 2007, Tielrode (O), sur l'Escaut : 1 mâle ad. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).
- 14 au 18 novembre 2007, Brecht (A), Hoofsweer : 1 mâle ad. en mue vers le plumage d'hiver (rapports Jan Scheirs et Gerald Driessens ; BAHC).

Fuligule à bec cerclé (0, 16, 4-0-1)
(*Aythya collaris*)

- 14 au 16 janvier 2007, Ploegsteert (H), argilières : 1 mâle (Kristof Goemaere, Grégory Lepoutre *et al.* ; photo Denis Devos arch. CH ; CH).
- 20 et 21 janvier 2007, Ieper (W), Verdrongen Weide : 1 mâle (rapport Olivier Dochy ; photos Koen Verbanck *in Dutch Birding* 29 : 134, Julien Piette arch. CH ; BAHC).
- 6 au 12 décembre 2007, Obourg (H), cimenterie : 1 mâle ad. (Hugues Dufourny *et al.* ; photos Véronique Buchet, David Monticelli arch. CH ; CH).

– 16 décembre 2007 au 20 janvier 2008, Lanaye (Lg), sur la Meuse (bras mort d'Eijsden) : 1 fem. ad. (André Burnel ; rapport Henri Dineur ; photo Jean-Marie Poncelet *in Aves* 45 : 221, Karel Lemmens *in Dutch Birding* 30 : 52, Arnoud B. van den Berg *in Dutch Birding* 30 : 133 ; CH).

- 27 au 30 mai 2009, Sint-Martens-Latem (O), Westerplas : 1 mâle ad. (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

Les deux mentions de janvier 2007, séparées par une douzaine de kilomètres seulement et sans recoupement de dates, concernent très probablement le même individu. La femelle de Lanaye en 2007-2008, se trouvait littéralement sur la frontière belgo-néerlandaise ; sa présence aux Pays-Bas a également été homologuée par le CDNA (OVAA *et al.* 2008, 2009).

Fuligule à tête noire (0, 1, 1-0-0)
(*Aythya affinis*)

- 17 novembre 2007 au 20 janvier 2008, Harelbeke (W), De Gavers : 1 mâle imm. de 1^{er} hiver (rapport Gerald Driessens ; photo Koen Verbanck *in Dutch Birding* 30 : 58 ; BAHC).

Seconde mention de cette espèce en Belgique et, tout comme la première fois (cf. SELOSSE & LA CH, 2002), l'oiseau impliqué est un mâle de première année. Cette espèce n'est détectée en Europe que depuis assez peu de temps (la première mention européenne, en Camargue, ne date que de 1986 ; VAN DEN BERG & BOSMAN, 1999). La fréquence d'observation de l'espèce a cependant rapidement augmenté depuis, plusieurs oiseaux étant maintenant observés chaque année en Grande-Bretagne (voir <http://bbrc.org.uk>). Une forte proportion de jeunes oiseaux supporte l'idée d'une origine sauvage.

Grèbe à bec bigarré (0, 0, 0-0-1)
(*Podilymbus podiceps*)

- 5 au 11 janvier 2009, Kluizen (O) : 1 ex. en plumage d'hiver (rapport Patrick Beirens ; BEKAERT, 2009 ; photos Johan Buckens *in Dutch Birding* 31 : 76 ; BAHC).

Il s'agit de la première observation de l'espèce en Belgique. Le site, le réservoir d'eau potable de Kluizen, dont l'accès est normalement interdit, était loin d'être idéal pour les observateurs désireux d'aller admirer cet oiseau. Il a heureusement été possible, en concertation avec l'administration, d'obtenir que l'accès soit exceptionnellement autorisé.

Puffin cendré (0, 17, 0-1-0)
(*Calonectris diomedea borealis*)

- 20 novembre 2008, Oostende (W), estacade ouest : 1 ex. (rapport Erik Vanloo ; BAHC).

Puffin des Baléares (0, 29, 1-4-5)
(*Puffinus mauritanicus*)

- 19 juillet 2007, Nieuwpoort (W) : 1 ex. (rapport Jan Heip ; BAHC).
- 15 août 2008, De Panne (W), Witte Berg : 1 ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).
- 23 août 2008, De Panne (W), Witte Berg : 2 ex. (rapport Joris Elst ; BAHC).
- 3 octobre 2008, Oostende (W), estacade ouest : 1 ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).



– 20 août 2009, Middelkerke (W) : 1 ex. en vol NE (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 5 septembre 2009, Oostende, Wenduine et De Panne (W) : 1 ex. en vol SO (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 6 septembre 2009, Oostduinkerke (W), Schipgat-duinen, 1 ex. en vol SO (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 31 octobre 2009, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 2 ex. en vol SO (rapport Bert Pecceu ; BAHC).

Depuis les années 90, l'aire de distribution en mer de cette espèce s'est déplacée vers le nord de façon remarquable (WYNN & YÉSOU, 2007). Actuellement, un grand nombre d'oiseaux séjournent une bonne partie de l'année dans les eaux britanniques et irlandaises, où l'espèce était auparavant rare. Dans ce contexte, on devrait logiquement s'attendre à une augmentation des observations belges. Bien qu'une telle augmentation s'observe dans une certaine mesure dans les données ci-dessus (les 4 oiseaux homologués en 2008 constituaient un record, qui a lui-même été battu dès 2009), les nombres d'oiseaux impliqués restent cependant toujours faibles.

Océanite tempête (5, 67, 3-6-0) (*Hydrobates pelagicus*)

– 9 novembre 2007, De Panne (W) : 1 ex. (rapport Davy De Groote ; BAHC).

– 10 novembre 2007, Wenduine (W) : 1 ex. (rapport Joris Elst ; BAHC).

– 11 novembre 2007, Middelkerke (W) : 1 ex. (rapport Gerald Driessens ; BAHC).

– 21 novembre 2008, De Panne (W), Witte Berg : 1 ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 22 novembre 2008, De Panne (W), Witte Berg : 2 ex. (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 22 novembre 2008, Oostende (W) : 3 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

Malgré la proximité relative de son aire de nidification (Bretagne, ouest et nord de la Grande-Bre-

tagne), cette espèce demeure une réelle rareté en Belgique.

Crabier chevelu (4, 27, 2-1-1) (*Ardeola ralloides*)

– 21 mai 2007, Ekeren (A), Bospolder : 1 ad. (rapport Jean-Pierre Bonnel ; BAHC).

– 22 juin au 8 juillet 2007, Virelles (H) : 1 ex. (Sébastien Pierret, Henri Dumoulin *et al.* ; photos Agnès et Alain Piette in *La Grièche* 8 : 4-5 ; CH).

– 4 août 2008, Hamme (O), Oude Durme : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 25 juin 2009, Zonhoven (L), Platwijers : 1 ex. (rapport Alex Bogaerts ; BAHC).

Le Crabier est presque annuel en Belgique ces dernières années ; la fin du mois de mai et le mois de juin sont la meilleure période de l'année pour le rencontrer.

Ibis falcinelle (72, 30, 2-0-1) (*Plegadis falcinellus*)

– 22 avril 2007, Zonhoven (L), Wijvenheide : 1 ex. (rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 20 mai 2007, Tienen (VB), bassins de décantation : 1 ad. en plumage nuptial (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

– 29 et 30 septembre 2009, Sint-Agatha-Rode (VB), Groot Broek : 1 imm. de 1^{er} hiver (rapport Peter Collaerts ; photo Ingrid Nel in *Le Bruant Wallon* 8 : 19 ; BAHC).

L'ibis falcinelle, qui avait connu un très fort recul en Europe occidentale, est à nouveau en augmentation depuis les années 1990. L'espèce a d'abord recolonisé les deltas du Guadalquivir et de l'Ebre en Espagne ; ensuite, à partir de 2006, une population nicheuse est apparue en France dans le delta du Rhône. Cette population compte maintenant plusieurs centaines de couples nicheurs, et est depuis en croissance exponentielle (KAYSER *et al.*, 2009). Bien que ce retour ne se fasse pas encore réellement sentir dans les mentions acceptées ci-dessus, on peut néanmoins s'attendre à voir d'avantage d'ibis en Belgique dans un avenir relativement proche.



Élanion blanc (0, 3, 1-0-1)

(*Elanus caeruleus*)

– 2 septembre 2007, Honnay (N), tienne du Crahau : 1 ex. en vol SO (Jacques Bultot, Damien Sevrin *et al.* ; CH)

– 4 août 2009, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 ad. (rapport Peter Symens ; BAHC).

Pygargue à queue blanche (31, 74, 5-3-6)

(*Haliaeetus albicilla*)

– 26 avril 2007, Knokke-Heist (W), Zwinbosjes : 1 imm. (rapport Davy De Groote ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Watermael-Boitsfort (RBC) : 1 imm. (rapport Karel Samyn ; BAHC).

– 24 octobre 2007, Boekhoute (O), Oesterputbrug : 1 ex. (rapport Walter Hamelinck ; BAHC).

– 28 octobre 2007, Kessenich (L), Uiterwaarden : 1 ex. (rapport Casper Sleven ; BAHC).

– 8 au 13 décembre 2007, Recogne (Lx), étang de Luchy : 1 juv. (Xavier Vandevyvre, David Monticelli ; photo David Monticelli arch. CH ; CH).

– 20 avril 2008, Kortessem (L) : 1 ex. de 4^e année ou plus (sur base de BECKERS *et al.*, non daté ; BAHC).

– 29 octobre 2008, Mortsel (A), poste de suivi migratoire Zigeuner : 1 imm. (rapport Wout De Rouck ; BAHC).

– 9 novembre 2008, Knokke (W), Het Zwin : 1 imm. (Véronique Adriaens ; photos Véronique Adriaens arch. CH ; CH).

– 25 janvier 2009, Turnhout (A), Turnhouts Vennengebied : 1 ad. en vol NNO (rapport Marc Smets ; BAHC).

– 15 octobre 2009, Kruibeke (O) : 1 imm. en vol SO (rapport Erik Van Bogaert ; BAHC).

– 18 octobre 2009, Asse (VB), Relegem, poste de suivi migratoire de Kruiskouter : 1 juv. en vol NE (Hugues de Garnier, Michel Janssens ; CH).

– 22 octobre 2009, Uitkerke (W) : 1 juv. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 5 décembre 2009 au 17 février 2010, Ronquières / Feluy / Manage / Ecaussinnes / Seneffe (H) : 1 juv. (Théo de Brouwer *et al.* ; photos Bernard Hanus *in Aves* 47 : 234, Mathias Bouzin arch. CH ; CH).

– 13 décembre 2009, Asse (VB), Relegem, poste de suivi migratoire de Kruiskouter : 1 juv. en vol SO (Michel Janssens ; CH).

Bien que se portant de mieux en mieux dans les pays situés au nord du nôtre (aux Pays-Bas, il a niché tous les ans depuis 2006 ; DE RODER & BIJLSMA, 2010), le pygargue reste une rareté en Belgique.

Vautour fauve (4, 29, 212-41-18)

(*Gyps fulvus*)

– mai à juillet 2007, toute la Belgique : afflux, total estimé à 212 ex. (très nombreux observateurs ; CH & BAHC).

Un afflux exceptionnel de Vautours fauves a eu lieu au cours de l'été 2007. Vu le nombre très élevé d'observations et la relative facilité d'identification de l'espèce, il a été décidé de considérer le phénomène comme homologué dans son ensemble. Les mentions ont été analysées par Dominique Verbelen (*in VANDEGEHUCHTE et al.*, 2009), qui a estimé par recoupements le nombre total d'oiseaux impliqués. Cet afflux a également atteint les Pays-Bas, où le CDNA a accepté un total de 113 individus (OVAA *et al.*, 2008). Bien que le phénomène dans son ensemble soit accepté, certains observateurs ont pris la peine de soumettre leurs observations aux comités d'homologation, qui les en remercient. Les mentions suivantes ont été homologuées individuellement et rentrent dans le cadre de l'invasion :

– 15 mai 2007, Bellegem (W) : 2 ex. (rapport Mathias Depoorter ; BAHC).

– 16 juin 2007, Ruisbroek (A) : 18 ex. (rapport Bart De Keersmaecker ; BAHC).

– 17 juin 2007, Mater (O) : 97 ex. ; Edelare (O) : 23 ex. (rapports Bart Heirweg et Guido Minnaert ; photo Gunther Groenez *in Dutch Birding* 29 : 266 ; BAHC).

– 18 juin 2007, Chimay (H), Virelles : 52 à 54 ex. (Damien, Robin et Dorian Gailly, Antoine Derouaux ; photos arch. CH ; CH).

– 19 juin 2007, Woluwe-Saint-Pierre (RBC) : 1 ex. (Charles Carels ; CH).



- 19 juin 2007, Weweler (Lg), entre Weweler et Lascheid : 1 ex. (Alain De Broyer ; CH).
 - 20 juin 2007, Auderghem (RBC), Clos du Bergoje : 1 ex. (Jacques Schwerz ; CH).
 - 20 juin 2007, Malmedy (Lg), Ma Campagne (site Natura 2000 33052) : 2 ex. (Alain De Broyer ; CH).
 - 21 juin 2007, Angleur (Lg), Bois Saint-Jacques : 2 ex. (Vincent Louwette ; CH).
 - 6 au 9 juillet 2007, Mont-Saint-Guibert (BW) : 1 juv. (rapport Lebrun R. ; CH).
 - 25, 26 et 28 mai 2008, Oplabbeek (L), terril minier de Zwartberg : 17 ex. les 25 et 26 mai ; 2 ex. le 28 mai (basé sur www.observations.be ; BAHC).
 - 29 et 30 mai 2008, Etikhove (O) : 9 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).
 - 8 juin 2008, Eisden (L) : 1 ex. (B. Vilain ; BAHC ; photo B. Vilain in BECKERS *et al.*, non daté: 11).
 - 23 juin 2008, Bassenge (Lg), Boirs : 11 ex. (Eric et Nils Bonten, Jean-Luc Doutrewé *et al.* ; photos Jean-Luc Doutrewé arch. CH ; CH).
 - 24 juin 2008, Jalhay (Lg), Solwaster : 1 ex. (Michel Petit ; CH).
 - 12 juin 2009, Termes (Lx), butte de Termes : 3 ex. (Marc Ameels ; CH).
 - 12 juin 2009, Gedinne (Lx), Louette-Saint-Pierre, en bordure du massif de la Croix Scaille : 15 ex. (Alain De Broyer ; photos Alain De Broyer arch. CH ; CH).
- ELST *et al.* (2010) ont par erreur publié la mention du 23 juin 2008 comme concernant un seul individu, et ont omis celle du 24 juin.
- Circaète Jean-le-Blanc** (4, 31, 1-6-11)
(*Circaetus gallicus*)
- 19 juin 2007, Tessengerlo (L), Engsbergen 1 ex. (rapport Frank Van De Meuter ; BAHC).
 - 24 avril 2008, Saint-Ghislain (H), Les Marionville : 1 ex. (Paola Cucurnia ; CH).
 - 3 au 5 mai 2008, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 ex. (rapport Dirk Symens ; BAHC).
 - 17 mai 2008, Sint-Agatha-Rode (VB), Groot Broek : 1 ex. (rapport Ronan Felix ; BAHC).
 - 24 au 27 mai 2008, Helchteren (L), domaine militaire : 1 ex. (sur base de BECKERS *et al.*, non daté ; BAHC).
 - 26 juin 2008, Leefdaal (VB) : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).
 - 6 juillet 2008, Saint-Aubin (N) : 1 ex. (Hugues Dufourny, Véronique Buchet ; CH) .
 - 5 avril 2009, Saint-Ghislain (H), Les Marionville : 1 ex. (Emmanuel Dehombreux, Vincent Dufour ; CH).
 - 11 au 17 avril 2009, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 ex., puis 2 ex. le 17 avril (rapport Dirk Symens ; BAHC).
 - 16 mai 2009, Lier (A) : 1 ex. en vol E (basé sur www.observations.be ; BAHC).
 - 17 et 18 mai 2009, Brecht (A) : Groot Schietveld, 1 ex. (rapport Dirk Symens ; BAHC).
 - 19 mai 2009, Harzé (Lg), Paradis, Bois des Fagnes : 1 ex. (Robin Gailly ; CH).
 - 22 mai 2009, Torgny (Lx) : 1 ex. (rapport Antoon Blondeel ; BAHC).
 - 13 juin 2009, Nijlen (A) : 1 ex. passant en vol (rapport Rudy Lenaerts ; BAHC).
 - 20 juin 2009, Asse (VB), Relegem, poste de campagne de Kruiskouter : 1 ex. en vol NE (Michel Janssens ; CH).
 - 19 juillet au 6 août 2009, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 ex. (rapport Dirk Symens ; photo Glenn Vermeersch in *Dutch Birding* 31 : 314 ; BAHC).
 - 19 au 21 août 2009, Turnhout (A), Turnhouts Vennengebied : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).
- L'observation du 20 juin 2009 a été par erreur publiée comme ayant eu lieu le 20 mai par FAVEYTS *et al.* (2011).



Avec 6 cas acceptés, l'année 2008 représentait déjà un record pour cette espèce ; l'année 2009, avec 11 oiseaux homologués, a été encore plus fructueuse. Juin est traditionnellement le meilleur mois (FAVEYTS & DE SMET, 2007) mais, au cours des trois années traitées ici, d'avantage d'observations ont été faites en mai.

Busard pâle (13, 15, 2-3-2)

(*Circus macrourus*)

– 30 et 31 août 2007, Clermont (N), Mont de Viscourt : 1 mâle imm. de 2^e été (Bernard Hanus ; photo Marc Fasol in *La Grièche* 8 : 9, Vincent Legrand in *Dutch Birding* 29 : 339 ; Bernard Hanus arch. CH ; CH).

– 22 octobre 2007, Diepenbeek (L), De Maten : 1 juv. (rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 9 avril 2008, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 mâle ad. (rapport Dirk Symens ; BAHC).

– 27 avril 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fontejntjes : 1 imm. de 1^{er} été (rapport Miguel Demeulemeester ; photo Johan Buckens in *Dutch Birding* 30 : 209 ; BAHC).

– 2 au 9 septembre 2008, Hannut (Lg) : 1 fem. imm. de 1^{er} été (Alain de Broyer *et al.* ; photo Alain De Broyer in *Aves* 46 : 124, Vincent Legrand in *Dutch Birding* 30 : 448 ; Philippe Vanmeerbeeck in *Bruant Wallon* 4 : 18 ; CH).

– 29 mars 2009, Hannut (Lg) : 1 mâle ad. (Jean-Sébastien Rousseau-Piot ; photos Jean-Sébastien Rousseau-Piot arch. CH ; CH).

– 25 août 2009, Boneffe / Tavieres (N) : 1 mâle imm. de 1^{er} été (Thibault Mariage, Alain de Broyer ; photos Alain De Broyer arch. CH ; CH).

L'observation du 27 avril 2008 a par erreur été publiée comme ayant été effectuée le 20 avril par ELST *et al.* (2010).

Cette espèce est en nette augmentation dans tout le nord-ouest de l'Europe (FAVEYTS & DE SMET, 2007). En Belgique, elle est observée annuellement depuis 2003.

Buse pattue (-, -, 12-2-10)

(*Buteo lagopus*)

– 20 octobre 2007, Meldert-Hoegaarden (VB) : 1 juv. (rapport Freek Verdonck et Peter Collaerts ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Lommel (L), Lommel-Kolonie : 1 juv. (rapport Toon Jansen ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Lommel (L), Lommel-Kolonie : 1 autre juv., en migration, à 14h30 (rapport Toon Jansen ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Mechelse Heide (L) : 1 juv. (rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Outgaarden (VB), Bosdelkouter : 1 juv. (rapport Erwin Collaerts ; BAHC).

– 21 octobre 2007, Watervliet (O) : 1 juv. (rapport Pieter Dhaluin ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Tessenderlo (L), Engsbergen : 1 juv. (rapport Frank Van de Meutter ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Geistingen (L), Houbenhof : 1 ex. (rapport Miel Opendacker ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Zoersel (A), terrain d'aviation d'Oostmalle : 1 juv. (rapport Jan Scheirs et Norbert Willaert ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Asse (VB), Relegem, Kruiskouter : 1 juv. (rapport Axel Smets ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Ixelles (RBC) : 1 juv. (Philippe Dubois ; CH).

– 23 octobre 2007, Schulen (L) : 1 juv. (rapport Koen Leysen).

– 9 au 27 mars 2008, Merdorp / Ambresin (Lg) : 2 juv. les 9 et 10 mars, ensuite 1 juv. (Benoît Deboeck, Thibault Mariage *et al.* ; photos Philippe Vanmeerbeeck in *Aves* 46 : 25, Benoît Deboeck arch. CH ; CH).

– 7 janvier 2009, Herenthout (A) : 1 ad. en vol O (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 11 janvier au 1 mars 2009, Knokke (W), Het Zwin : 1 mâle imm. de 2^e hiver (rapport Johan Buckens ; BAHC).

– 4 au 8 février 2009, Merelbeke (O) : 1 fem. imm. de 2^e hiver (rapport Wouter Faveyts ; BAHC).



– 6 au 23 février 2009, Woumen (W), IJzerbroeken : 1 ex. (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 21 février 2009, Schelderode (O) : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 28 février 2009, Cantelmoliniepolder, Knokke (W) : 1 fem. imm de 2^e hiver (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 7 au 15 mars 2009, Kalmthout (A) : 1 imm. de 1er hiver (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 22 octobre 2009, Uitkerke (W) : 1 juv. en vol NE (rapport Werner Goussej ; BAHC).

– 31 octobre 2009, Beerse (A), Het Blak : 1 ad. en vol (rapport François Bartholomeeusen ; BAHC).

– 2 novembre 2009, Hoogstraten (A), Minderhout : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

Aigle pomarin (3,3,1-0-1)
(*Aquila pomarina*)

– 14 juillet 2007, Zwijndrecht (A) : 1 imm. (rapport Wouter Faveyts ; BAHC).

– 19 avril 2009, Lommel (L), Kristallijn : 1 ex. en vol NE (rapport Toon Jansen ; BAHC).

Aigle des steppes (0, 1, 1-0-0)
(*Aquila nipalensis*)

– 5 juin 2007, Zolder (L), Terlamen : 1 imm. en vol N (rapport Geert Beckers ; BAHC).

C'est la seconde observation belge de cette espèce.

Aigle botté (0, 8, 0-0-0)
(*Aquila pennata*)

ADDENDUM

– 14 août 1999, Virton (Lx) : 1 ex. de forme claire (rapport Koert Scholten ; BAHC).

Une donnée vieille de plus de 10 ans, soumise par un ornithologue néerlandais avec une description très complète de l'espèce (qui présente traditionnellement un taux élevé de données non-acceptées).

Aigle de Bonelli (1, 4, 1-0-0)
(*Aquila fasciata*)

– 15 mai 2007, Hensies (H), marais d'Hensies : 1 imm. de 1er été (Dirk et Luc Verroken ; photos Luc Verroken arch. CH ; CH).

Cette mention a accidentellement été omise par VANDEGEHUCHTE *et al.* (2009).

Marouette poussin (4, 30, 1-1-1)
(*Porzana parva*)

– 30 avril 2007, Wintam (A), Zuidelijk Eiland : 1 ad. (rapport Geert Spanoghe ; photo Yves Adams ; BAHC)

– 15 août 2008, Harelbeke (W), De Gavers : 1 juv. (rapport Filip Goussaert ; BAHC).

– 22 août au 5 septembre 2009, Lier (A), Andersstad : 1 imm. de 1^{er} hiver (basé sur www.observations.be ; photo Kris De Rouck *in Dutch Birding* 31 : 319 ; BAHC)

Marouette de Baillon (4, 25, 1-0-0)
(*Porzana pusilla*)

– 15 juillet 2007, Wintam (A), Noordelijk Eiland : 1 ad. (rapport René De Boom ; BAHC).

Outarde canepetière (15, 10, 0-1-0)
(*Tetrax tetrax*)

– 20 avril 2008, Korbeek-Dijle (VB) : 1 mâle ad. (rapport Johan Nysten ; photos Raymond De Smet *in Dutch Birding* 30 : 208, Vincent Legrand *in Dutch Birding* 30 : 209 ; BAHC).

Première donnée d'Outarde canepetière depuis 2000 : un mâle adulte qui s'est laissé admirer par une foule d'observateurs ! Cette espèce est en régression, en particulier dans le SO de l'Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) ; il ne faut donc pas s'attendre à ce que sa fréquence d'observation en Belgique augmente.

Oedicnème criard (9, 52, 6-1-1)
(*Burhinus oedicnemus*)

– 29 avril 2007, Ragnies (H) : 1 ex. (Bernard Hanus ; photos Bernard Hanus *in La Grièche* 7 : 13 ; CH).



– 10 mai 2007, Remichcampagne (Lx) : 1 ex. (Yves Kempeneers ; CH).

– 13 mai 2007, Kruishoutem (O), Zijldegemkouter : 1 fem. ad. (rapport Davy De Groote ; photo Bart Heirweg ; BAHC).

– 17 juillet 2007, Gent (O), Kluizendok : 1 ex. (rapport Davy Bosman ; BAHC).

– 20 juin 2007, Matagne-la-Petite (N) : 1 ad. (François Doyen, Jacques Houbart ; photos François Doyen arch. CH ; CH).

– 24 et 25 août 2007, Boneffe (N), plaine de Boneffe nord : 1 ad. (Thibault Mariage *et al.* ; photos Walther Leers arch. CH ; CH).

– 15 juin 2008, Wuustwezel (A), Wezelse Heide : 1 ad. (rapport Dirk Symens ; BAHC).

– 21 et 22 mai 2009, Clermont-lez-Walcourt (N) : 1 ad. (Bernard Hanus ; rapport Maarten Schurmans ; photo Bernard Hanus *in La Grièche* 16 : 7 ; CH & BAHC).

Glaréole à collier (0, 3, 0-3-0) (*Glareola pratincola*)

– 5 mai 2008, Doel (O), Doelpolder Noord : 1 ex. (rapport Raf Drijvers ; BAHC).

– 7 mai 2008, Rotem (L), Bichterweerd : 1 ex. (rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 22 au 25 juin 2008, Bredene (W) : 1 ad. (rapport Miguel Demeulemeester ; photo Koen Verbanck *in Dutch Birding* 30 : 284 ; BAHC).

Glaréole à ailes noires (1, 1, 0-0-1) (*Glareola nordmanni*)

– 25 et 26 septembre 2009, Longchamps (N) : 1 ad. (Philippe Vanmeerbeeck *et al.* ; rapport Peter Collaerts ; photos Philippe Vanmeerbeeck *in Bruant Wallon* 8 : 10 ; CH & BAHC).

La mention précédente de cette espèce en Belgique date de 1982. La rareté de la Glaréole à ailes noires chez nous contraste fortement avec la régularité avec laquelle elle est observée aux Pays-Bas (37 mentions homologuées jusqu'à 2009; OVA *et al.*, 2010). Cette espèce apparaît

typiquement dans le nord-ouest de l'Europe occidentale à l'automne (VAN DEN BERG & BOSMAN, 1999, HUDSON *et al.* 2010), contrairement à la Glaréole à collier (*Glareola pratincola*) qui est beaucoup plus fréquente au printemps.

Pluvier bronzé (0, 0, 0-0-1) (*Pluvialis dominica*)

– 26 avril 2009, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes, puis Knokke (W), Het Zwin : 1 ex. (rapport Johan Buckens ; BAHC).

Première mention belge de l'espèce. Cet oiseau a d'abord été observé en migration active depuis le poste de suivi migratoire des Fonteintjes, puis retrouvé en stationnement au Zwin, en compagnie de Pluviers argentés (*Pluvialis squatarola*), par un des observateurs ayant participé à la première observation. Au Zwin, il a plusieurs fois survolé la partie néerlandaise du site, et a ensuite finalement continué sa route vers le NE au-dessus du territoire des Pays-Bas.

Pluvier fauve (0, 4, 0-2-1) (*Pluvialis fulva*)

– 19 au 21 novembre 2008, Doel (O), Paardenschor : 1 ad. (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 30 en 31 décembre 2008, Nieuwpoort (W), Ijzermonding : 1 ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 30 octobre au 9 décembre 2009, Kieldrecht / Sint-Gillis-Waas (O), Nieuwe Arenbergpolder / Drijdyck / Puttenplas : 1 ex. en plumage d'hiver (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

L'année 2008 a vu, pour la première fois, plusieurs mentions homologuées de Pluvier fauve. Les observations de Flandre orientale en 2008 et 2009 sont géographiquement proche, et il est concevable qu'elles concernent un seul individu revenant sur le même site ; le BAHC a néanmoins choisi de les traiter comme deux cas distincts.

Vanneau sociable (0, 8, 2-0-0) (*Vanellus gregarius*)

– 13 au 27 septembre 2007, Virelles (H) : 1 ad. (Fabrice Etienne, Hugues Dufourny *et al.* ; DEFLORENNE, 2007c ; photos Julien Piette *in La Grièche* 9 : 37 ; CH).



– 15 décembre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 ex. (rapport Joris Elst ; BAHC).

Bécasseau tacheté (0, 58, 0-2-4)
(*Calidris melanotos*)

– 3 au 8 septembre 2008, Brugge (W), Zeebrugge, Hoge Noen : 2 juv. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 3 mai 2009, Éghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ad. en plumage nuptial (Jean-Sébastien Rousseau-Piot ; photos Jean-Sébastien Rousseau-Piot arch. CH ; CH).

– 4 mai 2009, Tienen (VB), bassins de décantation : 1 ad. (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

– 30 mai au 1 juin 2009, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 1 ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 16 août 2009, Veurne (W) : 1 ad. capturé et bague (rapport Norbert Roothaert ; BAHC).

Bien que le Bécasseau tacheté soit souvent perçu comme une espèce américaine, il niche aussi dans l'Arctique sibérien. Aux cours des dernières décennies, l'aire de nidification sibérienne de l'espèce s'est étendue vers l'ouest, pour atteindre la limite nord-ouest de la Russie européenne (JACKSON, 1997 ; voir aussi LAPPO, 1998). Il est plus que probable que bon nombre des oiseaux observés en Europe nous arrivent de l'est, et non de l'ouest.

Bécasseau falcinelle (4, 18, 3-1-1)
(*Limicola falcinellus*)

– 20 et 21 mai 2007, Mont-Saint-Guibert (WB), sablière : 1 ad. en plumage nuptial (Bruno Marchal *et al.* ; photo Bruno Marchal [asbl Plumalia] arch. CH ; CH).

– 22 mai 2007, Bourgoyen, Gent (O) : 1 ad. en plumage nuptial (rapport Simon Feys ; BAHC).

– 24 mai 2007, Stuivekenskerke (W), Viconiakleiputten : 1 ad. en plumage nuptial (rapport Koen



Photo 1 – Bécassine double / Great Snipe *Gallinago media* (Rotem [L], 06-05-2007, photo : Vincent Legrand)



Devos ; photos Julien Piette et Yves Baptiste ; BAHC).

– 12 mai 2008, Rotem (L), Bichterweerd: 1 ad. en plumage nuptial (rapport Geert Beckers ; photo Ran Schols in *Dutch Birding* 30 : 284, 287 ; BAHC).

– 6 au 9 juillet 2009, Tienen (VB), bassins de décantation : 1 ad. (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

Bécasseau rousset (0, 7, 0-1-0)

(*Tryngites subruficollis*)

– 21 août 2008, Clermont (N), Viscourt : 1 ad. (Bernard Hanus ; HANUS, 2008, 2009 ; photos Bernard Hanus in *La Grièche* 13 : 26, 27, 28, 29, *Aves* 46 : 94 ; CH).

Il s'agit de la première mention wallonne de l'espèce. Sur les 7 autres observations belges de Bécasseau rousset, 6 ont été réalisées à la côte, tandis que la 7^e vient de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers. Une observation en zone de grande culture dans la province de Namur n'était donc pas du tout prévisible.

Bécassine double (68, 68, 1-2-2)

(*Gallinago media*)

– 4 au 7 mai 2007, Rotem (L), Bichterweerd : 1 mâle de 1^{er} été paradant (rapport Geert Beckers & Gerald Driessens ; photo Ran Schols in *Dutch Birding* 29 : 171, 176, Vincent Legrand in *Dutch Birding* 29 : 267 ; BAHC).

– 14 mai 2008, Rotem (L), Bichterweerd, 1 ex. (rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 14 mai 2008, Verrebroek (O) : 1 ex. (rapport Keny Hessel ; BAHC).

– 16 mai 2008, Koningshooikt (A), Jutse Plassen : 1 mâle paradant (rapport Wim Heylen ; BAHC).

– 16 et 17 mai 2009, Mouscron (H), Luigne, le long de l'Espierres : 1 ex. (rapport Christophe Gruwier ; CH).

L'observation de Verrebroek a été publiée par erreur comme ayant été effectuée en 2009 par FAVEYTS *et al.* (2011).

Alors que précédemment les mentions d'automne (principalement septembre) dépassaient en nombre celles de printemps (avril-mai), cette tendance semble s'être inversée ces dernières années. Une étude récente (KLAASEN *et al.*, 2011), portant sur des Bécassines doubles munies d'un géolocalisateur, a conclu que ces oiseaux ralliaient l'Afrique centrale depuis la Scandinavie en seulement quelques jours, donc pratiquement sans s'arrêter. Ce fait n'est sans doute pas étranger à la grande rareté de l'espèce en Europe en dehors de son aire de nidification.

Bécassin à long bec (0, 4, 1-0-0)

(*Limnodromus scolopaceus*)

– 13 mai 2007, Mont-Saint-Guibert (BW), sablière : 1 ex. (Jean-Sébastien Rousseau-Piot ; photos Bruno Marchal in *Aves* 45 : 46, *Bruant Wallon* 2 : 27,34, Jean-Sébastien Rousseau-Piot arch. CH ; CH).

Il s'agit de la première mention wallonne de l'espèce.

Chevalier à pattes jaunes (0, 5, 0-0-0)

(*Tringa flavipes*)

CORRIGENDUM

Une des 6 mentions belges homologuées de cette espèce, concernant un adulte observé les 6 et 7 août **1998** dans l'arrière-port de Zeebrugge (voir RATY & LA CH, 2005), a été réexaminée par le BAHC. Les photos de cet oiseau montrent des caractères qui ne conviennent pas pour un Chevalier à pattes jaunes. Après discussion, le BAHC est arrivé à un consensus, et suggère qu'il s'agissait d'un Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) ayant une apparence quelque peu inhabituelle. Le nombre de mentions belges de Chevalier à pattes jaunes est donc réduit à 5.

Chevalier stagnatille (4, 184, 5-0-1)

(*Tringa stagnatilis*)

– 30 avril au 2 mai 2007, Brugge (W), Zeebrugge, Hoge Noen : 1 ex. (rapport Davy de Groote ; BAHC).

– 2 au 16 juin 2007, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 2 ex. (rapport Tim Goethals, photo Johan Buckens ; BAHC).

– 21 août 2007, Nieuwpoort (W), IJzermondung : 1 ad. en plumage d'hiver (rapport Koen Devos ; BAHC).



Photo 2 – Mouette de Franklin / Franklin's Gull *Larus pipixcan* (Gent [O], 12-07-2009, photo : Vincent Legrand)

– 15 au 22 août 2007, Adinkerke (W) : 1 ex. (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 25 au 28 août 2009, Sint-Agatha-Rode (VB), Groot Broek : 1 juv. (basé sur www.observations.be; photo Luc Hendickx in *Bruant Wallon* 7 : 10 ; BAHC).

Phalarope à bec étroit (-, -, 6-0-2)
(*Phalaropus lobatus*)

– 11 août 2007, Tienen (VB), bassins de décantation : 1 juv. muant vers 1^{er} hiver (rapport et photo Maarten Schurmans ; BAHC).

– 11 août 2007, Schulen (L), Schulensbroek : 1 juv. muant vers 1^{er} hiver (rapport Koen Leysen ; BAHC).

– 18 au 25 août 2007, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 2 juv. puis, à partir du 21 août, 3 juv. (rapport Stijn Cooleman, photo Miel Ferdinande ; BAHC).

– 11 novembre 2007, De Panne (W) : 1 imm. de 1^{er} hiver (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 3 juin 2009, Freux (Lx) : 1 fem. ad. en plumage nuptial (Benôît Molitor, Didier Vieuxtemps ; photos Didier Vieuxtemps arch. CH ; CH).

– 19 au 21 septembre 2009, Zuienkerke (W), Uitkerkse Polder : 2 juv. (basé sur www.observations.be; BAHC).

Mouette de Franklin (0, 2, 0-0-1)
(*Larus pipixcan*)

– 10 au 12 juillet 2009, Kluizendok, Gent (O) : 1 ad. en plumage nuptial (rapport Peter Collaerts ; photo Filip De Ruwe in *Dutch Birding* 31 : 255; BAHC).

Troisième mention de l'espèce en Belgique, la précédente datant déjà de 2000. L'aire de distribution normale de la Mouette de Franklin se trouve dans la partie ouest de l'Amérique du Nord. Il a été proposé que les oiseaux de cette espèce qui arrivent en Europe pourraient être des individus remontant accidentellement dans l'Atlantique (au lieu du Pacifique) depuis leurs zones d'hivernage (FRASER *et al.*, 2007).



Mouette de Bonaparte (0, 2, 0-1-0)

(*Larus philadelphia*)

– 8 juin 2008, Sint-Idesbald (W), sur la plage : 1 imm. de 1^{er} été (rapport Peter Adriaens ; photo Peter Adriaens in *Dutch Birding* 30 : 286 ; BAHC).

Cette donnée montre clairement que l'observation d'un laridé rare peut survenir à n'importe quel moment de l'année.

Goéland railleur (0, 2, 1-0-0)

(*Larus genei*)

– 11 au 13 avril 2007, Knokke (W), Het Zwin : 1 ad. en plumage nuptial (rapport Patrick Beirens ; DIRKS, 2007 ; photos Sjaak Schilperoort in *Dutch Birding* 29 : 184, Jan den Hertog in *Dutch Birding* 29 : 198 ; BAHC).

Seconde observation de l'espèce dans notre pays, moins d'un an après la première (voir RATY & LA CH, 2010). Cet oiseau a été également observé dans la partie néerlandaise du Zwin ; sa présence aux Pays-Bas a été homologuée par le CDNA néerlandais (OVAA *et al.*, 2008).

Goéland d'Audouin (0, 0, 0-1-0)

(*Larus audouinii*)

– 13 avril 2008, Stokkem (L), puis Herstal (Lg), barrage de Monsin : 1 ad. en plumage nuptial (Geert Beckers *et al.* à Stokkem, Laurent Raty à Herstal ; BECKERS 2008a, 2008b, photos Geert Beckers in *Dutch Birding* 30 : 210 ; BAHC & CH)

Première mention de l'espèce en Belgique. Cette espèce a vu ses populations nicheuses augmenter très fortement au cours des dernières décennies (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). Parallèlement à cette augmentation, quelques oiseaux ont commencé à apparaître dans nos régions (nord de la France : HOOGENDOORN, 1995 ; Allemagne : FLORE, 1997 ; Grande-Bretagne : WALKER, 2004 ; Pays-Bas : WOLF, 2003). L'oiseau belge a été découvert vers 11h du matin à Stokkem dans le Limbourg ; vers 13h40, il a été observé volant vers le sud au Pietersplas à Maastricht (Pays-Bas) ; il a enfin été retrouvé en fin de journée sur le barrage de Monsin près de Liège, environ 45 kilomètres au sud de son point de découverte initiale. Son observation aux Pays-Bas a été homologuée par le CDNA néerlandais (OVAA *et al.* 2009).

Goéland à bec cerclé (0, 18, 0-1-0)

(*Larus delawarensis*)

– 1 avril 2008, Kluizen (O), Spaarbekken, au dortoir : 1 ad. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

Une donnée classique pour cette espèce : 10 des 19 Goélants à bec cerclé homologués en Belgique ont été observés au dortoir de laridés de Kluizen et, parmi ces 10 observations, 9 ont été réalisées en mars-avril.

Goéland de la Baltique (0, 0, 2-0-1)

(*Larus fuscus fuscus*)

– 11 mai 2007, Gent (O), Kluizendok : 1 imm. de 1^{er} été (rapport et photos Davy Bosman ; BAHC).

– 2 juin 2007, Cerfontaine (N), lac de l'Eau d'Heure : 1 imm. de 1^{er} été portant une bague de couleur blanche marquée « KRV.1 » le 21 juillet 2006 (Philippe Deflorenne ; DEFLORENNE, 2007b, 2007d ; photos Philippe Deflorenne in *Aves* 44 : 201, 213, *La Grièche* 8 : 34, 35, 37 ; CH), bagué comme pullus à Rombak (mer Blanche, Russie ; Risto Juvaste in *litt.*).

– 8 octobre 2009, Oostende (W), 1 ad. portant une bague de couleur noire marquée « J683 » (rapport Roland Francois ; BAHC), bagué à Horsvaer, Norland, en Norvège.

Les trois mentions reprises ci-dessus sont les premières mentions belges homologuées de cette sous-espèce. La première d'entre elles a été publiée avec une date incorrecte par VANDEGEHUCHTE *et al.* (2009). L'identification de ce taxon en l'absence d'une bague prouvant l'origine de l'oiseau est actuellement considérée comme impossible.

Goéland à ailes blanches (2, 33, 1-5-0)

(*Larus glaucooides*)

– 7 janvier au 22 février 2007, Froidchapelle (H) / Boussu-lez-Walcourt (H) / Cerfontaine (N), Barrages de l'Eau d'Heure : 1 ad. (Philippe Deflorenne *et al.* ; rapport Dirk Verroken ; DEFLORENNE, 2007a ; photos Philippe Deflorenne in *La Grièche* 6 : 22, 24, 25, Johan Buckens in *Dutch Birding* 29 : 134 ; CH).

– 12 au 21 janvier 2008, Cerfontaine (N), lac de l'Eau d'Heure : 1 imm. de 1^{er} hiver (Philippe Deflorenne *et al.* ; photo Philippe Deflorenne in *Aves* 45 :



224, *La Grièche* 10 : 14, Marc Fasol in *La Grièche* 10 : 15 ; CH).

– 23 novembre au 20 décembre 2008, Oostende (W) : 1 imm. de 1^{er} hiver (basé sur www.observations.be ; BAHC).

10 décembre 2008, Havay (H), et 8 avril 2009, Havay (H), puis Givry (H) : 1 imm. de 1^{er} hiver (Vincent Leirens; photo Vincent Leirens arch. CH ; CH).

– 12 au 14 décembre 2008, Oostende (W) : 1 imm. de 2^e hiver (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 28 décembre 2008 au 12 janvier 2009, Herstal (Lg) : 1 imm. de 1^{er} hiver (Marc Fasol, Charly Farinelle, Jacques Franchimont *et al.* ; photos Charly Farinelle arch. CH ; CH).

L'oiseau de Havay/Givry (H) cité ci-dessus fréquentait la décharge de Villers-Sire-Nicole (Nord, France), située juste au sud de Havay.

Goéland de Kumlien (0, 0, 0-1-0) (*Larus glaucooides kumlienii*)

– 6 janvier 2008, Nieuwpoort (W), IJzermonding : 1 ad., ssp. *L. g. kumlienii* (Peter Adriaens *et al.* ; ADRIAENS, 2008 ; photo Pieter Vantiegem in *Dutch Birding* 30 : 64 ; BAHC & CH).

Il s'agit de la première mention belge de cette sous-espèce.

Sterne hansel (19, 112, 5-3-1) (*Gelochelidon nilotica*)

– 29 avril 2007, Knokke (W), Het Zwin : 2 ad. (rapport Maarten Schurmans ; BAHC).

– 29 avril 2007, Adinkerke (W), De Drie Vijvers : 1 ad. (rapport Diederik D'Hert ; BAHC).

– 30 avril 2007, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 2 ad. (rapport Stijn Baeten ; BAHC).

– 20 avril 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 1 ad. (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 27 avril 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 1 ad. (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 25 mai 2008, Rumst (A), AWW5 : 1 ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 4 août 2009, Kluizen (O), Spaarbekken : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

Sterne caspienne (11, 117, 5-13-4) (*Hydroprogne caspia*)

– 30 avril 2007, Knokke (W), Het Zwin : 3 ex. (rapport Dieter Van Den Heuvel ; photo Johan Buckens in *Dutch Birding* 29 : 196 ; BAHC).

– 20 août 2007, Nieuwpoort (W), IJzermonding : 1 ad. et 1 juv. (rapport Dieter Van Den Heuvel ; BAHC).

– 14 avril 2008, Liège (Lg), barrage de Monsin : 1 ad. en plumage nuptial (Marc Ameels ; photo Marc Ameels arch. CH ; CH).

– 19 avril 2008, Brecht (A), Groot Schietveld : 1 ad. (rapport Peter Symens ; BAHC).

– 28 avril 2008, Rotem (L), Bichterweerd : 1 ad. (rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 24 juin 2008, Sint-Agatha-Rode (VB), Groot Broek : 2 ad. (basé sur www.observations.be ; photo Axel Smets in *Bruant Wallon* 3 : 17 ; BAHC).

– 28 au 31 juillet 2008, Gent (O), Bourgoyen : 2 ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 25 juillet 2008, Aalter (O), Kraenepoel : 4 ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 9 août 2008, Mol (A), Molse Zandputten : 1 ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 29 août 2008, Nieuwpoort (W), IJzermonding : 1 ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 5 avril 2009, Mol (A), Molse Zandputten : 2 ad. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 9 mai 2009, Grobbendonk (A) : 1 ad. (rapport Robin Vermeylen ; BAHC).

– 10 mai 2009, Mol (A) : 1 ex. (rapport Maarten Schurmans ; BAHC).

À partir du 1^{er} janvier 2011, cette espèce n'est plus



soumise à homologation qu'en Région wallonne et en Région bruxelloise.

Guifette leucoptère (6, 199, 345-7-3)

(*Chlidonias leucopterus*)

– 17 au 21 mai 2007, toute la Belgique : afflux, totaux estimés à 31 ex. en Wallonie et 312 ex. en Flandre (très nombreux observateurs ; CH & BAHC).

Au cours du printemps 2007, sur une durée d'à peine une semaine, a eu lieu le plus grand afflux de Guifettes leucoptères jamais enregistré en Belgique. En raison du nombre très important d'observations et de la facilité d'identification de l'espèce à cette époque de l'année, il a été décidé de considérer le phénomène comme homologué dans son ensemble. Le nombre total d'oiseaux observés en Wallonie a été estimé par MARIAGE & JACOB (2008), tandis que les mentions flamandes ont été comptabilisées par le BAHC lui-même (VANDEGEHUCHTE *et al.*, 2009 ; les mentions wallonnes sont par contre entièrement omises dans cette publication). Cet afflux a également été constaté ailleurs dans le nord-ouest de l'Europe, en particulier aux Pays-Bas (plusieurs milliers d'exemplaires et quatre couples reproducteurs ; EBELS, 2007a, 2007b). Bien que le phénomène dans son ensemble soit accepté, certains observateurs ont pris la peine de soumettre leurs observations aux comités d'homologation, qui les en remercient. Les mentions suivantes ont été homologuées individuellement et rentrent dans le cadre de cette invasion :

– 17 mai 2007, Bernissart (H), marais d'Harchies, étang de Pommeroeul, et 21 mai 2007, Hensies (H), marais d'Hensies : 1 ad. (Dirk et Luc Verroken *et al.* ; photos Luc Verroken, arch. CH ; CH).

– 18 mai 2007, Tienen (VB), bassins de décantation : 1 ad. en plumage nuptial (rapport Philippe Smets ; BAHC).

– 18 mai 2007, Antwerpen (A), Blokkersdijk : 1 ex. (rapport Stijn Baeten ; BAHC).

– 18 mai 2007, Verrebroek (O) : 1 ex. (rapport Stijn Baeten ; BAHC).

– 19 mai 2007, Éghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 3 ad. et 1 subad. (Philippe Vanmeerbeeck *et al.* ; photos Philippe Vanmeerbeeck *in Aves* 45 : 60, 61 ; CH).

– 20 et 21 mai 2007, Zoutleeuw (VB), Het Vinne : respectivement 8, et 3 ad. en plumage nuptial (rapport Philippe Smets ; BAHC).

– 20 mai 2007, Zemst (VB), Bos van Aa : 2 ex. (rapport Maurice Segers ; BAHC).

– 20 mai 2007, Duffel (A) : 14 ex. (rapport Gerald Driessens ; BAHC).

– 21 mai 2007, Hollogne-sur-Geer (Lg), bassins de décantation : 2 ex. (Alain De Broyer ; photos Alain De Broyer arch. CH ; CH).

– 21 août 2007, Harelbeke (W), De Gavers : 1 ex. (rapport Koen Verbanck ; BAHC).

– 25 août 2007, Zoutleeuw (VB), Het Vinne : 1 juv. (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

– 11 mai 2008, Rotem (L), Bichterweerd : 2 ad. (sur base de BECKERS *et al.*, non daté ; photo Ran Schols *in Dutch Birding* 30 : 285 ; BAHC).

– 28 juillet 2008, Geistingen (L), Houbenhof : 1 ex. (rapport Geert Beckers ; BAHC).

– 31 août 2008, Geistingen (L), Houbenhof : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 6 au 10 septembre 2008, Kallo (O), Groot Rietveld : 1 juv. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 12 septembre 2008, Kruikebeke (O) : 1 ex. (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 13 septembre 2008, Oostende (W), estacade ouest : 1 ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 7 mai 2009, Kieldrecht (O), Putten West : 1 ad. en plumage nuptial (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 10 mai 2009, Kieldrecht (O), Puttenplas : 2 ex. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

Guillemot à miroir (1, 12, 0-1-0)
(*Cephus grylle*)

– 1 mars 2008, Oostende (W) : 1 ad. (rapport Andreas Ranner ; BAHC).

Un ornithologue autrichien attentif a observé, lors



d'un voyage à la côte belge, le quatorzième Guillemot à miroir de Belgique.

Macareux moine (6, 140, 6-0-0)
(*Fratercula arctica*)

– 10 novembre 2007, Wenduine (W) : 1 ad. en plumage d'hiver et 1 juv. (rapport Joris Elst ; BAHC).

– 10 novembre 2007, De Panne (W) : 1 ex. (photo Diederik d'Hert ; BAHC).

– 11 novembre 2007, Wenduine (W) : 1 ad. en plumage d'hiver (rapport Joris Elst ; BAHC).

– 11 novembre 2007, Middelkerke (W) : 1 ad. (rapport Gerald Driessens, photo Johan Buckens ; BAHC).

– 11 novembre 2007, Oostende (W) : 1 ex. (photo Jonas Mortelmans ; BAHC).

ADDENDUM

– 14 février **2005**, Blankenberge (W) : 1 ex. (rapport Tim Bekaert ; BAHC).

Coucou-geai (1, 5, 1-0-0)
(*Clamator glandarius*)

– 28 juillet 2007, Westvleteren (W) : 1 juv. trouvé affaibli ; amené en centre de revalidation où il décède le 29 juillet (Nathalie Parret ; photos Miguel Demeulemeester ; BAHC).

Harfang des neiges (0, 2, 0-1-0)
(*Bubo scandiacus*)

– 19 novembre 2008 au 13 mars 2009, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 1 mâle imm. (rapport Peter Collaerts ; DRIESSENS, 2009 ; photos Filip de Ruwe *in Dutch Birding* 31 : 57 ; BAHC).

Le Harfang qui a passé tout l'hiver 2008-2009 dans le polder d'Uitkerke a sans doute été l'un des oiseaux rares les plus populaires et les plus observés de Belgique. Des centaines d'ornithologues, littéralement – non seulement belges, mais aussi venant des pays voisins – se sont déplacés pour admirer cet oiseau. L'hiver 2008-2009 a vu un afflux notable de cette espèce dans nos régions, avec notamment 9 mentions homologuées au Royaume-Uni (HUDSON *et al.* 2010), une jeune femelle hivernant sur les îles de la mer des

Wadden aux Pays-Bas (OVAA *et al.* 2010), et même un oiseau observé aux Açores (VAN DEN BERG & HAAS, 2009).

Martinet à ventre blanc (2, 26, 0-1-2)
(*Apus melba*)

– 9 mai 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 1 ex. (rapport Miguel Demeulemeester ; photo Johan Buckens *in Dutch Birding* 30 : 366 ; BAHC).

– 9 et 10 avril 2009, Blankenberge (W) : 1 ex. (rapport Johan Buckens ; BAHC).

– 13 avril 2009, Tienen (VB) : 1 ex. (rapport Michaël Vandeput ; BAHC).

ADDENDUM

– 14 avril **2003**, Bredene (W), Spanjaardduinen : 1 ex. (rapport Johan Buckens ; BAHC).

Alouette calandre (0, 1, 0-1-0)
(*Melanocorypha calandra*)

– 12 mai 2008, Groot Schietveld, Brecht (A), 1 ex (rapport Peter Symens ; BAHC).

Seconde mention de cette espèce en Belgique. La première observation avait été réalisée à Ramillies (N), le 23 novembre 1997 (voir SELOSSE & LA CH, 2002). Tout comme en 2008, il s'agissait d'une observation sans document photographique.

Alouette calandrelle (12, 26, 0-1-2)
(*Calandrella brachydactyla*)

– 21 avril 2008, Kieldrecht (O), Putten West : 1 ex. (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 25 avril 2009, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 1 ex. en vol NE (Christophe Gruwier *et al.* ; CH).

– 16 au 18 mai 2009, Harzé (Lg), Paradis : 1 ex. (Robin Gailly *et al.* ; photos René Dumoulin *in Aves* 47 : 56 ; CH).

Hirondelle rousseline (0, 23, 1-5-5)
(*Cecropis daurica*)

– 21 avril 2007, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 3 ex. en vol. NE (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC)



Photo 3 – *Hirondelle rousseline* / Red-rumped Swallow
Cecropis daurica (Knokke [W], 17-11-2009, photo : Jules Fouarge)

– 27 avril 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 2 ex. en vol. NE (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC) ; De Haan (W), 1 ex. en vol. NE (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 4 mai 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 1 ex. en vol. NE (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 9 mai 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 2 ex. en vol. NE (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 10 avril 2009, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes : 2 ex. en vol. NE (rapport Johan Buckens ; BAHC).

– 26 avril 2009, Uitkerke (W), Uitkerkse Polder : 1 ex. (rapport Niels Goulem ; BAHC).

– 17 novembre 2009, Knokke (W), Het Zwin : 2 imm. de 1^{er} hiver (Jules Fouarge; photos Jules Fouarge arch. CH ; CH).

ERRATUM

– 29 avril **2006**, Zoutleeuw (VB), Het Vinne, 1 ex. (et non 2 ex.) (rapport Philippe Smets ; BAHC).

L'oiseau du 4 mai 2008 a également été vu à La Panne et Bredene. L'apparition annuelle de plusieurs Hirondelles rousselines est aujourd'hui devenue une évidence en Belgique. La plupart des oiseaux sont observés au printemps (avril-mai), en

passage le long de la côte. Ces observations représentent des cas typiques d'« overshooting » : des oiseaux qui, lors de leur migration de printemps, arrivent chez nous en dépassant accidentellement leur aire de nidification, située plus au sud. Les données d'automne sont nettement plus rares; les oiseaux du 17 novembre 2009 ci-dessus constituent la mention la plus tardive jamais enregistrée en Belgique.

Pipit de Godlewski (0, 5, 1-0-0) (*Anthus godlewskii*)

– 21 octobre 2007, Flémalle (Lg), Awirs, Terril du Hena : 1 imm. de 1^{er} hiver capturé et bagué (49V53993) (André Burnel, André Vandewer *et al.* ; BURNEL *et al.*, 2008; photo André Burnel *in Aves* 45 : 187, 188, arch. CH ; CH).

Il s'agit de la première mention wallonne de cette espèce. Les photos des rectrices des Pipits de Richard et de Godlewski ont été malencontreusement inversées dans la publication citée ci-dessus.

Bergeronnette citrine (0, 7, 1-0-0) (*Motacilla citreola*)

– 8 au 10 septembre 2007, De Panne (W), Adinkerke : 1 imm. de 1^{er} hiver (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

Rossignol progré (0, 30, 1-0-0) (*Luscinia luscinia*)

– 25 août 2007, Koksijde (W), Doornpanne : 1 ex. capturé et bagué (rapport Diederik D'Hert ; BAHC).

Gorgebleue à miroir roux (4, 52, 0-1-0) (*Luscinia svecica svecica*)

– 17 mai 2008, Oorderen (A), Grote Kreek : 1 mâle ad. en plumage nuptial (rapport Karel Helsen ; BAHC).

Seuls les mâles adultes en plumage nuptial sont facilement reconnaissables. Le chevauchement des mensurations avec celles de *L. s. cyaneacula* rend les femelles et les oiseaux d'automne en main difficiles, voire impossibles, à identifier.

Robin à flancs roux (0, 3, 0-0-2) (*Tarsiger cyanurus*)

– 15 au 26 octobre 2009, Heist (W), haie : 2 ex. du



15 au 17 octobre inclus, ensuite 1 ex. (rapport Jelle Van den Berghé ; photo Dirk Ottenburghs in *Dutch Birding* 31 : 377 ; BAHC).

La présence de deux oiseaux simultanément au même endroit en Belgique reste unique à ce jour.

Iranie à gorge blanche (0, 0, 1-0-0)
(*Irania gutturalis*)

– 25 août 2007, Sint-Laureins (O) : 1 juv. capturé et bagué (rapport Kjell Janssens ; JANSSENS, 2007 ; photos Kjell Janssens in *Dutch Birding* 29 : 340 ; BAHC).

Nouvelle espèce pour la Belgique. L'endroit et la date ne sont pas exactement ce à quoi on s'attendrait pour un tel migrateur à longue distance. Une des 4 données acceptées aux Pays-Bas est cependant très similaire : elle concerne aussi une capture à l'intérieur des terres, le 30 août 2003 à Loozerheide, dans le Limbourg. L'iranie à gorge blanche est une grande rareté en Europe, hors de son aire de nidification. Les données se comptent sur les doigts de la main, la plupart dans le Nord de l'Europe (RIJPM & BAKKER, 2006).

Tarier oriental (0, 8, 0-1-0)
(*Saxicola maurus*)

– 19 au 21 octobre 2008, Kumtich (VB), Terrassenlandschap : 1 mâle imm. de 1^{er} hiver (rapport Peter Collaerts ; BAHC).

Monticole de Roche (5, 1, 0-0-0)
(*Monticola saxatilis*)

ADDENDUM

– 13 avril 2000, Büllingen (Lg), Mürringen, lieu-dit Bolder : 1 mâle ad. (Frank Vassen ; CH).

Première mention de l'espèce en Belgique depuis 1905 ! Cette observation a été par erreur publiée comme ayant été effectuée le 23 avril par ELST *et al.* (2010).

Grive à ailes rouges (3, 1, 0-0-1)
(*Turdus eunomus*)

– 3 au 24 janvier 2009, Érezée (Lx), 1 mâle imm. de 1^{er} hiver (Noé Terorde *et al.* ; TERORDE & DEROUAUX, 2009 ; EBELS *et al.*, 2009 ; rapport Peter Collaerts ; photos Jean-Marie Poncelet in *Aves* 46 : 2, 3, 6, Jules Fouarge in *Aves* 46 : 3, Martin van der Schalk et Roland Jansen in *Dutch Birding* 31 : 75 ; CH & BAHC).



Photo 4 – Grive à ailes rouges / Dusky Thrush *Turdus eunomus* (Érezée [Lx] 04-01-2009, photo : Vincent Legrand)



La mention précédente de cette espèce en Belgique remontait à 1956 ; l'oiseau d'Érezée représente la première mention de terrain de l'espèce dans notre pays.

Locustelle fluviatile (0, 11, 2-3-3)

(*Locustella fluviatilis*)

– 16 au 26 mai 2007, Kessel (A), Kessel Bartstraat : 1 mâle chanteur (rapport Stijn Baeten et Gerald Driessens ; BAHC).

– 1 au 4 juin 2007, Harchies (H) : 1 mâle chanteur (Rudy Crohin, Véronique Adriaens, Dirk Verroken *et al.* ; photos Elisabeth Godding arch. CH ; CH).

– 10 au 13 mai 2008, Erpe-Mere (O), réserve Honnegem : 1 mâle chanteur (rapport Wouter Faveyts ; BAHC).

– 30 juin au 4 juillet 2008, Hotton (Lx), Fronville, camp militaire de Marche-en-Famenne : 1 mâle chanteur (Brigitte Chiwy, Didier Vieuxtemps, Geert Spanoghe *et al.* ; photos Marc Ameels *in Aves* 46 : 90, 47 : 71 ; CH).

– 27 août 2008, Ingooigem (W) : 1 ex. capturé et bagué (rapport Marcel Lauwers ; BAHC).

– 28 mai au 6 août 2009, Marche-en-Famenne (Lx), dans une friche le long de la N839 : nidification ; 1 mâle chanteur jusqu'à fin juin, puis chantant de nouveau, mais en sourdine, fin juillet ; 2 juv. capturés et bagués (10863880 et 10863881) le 6 août (Philippe Goffart, Didier Vieuxtemps *et al.* ; GOFFART *et al.*, 2010 ; enregistrement du mâle arch. CH ; photos Marc Declercq *in Aves* 47 : 66, Didier Vieuxtemps *in Aves* 47 : 67, *Dutch Birding* 31 : 319 ; CH).

Les observations de 2009 constituent le premier cas de nidification de l'espèce en Belgique.

Rousserolle des buissons (0, 8, 0-0-1)

(*Acrocephalus dumetorum*)

– 22 août 2009, Mechelen (A), Mechels Broek : 1 imm. de 1^{er} hiver capturé et bagué (rapport Regis Nossent ; BAHC).

Rousserolle isabelle (0, 25, 2-1-1)

(*Acrocephalus agricola*)

– 12 juin 2007, Heist (W), Kleiputten : 1 ex. (rapport Peter Adriaens ; photo Johan Buckens *in Dutch Birding* 29 : 268 ; BAHC).

– 11 août 2007, Mont-Saint-Guibert (BW), centre d'enfouissement technique : 1 ad. capturé et bagué (10338183) (Olivier Poncin, Bruno Marchal *et al.* ; photos Olivier Poncin et Bruno Marchal arch. CH ; CH).

– 31 août 2008, Sint-Laureins (O), Kommer : 1 ex. capturé et bagué (rapport Paul Schollaert ; photo Miguel Demeulemeester *in Dutch Birding* 30 : 366 ; BAHC).

– 18 septembre 2009, Wijchmaal (VB) : 1 imm. de 1^{er} hiver capturé et bagué (rapport Andy Vanendert ; BAHC).

L'oiseau de Heist en 2007 n'est que la deuxième observation de juv. de Rousserolle isabelle. C'est aussi seulement la troisième observation de terrain de l'espèce. Il est intéressant de noter que sur l'île de Vlieland, aux Pays-bas, au mois d'août de la même année, trois juvéniles et une femelle adulte de cette espèce portant une plaque d'incubation ont été capturés, suggérant que l'espèce avait niché sur place (VAN REE, 2007 ; OVAA, 2008).

Fauvette passerinette (0, 17, 0-1-1)

(*Sylvia cantillans*)

– 25 mai 2008, Stuivekenskerke (W), Viconiakleiputten : 1 mâle (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 9 mai 2009, Brugge (W), Zeebrugge, plage du môle ouest : 1 mâle chanteur, ssp. *S. c. albistriata* (rapport Tom Goossens ; photo Johan Buckens *in Dutch Birding* 31 : 258 ; BAHC).

L'oiseau de Zeebrugge en 2009 a été identifié comme appartenant à la sous-espèce orientale *albistriata* (nichant de l'extrême nord-est de l'Italie jusqu'à la Turquie) sur base de son cri.

Fauvette pitchou (0, 8, 0-1-0)

(*Sylvia undata*)

– 18 octobre 2008 au 1^{er} février 2009, Heist (W), plage : 1 imm. de 1^{er} hiver (basé sur www.observations.be ; photo Patrick Beirens *in Dutch Birding* 30 : 448 ; BAHC).



Il s'agit du second cas d'hivernage dans notre pays.

Pouillot boréal (0, 5, 2-0-0)

(*Phylloscopus borealis*)

– 23 septembre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, buissons sur la plage : 1 ex. (rapports Patrick Beirens et Gerald Driessens ; photo Johan Buckens in *Dutch Birding* 29 : 414 ; BAHC).

– 3 octobre 2007, Raversijde (W), Koninklijke Domein Prins Karel : 1 ex. (rapport Tim Goethals ; photos Johan Buckens in *Dutch Birding* 29 : 413, Miel Ferdinande arch. BAHC ; BAHC).

Pouillot de Pallas (0, 97, 2-3-2)

(*Phylloscopus proregulus*)

– 17 et 18 octobre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, château d'eau : 1 ex. (rapport Avrilien Dermout ; photo Patrick Beirens ; BAHC).

– 18 au 21 octobre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, château d'eau : 1 autre ex. (rapport Patrick Beirens et Gerald Driessens ; photo Patrick Beirens in *Dutch Birding* 29 : 413 ; BAHC).

– 10 octobre 2008, Heultje (A), Wittegracht : 1 ex. capturé et bagué (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 1 novembre 2008, Pepingen (VB) : 1 ex. capturé et bagué (rapport Edwig Vanhassel ; BAHC).

– 14 novembre 2008, Grembergen (O) : 1 ex. capturé et bagué (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 25 et 26 octobre 2009, Wenduine (W) : 1 ex. (rapport Peter Adriaens ; BAHC).

– 13 novembre 2009, Essen (A) : 1 ex. capturé et bagué (rapport Joris Elst ; BAHC).

Pouillot de Schwarz (0, 20, 1-0-2)

(*Phylloscopus schwarzi*)

– 12 octobre 2007, Ingooigem (W) : 1 imm. de 1^{er} hiver capturé et bagué (10588311) (rapport Marcel Lauwers ; BAHC).

– 21 et 22 octobre 2009, Brugge (W), Zeebrugge,

avant-port : 1 ex. (rapport Franck Hollander ; photo Raphaël Lebrun in *Dutch Birding* 31 : 377 ; BAHC).

– 21 et 22 octobre 2009, Bellem (O) : 1 ex. capturé et bagué le 21, toujours sur place le jour suivant (rapport Nico De Regge ; BAHC).

Pouillot brun (0, 33, 2-0-0)

(*Phylloscopus fuscatus*)

– 19 octobre 2007, De Haan (W) : 1 ex. capturé et bagué (AH1508) (rapport Philippe Schepens ; BAHC).

– 20 au 22 octobre 2007, Nieuwpoort (W) : 1 ex. (rapports Patrick Beirens et Erwin Collaerts ; BAHC).

ADDENDUM

– 21 octobre **2001**, Westende (W) : 1 ex. (rapport Johan Buckens ; BAHC).

Pouillot ibérique (0, 3, 0-0-1)

(*Phylloscopus ibericus*)

– 13 avril au 17 juin 2009, Mouscron (H), Dotignies : 1 mâle chanteur (rapport Christophe Gruwier ; enregistrement Nicolas Selosse arch. CH ; photos Johan Buckens et Quentin Dupriez arch. CH ; CH).


Cette espèce a été signalée plusieurs fois par an en Belgique ces dernières années mais toutes les mentions n'arrivent pas jusqu'aux comités d'homologation. Ces mentions concernent à peu près toujours des mâles chanteurs. Pour confirmer l'identification de l'espèce, il est essentiel que son chant, et éventuellement son cri, ait été enregistré car un certain nombre de cas signalés ces dernières années se sont finalement avérés être des oiseaux au chant aberrant, soit des Pouillots véloces (*Phylloscopus collybita*), soit peut-être des hybrides Pouillot véloce x Pouillot fitis (*Ph. trochilus*).

Gobemouche nain (0, 84, 4-4-2)

(*Ficedula parva*)

– 17 mai 2007, Nieuwpoort (W) : 1 ex. (rapport Joachim Bertrands, photo Dieter Coelembier ; BAHC).

– 19 et 20 septembre 2007, Heist (W) : 1 imm. de 1^{er} hiver (rapport Tomas Willems ; BAHC).



– 7 octobre 2007, Brugge (W), Zeebrugge : 1 mâle ad. (rapport Patrick Beirens ; BAHC).

– 20 au 25 octobre 2007 : Blankenberge (W), buissons le long de la route côtière : 1 imm. de 1^{er} hiver (rapports Patrick Beirens, Davy Bosman et Gerald Driessens ; BAHC).

– 4 juin 2008, Verrebroek (O), Verrebroekse Plas-sen : 1 mâle imm. de 1^{er} été chanteur (rapport Kenny Hessel ; BAHC).

– 26 septembre 2008, Blankenberge (W), Sealife : 1 mâle ad. (rapport Patrick Beirens ; BAHC).

– 4 octobre 2008, Loppem (W) : 1 imm. de 1^{er} hiver, capturé et bagué (rapport Filip Deruwe ; BAHC).

– 31 octobre 2008, Brugge (W), Zeebrugge, buis-sons le long de la route côtière : 1 imm. de 1^{er} hiver. (rapport Patrick Beirens ; BAHC).

– 4 mai 2009, Wuustwezel (A) : 1 mâle imm. de 1^{er}

été (rapport Peter Symens ; BAHC).

– 31 octobre 2009, Heist (W), môle ouest : 1 imm. de 1^{er} hiver (rapport Tom Goossens ; BAHC).

ELST *et al.* (2010) ont par erreur publié l'observation du 4 juin 2008 comme ayant été effectuée le 5 juin, et le mâle adulte du 26 septembre 2008 comme étant un oiseau de première année.

Grimpereau des bois nordique

(*Certhia familiaris familiaris*)

– 12 février 2009, Brugge (W), Zeebrugge : 1 ex. capturé et bagué, ssp. *C. f. familiaris* (rapport Phi-lippe Schepens ; BAHC).

Pie-grièche isabelle (0, 3, 0-1-0)

(*Lanius isabellinus*)

– 11 octobre 2008, Oorderen (A), De Kuifeend : 1 imm. de 1^{er} hiver, ssp. *L. i. phoenicuroides* (basé sur www.observations.be ; BAHC).



Photo 5 – Pie-grièche à poitrine rose / Lesser Grey Shrike *Lanius minor* (Othée [L] 29-08-2009, photo : Vincent Legrand)



Les parties inférieures de cet oiseau étaient blanchâtres, sans traces de roux ou d'orange, et assez fortement barrées ; la gorge était blanche ; la teinte des parties supérieures était plutôt froide ; et le masque était relativement marqué. Ces caractères suggèrent une Pie-grièche du Turkestan (*Lanius isabellinus phoenicuroides*), plutôt qu'une Pie-grièche de Dahourie (*L. i. isabellinus*).

Pie-grièche à poitrine rose (1, 6, 0-1-1)
(*Lanius minor*)

– 19 et 20 juillet 2008, Heers (L), Opheers / Waremme (Lg), Oleye : 1 ex. (Yvon Princen *et al.* ; photos Jules Fouarge arch. CH ; BAHC & CH).

– 28 et 29 août 2009, Othée (Lg) : 1 juv. (Carine Richerzhagen, Peter Collaerts *et al.* ; photos Dirk Ottenburghs et Vincent Legrand *in Dutch Birding* 31 : 320, Marc Ameels, Jean-Sébastien Rousseau-Piot arch. CH ; BAHC & CH).

Deux mentions, deux années consécutives et toutes deux en Hesbaye, représentent un résultat assez remarquable pour cette espèce qui n'avait plus été observée en Belgique depuis 20 ans.

Pie-grièche à tête rousse (-, 132, 2-0-2)
(*Lanius senator*)

– 15 mai 2007, Bertrix (Lx), Nevraumont : 1 ex. (Pierre Ghysel ; photos Pierre Ghysel arch. CH ; CH).

– 10 juillet 2007, Lummen (L), vallée du Zwarte Beek : 1 fem. ad. (rapport Steven Vangompel ; BAHC).

– 19 au 28 avril 2009, Zandvoorde (W), Weiden Noordede, 1 mâle (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 5 au 7 mai 2009, Stalhille (W), Weiden Pompje, 1 fem. (basé sur www.observations.be ; BAHC).

Les deux mentions de 2009 se succèdent de peu et sont géographiquement proches l'une de l'autre, mais concernent sans aucun doute possible deux oiseaux distincts.

Étourneau roselin (17, 42, 0-0-1)
(*Pastor roseus*)

– 26 septembre au 1 octobre 2009, Blankenberge (W),

De Fonteintjes : 1 juv. (rapport Tom Goossens ; BAHC).

Sizerin blanchâtre (1, 22, 0-4-0)
(*Carduelis homemanni*)

– 25 novembre 2008, Essen (A), De Nol : 1 ex. capturé et bagué (rapport Joris Elst ; BAHC).

– 26 novembre 2008, Houthulst (W) : 1 ex. capturé et bagué (rapport Miguel Demeulemeester ; BAHC).

– 29 novembre 2008, Etegem (W), Rohoekske : 1 ex. capturé et bagué (basé sur www.observations.be ; BAHC).

– 1 décembre 2008, Oorderen (A), De Kuifeend : 1 ex. capturé et bagué (rapport Ludo Roothaert ; BAHC).

Ces oiseaux sont arrivés avec le fort afflux de Sizerins boréaux (*Carduelis f. flammea*) de la fin de l'automne 2008. C'était le moment où jamais pour obtenir une observation de terrain !

Roselin cramois (3, 38, 0-0-3)
(*Carpodacus erythrinus*)

– 25 mai au 11 juin 2009, Elsenborn (Lg) : 1 mâle ad. chanteur (Klaus Forßmann, Heinz Weishaupt ; photos arch. CH ; CH).

– 1 juin 2009, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 mâle imm. de 1^{er} été (rapport Johan Buckens ; BAHC).

– 20 juin 2009, Boorseem (L), Gravelco : 1 mâle imm. de 1^{er} été (rapport Jan Geens ; BAHC).

Le Roselin cramois reste une espèce très irrégulière et imprévisible. En sont témoins ces trois mâles chanteurs dispersés sur la totalité du territoire belge en 2009, qui suivent deux années sans la moindre observation.

Bruant à calotte blanche (1, 19, 0-0-1)
(*Emberiza leucocephalos*)

– 7 mars 2009, Theux (Lg), Laboru : 1 mâle de 2^e année calendaire, capturé et bagué (10810667) (Joseph Rouchet, Claudy Hardy ; photos arch. CH ; CH).

Bruant zizi (125, 76, 3-2-1)
(*Emberiza cirulus*)



– 4 avril 2007, Theux (Lg), Laboru : 1 mâle, capturé et bagué (48V25676) (rapport Joseph Rouchet ; photos arch. CH ; CH).

– 26 mai au 18 juin 2007, Treignes (N), rue de Mazée : 1 mâle chanteur (Olivier Roberfroid, Marc Lambert *et al.* ; ROBERFROID, 2007 ; photos Fanny Ellis in *La Grièche* 8 : 27, 28, Vincent Legrand et Marc Ameels in *Dutch Birding* 29 : 268 ; CH).

– 13 au 16 juillet 2007, Harzé (Lg) : 1 mâle chanteur (Robin Gailly ; photos Robin Gailly arch. CH ; CH).

– 15 mai 2008, Zoersel (A), terrain d'aviation d'Oostmalle : 1 fem. (rapport Jan Scheirs ; BAHC).

– 12 décembre 2008 au 18 janvier 2009, Doel (O), Scheldedijk : 1 mâle ad. (rapport Gerald Driessens ; photo Toy Jansen in *Dutch Birding* 31 : 54 ; BAHC).

– 16 mai 2009, Koksijde (W) : 1 mâle de 1^{er} été, capturé et bagué (rapport Robert Desaever ; BAHC).

Bruant fou (24, 28, 0-1-1)
(*Emberiza cia*)

– 21 avril 2008, Theux (Lg), Juslenville : 1 mâle ad. dans un jardin (Paul Dupont ; photo Paul Dupont arch. CH ; CH).

– 20 octobre 2009, Sommethonne (Lx) : 1 fem. imm. de 1^{er} hiver, capturée et baguée (11002933) (Joseph Trossard, Eric Dans ; photo Eddy Colson arch. CH ; CH).

Bruant nain (6, 42, 3-0-3)
(*Emberiza pusilla*)

– 29 septembre 2007, Lebbeke (O) 1 ex. (rapport Albert Mannaert ; BAHC).

– 19 au 21 octobre 2007, Brugge (W), Zeebrugge, avant-port : 1 ex. (Alain De Broyer *et al.* ; CH).

– 22 octobre au 13 novembre 2007, Essen (A), bassins Pidpa : 1 ex. (rapport Joris Elst ; BAHC).

– 23 octobre 2007, Wijchmaal (L) : 1 imm. de 1^{er} hiver capturé et bagué (10421901) (rapport Karel Van Endert ; BAHC).

– 5 janvier 2009, Berendrecht (A) : 1 imm. de 1^{er} hiver capturé et bagué (rapport Guido Goris ; BAHC).

– 25 au 28 février 2009, Drogenen (O) : 1 ex. (rapport Geert Spanoghe ; BAHC).

– 30 octobre 2009, Sint-Amands (A) : 1 ex. (rapport André Pauwels ; BAHC).

L'observation d'octobre 2007 a été accidentellement omise par VANDEGEHUCHTE *et al.* (2009).

1.2. Données n'ayant pas reçu l'homologation

1.2.1. Catégorie D (oiseaux d'origine incertaine, mais potentiellement sauvages)

Bernache à cou roux
(*Branta ruficollis*)

– 31 octobre 2009, Havinnes (H), 1 ex. (Vincent Dufour ; CH).

Cette observation a par erreur été publiée comme ayant été effectuée le 30 octobre par FAVEYTS *et al.* (2011).

1.2.2. Catégorie E (échappés de captivité)

Oie des neiges
(*Anser caerulescens*)

– 7 septembre 2007, Verrebroek (O), Verrebroekse Plassen : 3 ex. (rapport Dimitry De Wilde ; BAHC).

– 24 mars 2007, Duffel (A) : 1 ad. de forme blanche en vol (Frédéric Garcia ; CH).

– 19 avril au 21 août 2009, Tongeren (L) : 1 ex. (BAHC).

– 13 au 27 août 2009, Verrebroek (O) : 2 ex. (BAHC).

Oie de Ross
(*Anser rossii*)

– 19 décembre 2009 au 17 janvier 2010, Klemskerke / De Haan / Houtave / Zuienkerke (W) : 1 ex. (BAHC).



Oie naine

(*Anser erythropus*)

– 18 octobre 2008, 4 et 31 janvier, 27 mars, 6 au 11 mai, 29 septembre et 9 décembre 2009, Denderleeuw (O), Wellemeersen : 1 ex. (basé sur www.observations.be; BAHC).

– 3 janvier 2009, Rijkevorsel (A) : 1 ex. (BAHC).

– 12 mars, 15 avril 2009, Bree (L), De Luysen – Mariahof : 1 ex. (BAHC).

– 15 octobre, Tervuren (VB) : 1 ex. (BAHC).

Bernache à cou roux

(*Branta ruficollis*)

– 5 août 2009, Essen (A) : 1 ex. (BAHC).

Bernache de Hutchins

(*Branta hutchinsii*)

– 28 décembre 2009, Klemskerke (W) : 1 ex. (BAHC).

Le BAHC a estimé qu'une origine captive était la plus probable pour cet oiseau.

Pélican blanc

(*Pelecanus onocrotalus*)

– 8 novembre 2009, Oostende (W), zone portuaire : 1 ex. en vol (BAHC).

Buse féroce

(*Buteo rufinus*)

– 19 octobre 2008 au 26 mars 2009, Doel (O) : 1 imm., ssp. *B. r. cirtensis* (rapport Kenny Hessel ; HESSEL, 2008a, 2008b ; photos Johan Buckens in *Dutch Birding* 30 : 418, Patrick Beirens in *Dutch Birding* 30 : 451, Jan den Hertog in *Dutch Birding* 31 : 52 ; BAHC).

Après des recherches approfondies et la consultation de plusieurs spécialistes, le BAHC a estimé qu'il était préférable de ne pas accepter cette observation comme la première mention de Buse féroce en Belgique. Cet oiseau est identifié comme appartenant à la sous-espèce nord-africaine *cirtensis*, notamment en raison de sa petite taille, avec une tête proportionnellement grosse. Cette

sous-espèce est décrite dans la littérature (FERGUSON-LEES & CHRISTIE, 2001 ; DEL HOYO *et al.*, 1994) comme principalement sédentaire, n'effectuant que des mouvements erratiques à courte distance. Les mentions acceptées de *cirtensis* en Europe sont très peu nombreuses, et fortement concentrées dans les régions immédiatement proches de l'Afrique (extrême sud de l'Espagne, sud de l'Italie). L'importation illégale de Buse féroce *cirtensis* d'Afrique du Nord est par contre apparemment une réalité avérée ou fortement suspectée dans plusieurs pays d'Europe du Nord.

1.2.3. Données dont le traitement a été laissé en suspens

Buse de Russie

(*Buteo buteo vulpinus*)

– 30 septembre 2007, Honnay (N), Tienne du Cra-hau : 1 ad. (Stéphane Cornet, Damien Sévrin *et al.* ; photos Stéphane Cornet arch. CH; CH).

– 30 septembre 2007, Corenne (N), Jusaine, 1 ad. (Hugues Dufourny ; CH).

– 10 au 12 septembre 2009, Verlaine (Lg), 1 ex. (Thierry Ory ; CH).

Ces mentions sont raisonnablement bien documentées et concernent des oiseaux présentant des caractères associés à cette sous-espèce dans la littérature. Néanmoins, dans l'état actuel de nos connaissances, il ne nous est pas possible d'affirmer avec un degré de certitude raisonnable que ces oiseaux *sont* des Buses de Russie. La CH est cependant intéressée par la collecte de mentions de tels oiseaux, et préfère donc publier ces mentions séparément des observations réellement insuffisamment documentées.

1.2.4. Données insuffisamment documentées

Oie naine (*Anser erythropus*) : 2 novembre 2008, Brecht (A), 1 ex. (BAHC) ; 11 novembre 2008, Houthulst (W), 4 ex. (BAHC). Deux oiseaux observés en vol : sans preuve matérielle photographique, ces données sont difficiles à documenter et à accepter.

Oie de la taïga (*Anser fabalis fabalis*) : 11 janvier 2009, Nieuwenrode (VB), 5 ex. (BAHC).



Oie rieuse du Groenland (*Anser albifrons flavirostris*) : 26 janvier 2007, Heppeneert (L), 1 ex. (BAHC). Un bec jaune ou orange n'est pas en soi suffisant pour faire d'une Oie rieuse un oiseau du Groenland. Le bec des Oies rieuses sibériennes *Anser a. albifrons*, même s'il est normalement principalement rose, présente aussi fréquemment des parties jaunes (cf. CRAMP & SIMMONS, 1988) ; chez certains oiseaux, ce jaune serait plus important. D'autre part, une « grande Oie rieuse avec un grand bec orangé » risque aussi toujours d'être un hybride porteur de gènes d'Oie cendrée (*Anser anser*). Pour ces raisons, les comités d'homologation préfèrent être prudents et n'accepter, pour l'instant en tout cas, que les individus présentant une suite complète de caractères associés à *flavirostris*. L'oiseau devrait être un peu plus grand qu'une Oie rieuse classique ; avoir le cou et le bec plus longs ; avoir un plumage nettement plus foncé, avec une teinte de fond plus brune sur le ventre, une ligne blanche au flanc moins marquée, une bande terminale blanche plus étroite à la queue et des liserés pâles plus fins aux couvertures et aux tertiaires ; avoir un bec à peu près entièrement jaune vif ou orange. Des photos et descriptions d'oiseaux présentant une partie seulement de ces caractères sont néanmoins bienvenues et seront conservées avec soin pour être réexaminées, si de nouvelles informations concernant l'identification des sous-espèces d'Oie rieuse devaient être publiées.

Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*) : 11 juin 2007, Kalmhout (A), Klein Schietveld, 1 ex. (BAHC) ; 15 mai 2007, Lommel (L), 1 ex. (BAHC). Descriptions trop sommaires.

Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) : 23 novembre 2007, Leopoldsburg (L), 1 ex. (BAHC) ; 31 décembre 2008, Ougrée (Lg), 1 imm. (CH) ; 4 janvier 2009, Groot Schietveld, Brecht (A), 1 ad. en vol NE (BAHC). Descriptions insuffisantes.

Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*) : 12 et 13 janvier 2008, De Pinte (O), 1 ex. (BAHC).

Vautour fauve (*Gyps fulvus*) : 24 juillet 2009, Eupen (Lg), 1 ex. (BAHC).

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : 22 août 2007, Kinrooi (L), 1 ex. (BAHC) ; 3 avril 2009, Lommel (L), Kristallijn, 1 ex. en vol ESE (BAHC) ;

23 avril 2009, Viersel (A), Viersels Gebroekt, 1 ex. en vol NE (BAHC) ; 26 mai 2009, Knesselare (O), Vrekem, 1 ex. en vol SO (BAHC) ; 1 juin 2009, Halleux (Lx), 1 ex. (BAHC).

Busard pâle (*Circus macrourus*) : 14 juillet 2008, Louvain-la-Neuve, 1 mâle ad. (CH).

Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 30 septembre 2007, Ertvelde (O), 1 ex. (BAHC) ; 11 avril 2009, Viersel (A), Viersels Gebroekt, 1 imm. de 1^{er} en vol (BAHC). Données insuffisamment documentées.

Buse pattue (*Buteo lagopus*) : 17 janvier 2007, Zandvliet (A), 1 ex. (BAHC) ; 11 mars 2007, Doel (O), Doelpolder Noord, 1 ex. (BAHC) ; 15 mai 2007, Bierset (Lg), aéroport, sablière de Fontaine, 1 fem. ad. (CH) ; 23 mai 2007, Wierde (N), vallée du Tronquoi, 1 fem. (CH) ; 23 octobre 2007, Watermael-Boitsfort (RBC), 1 ex. (CH) ; 8 octobre 2008, Honnay (N), Tienne du Crahau, 1 ex. (CH) ; 18 janvier 2009, Boorseem (L), Gravelco, 1 ex. (BAHC) ; 7 mars 2009, Groot Schietveld, Brecht (A), 1 ex. (BAHC) ; 8 novembre 2009, Hageven, Neerpelt (L), 1 fem. ad. en vol O. (BAHC). Tout l'hiver 2009-2010, Cronwez (Lg), 1 ex. (CH).

Aigle pomarin (*Aquila pomarina*) : 7 mai 2008, Schelle (A), 1 ad. (BAHC). La détermination des aigles de taille moyenne (Aigles pomarin, criard *Aquila clanga*, et des Steppes *Aquila nipalensis*) peut être très difficile, d'où l'avis souvent très critique des comités d'homologation pour les données de ces espèces.

Aigle botté (*Aquila pennata*) : 21 septembre 2007, Oostduinkerke (W), Ter Yde, 1 ex. (BAHC) ; 14 mai 2008, Eeklo (W), 1 ad. (BAHC) ; 26 août 2009, Rutten (L), 1 ex. (BAHC).

Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*) : 15 avril 2007, Schulen (L), Schulensbroek, 1 ex. (CH) ; 27 mars 2007, Gosselies (H), 1 imm. de 1^{er} été (CH) ; 28 octobre 2009, Mons (H), Spiennes (CH). Descriptions trop sommaires.

Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*) : 6 novembre 2009, Zandvoorde (W), Zwaanhoek, 1 ad. en plumage d'hiver (BAHC).

Bécassin indéterminé (*Limnodromus* sp.) : 27 avril 2008, Brugge (W), Zeebrugge, De Fonteintjes,



1 ex. en vol NE (CH). Un oiseau supposé être le même individu a ensuite été observé et photographié en vol au-dessus du Verdrongen Zwarte Polders et à Breskens, Oostburg, Zeeuws Vlaanderen, Pays-Bas. Cette mention a été rejetée par le CDNA (OVAA *et al.*, 2009) ; la CH a jugé que la partie néerlandaise de l'observation était essentielle pour l'homologation de l'oiseau en Belgique.

Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*) : 6 et 7 août 1998, Brugge (W), Zeebrugge, arrière-port : 1 ex. Voir section 1 de ce rapport.

Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*) : 6 août 2008, Schullen (L), 1 ex. (BAHC). Description trop sommaire.

Goéland ichtyaète (*Larus ichthyaetus*) : 9 mai 2009, Leflinge (W), 1 ad. en plumage nuptial en vol O. (BAHC).

Goéland de la Baltique (*Larus fuscus fuscus*) : 7 juillet 2008, Argenteau (Lg), 1 ad. (CH). Dans l'état actuel de nos connaissances, seuls les oiseaux portant une bague démontrant qu'ils sont nés dans l'aire de répartition de ce taxon peuvent lui être attribués avec certitude.

Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*) : 21 août 2009, Kristallijn, Lommel (L), 2 ex. en vol N. (BAHC).

Macareux moine (*Fratercula arctica*) : 22 février 2009, mer du Nord (W), Oostende Pelagic, 3 ex. (BAHC).

Coulicou à bec jaune (*Coccyzus americanus*) : novembre 2008, port d'Antwerpen (A / O), 1 ex. trouvé vivant, amené en centre de revalidation, mais mort ensuite (BAHC). L'oiseau a été déposé dans les collections de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Le BAHC n'a pas été en mesure d'établir clairement les circonstances exactes de la découverte de cet oiseau.

Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) : 18 mai 2009, Mouscron (H), Dottignies, 1 ex. (CH). Rien ne permet d'exclure une Alouette des champs (*Alauda arvensis*).

Gorgebleue à miroir roux (*Luscinia svecica svecica*) : 16 septembre 2007, Tienen (VB), 1 ex. capturé et bagué (BAHC). Donnée non évaluée en automne.

Merle bleu (*Monticola solitarius*) : 14 mai, Mol. (L), 1 ex. Donnée insuffisamment documentée.

Mésange azurée (*Parus cyanus*) : 22 et 23 avril 1986, Sint-Agatha-Rode (VB), 2 ex. Une très vieille mention datant de 1986 a fini malgré tout par arriver devant le BAHC. La Mésange azurée est une espèce extrêmement rare en Europe occidentale, et la description et le croquis l'accompagnant ne permettent pas d'ajouter cette espèce à la liste belge. La description ne correspond pas non plus à une Mésange de Pleske (hybride entre la Mésange azurée et la Mésange bleue *Parus caeruleus*).

Chocard à bec jaune (*Pyrhacorax graculus*) : 5 juin 2007, Doische (N), 1 ex. (CH) ; 22 février 2008, Hamois (N), 1 ex. (CH). Dans les deux cas, documentation insuffisante pour une première belge.

Cassenois moucheté de Sibérie (*Nucifraga cyrocactes macrorhynchos*) : 14 et 15 octobre 2009, Beverlo (L), 1 ex. (BAHC) ; 27 octobre au 2 décembre 2009, Haasrode (VB), 1 ex. (BAHC). L'identification de ces deux oiseaux comme Cassenois moucheté n'est pas disputée mais cette espèce n'est pas soumise à homologation en Belgique. Le BAHC a par contre considéré qu'il était préférable de ne pas tenter d'identifier la sous-espèce concernée sur le terrain.

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : mai 2007, Helchteren (L), 1 ad. (BAHC). Description trop sommaire.

Bec-croisé perroquet (*Loxia pytyopsittacus*) : 2 novembre 2009, Wuustwezel (A), 3 ex. (BAHC). Pour être acceptée, une mention de cette espèce devrait être accompagnée d'un enregistrement et/ou de photos.

Bec-croisé bifascié (*Loxia leucoptera*) : 1 juillet 2009, Koksijde (W), 1 juv. (BAHC). Description suggestive mais insuffisante d'une observation sans jumelles. L'oiseau se trouvait sur le site de baguage d'un bagueur expérimenté, qui a déjà précédemment bagué cette espèce au même endroit.

Bruant zizi (*Emberiza cirulus*) : 23 avril 2007, Liège (Lg), 1 mâle chanteur (CH). Description insuffisante.

Bruant nain (*Emberiza pusilla*) : 1 avril 2009, Sint-Martens-Latem (O), Westerplas, 1 ex. (BAHC).



2. Espèces soumises à homologation uniquement en Région wallonne et bruxelloise

2.1. Mentions homologuées

Oie à bec court (1, 0-0-2) (*Anser brachyrhynchus*)

– 14 janvier au 11 mars 2009, Obourg / Maisières (H) : 1 ex. (Vincent Leirens, Emmanuel Dehombreux *et al.* ; photos Philippe Vanmeerbeeck arch. CH).

– 24 février 2009, Namêche : 1 ex. (Xavier Vandevyvre).

Fuligule nyroca (70, 3-1-7) (*Aythya nyroca*)

– 23 mai au 8 septembre 2007, Bernissart (H), marais d'Harchies : 1 mâle ad. (Dirk Verroken *et al.*; photos Dirk Verroken arch. CH).

– 20 et 23 octobre 2007, Hensies (H), marais d'Hensies : 1 mâle imm. de 1^{er} hiver (Dirk Verroken *et al.* ; photo Luc Verroken arch. CH).

– 25 décembre 2007, Escanaffles (H), sur l'Escaut ; 12 janvier 2008, Escanaffles (H), bassins de décan-tation : 1 mâle ad. (Dirk Derdeyn, Mathieu Derume *et al.* ; photo Luc Verroken arch. CH).

– 11 juillet au 9 septembre 2008, Bernissart (H), marais d'Harchies : 1 mâle ad. (Hugues Dufourny).

– 11 janvier au 15 février 2009, Cerfontaine (N) / Froidchapelle (H), barrages de l'Eau d'Heure : 1 mâle ad. (basé sur www.observations.be ; photos Alain Piette in *La Grièche* 15 : 6, arch. CH).

– 3 février 2009, Liège (Lg), dérivation à hauteur de l'île de la Boverie : 1 fem. (Luc Schmitz).

– 6 janvier au 27 décembre 2009, Ploegsteert (H), argilières : jusque 3 ex. au printemps ; nidi-fication (1 mâle, 1 fem. et 2 pulli) (basé sur www.observations.be ; photos).

À partir du 1^{er} janvier 2011, cette espèce n'est plus soumise à homologation. L'origine des oiseaux observés en Wallonie est devenue très difficile à évaluer ; l'espèce est fréquemment détenue en captivité par les collectionneurs privés et des oiseaux échappés sont régulièrement observés. Depuis 2006, un couple d'origine inconnue niche à Ploegsteert et, ces dernières années, la présence d'individus hybrides nyroca X milouin, essentiellement observés dans la vallée de Haine mais aussi ailleurs en Hainaut, laisse supposer que des repro- ductions hybrides ont lieu localement.

Harelde boréale (-, 2-0-0) (*Clangula hyemalis*)

– 18 et 19 novembre 2007, Pecq (H), sur l'Escaut à hauteur d'Esquelmes, près du pont Bolus : 1 imm. de 1^{er} hiver (Pascal Boland, Nicolas Dutoit *et al.* ; photo Luc Verroken arch. CH).

– 24 au 26 décembre 2007, Pottes (H) / Bossuit (W), sur l'Escaut : 1 fem. (Dirk Derdeyn, Mathieu Derume *et al.*, photos Benoît Gauquie, Luc verroken arch. CH).

Ces deux mentions concernent potentiellement un seul oiseau, dont le plumage aurait légèrement évolué entre fin novembre et fin décembre.

Plongeon imbrin (18, 2-1-1) (*Gavia immer*)

– 27 novembre au 11 décembre 2007, Froidchapelle (H), lac de la Plate-Taille : 1 ad. (Thibault Ma-riage, Hugues Dufourny *et al.* ; photos Véronique Buchet arch. CH).

– 3 décembre 2007, Froidchapelle (H), lac de la Plate-Taille : 1 imm. de 1^{er} hiver, en stationnement, puis quittant le site en vol ENE à 10 : 39 (Hugues Dufourny).

– 27 janvier au 7 avril 2008, Obourg, cimenteries : 1 imm. de 1^{er} hiver (Fabien Ruyschaert *et al.* ; photos Fabien Ruyschaert arch. CH).

– 16 et 17 novembre 2009, Bernissart (H), marais d'Harchies : 1 juv. (basé sur www.observations.be ; photos).

– 27 novembre au 18 décembre 2009, Froidchapelle (H), lac de la Plate-Taille : 1 imm. de 1^{er} hiver (Alain



De Broyer *et al.* ; photo Alain De Broyer *in La Grièche* 18 : 2, Philippe Deflorenne *in La Grièche* 19 : 3).

– 4 décembre 2009 au 26 mars **2010**, Obourg (H), cimenterie : 1 juv. (basé sur www.observations.be ; photos).

– 15 au 18 décembre 2009, Hermalle-sous-Argenteau (Lg), gravières : 1 juv. (basé sur www.observations.be ; photos).

Le statut des différentes espèces de Plongeon (*Gavia* spp.) aux Barrages de l'Eau d'Heure a été récemment passé en revue par DEFLORENNE (2008).

Grèbe esclavon (80, 0-1-1)
(*Podiceps auritus*)

– 31 mai au 29 juin 2008, Waremme (Lg), bassins de décantation : 1 ad. en plumage nuptial (Pierre Loly *et al.* ; photo Bernard Bouckennooghe *in Aves* 46 : 81)

– 13 au 15 novembre 2009, Froidchapelle (H), lac de la Plate-Taille : 1 ex. en plumage d'hiver (Philippe Deflorenne, Véronique Adriaens *et al.* ; photo Philippe Deflorenne *in La Grièche* 18 : 3).

Fou de Bassan (8, 0-1-0)
(*Morus bassanus*)

– 13 octobre 2008, Spy (N), campagnes de Saucin : 1 juv. trouvé épuisé par un agriculteur dans son champ, déposé au CREAVES de La Hulpe le 15 octobre (Pierre Mathieu, Pierre Stassin ; photos Pierre Stassin arch. CH).

Bihoreau gris (-, 6-3-11)
(*Nycticorax nycticorax*)

– 5 juin au 8 septembre 2007, Hensies (H), marais d'Hensies : nidification ; jusqu'à 3 ad., 1 subad. et 1 juv. (Jérémy Simar, Dirk Verroken *et al.* ; photos Vincent Leirens *in La Grièche* 8 : 4, Marc Rocca *in Aves* 45 : 75, 80, Dirk et Luc Verroken arch. CH).

– 15 juillet 2007, Chimay (H), Virelles, étang : 1 ad. (Antoine Derouaux).

– 21 avril au 11 juillet 2008, Bernissart / Hensies (H), marais d'Harchies-Hensies : jusqu'à 2 ex. (1 ad., 1 imm. de 1^{er} été ; basé sur www.observations.be ; photos).

– 23 et 24 août 2008, Chimay (H), Virelles, étang : 1 juv. (photo Philippe Deflorennes *in La Grièche* 13 : 4).

– 16 avril au 8 octobre 2009, Bernissart / Hensies (H), marais d'Harchies-Hensies : nidification ; jusqu'à 7 ad. et 3 juv. (basé sur www.observations.be ; photos).

– 8 novembre 2009, Antheit (Lg), près d'une mare dans un jardin : 1 ad. (basé sur www.observations.be ; photos).

La majorité des mentions de cette espèce en Wallonie provient des marais d'Harchies/Hensies, qui abritent une héronnière mixte où le Bihoreau est récemment revenu nicher (voir JENARD *et al.*, 2008). À partir du 1^{er} janvier 2011, cette espèce n'est plus soumise à homologation.

Héron garde-boeufs (25, 3-3-13)
(*Bubulcus ibis*)

– 31 mars au 16 mai 2007, Hensies (H), marais d'Hensies : jusqu'à 3 ad. (Dirk Verroken *et al.* ; photos Dirk Verroken arch. CH).

– 9 avril au 28 décembre 2008, Harchies / Hensies (H), marais d'Harchies et d'Hensies : jusqu'à 3 ex. (Véronique Adriaens, Thibault Mariage, Patricia Deloyer, <http://www.observations.be>).

– 1 septembre 2008 au 2 janvier 2009, Cerfontaine (N), Soumoy / Silenrieux, barrages de l'Eau d'Heure : 1 juv. le 1 septembre ; 1 ad. et 1 juv. à partir du 11 novembre (basé sur www.observations.be ; DEFLORENNE, 2009 ; photos Philippe Deflorenne *in La Grièche* 14 : 26, 29, Bernard Hanus *in La Grièche* 14 : 27).

– 25 mars au 21 août 2009, Harchies / Hensies (H), marais d'Harchies et d'Hensies : nidification ; jusqu'à 11 ex. présents, 3 pulli en juin (basé sur www.observations.be ; photos).

À partir du 1^{er} janvier 2011, cette espèce n'est plus soumise à homologation.

Faucon kobez (90, 1-4-5)
(*Falco vespertinus*)

– 18 au 21 août 2007, Burdinne (Lg), plaine agricole au nord de Burdinne : 1 juv. (Axel Smets, Thibault Mariage *et al.* ; photos Jules Fouarge arch. CH).



Photo 6 – *Faucon kobez* / *Red-footed Falcon* *Falco vespertinus* (Marche-en-Famenne [Lx], 22-05-2008, photo : Alain De Broyer)



– 11 mai 2008, Libramont-Chevigny (Lx), Remagne : 1 fem. imm. de 1^{er} été (Yannic Giot, Benjamin Christophe).

– 14 mai 2008, Namêche (N) : 1 fem. (Xavier Vandevyvre).

– 14 mai 2008, Termes (Lx) : 1 fem. imm. de 1^{er} été (Rudi Dujardin ; photos Rudi Dujardin arch. CH).

– 21 et 22 mai 2008, Marche-en-Famenne (Lx), plateau du Gerny : 1 mâle imm. de 1^{er} été (Didier Vieuxtemps *et al.* ; photo Alain De Broyer arch. CH).

– 20 mai 2009, Ransart (H) : 1 mâle ad. et 1 fem. (Jacques Bultot ; photo Jacques Bultot arch. CH).

– 2 juin 2009, Mouscron (H) : 1 fem. imm. de 1^{er} été (Denis Devos ; photo Denis Devos arch. CH).

– 13 août 2009, Boneffe (N) / Folx-les-Caves (BW), plaine de Boneffe nord : 1 juv. (Thibault Mariage).

– 25 août 2009, Marche-en-Famenne (Lx), On : 1 juv. (Quentin Smits, Didier Vieuxtemps; photos Didier Vieuxtemps arch. CH)

ADDENDUM

– 1^{er} octobre **2001**, Plombières (Lg), Montzen : 1 juv. capturé et bagué (Hugues Defourny).

Le mois de mai 2008 a vu un afflux exceptionnel de cette espèce en Wallonie, avec au moins 17 mentions signalées. Malheureusement, la majorité d'entre elles n'ont pas été soumises à la CH.

Phalarope à bec large (6, 0-0-1) (*Phalaropus fulicarius*)

– 27 novembre 2009 au 3 décembre 2009, Hologne-sur-Geer (Lg), bassins de décantation : 1 ex. (Alain Jortay, Pierre Loly *et al.*; photos Philippe Vanmeerbeek *in Aves* 47 : 178, Charly Farinelle *in Aves* 47 : 236).

Labbe parasite (7, 1-0-0) (*Stercorarius parasiticus*)

– 13 septembre, au moins jusqu'au 10 octobre 2007, Bernissart (H), marais d'Harchies : 1 juv. (Luc Verroken *et al.* ; photos Philippe Vanmeerbeek).

Un jeune Labbe parasite trouvé au lac du Héron (Villeneuve d'Ascq, Nord, France) le 13 octobre 2007 (Jean-Pierre Prengarbe, Quentin Dupriez *et al.*) semble bien avoir été le même individu que celui d'Harchies. Cette mention a été homologuée par le CHR Nord – Pas-de-Calais (<http://www.gon.fr/GON/spip.php?rubrique107>).

Labbe indéterminé (*Stercorarius* sp.)



– 19 novembre 2007, Froidchapelle (H), lac de la Plate-Taille : 1 ad. ou subad. de forme sombre (Hugues Dufourny).

Cet oiseau, observé dans des conditions difficiles, avait été soumis comme Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*).

Mouette de Sabine (2, 1-0-0)
(*Xema sanini*)

– 5 et 6 novembre 2007, Bihain (Lx) : 1 juv. (Serge Rouxhet, André Lambotte; photos Serge Rouxhet arch. CH).

Goéland bourgmestre (10, 4-1-1)
(*Larus hyperboreus*)

– 27 au 31 mars 2007, Mont-Saint-Guibert (BW) : 1 imm. de 1^{er} été (Marc Fasol ; photos Marc Fasol arch. CH).

– 14, 17, 19, 23 et 29 novembre, 8 et 14 décembre 2007, Mont-Saint-Guibert (BW) : 1 imm. de 1^{er} hiver

(Bruno Nef *et al.* ; photos Bruno Marchal/asbl Plumalia in *Le Bruant Wallon* 1 : 9, Bruno Nef arch. CH).

– 17 novembre 2007, Genval (BW), au dortoir : 1 imm. de 1^{er} hiver (David Monticelli ; photos David Monticelli arch. CH).

– 20 décembre 2007 au 20 janvier 2008, barrages de l'Eau d'Heure (N) / (H) : 1 imm. de 1^{er} hiver (Hugues Dufourny *et al.* ; photo Véronique Buchet in *La Grièche* 10 : 13) ; 17 et 18 janvier 2008, Erpion (H) : 1 imm. de 1^{er} hiver (Bernard Hanus *et al.* ; photo Bernard Hanus in *La Grièche* 10 : 14).

– 26 décembre 2008 au 26 janvier 2009, barrages de l'Eau d'Heure (N) / (H) : 1 imm. de 2^e hiver (Philippe Deflorenne, Hugues Dufourny *et al.* ; photos Philippe Deflorenne et Bernard Hanus in *La Grièche* 15 : 12).

– 30 janvier 2009, Saint-Ghislain (H), Tertre : 1 imm. de 2^e hiver (basé sur www.observations.be ; photos).



Photo 7 – Phalarope à bec large / Grey Phalarope *Phalaropus fulicarius* (Hollogne-sur-Geer, 30-11-2009, photo : Alain De Broyer)



Toutes les photos de l'hiver 2007-2008 montrent des oiseaux très semblables, et pourraient concerner un seul individu. Il est aussi vraisemblable que les observations réalisées au cours des hivers 2007-2008 et 2008-2009 aux barrages de l'Eau d'Heure concernent le même oiseau, revenant hiverner sur le même site.

Guiffette moustac (141, 0-6-4)

– 13 mai 2008, Bernissart (H), marais d'Harchies : 3 ex. (Fabien Ruyschaert *et al.* ; photos Fabien Ruyschaert, Luc Verroken arch. CH).

– 28 et 29 mai 2008, Hensies (H), marais d'Hensies : 1 ad. (basé sur www.observations.be).

– 7 juin 2008, Éghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ex. (Damien Sevrin *et al.*).

– 5 juillet 2008, Bernissart / Hensies (H), marais d'Harchies et d'Hensies : 1 ex. (Thibault Mariage *et al.* ; photo Luc Verroken arch. CH).

– 16 avril 2009, Éghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; photos Philippe Vanmeerbeeck *in Aves* 47 : 55).

– 30 avril 2009, Éghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ex. (Thibault Mariage *et al.* ; photo Benjamin Christophe arch. CH).

– 8 mai 2009, Virton (Lx), Latour, étang : 2 ex. (basé sur www.observations.be ; photos).

– 23 et 24 mai 2009, Bernissart (H), Marais d'Harchies : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; photos).

Mergule nain (3, 1-0-0)

(*Alle alle*)

– novembre 2007, Masnuy-Saint-Jean (H) : 1 ex., soigné pendant quelques jours au CREAVES « Clos de l'Olivier », mort ensuite (Dr Jean-Pierre Wauty *et al.*).

La dernière mention wallonne homologuée remonte à 1987 !

Pipit à gorge rousse (37, 1-0-3)

(*Anthus cervinus*)

– 30 octobre 2007, Fosses-la-Ville (N) : 1 ex. (Alain De Broyer, Quentin Goffette).

– 7 mai 2009, Clavier (Lg), zone agricole au SE de Pair : 1 ad. en plumage nuptial (Damien Sevrin).

– 14 mai 2009, Matagne-la-Petite (N) : 1 ex. (Frédéric Van Hove, Alain De Broyer).

– 15 mai 2009, Piétrain / Saint-Jean-Geest (BW) : 1 ad. en plumage nuptial (Erwin Collaert; photo Erwin Collaerts *in Bruant Wallon* 5 : 19).

– 16 mai 2009, Mouscron (H), Luigne : 1 fem. ad. en plumage nuptial (Denis Devos, photo Denis Devos arch. CH).

Pipit maritime (2, 0-3-0)

(*Anthus petrosus*)

– 9 avril 2008, Bernissart (H), Pommeroeul, au bord du canal Pommeroeul-Condé : 1 ex. (Luc & Dirk Verroken ; photo Luc Verroken *in Aves* 46 : 32).

– 30 septembre 2008, Saint-Ghislain (H), au bord de la Haine, immédiatement au sud des Marionville : 2 imm. de 1^{er} hiver (Hugues Dufourny).

Phragmite aquatique (7, 0-1-1)

(*Acrocephalus paludicola*)

– 28 septembre 2008, Burg-Reuland (Lg), Aldringen : 1 juv. (Bruno Ghysenberghs, Raphaël Thunus *et al.* ; photo Guido Schutz arch. CH).

– 22 août 2008, Bernissart (H), Pommeroeul : 1 ad. capturé et bagué (11312290) (Alain Malengreau *et al.* ; photos Ph. Godart arch. CH).

Cisticole des joncs (14, 3-1-0)

(*Cisticola juncidis*)

– 18 avril au 10 juin 2007, Mouscron (H), zoning industriel de la Martinoire : 1 mâle chanteur et 1 fem., tentative de nidification présumée avortée (transport de nourriture vers le nid par les deux adulte, mais pas d'observations de jeunes à l'envol malgré recherches) (Christophe Gruwier ; photos Christophe Gruwier *in Aves* 45 : 53).

– 26 juillet au 12 août 2007, Malonne (N), Flawinne : 1 mâle chanteur (Quentin Goffette *et al.* ; photos Quentin Goffette arch. CH).



– 23 août 2008, Éghezée (N), Longchamps, bassins de décantation : 1 ex. (Damien Sevrin).

Fauvette épervière (30, 2-0-1)
(*Sylvia nisoria*)

– 31 août 2007, Amay (Lg), Flône : 1 imm. de 1^{er} hiver capturé et bagué (48V13110) (Pierre Loly *et al.* ; photo Marc Declercq arch. CH).

– 30 septembre 2007, Nodebais (BW) : 1 imm. de 1^{er} hiver capturé et bagué (Vincent Bulteau ; photo arch. CH).

– 12 septembre 2009, Nodebais (BW) : 1 imm. de 1^{er} hiver capturé et bagué (Vincent Bulteau ; photo arch. CH).

Pouillot à grands sourcils (17, 3-5-0)
(*Phylloscopus inornatus*)

– 4 octobre 2007, Ethe (Lx), Pré aux Faux : 1 ex. capturé et bagué (AD7853) (Gérard Michiels).

– 11 octobre 2007, Herve (Lg), Bolland : 1 ex. capturé et bagué (Jean-Paul Rapaille *et al.* ; photos Georges Grosjean arch. CH).

– 14 octobre 2007, Flémalle (Lg), Awirs, terriil du Hena : 1 ex. capturé et bagué (AI9049) (André Burnel *et al.* ; photos Pierre Duchesne arch. CH).

– 27 septembre 2008, Sourbrodt (Lg) : 1 ex. capturé et bagué (Émile Degros, Hugues Defourny *et al.* ; photos Hugues Defourny arch. CH).

– 9 octobre 2008, Tintigny (Lx), Breuvanne : 1 ex. (Rudi Dujardin, Marc Ameels ; photo Marc Ameels arch. CH).

– 11 octobre 2008, Ethe (Lx), route de Bleid : 1 ex. capturé et bagué (AK1688) (Gérard Michiels ; photos Gérard Michiels arch. CH).

– 18 octobre 2008, Watermael-Boitsfort (RBC), domaine des Silex : 1 ex. capturé et bagué (AJ7700) (Mario Ninanne *et al.* ; photos Alexis dall'Asta arch. CH).

– 20 octobre 2008, Watermael-Boitsfort (RBC), domaine des Silex : 1 ex. capturé et bagué (AJ7714) (Mario Ninanne *et al.* ; photos Alexis dall'Asta, arch. CH).

Linotte à bec jaune (-, 0-1-1)
(*Carduelis flavirostris*)

– 31 octobre 2008, Èthe (Lx), route de Bleid : 1 fem. imm. de 1^{er} année hiver capturée et baguée (11118246) (Gérard Michiels ; photos Gérard Michiels, arch. CH).

– 27 octobre 2009, Sommethonne (Lx) : 1 mâle capturé et bagué (11174323) (Joseph Trossard, Éric Dans *et al.* ; photos Gérard Michiels arch. CH).

Bruant des neiges (-, 3-1-2)
(*Plectrophenax nivalis*)

– 11 novembre 2007, Honnelles (H), Angre : 1 ex. (basé sur www.observations.be ; photo).

– 16 novembre 2007, Genappe, Houtain-le-Val (BW) : 3 ex. (Pierre Melon ; photos Pierre Melon arch. CH).

– 17 novembre 2007, Fagne de Malchamps (Lg) : 1 ex. (Michel Legrand ; photos Michel Legrand arch. CH).

– 28 novembre 2008, Rossignol (Lx) : 1 ex. (F. Jehenson *fade* Rudi Dujardin ; photos F. Jehenson arch. CH).

– 1^{er} mars 2009, Jamagne (N) 1 ex. (basé sur www.observations.be ; photo Véronique Buchet *in La Grièche* 16 : 20).

– 18 novembre 2009, Voroux-Goreux (Lg) : 1 fem. imm. de 1^{er} hiver (André Vandewer, André Burnel).

2.2. Mentions insuffisamment documentées

Faucon kobez (*Falco vespertinus*) : 2 mai 2007, Sibret (Lx), Virée-du-Renard, 1 mâle. Description insuffisante.

Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*) : 20 octobre 2007, Havinnes, 1 ex. Description insuffisante.

Pipit de Richard (*Anthus richardi*) : 31 octobre 2009, Havinnes, 1 ex. Description insuffisante.



Bibliographie

- ADRIAENS P. (2008) : Kumliens Meeuw bij Nieuwpoort. *Dutch Birding*, 30 : 63-65.
- AERC TAC (2003) : AERC TAC's Taxonomic Recommendations. Accessible en ligne sur <http://www.aerc.eu/tac.html>
- BECKERS G. (2008a) : Nieuw voor België : Audouin's Meeuw. *Natuur.oriolus*, 74 : 45-51.
- Beckers G. (2008b) : Audouins Meeuw in Belgisch-Nederlands Maasgebied. *Dutch Birding*, 30 : 210-211.
- BECKERS G., VANDERYDT C., VANGOMPEL S., RAYMAEKERS S., BERTRANDS J. (non daté) : *Zeldzame vogels in Limburg 2008. 2^e rapport*.
- VAN DEN BERG A.B., BOSMAN C. (1999) : *Zeldzame vogels van Nederland*. GMB Uitgeverij, Haarlem, Nederland.
- VAN DEN BERG A.B., HAAS M. (2009) : WP reports. *Dutch Birding*, 31 : 122-131.
- BEKAERT L. (2009) : Dikbekfuut bij Kluizen. *Dutch Birding* 31 : 76-77.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004) : *Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status*. BirdLife International Conservation Series, 12. Cambridge, UK.
- BURNEL A., FRAIPONT R., VANDEWER A. : Première mention du Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*) en Wallonie. *Aves*, 45 : 186-189.
- CRAMP S., SIMMONS K.E.L (EDS) (1988) : *Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic. Volume I : Ostrich to ducks*. Oxford University Press, Oxford London New York.
- CROCHET P.-A., RATY L., DE SMET G., ANDERSON B., BARTHEL P.H., COLLINSON J.M., DUBOIS P.J., HELBIG A.J., JIGUET F., JIRLE E., KNOX A.G., LE MARÉCHAL P., PARKIN D.T., PONS J.-M., ROSELAAR C.S., SVENSSON L., VAN LOON A.J., YÉSOU P. (2010) : *AERC TAC's Taxonomic Recommendations. July 2010*. Accessible en ligne sur <http://www.aerc.eu/tac.html>
- CROCHET P.-A., BARTHEL P.H., BAUER H.-G., VAN DEN BERG A.B., BEZZEL E., COLLINSON J.M., DIETZEN C., DUBOIS P.J., FROMHOLTZ J., HELBIG A.J. †, JIGUET F., JIRLE E., KNOX A.G., KRÜGER T., LE MARÉCHAL P., VAN LOON A.J., PÄCKERT M., PARKIN D.T., PONS J.-M., RATY L., ROSELAAR C.S., SANGSTER G., STEINHEIMER F.D., SVENSSON L., TYRBERG T., VOTIER S.C., YÉSOU P. (2011) : *AERC TAC's taxonomic recommendations : 2011 report*. Accessible en ligne sur <http://www.aerc.eu/tac.html>
- DEFLORENNE PH. (2007a) : Aux BEH observation exceptionnelle d'un... Goéland à ailes blanches adulte! *La Grièche*, 6 : 22 – 26.
- DEFLORENNE PH. (2007b) : Le Goéland de la Baltique (*Larus fuscus fuscus*) a répondu à l'appel... *La Grièche*, 8 : 34-38.
- DEFLORENNE PH. (2007c) : Emeute à Virelles... ou La présence d'un Vanneau sociable. *La Grièche*, 9 : 35-38.
- DEFLORENNE PH. (2007d) : Première mention wallonne du Goéland de la Baltique (*Larus fuscus fuscus*) aux Barrages de l'Eau d'Heure. Statut et aide à l'identification. *Aves*, 44 : 201-213.
- DEFLORENNE PH. (2008) : Les observations de plongeurs (*Gavia* sp.) aux Barrages de l'Eau d'Heure et dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. *La Grièche*, 10 : 24-30.
- DEFLORENNE PH. (2009) : Premières observations du Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*) dans le sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. *La Grièche* 14 : 26-31.
- DE SMET G. (non publié) : *Voorlopige lijst van Belgische vogels*.
- DIRKS E.M.E. (2007) : Dunbekmeeuw in Het Zwin. *Dutch Birding*, 29 : 198.
- DRIESENS G. (2009) : Onze eregast uit Canada : een Sneeuwuil *Bubo scandiaca*. *Natuur.oriolus*, 75 : 23-24.
- DUBOIS P. J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P. (2000) : *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de France métropolitaine*. Nathan / HER, Paris.



- EBELS E.B. (2007a) : Spectaculaire influx van Witvleugelsterns. *Dutch Birding*, 29 : 198-199.
- EBELS E.B. (2007b) : Succesvolle broedgevallen van Witvleugelstern in Krimpenerwaard en Sliedrechtse Biesbosch. *Dutch Birding*, 29 : 342-343.
- EBELS E.B., ADRIAENS P., DRIESSENS G. (2009) : Bruine Lijster in Erezée. *Dutch Birding*, 31 : 75-76.
- Elst J., Faveyts W., Spanoghe G., Vandegehuchte M., de leden van het BAHC (2010) : Zeldzame vogels in België in 2008. Zesendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.oriolus*, 76 : 43-50.
- FAVEYTS W., ELST J., DE LEDEN VAN HET BAHC (2011) : Zeldzame vogels in België in 2009. Zevenendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.oriolus*, 77 : 48-59.
- FAVEYTS W., DE SMET G. (2007) : Zeldzame roofvogels in Vlaanderen. *Natuur.oriolus*, 73 : 75-88.
- FERGUSON-LEES J., CHRISTIE D.A. (2001) : *Raptors of the World*. Helm, London.
- FLORE B.-O. (1997) : Die Korallenmöwe *Larus audouinii*, eine neue Art für Deutschland. *Limicola*, 11 : 281-285.
- FRASER P.A., ROGERS M.J., THE RARITIES COMMITTEE (2007) : Report on rare birds in Great Britain in 2005. Part I : non-passerines. *British Birds*, 100 : 16-61.
- GOFFART PH., VIEUXTEMPS D., DEROUAUX A. (2010) : Premier cas de nidification de la Locustelle fluviatile *Locustella fluviatilis* en Belgique. *Aves*, 47 : 65-73.
- HANUS B. (2008) : Première observation du Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*) en Wallonie. *La Grièche*, 13 : 26-29.
- HANUS B. (2009) : Première observation du Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*) en Wallonie. *Aves*, 46 : 94-96.
- HESSEL K. (2008a) : Nieuw voor België : Arendbuizerd *Buteo rufinus* te Doel (O). *Natuur.oriolus*, 74 : 150-152.
- HESSEL K. (2008b) : Arendbuizerd bij Doel. *Dutch Birding*, 30 : 450-452.
- Hoogendoorn W. (1995) : The Audouin's Gull in northern France. *Birding World*, 8 : 263-265.
- DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (EDS.) (1994) : *Handbook of the Birds of the World. Vol. 2 New World Vultures to Guineafowl*. Lynx Editions. Barcelona
- HUDSON N., THE RARITIES COMMITTEE (2010) : Report on rare birds in Great Britain in 2009. *British Birds*, 103 : 562-638.
- JACKSON P. (1997) : Pectoral Sandpiper. p. 278 in Hagemeyer W.J.M., Blair M.J. (eds) : *The EBCC atlas of European breeding birds : their distribution and abundance*. Poyser, London, UK.
- JANSSENS K. (2007) : Eerste Perzische Roodborst *Irania gutturalis* voor België in Sint-Laureins (O). *Natuur.oriolus*, 73 : 143.
- JENARD PH., LEIRENS V., ROCA M., VERROKEN D. ET L., SIMAR J. (2008) : Première nidification wallonne de l'Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) et retour du Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) au sein de la héronnière mixte du marais d'Harchies en 2006. *Aves*, 45 : 65-80.
- KAYSER Y., BLANCHON T. & GAUTHIER-CLERC M. (2009) : L'ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* nicheur régulier en Camargue. *Ornithos*, 16 : 404-406.
- KLAASSEN H.G., ALERSTAM T., CARLSSON P., FOX J.W., LINDSTRÖM Å. (2011) : Great flights by great snipes : long and fast non-stop migration over benign habitats. *Biol. Lett.*, doi : 10.1098/rsbl.2011.0343
- LAPPO E.G. (1998) : Mapping breeding range structure of tundra waders in Russia. *Intl. Wader Stud.*, 10 : 152-169.
- MARIAGE T., JACOB J.-P. (2008) : Afflux de Guifettes leucoptères (*Chlidonias leucopterus*) en Wallonie en mai 2007. *Aves*, 45 : 59-61.
- NYSTEN J. (2008) : Kleine Trap *Tetrax tetrax* te Korbeek-Dijle, een sfeerverslag. *Natuur.oriolus*, 74 : 55.
- OVAA A., VAN DER LAAN J., BERLIJN M., CDNA (2008) : Rare birds in the Netherlands in 2007. *Dutch Birding*, 30 : 369-389.



- OVAA A., GROENEDIJK D., BERLIJN M., CDNA (2009) : Rare birds in the Netherlands in 2008. *Dutch Birding*, 31 : 331-352.
- OVAA A., GROENEDIJK D., BERLIJN M., CDNA (2010) : Rare birds in the Netherlands in 2009. *Dutch Birding*, 32 : 363-383.
- RATY L., LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2005) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 1998 à 2003, seconde partie : Espèces soumises à homologation nationale. *Aves*, 41 : 165-208.
- RATY L. & LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2006) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 2004, seconde partie : Espèces soumises à homologation nationale. *Aves* 43 (3) : 189-198.
- RATY L., LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2010) : Rapport de la Commission d'Homologation. Année 2006. *Aves*, 47 : 153-165.
- VAN REE T. (2007) : Veldrietzanglers op Vlieland. *Dutch Birding* 29 : 343.
- RIJPMAN U., BAKKER A. (2006) : Perzische Roodborst bij Pietersbierum in oktober 2005. *Dutch Birding*, 28 : 302-304.
- ROBERFROID O. (2007) : Le Bruant zizi à Treignes. *La Grièche*, 8 : 27-28.
- DE RODER F.E. & BIJLSMA R. 2009. Broedgeval van Zearend *Haliaeetus albicilla* in de Oostvaardersplassen in 2010. *De Takkeling*, 18 : 192-196.
- SELOSSE N., LA COMMISSION D'HOMOLOGATION (2002) : Rapport de la Commission d'Homologation. Années 1996 et 1997. *Aves*, 38 : 127-157.
- TERORDE N., DEROUAUX A. (2009) : Séjour d'une Grive à ailes rousses (*Turdus eunomus*) à Erezée du 03 au 24 janvier 2009. *Aves*, 46 : 1-8.
- VANDEGEHUCHTE M., DE LEDEN VAN HET BAHC (2009) : Zeldzame vogels in België in 2007. Vijfendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.oriolus*, 75 : 113-121.
- VOOUS K. H. (1973) : List of Recent Holarctic Bird Species - Non-Passerines. *Ibis*, 115 : 612-638.
- VOOUS K. H. (1977a) : List of Recent Holarctic Bird Species - Passerines. *Ibis*, 118 : 223-250.
- VOOUS K. H. (1977b) : List of Recent Holarctic Bird Species - Passerines (Conclusion). *Ibis*, 118 : 376-405.
- WALKER D. (2004) : Audouin's Gull : new to Britain. *British Birds*, 90 : 537-541.
- WOLF P. (2003) : Audouins Meeuw op Neeltje Jans. *Dutch Birding*, 25 : 205-206.
- WYNN R.B., YÉSOU P. (2007) : The changing status of Balearic Shearwater in northwest European waters. *British Birds*, 100 : 392-406.

LAURENT RATY
Avenue de la Chapelle 38
B-1200 Bruxelles
l.raty@skynet.be
SECRETARIAT DE LA CH :
Suzanne Bonmarchand
Boulevard Lambert 128
B-1030 Bruxelles
Tél. +32 - 2/242 30 07
bonmarchand@skynet.be

SUMMARY – Report of the Rarities Committee. Years 2007-2009.

This combined report of both Belgian rarities committees (the Flemish BAHC and the French-speaking CH) deals with records of bird species subject to acceptance by the committees, either in the entire country, or outside the Flemish Region only, in 2007, 2008, and 2009. A few older records that had not yet been assessed by the committees are also included.

These years saw the first Belgian records of Pied-billed Grebe (*Podilymbus podiceps*), American Golden Plover (*Pluvialis dominica*), Audouin's Gull (*Larus audouinii*), Kumlien's Gull (*Larus glaucooides kumlienii*), White-throated Robin (*Irania gutturalis*), and Baltic Gull (*Larus fuscus fuscus*). Unprecedented influxes of Griffon Vulture (*Gyps fulvus*) and White-winged Tern (*Chlidonias leucopterus*), in 2007, are also covered in this report.